

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR TIVR LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## ditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## rmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## diologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## ééducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.


## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- 0 Réclamation : contact@mupras.com
- 0 Prise en charge : pec@mupras.com
- 0 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.



## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
30 Aout 2011			200,00	<p>Docteur Abdellatif BEN AMAR</p> <p>Medecine Générale</p> <p>Echographie</p> <p>155, Av. Afghanistan H.H</p> <p>Casablanca - Tél.: 05 22 30 33 90</p>

## EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
 REZKOUR Driss Docteur en Pharmacie	30/8/2021	355.20

## **ANALYSES - RADIOGRAPHIES**

## AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION

O.D.F  
PROTHESES DENTAIRES

## DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
00000000	00000000
35533411	11433553

### **[Création, remont, adjonction]**

**VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS**

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr. ABDELALI TLEMÇANI

MEDECINE GENERALE

Echographie

155, Avenue Afghanistan

Hay El Hassani - Casablanca

Tél. : 05.22.90.33.90

الدكتور عبد العالى التلمسانى

الطب العام

أمراض النساء و الرجال والأطفال

الفحص بالتلفزة

155، شارع أفغانستان

حي الحسني - الدار البيضاء

الهاتف: 05.22.90.33.90

٦٤

Casablanca, le

30 AOUT 2021

16.20

- Noghan en

$\frac{1}{4}$  g à m.d.



HARRATI DR. ISS

0  $\frac{1}{4}$

30/8/21  
2021

339.00  $\frac{1}{2}$  g le soin

- Soham en

$\frac{1}{2}$  g le soin

355.20



Docteur Abdellali TLEMÇANI  
Médecine Générale  
Echographie  
155, Av. Afghanistan H.H.  
Casablanca - Tél.: 05 22 90 33 90

المرجو إحضار الوصفة عند المراقبة

26/08/21



# NOZINAN® 25 mg

# NOZINAN® 100 mg

Lévomépromazine

comprimé pelliculé sécable

SANOFI

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre pharmacien.
- Ce médicament a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

## 1. QU'EST-CE QUE NOZINAN, comprimé pelliculé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : ANTIPSYCHOTIQUE - code ATC : N05AA02

Ce médicament appartient à une famille de médicaments appelés antipsychotiques. Il agit sur le cerveau.

Il est utilisé pour traiter une maladie caractérisée par des symptômes tels que le fait d'entendre, de voir ou de sentir des choses qui n'existent pas, d'avoir une suspicion inhabituelle, des croyances erronées, un discours et un comportement incohérents et un retrait affectif et social. Les personnes qui présentent cette maladie peuvent également se sentir déprimées, coupables, anxieuses ou tendues.

Ce médicament est réservé à l'adulte

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE NOZINAN, comprimé pelliculé sécable ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolerance à certains sures, contactez-le avant de prendre ce médicament.

### Ne prenez jamais NOZINAN, comprimé pelliculé sécable :

- Si vous êtes allergique à la substance active (la lévomépromazine) ou à l'un des composants contenus dans ce médicament. Vous trouverez la liste des composants à la rubrique 6.
- Si vous avez des difficultés à uriner.
- Si vous avez ou si vous risquez d'avoir un glaucome (une maladie touchant l'œil où la pression du liquide à l'intérieur de l'œil est augmentée et pouvant entraîner la vue).
- Si vous avez déjà eu dans le passé une chute importante du nombre de certains globules blancs dans le sang (granulocytose).
- Si vous prenez l'un des médicaments suivants :
  - la cabergoline, du quinagolide (médicaments utilisés pour traiter un écoulement abnormal de lait)
  - le citalopram et l'escitalopram (médicaments pour traiter l'anxiété ou la dépression)
  - l'hydroxyzine (un médicament utilisé pour traiter les manifestations mineures d'anxiété, en prémédication avant anesthésie générale, dans l'urticaire, ainsi que dans le traitement de certaines insomnies)
  - la pipéraquine (médicament pour traiter le paludisme, une maladie due à un parasite)
  - la dompéridone (médicament utilisé pour traiter les nausées et les vomissements)
  - Si vous êtes allergique au blé car ce médicament contient de l'amidon de blé.
- EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.
- Avertissements et précautions**
- Ce médicament contient un sucre, le lactose. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).
- Ce médicament peut être utilisé en cas de maladie coeliaque (difficulté d'absorption du gluten par l'intestin). En effet, ce médicament contient de l'amidon de blé (source de gluten), mais seulement à l'état de trace. Il est donc considéré comme sans danger si vous souffrez d'une maladie coeliaque.

Avant de prendre NOZINAN, comprimé pelliculé sécable, prévenez votre médecin :

- Si vous souffrez d'une maladie
- Si vous avez des facteurs de tension élevée, une quantité sang, ce médicament devra être arrêté (accident c
- Si vous avez une maladie c
- Si vous avez déjà fait des c
- Si votre prostate (glande produisant le sperme) a augmenté
- Si vous avez une constipation.

Ce médicament doit être utilisé avec précaution :

- chez les patients âgés atteints de démence,
- si vous ou quelqu'un de votre famille a été atteint de formation de caillots sanguins car la prise d'antipsychotiques a été associée à la formation de caillots sanguins.

Pendant le traitement

- Vous devez prévenir immédiatement votre médecin dans les cas suivants : - Si vous ressentez une rigidité de vos muscles, des troubles de la conscience et de la fièvre. Dans ce cas, vous devez arrêter immédiatement le traitement en plus de prévenir votre médecin.
- Si vous avez de la fièvre, une pâleur, une forte transpiration ou tout autre signe révélateur d'une infection. En effet, ce médicament peut provoquer dans des cas exceptionnels une chute de vos globules blancs ce qui favorise une infection.
- Si vous avez une constipation qui dure dans le temps, ainsi que des ballonnements et des douleurs dans le ventre. En effet, ce médicament peut provoquer, dans de très rares cas, un arrêt de votre transit (occlusion intestinale) et/ou une inflammation très grave de l'intestin qui peut aller jusqu'à une destruction localisée (nécrose).
- Afin de dépister un éventuel trouble du cœur, votre médecin pourra vous faire un examen pour enregistrer l'activité électrique du cœur (électrocardiogramme). En effet, certains médicaments de la même famille que NOZINAN (les antipsychotiques) peuvent, dans de très rares cas, provoquer des troubles du rythme du cœur (voir rubrique 4).
- Si vous êtes diabétique ou présentez des facteurs de risque de diabète, vous devrez surveiller très attentivement votre glycémie (taux de sucre dans le sang).

### Enfants et adolescents

Ce médicament est réservé à l'adulte.

### Autres médicaments et NOZINAN, comprimé pelliculé sécable

Vous ne devez jamais prendre NOZINAN en même temps que les médicaments suivants :

- la cabergoline, le quinagolide (médicaments utilisés pour traiter des montées de lait excessives ou anormales),
- des médicaments pouvant entraîner des troubles graves du rythme cardiaque tels que :
  - le citalopram et l'escitalopram (médicaments pour traiter l'anxiété ou la dépression),
  - l'hydroxyzine (médicament utilisé pour traiter les manifestations mineures d'anxiété, en prémédication avant anesthésie générale, dans l'urticaire, ainsi que dans le traitement de certaines insomnies),
  - la dompéridone (médicament utilisé pour traiter les nausées et les vomissements),
  - la pipéraquine (médicament pour traiter le paludisme).
- Vous devez éviter de prendre NOZINAN en même temps que :
  - un médicament pour traiter la maladie de Parkinson,
  - un médicament qui contient de l'alcool,
  - l'oxybate de sodium (médicament pour traiter la narcolepsie),
  - un médicament qui peut entraîner des troubles graves du rythme cardiaque :
  - des neuroleptiques (médicaments pour traiter certains troubles psychiatriques tels que l'amisulpride, la chlorpromazine, la cyamémazine, le dropéridol, la flupérazine, l'halopéridol, le pimozide, le pipaméprone, le pipotiazine, le sulpiride, le sultopride, le triapride, le fluépenthixol, le zuclopentixol),
  - des antiparasitaires (médicaments pour traiter les maladies dues aux parasites tels que la chloroquine, l'halofantrine, l'hydroxychloroquine, la luméfantrine, la pentamidine),
  - des antibiotiques (médicaments pour traiter des infections tels que l'érythromycine et la spiromycine administrés dans une veine, la moxifloxacine),
  - la mizolastine (médicament pour traiter une allergie),
  - des anticancéreux (médicaments pour traiter des cancers tels que le torémifène, l'arsénium, le vandetanib),
  - le dolasétron administré dans une veine (médicament utilisé chez l'adulte pour traiter ou prévenir des nausées et vomissements induits par certains traitements ou chirurgies),
  - la vincamine administrée dans une veine (médicament pour traiter certains troubles neurologiques mineurs liés au vieillissement),
  - le diphenamid (médicament pour traiter des troubles de la sécrétion gastrique, une transpiration excessive),

LOT : 21E002  
PER..03 2026

P.P.V : 16DH20



6 118000 060475

## NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

## Solian® 200 mg, comprimé pelliculé sécable

SANOFI 

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
  - Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
  - Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
  - Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

#### Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que Solian et dans quels cas est-il utilisé
  2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Solian
  3. Comment prendre Solian
  4. Quels sont les effets indésirables éventuels
  5. Comment conserver Solian
  6. Informations supplémentaires

## 1. QU'EST-CE QUE SOLIAN ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ

Solian appartient à une famille de médicaments appelés antipsychotiques. Ce médicament est utilisé pour traiter les personnes souffrant de schizophrénie. La schizophrénie est une maladie mentale caractérisée par certains troubles psychiques et du comportement, comme par exemple des hallucinations ou de l'agitation.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE SOLIAN

### Contre-indications :


Ne prenez jamais Solian

- Si vous êtes allergique à la substance active (l'amisulpride) ou à l'un des autres composants contenus dans Solian. Vous trouverez la liste des

- si vous souffrez de diabète ou si vous présentez des facteurs de risque de diabète

- si vous avez des antécédents d'hyperprolactine dans le sang) ou une t (hormone provoquant la sécrétion de i des troubles d'origine hypophysaire. surveiller étroitement pendant le traité Pendant le traitement, si vous présentez bles de la conscience, accompagnés immédiatement votre traitement et cons En cas de survenue d'une infection ou d'une fi. pour, votre médecin pourra être amené à vous faire pratiquer immédiatement un bilan sanguin. En effet, ce médicament peut provoquer une perturbation des éléments sanguins (diminution du nombre de globules blancs) mise en évidence sur les résultats d'une prise de sang (voir rubrique 4. « Quels sont les effets indésirables éventuels ? »).

Sanofi-aventis Maroc  
Route de Rabat -R.P. 11  
Ain sebaâ Casablanca  
SOLIAN 200mg, cp stc B 30  
PPV : 339,00 DH



6 118001 081271

## Utilisation chez l'enfant

- Ce médicament ne doit pas être utilisé chez l'enfant jusqu'à 15 ans.  
- L'utilisation de ce médicament n'est pas recommandée entre 15 et 18 ans. Ce médicament ne doit pas être arrêté brutalement car cela peut provoquer l'apparition d'un phénomène de sevrage. Celui-ci se caractérise par l'apparition de signes tels que insomnie, nausées, vomissements, mais on peut observer également des mouvements anormaux et la réapparition de troubles psychotiques.

#### Prise ou utilisation d'autres médicaments

**Vous ne devez jamais prendre** ce médicament avec la cabergoline, le quinagolide (médicaments utilisés dans les troubles de la lactation), le citalopram, l'escitalopram (médicaments pour traiter l'anxiété ou la dépression), la dompéridone (médicament pour traiter les nausées et les vomissements), l'hydroxyzine (médicament pour traiter l'anxiété ou l'urticaire).

**Vous devez éviter de prendre ce médicament avec :**

- certains médicaments utilisés dans le traitement de la maladie de Parkinson (amantadine, apomorphine, bromocriptine, entacapone, lisuride, pergolide, piribétil, pramipexole, rasagiline, ropinirole, rotigotine, sélegiline, tolcapone),
  - la lévodopa.