

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Educations :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Prothèses :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire, en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Déclaration : contact@mupras.com
Prendre en charge : pec@mupras.com
Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge
Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° M21- 0056696

☒ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 6947 Société : R.A.M

☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre : Retraité

Nom & Prénom : KHALADI Abdallah

Date de naissance : 22-2-56

Adresse : LOTISSIRI PASS 2 BERRECHID

Tél. : 0702344800 Total des frais engagés : 727,30 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : 15/7/2019

Nom et prénom du malade : BENNANI ZIATNI Amin Age : 46 ans

Lien de parenté : ☐ Lui-même ☒ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : palpitations + dyslipidémie

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casa Le : 15/7/2019

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
15/07/22	CS ECG	1	250,00	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Pharmacie ALFAO 1.3.5 Rue N. Abou Madi - BEBRECHID - Tel: 0522 33 64 01	15/07/22	477,30

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX


Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE H 25533412 00000000 D 21433552 00000000 G 00000000 35533411 B			COEFFICIENT DES TRAVAUX
	(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EX

Dr. KHADRE MOHAMED FOUAD

Cardiologue

Lauréat de la faculté de médecine de Casablanca

Ancien Médecin à l'hôpital Cheikh Khalifa de Casablanca

Ancien Médecin praticien à Klinikum Lüdenscheid Allemagne

Diplômé en Echocardiographie Doppler de l'université Bordeaux II



د. خضر محمد فؤاد

أخصائي أمراض القلب والشرابيين

خريج كلية الطب بالدار البيضاء

طبيب سابق بمستشفى الشيخ خليفة بالدار البيضاء

طبيب سابق بمستشفى لودنشايد بألمانيا

حاصل على شهادة الفحص بالصدك من جامعة بوردو بفرنسا

Ordonnance

Berrechid, le :

Berrechid le : **15 juillet 2021**

Mme BENNANI ZIATNI AMINA

TOPFORCE

1 gel/J matin

KALMANER

1 gel X 2 /J pdt 10 jours

Puis 1 gel /J le soir

STREMAG

1 gel /J le soir

FERPLEX

1 AMPX2/J pdt 1 mois

Puis 1 AMP/J le soir

ROSUVAS SUN 10MG

1 Cp/j le soir

D3 NORM

20 gouttes/J le soir

477,30

60,00 x 12.

17,80 x 3

79,50 x 3.



Traitement pendant : 3 Mois

FERPLEX 40 mg

Fer protein succinylate

Boîte de 10 Falcons buvables

PPV 60,00 Dhs



6 118001 440016

تم

مل

تناول أو استع

إذا كنت تأخذ

الحصول عليها

• مضادات حي

• إذا كنت تأخذ

البيوفسفونات.

• البيبسيلامين عند استعمالها لالتهاب المفاصل (التهاب المفاصل).

• الفاسيتيل دوبايتستعمل لعلاج ارتفاع ضغط الدم.

• تيروكسين يستعمل لعلاج نقص إفراز الدرقية (الغدة الدرقية قليلة

النشاط).

• لوفويو و كاريديوبا يستعمل لعلاج مرض الشلل الرعاشي.

• ميكوفينولات موفيتيل يستعمل للوقاية لرفض زرع الأعضاء أو الأنسجة.

• انخفاض الإمتصاص المعوي للحديد وكذلك فعالية فيريلكس 40 ملغ

محلول لشرب في حالة أخذه مع الأدوية المذكورة أدناه لا بد من الفصل

بين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب و الأدوية التالية مدة لا تقل عن

ساعتين قبل تناول :

• مضادات الحموضة تستعمل عادة عند المرضى الذين يعانون من

حموضة المعدة.

• كلورامفينيكول (مضاد حيوي)

• الكوليسترامين يستعمل عند المرضى الذين يعانون من قرح

الكوليسترول في الدم.

• أدوية لعلاج القرحة المعوية أو الجزر المعدي المريئي مثل أوميبرازول

لنزوبرازول و بانتوبيرازول.

• مخاطر التداخل في الاختبارات التشخيصية :

• هذا الدواء قد يتداخل مع الفحوصات المختبرية للبحث عن الدم الخفي

في البراز.

تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب مع الأغذية والمشروبات :

بعض الأغذية النباتية و الحليب و القهوة و الشاي تخفف امتصاص

الحديد، لذلك من الضروري يجب أخذ فيريلكس 40 ملغ عن مدة لا تقل

عن ساعتين عند تناول هذه الأغذية أو عند تناول هذه الأخيرة يجب

الانتظار ساعتين قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ.

• زيادة امتصاص مشتقات الحديد بعد تناول عصير الحمضيات

(البرتقال، الليمون وغيرها) الطازج.

الحمل والرضاعة :

• إستهتر طبيبك أو الصيدلاني قبل أخذ أي دواء.

• يؤخذ فيريلكس خلال فترة الحمل والرضاعة لعلاج نقص الحديد، ليس

هناك احتياطات خاصة يجب اتخاذها.

القيادة واستعمال الآلات :

• لم يلاحظ أي آثار على قدرة السيادة واستعمال الآلات.

معلومة هامة حول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :

هذا الدواء يحتوي على سريترول، إذا كنت تعاني من عدم تحمل السكريات

نشرة :

فيريلكس 40 ملغ

بروتين سينسيلات الحديد

الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء.

• حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.

• إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات

من طبيبك أو الصيدلاني.

• هذا الدواء، تم وصفه إليك شخصيا. لا تناوله شخصا آخر أبدا ولو

في وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك.

• في حالة تفاقم بعض الأعراض الجانبية أو إذا لاحظت آثارا جانبية غير

مدرج في هذه النشرة، اطلب طبيبك أو الصيدلاني عليه.

فهرس النشرة :

1. ما هو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب

استعماله.

2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ

محلول لشرب.

3. كيفية استعمال فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.

4. ما هي التأثيرات الجانبية المحتملة.

5. كيف يتم تخزين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.

6. معلومات إضافية.

1. **ما هو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب**

استعماله :

المجموعة الصيدلانية العلاجية مضاد لفقر الدم/الحديد.

فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب هو الدواء الذي يوفر الحديد في كريات

الدم الحمراء، لمعالجة نقص الحديد ولعلاج فقر الدم (انخفاض مستوى

هيموغلوبين وعدد وقياس الكريات الحمراء) بسبب نقص الحديد.

2. **ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40**

ملغ محلول لشرب :

لا يجب تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب في الحالات

التالية :

• إذا كانت لديك حساسية (حساسية مفرطة) لبروتين سينسيلات

الحديد أو أحد مكونات هذا الدواء.

• إذا كانت لديك حساسية من بروتينات الحليب.

• إذا كنت تعاني من مرض يؤدي إلى تراكم الحديد في الجسم (داء

هيموسيديريني وداء ترسب الأصبغة الدموية).

• إذا كنت تعاني من التهاب البنكرياس (التهاب البنكرياس) أو تشمع

الكبد (مرض كبدي مزمن يتميز بتشكيل آفات ليفية أو "ندوب" في

أنسجة الكبد وغير بنيتها وفعاليتها العادية) بسبب تراكم الحديد.

التحذيرات الخاصة لفيريلكس 40 ملغ :

• في حالة نقص الحديد أو فقر الدم، استشر طبيبك قبل أن تأخذ هذا الدواء.

FERPLEX 40 mg

Fer protein succinylate

Boîte de 10 Falcons buvables

PPV 60,00 Dhs



6 118001 440016

تناول أو استعمل

إذا كنت تأخذ

الحصول عليها

• مضادات حيوية

• إذا كنت تأخذ

البيوسفونات.

• البيبسيلامين عند استعمالها لالتهاب المفاصل (التهاب المفاصل).

• الفاسيتيل دوبايتستعمل لعلاج ارتفاع ضغط الدم.

• تيروكسين يستعمل لعلاج نقص إفراز الدرقية (الغدة الدرقية قليلة النشاط).

• لوفويو و كاريديوبا يستعمل لعلاج مرض الشلل الرعاشي.

• ميكوفينولات موفيتيل يستعمل للوقاية لرفض زرع الأعضاء والأنسجة.

• انخفاض الإنمصاص المعوي للحديد وكذلك فعالية فيريلكس 40 ملغ

محلول لشرب في حالة أخذه مع الأدوية المذكورة أدناه لا بد من الفصل

بين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب والأدوية التالية مدة لا تقل عن

ساعتين قبل تناول :

• مضادات الحموضة تستعمل عادة عند المرضى الذين يعانون من

حموضة المعدة.

• كلورامفينيكول (مضاد حيوي)

• الكوليسترامين يستعمل عند المرضى الذين يعانون من قرح

الكوليسترول في الدم.

• أدوية لعلاج القرحة المعوية أو الجزر المعدي المريئي مثل أوميبرازول

لنزوبرازول وپانتوپرازول.

• مخاطر التداخل في الاختبارات التشخيصية :

• هذا الدواء قد يتداخل مع الفحوصات المختبرية للبحث عن الدم الخفي

في البراز.

تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب مع الأغذية والمشروبات :

بعض الأغذية النباتية والحليب والقهوة والشاي تخفف امتصاص

الحديد، لذلك من الضروري يجب أخذ فيريلكس 40 ملغ عن مدة لا تقل

عن ساعتين عند تناول هذه الأغذية أو عند تناول هذه الأخيرة يجب

الانتظار ساعتين قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ.

زيادة امتصاص مشتقات الحديد بعد تناول عصير الحمضيات

(البرتقال، الليمون وغيرها) الطازج.

الحمل والرضاعة :

إستشر طبيبك أو الصيدلاني قبل أخذ أي دواء.

يؤخذ فيريلكس خلال فترة الحمل والرضاعة لعلاج نقص الحديد، ليس

هناك احتياطات خاصة يجب اتخاذها.

القيادة واستعمال الآلات :

لم يلاحظ أي آثار على قدرة السيادة واستعمال الآلات.

معلومة هامة حول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :

هذا الدواء يحتوي على سريولول إذا كنت تعاني من عدم تحمل السكريات

نشرة :

فيريلكس 40 ملغ

بروتين سينسيلات الحديد

الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء.

• حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.

• إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات

من طبيبك أو الصيدلاني.

• هذا الدواء تم وصفه إليك شخصيا. لا تناوله شخصا آخر أبدا ولو

في وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك.

• في حالة تفاقم بعض الأعراض الجانبية أو إذا لاحظت آثارا جانبية غير

مدرج في هذه النشرة، اطلب طبيبك أو الصيدلاني عليه.

فهرس النشرة :

1. ما هو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب

استعماله.

2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ

محلول لشرب.

3. كيفية استعمال فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.

4. ما هي التأثيرات الجانبية المحتملة.

5. كيف يتم تخزين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.

6. معلومات إضافية.

1. ما هو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب

استعماله :

المجموعة الصيدلانية العلاجية مضاد لفقر الدم/الحديد.

فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب هو الدواء الذي يوفر الحديد في كريات

الدم الحمراء لمعالجة نقص الحديد ولعلاج فقر الدم (انخفاض مستوى

هيموغلوبين وعدد وقياس الكريات الحمراء) بسبب نقص الحديد.

2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40

ملغ محلول لشرب :

لا يجب تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب في الحالات

التالية :

• إذا كانت لديك حساسية (حساسية مفرطة) لبروتين سينسيلات

الحديد أو أحد مكونات هذا الدواء.

• إذا كانت لديك حساسية من بروتينات الحليب.

• إذا كنت تعاني من مرض يؤدي إلى تراكم الحديد في الجسم (داء

هيموسيديريئي وداء ترسب الأصبغة الدموية).

• إذا كنت تعاني من التهاب البنكرياس (التهاب البنكرياس) أو تشمع

الكبد (مرض كبدي مزمن يتميز بتشكيل آفات ليفية أو "ندوب" في

أنسجة الكبد وبغير بنيته وفعاليتها العادية) بسبب تراكم الحديد.

التحذيرات الخاصة لفيريلكس 40 ملغ :

• في حالة نقص الحديد أو فقر الدم استشر طبيبك قبل أن تأخذ هذا الدواء.

FERPLEX 40 mg

Fer protein succinylate

Boîte de 10 Falcons buvables

PPV 60,00 Dhs



6 118001 440016

تناول أو استعمل

إذا كنت تأخذ

الحصول عليها

• مضادات حيوية

• إذا كنت تأخذ

البيوسفونات.

• البيبسيلامين عند استعمالها لالتهاب المفاصل (التهاب المفاصل).

• الفاسيتيل دوبايتستعمل لعلاج ارتفاع ضغط الدم.

• تيروكسين يستعمل لعلاج نقص إفراز الدرقية (الغدة الدرقية قليلة النشاط).

• لوفويو و كاريديوبا يستعمل لعلاج مرض الشلل الرعاشي.

• ميكوفينولات موفيتيل يستعمل للوقاية لرفض زرع الأعضاء والأنسجة.

• انخفاض الإنمصاص المعوي للحديد وكذلك فعالية فيريلكس 40 ملغ

محلول لشرب في حالة أخذه مع الأدوية المذكورة أدناه لا بد من الفصل

بين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب والأدوية التالية مدة لا تقل عن

ساعتين قبل تناول :

• مضادات الحموضة تستعمل عادة عند المرضى الذين يعانون من

حموضة المعدة.

• كلورامفينيكول (مضاد حيوي)

• الكوليسترامين يستعمل عند المرضى الذين يعانون من قرح

الكوليسترول في الدم.

• أدوية لعلاج القرحة المعوية أو الجزر المعدي المريئي مثل أوميبرازول

لنزوبرازول وپانتوپرازول.

• مخاطر التداخل في الاختبارات التشخيصية :

• هذا الدواء قد يتداخل مع الفحوصات المختبرية للبحث عن الدم الخفي

في البراز.

تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب مع الأغذية والمشروبات :

بعض الأغذية النباتية والحليب والقهوة والشاي تخفف امتصاص

الحديد، لذلك من الضروري يجب أخذ فيريلكس 40 ملغ عن مدة لا تقل

عن ساعتين عند تناول هذه الأغذية أو عند تناول هذه الأخيرة يجب

الانتظار ساعتين قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ.

زيادة امتصاص مشتقات الحديد بعد تناول عصير الحمضيات

(البرتقال، الليمون وغيرها) الطازج.

الحمل والرضاعة :

إستشر طبيبك أو الصيدلاني قبل أخذ أي دواء.

يؤخذ فيريلكس خلال فترة الحمل والرضاعة لعلاج نقص الحديد، ليس

هناك احتياطات خاصة يجب اتخاذها.

القيادة واستعمال الآلات :

لم يلاحظ أي آثار على قدرة السيادة واستعمال الآلات.

معلومة هامة حول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :

هذا الدواء يحتوي على سريترول، إذا كنت تعاني من عدم تحمل السكريات

نشرة :

فيريلكس 40 ملغ

بروتين سينسيلات الحديد

الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء.

• حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.

• إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات

من طبيبك أو الصيدلاني.

• هذا الدواء تم وصفه إليك شخصيا. لا تناوله شخصا آخر أبدا ولو

في وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك.

• في حالة تفاقم بعض الأعراض الجانبية أو إذا لاحظت آثارا جانبية غير

مدرج في هذه النشرة، اطلب طبيبك أو الصيدلاني عليه.

فهرس النشرة :

1. ما هو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب

استعماله.

2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ

محلول لشرب.

3. كيفية استعمال فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.

4. ما هي التأثيرات الجانبية المحتملة.

5. كيف يتم تخزين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.

6. معلومات إضافية.

1. **ما هو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب**

استعماله :

المجموعة الصيدلانية العلاجية مضاد لفقر الدم/الحديد.

فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب هو الدواء الذي يوفر الحديد في كريات

الدم الحمراء، لمعالجة نقص الحديد ولعلاج فقر الدم (انخفاض مستوى

هيموغلوبين وعدد وقياس الكريات الحمراء) بسبب نقص الحديد.

2. **ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40**

ملغ محلول لشرب :

لا يجب تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب في الحالات

التالية :

• إذا كانت لديك حساسية (حساسية مفرطة) لبروتين سينسيلات

الحديد أو أحد مكونات هذا الدواء.

• إذا كانت لديك حساسية من بروتينات الحليب.

• إذا كنت تعاني من مرض يؤدي إلى تراكم الحديد في الجسم (داء

هيموسيديريئي وداء ترسب الأصبغة الدموية).

• إذا كنت تعاني من التهاب البنكرياس (التهاب البنكرياس) أو تشمع

الكبد (مرض كبدي مزمن يتميز بتشكيل آفات ليفية أو "ندوب" في

أنسجة الكبد وبغير بنيته وفعاليتها العادية) بسبب تراكم الحديد.

التحذيرات الخاصة لفيريلكس 40 ملغ :

• في حالة نقص الحديد أو فقر الدم، استشر طبيبك قبل أن تأخذ هذا الدواء.

FERPLEX 40 mg

Fer protein succinylate

Boîte de 10 Falcons buvables

PPV 60,00 Dhs



6 118001 440016

تم
مل

تناول أو استع

إذا كنت تأخذ
الحصول عليها
• مضادات حيوي
• إذا كنت تأخذ
البيوفسفونات.

• البيبسيلاامين عند استعمالها لالتهاب المفاصل (التهاب المفاصل).
• الفاسميتيل دوبايتستعمل لعلاج ارتفاع ضغط الدم.
• تيروكسين يستعمل لعلاج نقص إفراز الدرقية (الغدة الدرقية قليلة النشاط).
• لوفويو و كاريديوبا يستعمل لعلاج مرض الشلل الرعاشي.
• ميكوفينولات موفيتيل يستعمل للوقاية لرفض زرع الأعضاء أو الأنسجة.
• انخفاض الإنمصاص المعوي للحديد وكذلك فعالية فيريلكس 40 ملغ
محلول لشرب في حالة أخذه مع الأدوية المذكورة أدناه لا بد من الفصل
بين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب و الأدوية التالية مدة لا تقل عن
ساعتين قبل تناول :

• مضادات الحموضة تستعمل عادة عند المرضى الذين يعانون من
حموضة المعدة.
• كلورامفينيكول (مضاد حيوي)
• الكوليسترامين يستعمل عند المرضى الذين يعانون من قرح
الكوليسترول في الدم.
• أدوية لعلاج القرحة المعوية أو الجزر المعدي المريئي مثل أوميبرازول
لنزوبرازول و بانتوبيرازول.
مخاطر التداخل في الاختبارات التشخيصية :
• هذا الدواء قد يتداخل مع الفحوصات المختبرية للبحث عن الدم الخفي
في البراز.

تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب مع الأغذية والمشروبات :
بعض الأغذية النباتية و الحليب و القهوة و الشاي تخفف امتصاص
الحديد، لذلك من الضروري يجب أخذ فيريلكس 40 ملغ عن مدة لا تقل
عن ساعتين عند تناول هذه الأغذية أو عند تناول هذه الأخيرة يجب
الانتظار ساعتين قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ.
زيادة امتصاص مشتقات الحديد بعد تناول عصير الحمضيات
(البرتقال، الليمون وغيرها) الطازج.

الحمل والرضاعة :

إستشر طبيبك أو الصيدلاني قبل أخذ أي دواء.
يؤخذ فيريلكس خلال فترة الحمل والرضاعة لعلاج نقص الحديد، ليس
هناك احتياطات خاصة يجب اتخاذها.

القيادة واستعمال الآلات :

لم يلاحظ أي آثار على قدرة السيادة واستعمال الآلات.

معلومة هامة حول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :

هذا الدواء يحتوي على سريترول، إذا كنت تعاني من عدم تحمل السكريات،

نشرة :

فيريلكس 40 ملغ بروتين سينسيلات الحديد

الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء.
• حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
• إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات
من طبيبك أو الصيدلاني.
• هذا الدواء تم وصفه إليك شخصيا. لا تناوله شخصا آخر أبدا ولو
في وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك.
• في حالة تفاقم بعض الأعراض الجانبية أو إذا لاحظت آثارا جانبية غير
مدرج في هذه النشرة، اطلب طبيبك أو الصيدلاني عليه.

فهرس النشرة :

1. ما هو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله.
2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.
3. كيفية استعمال فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.
4. ما هي التأثيرات الجانبية المحتملة.
5. كيف يتم تخزين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.
6. معلومات إضافية.

1. ما هو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله :

المجموعة الصيدلانية العلاجية مضاد لفقر الدم/الحديد.
فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب هو الدواء الذي يوفر الحديد في كريات
الدم الحمراء، لمعالجة نقص الحديد ولعلاج فقر الدم (انخفاض مستوى
هيموغلوبين وعدد وقياس الكريات الحمراء) بسبب نقص الحديد.

2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :

لا يجب تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب في الحالات التالية :

- إذا كانت لديك حساسية (حساسية مفرطة) لبروتين سينسيلات الحديد أو أحد مكونات هذا الدواء.
- إذا كانت لديك حساسية من بروتينات الحليب.
- إذا كنت تعاني من مرض يؤدي إلى تراكم الحديد في الجسم (داء هيموسيديريتي و داء ترسب الأصبغة الدموية).
- إذا كنت تعاني من التهاب البنكرياس (التهاب البنكرياس) أو تشمع الكبد (مرض كبدي مزمن يتميز بتشكيل آفات ليفية أو "ندوب" في أنسجة الكبد وغيور بنيته وفعاليتها العادية) بسبب تراكم الحديد.

التحذيرات الخاصة لفيريلكس 40 ملغ :

• في حالة نقص الحديد أو فقر الدم، استشر طبيبك قبل أن تأخذ هذا الدواء.

FERPLEX 40 mg

Fer protein succinylate

Boîte de 10 Falcons buvables

PPV 60,00 Dhs



6 118001 440016

تناول أو استعمل

إذا كنت تأخذ

الحصول عليها

• مضادات حيوية

• إذا كنت تأخذ

البيوفوسفونات.

• البيبسيلامين عند استعمالها لالتهاب المفاصل (التهاب المفاصل).

• الفاسيتيل دوبايتستعمل لعلاج ارتفاع ضغط الدم.

• تيروكسين يستعمل لعلاج نقص إفراز الدرقية (الغدة الدرقية قليلة النشاط).

• لوفويو و كاريديوبا يستعمل لعلاج مرض الشلل الرعاشي.

• ميكوفينولات موفيتيل يستعمل للوقاية لرفض زرع الأعضاء والأنسجة.

• انخفاض الإنمصاص المعوي للحديد وكذلك فعالية فيريلكس 40 ملغ

محلول لشرب في حالة أخذه مع الأدوية المذكورة أدناه لا بد من الفصل

بين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب والأدوية التالية مدة لا تقل عن

ساعتين قبل تناول :

• مضادات الحموضة تستعمل عادة عند المرضى الذين يعانون من

حموضة المعدة.

• كلورامفينيكول (مضاد حيوي)

• الكوليسترامين يستعمل عند المرضى الذين يعانون من قرح

الكوليسترول في الدم.

• أدوية لعلاج القرحة المعوية أو الجزر المعدي المريئي مثل أوميبرازول

لنزوبرازول وبيانتوبرازول.

• مخاطر التداخل في الاختبارات التشخيصية :

• هذا الدواء قد يتداخل مع الفحوصات المختبرية للبحث عن الدم الخفي

في البراز.

تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب مع الأغذية والمشروبات :

بعض الأغذية النباتية والحليب والقهوة والشاي تخفف امتصاص

الحديد، لذلك من الضروري يجب أخذ فيريلكس 40 ملغ عن مدة لا تقل

عن ساعتين عند تناول هذه الأغذية أو عند تناول هذه الأخيرة يجب

الانتظار ساعتين قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ.

زيادة امتصاص مشتقات الحديد بعد تناول عصير الحمضيات

(البرتقال، الليمون وغيرها) الطازج.

الحمل والرضاعة :

إستشر طبيبك أو الصيدلاني قبل أخذ أي دواء.

يؤخذ فيريلكس خلال فترة الحمل والرضاعة لعلاج نقص الحديد، ليس

هناك احتياطات خاصة يجب اتخاذها.

القيادة واستعمال الآلات :

لم يلاحظ أي آثار على قدرة السيادة واستعمال الآلات.

معلومة هامة حول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :

هذا الدواء يحتوي على سريترول إذا كنت تعاني من عدم تحمل السكريات

نشرة :

فيريلكس 40 ملغ

بروتين سينسيلات الحديد

الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء.

• حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.

• إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات

من طبيبك أو الصيدلاني.

• هذا الدواء تم وصفه إليك شخصيا. لا تناوله شخصا آخر أبدا ولو

في وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك.

• في حالة تفاقم بعض الأعراض الجانبية أو إذا لاحظت آثارا جانبية غير

مدرج في هذه النشرة، اطلب طبيبك أو الصيدلاني عليه.

فهرس النشرة :

1. ما هو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب

استعماله.

2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ

محلول لشرب.

3. كيفية استعمال فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.

4. ما هي التأثيرات الجانبية المحتملة.

5. كيف يتم تخزين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.

6. معلومات إضافية.

1. ما هو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب

استعماله :

المجموعة الصيدلانية العلاجية مضاد لفقر الدم/الحديد.

فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب هو الدواء الذي يوفر الحديد في كريات

الدم الحمراء لمعالجة نقص الحديد ولعلاج فقر الدم (انخفاض مستوى

هيموغلوبين وعدد وقياس الكريات الحمراء) بسبب نقص الحديد.

2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40

ملغ محلول لشرب :

لا يجب تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب في الحالات

التالية :

• إذا كانت لديك حساسية (حساسية مفرطة) لبروتين سينسيلات

الحديد أو أحد مكونات هذا الدواء.

• إذا كانت لديك حساسية من بروتينات الحليب.

• إذا كنت تعاني من مرض يؤدي إلى تراكم الحديد في الجسم (داء

هيموسيديريني وداء ترسب الأصبغة الدموية).

• إذا كنت تعاني من التهاب البنكرياس (التهاب البنكرياس) أو تشمع

الكبد (مرض كبدي مزمن يتميز بتشكيل آفات ليفية أو "ندوب" في

أنسجة الكبد وبغير بنيته وفعاليتها العادية) بسبب تراكم الحديد.

التحذيرات الخاصة لفيريلكس 40 ملغ :

• في حالة نقص الحديد أو فقر الدم استشر طبيبك قبل أن تأخذ هذا الدواء.

FERPLEX 40 mg

Fer protein succinylate

Boîte de 10 Falcons buvables

PPV 60,00 Dhs



6 118001 440016

تناول أو استع

إذا كنت تأخذ

الحصول عليها

• مضادات حي

• إذا كنت تأخذ

البيوسفونات.

• البيبسيلامين عند استعمالها لالتهاب المفاصل (التهاب المفاصل).

• الفاسيتيل دوبايتستعمل لعلاج ارتفاع ضغط الدم.

• تيروكسين يستعمل لعلاج نقص إفراز الدرقية (الغدة الدرقية قليلة

النشاط).

• لوفويو و كاريديوبا يستعمل لعلاج مرض الشلل الرعاشي.

• ميكوفينولات موفيتيل يستعمل للوقاية لرفض زرع الأعضاء أو الأنسجة.

• انخفاض الإنمصاص المعوي للحديد وكذلك فعالية فيريلكس 40 ملغ

محلول لشرب في حالة أخذه مع الأدوية المذكورة أدناه لا بد من الفصل

بين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب و الأدوية التالية مدة لا تقل عن

ساعتين قبل تناول :

• مضادات الحموضة تستعمل عادة عند المرضى الذين يعانون من

حموضة المعدة.

• كلورامفينيكول (مضاد حيوي)

• الكوليسترامين يستعمل عند المرضى الذين يعانون من قرح

الكوليسترول في الدم.

• أدوية لعلاج القرحة المعوية أو الجزر المعدي المريئي مثل أوميبرازول

لنزوبرازول و بانتوبيرازول.

• مخاطر التداخل في الاختبارات التشخيصية :

• هذا الدواء قد يتداخل مع الفحوصات المختبرية للبحث عن الدم الخفي

في البراز.

تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب مع الأغذية والمشروبات :

بعض الأغذية النباتية و الحليب و القهوة و الشاي تخفف امتصاص

الحديد، لذلك من الضروري يجب أخذ فيريلكس 40 ملغ عن مدة لا تقل

عن ساعتين عند تناول هذه الأغذية أو عند تناول هذه الأخيرة يجب

الانتظار ساعتين قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ.

• زيادة امتصاص مشتقات الحديد بعد تناول عصير الحمضيات

(البرتقال، الليمون وغيرها) الطازج.

الحمل والرضاعة :

• إنشتر طبيبك أو الصيدلاني قبل أخذ أي دواء.

• يؤخذ فيريلكس خلال فترة الحمل والرضاعة لعلاج نقص الحديد، ليس

هناك احتياطات خاصة يجب اتخاذها.

القيادة واستعمال الآلات :

• لم يلاحظ أي آثار على قدرة السيادة واستعمال الآلات.

معلومة هامة حول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :

• هذا الدواء يحتوي على سريولول إذا كنت تعاني من عدم تحمل السكريات

نشرة :

فيريلكس 40 ملغ

بروتين سينسيلات الحديد

الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء.

• حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.

• إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات

من طبيبك أو الصيدلاني.

• هذا الدواء تم وصفه إليك شخصيا. لا تناوله شخصا آخر أبدا ولو

في وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك.

• في حالة تفاقم بعض الأعراض الجانبية أو إذا لاحظت آثارا جانبية غير

مدرج في هذه النشرة، اطلب طبيبك أو الصيدلاني عليه.

فهرس النشرة :

1. ما هو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب

استعماله.

2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ

محلول لشرب.

3. كيفية استعمال فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.

4. ما هي التأثيرات الجانبية المحتملة.

5. كيف يتم تخزين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.

6. معلومات إضافية.

1. ما هو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب

استعماله :

المجموعة الصيدلانية العلاجية مضاد لفقر الدم/الحديد.

فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب هو الدواء الذي يوفر الحديد في كريات

الدم الحمراء، لمعالجة نقص الحديد ولعلاج فقر الدم (انخفاض مستوى

هيموغلوبين وعدد وقياس الكريات الحمراء) بسبب نقص الحديد.

2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40

ملغ محلول لشرب :

لا يجب تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب في الحالات

التالية :

• إذا كانت لديك حساسية (حساسية مفرطة) لبروتين سينسيلات

الحديد أو أحد مكونات هذا الدواء.

• إذا كانت لديك حساسية من بروتينات الحليب.

• إذا كنت تعاني من مرض يؤدي إلى تراكم الحديد في الجسم (داء

هيموسيديريني و داء ترسب الأصبغة الدموية).

• إذا كنت تعاني من التهاب البنكرياس (التهاب البنكرياس) أو تشمع

الكبد (مرض كبدي مزمن يتميز بتشكيل آفات ليفية أو "ندوب" في

أنسجة الكبد وغيور بنيته وفعاليتها العادية) بسبب تراكم الحديد.

التحذيرات الخاصة لفيريلكس 40 ملغ :

• في حالة نقص الحديد أو فقر الدم، استشر طبيبك قبل أن تأخذ هذا الدواء.

FERPLEX 40 mg

Fer protein succinylate

Boîte de 10 Falcons buvables

PPV 60,00 Dhs



6 118001 440016

تناول أو استعمل

إذا كنت تأخذ

الحصول عليها

• مضادات حيوية

• إذا كنت تأخذ

البيوفوسفونات.

• البيبسيلامين عند استعمالها لالتهاب المفاصل (التهاب المفاصل).

• الفاسيتيل دوبايتستعمل لعلاج ارتفاع ضغط الدم.

• تيروكسين يستعمل لعلاج نقص إفراز الدرقية (الغدة الدرقية قليلة النشاط).

• لوفويو و كاريديوبا يستعمل لعلاج مرض الشلل الرعاشي.

• ميكوفينولات موفيتيل يستعمل للوقاية لرفض زرع الأعضاء والأنسجة.

• انخفاض الإنمصاص المعوي للحديد وكذلك فعالية فيريلكس 40 ملغ

محلول لشرب في حالة أخذه مع الأدوية المذكورة أدناه لا بد من الفصل

بين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب والأدوية التالية مدة لا تقل عن

ساعتين قبل تناول :

• مضادات الحموضة تستعمل عادة عند المرضى الذين يعانون من

حموضة المعدة.

• كلورامفينيكول (مضاد حيوي)

• الكوليسترامين يستعمل عند المرضى الذين يعانون من قرح

الكوليسترول في الدم.

• أدوية لعلاج القرحة المعوية أو الجزر المعدي المريئي مثل أوميبرازول

لنزوبرازول وپانتوپرازول.

• مخاطر التداخل في الاختبارات التشخيصية :

• هذا الدواء قد يتداخل مع الفحوصات المختبرية للبحث عن الدم الخفي

في البراز.

تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب مع الأغذية والمشروبات :

بعض الأغذية النباتية والحليب والقهوة والشاي تخفف امتصاص

الحديد، لذلك من الضروري يجب أخذ فيريلكس 40 ملغ عن مدة لا تقل

عن ساعتين عند تناول هذه الأغذية أو عند تناول هذه الأخيرة يجب

الانتظار ساعتين قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ.

زيادة امتصاص مشتقات الحديد بعد تناول عصير الحمضيات

(البرتقال، الليمون وغيرها) الطازج.

الحمل والرضاعة :

إستشر طبيبك أو الصيدلاني قبل أخذ أي دواء.

يؤخذ فيريلكس خلال فترة الحمل والرضاعة لعلاج نقص الحديد، ليس

هناك احتياطات خاصة يجب اتخاذها.

القيادة واستعمال الآلات :

لم يلاحظ أي آثار على قدرة السيادة واستعمال الآلات.

معلومة هامة حول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :

هذا الدواء يحتوي على سريترول، إذا كنت تعاني من عدم تحمل السكريات

نشرة :

فيريلكس 40 ملغ

بروتين سينيولات الحديد

الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء.

• حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.

• إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات

من طبيبك أو الصيدلاني.

• هذا الدواء تم وصفه إليك شخصيا. لا تناوله شخصا آخر أبدا ولو

في وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك.

• في حالة تفاقم بعض الأعراض الجانبية أو إذا لاحظت آثارا جانبية غير

مدرج في هذه النشرة، اطلب طبيبك أو الصيدلاني عليه.

فهرس النشرة :

1. ما هو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب

استعماله.

2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ

محلول لشرب.

3. كيفية استعمال فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.

4. ما هي التأثيرات الجانبية المحتملة.

5. كيف يتم تخزين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.

6. معلومات إضافية.

1. ما هو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب

استعماله :

المجموعة الصيدلانية العلاجية مضاد ل فقر الدم/الحديد.

فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب هو الدواء الذي يوفر الحديد في كريات

الدم الحمراء، لمعالجة نقص الحديد ولعلاج فقر الدم (انخفاض مستوى

هيموغلوبين وعدد وقياس الكريات الحمراء) بسبب نقص الحديد.

2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40

ملغ محلول لشرب :

لا يجب تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب في الحالات

التالية :

• إذا كانت لديك حساسية (حساسية مفرطة) لبروتين سينيولات

الحديد أو أحد مكونات هذا الدواء.

• إذا كانت لديك حساسية من بروتينات الحليب.

• إذا كنت تعاني من مرض يؤدي إلى تراكم الحديد في الجسم (داء

هيموسيديريني وداء ترسب الأصبغة الدموية).

• إذا كنت تعاني من التهاب البنكرياس (التهاب البنكرياس) أو تشمع

الكبد (مرض كبدي مزمن يتميز بتشكيل آفات ليفية أو "ندوب" في

أنسجة الكبد وبغير بنيته وفعاليتها العادية) بسبب تراكم الحديد.

التحذيرات الخاصة لفيريلكس 40 ملغ :

• في حالة نقص الحديد أو فقر الدم، استشر طبيبك قبل أن تأخذ هذا الدواء.

FERPLEX 40 mg

Fer protein succinylate

Boîte de 10 Falcons buvables

PPV 60,00 Dhs



6 118001 440016

تناول أو استعمل

إذا كنت تأخذ

الحصول عليها

• مضادات حيوية

• إذا كنت تأخذ

البيوفوسفونات.

• البيبسيلامين عند استعمالها لالتهاب المفاصل (التهاب المفاصل).

• الفاسيتيل دوبايتستعمل لعلاج ارتفاع ضغط الدم.

• تيروكسين يستعمل لعلاج نقص إفراز الدرقية (الغدة الدرقية قليلة النشاط).

• لوفويو و كاريديوبا يستعمل لعلاج مرض الشلل الرعاشي.

• ميكوفينولات موفيتيل يستعمل للوقاية لرفض زرع الأعضاء والأنسجة.

• انخفاض الإنمصاص المعوي للحديد وكذلك فعالية فيريلكس 40 ملغ

محلول لشرب في حالة أخذه مع الأدوية المذكورة أدناه لا بد من الفصل

بين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب والأدوية التالية مدة لا تقل عن

ساعتين قبل تناول :

• مضادات الحموضة تستعمل عادة عند المرضى الذين يعانون من

حموضة المعدة.

• كلورامفينيكول (مضاد حيوي)

• الكوليسترامين يستعمل عند المرضى الذين يعانون من قرح

الكوليسترول في الدم.

• أدوية لعلاج القرحة المعوية أو الجزر المعدي المريئي مثل أوميبرازول

لنزوبرازول وبيانتوبرازول.

• مخاطر التداخل في الاختبارات التشخيصية :

• هذا الدواء قد يتداخل مع الفحوصات المختبرية للبحث عن الدم الخفي

في البراز.

تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب مع الأغذية والمشروبات :

بعض الأغذية النباتية والحليب والقهوة والشاي تخفف امتصاص

الحديد، لذلك من الضروري يجب أخذ فيريلكس 40 ملغ عن مدة لا تقل

عن ساعتين عند تناول هذه الأغذية أو عند تناول هذه الأخيرة يجب

الانتظار ساعتين قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ.

زيادة امتصاص مشتقات الحديد بعد تناول عصير الحمضيات

(البرتقال، الليمون وغيرها) الطازج.

الحمل والرضاعة :

إستشر طبيبك أو الصيدلاني قبل أخذ أي دواء.

يؤخذ فيريلكس خلال فترة الحمل والرضاعة لعلاج نقص الحديد، ليس

هناك احتياطات خاصة يجب اتخاذها.

القيادة واستعمال الآلات :

لم يلاحظ أي آثار على قدرة السيادة واستعمال الآلات.

معلومة هامة حول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :

هذا الدواء يحتوي على سريترول إذا كنت تعاني من عدم تحمل السكريات

نشرة :

فيريلكس 40 ملغ

بروتين سينيولات الحديد

الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء.

• حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.

• إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات

من طبيبك أو الصيدلاني.

• هذا الدواء تم وصفه إليك شخصيا. لا تناوله شخصا آخر أبدا ولو

في وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك.

• في حالة تفاقم بعض الأعراض الجانبية أو إذا لاحظت آثارا جانبية غير

مدرج في هذه النشرة، اطلب طبيبك أو الصيدلاني عليه.

فهرس النشرة :

1. ما هو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب

استعماله.

2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ

محلول لشرب.

3. كيفية استعمال فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.

4. ما هي التأثيرات الجانبية المحتملة.

5. كيف يتم تخزين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.

6. معلومات إضافية.

1. ما هو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب

استعماله :

المجموعة الصيدلانية العلاجية مضاد لفقر الدم/الحديد.

فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب هو الدواء الذي يوفر الحديد في كريات

الدم الحمراء لمعالجة نقص الحديد ولعلاج فقر الدم (انخفاض مستوى

هيموغلوبين وعدد وقياس الكريات الحمراء) بسبب نقص الحديد.

2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40

ملغ محلول لشرب :

لا يجب تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب في الحالات

التالية :

• إذا كانت لديك حساسية (حساسية مفرطة) لبروتين سينيولات

الحديد أو أحد مكونات هذا الدواء.

• إذا كانت لديك حساسية من بروتينات الحليب.

• إذا كنت تعاني من مرض يؤدي إلى تراكم الحديد في الجسم (داء

هيموسيديريئي وداء ترسب الأصبغة الدموية).

• إذا كنت تعاني من التهاب البنكرياس (التهاب البنكرياس) أو تشمع

الكبد (مرض كبدي مزمن يتميز بتشكيل آفات ليفية أو "ندوب" في

أنسجة الكبد وبغير بنيته وفعاليتها العادية) بسبب تراكم الحديد.

التحذيرات الخاصة لفيريلكس 40 ملغ :

• في حالة نقص الحديد أو فقر الدم استشر طبيبك قبل أن تأخذ هذا الدواء.

FERPLEX 40 mg

Fer protein succinylate

Boîte de 10 Falcons buvables

PPV 60,00 Dhs



6 118001 440016

تناول أو استعمل

إذا كنت تأخذ

الحصول عليها

• مضادات حيوية

• إذا كنت تأخذ

البيوفوسفونات.

• البيبسيلامين عند استعمالها لالتهاب المفاصل (التهاب المفاصل).

• الفاسيتيل دوبايتستعمل لعلاج ارتفاع ضغط الدم.

• تيروكسين يستعمل لعلاج نقص إفراز الدرقية (الغدة الدرقية قليلة النشاط).

• لوفويو و كاريديوبا يستعمل لعلاج مرض الشلل الرعاشي.

• ميكوفينولات موفيتيل يستعمل للوقاية لرفض زرع الأعضاء والأنسجة.

• انخفاض الإنمصاص المعوي للحديد وكذلك فعالية فيريلكس 40 ملغ

محلول لشرب في حالة أخذه مع الأدوية المذكورة أدناه لا بد من الفصل

بين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب والأدوية التالية مدة لا تقل عن

ساعتين قبل تناول :

• مضادات الحموضة تستعمل عادة عند المرضى الذين يعانون من

حموضة المعدة.

• كلورامفينيكول (مضاد حيوي)

• الكوليسترامين يستعمل عند المرضى الذين يعانون من قرح

الكوليسترول في الدم.

• أدوية لعلاج القرحة المعوية أو الجزر المعدي المريئي مثل أوميبرازول

لنزوبرازول وپانتوپرازول.

• مخاطر التداخل في الاختبارات التشخيصية :

• هذا الدواء قد يتداخل مع الفحوصات المختبرية للبحث عن الدم الخفي

في البراز.

تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب مع الأغذية والمشروبات :

بعض الأغذية النباتية والحليب والقهوة والشاي تخفف امتصاص

الحديد، لذلك من الضروري يجب أخذ فيريلكس 40 ملغ عن مدة لا تقل

عن ساعتين عند تناول هذه الأغذية أو عند تناول هذه الأخيرة يجب

الانتظار ساعتين قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ.

زيادة امتصاص مشتقات الحديد بعد تناول عصير الحمضيات

(البرتقال، الليمون وغيرها) الطازج.

الحمل والرضاعة :

إستشر طبيبك أو الصيدلاني قبل أخذ أي دواء.

يؤخذ فيريلكس خلال فترة الحمل والرضاعة لعلاج نقص الحديد، ليس

هناك احتياطات خاصة يجب اتخاذها.

القيادة واستعمال الآلات :

لم يلاحظ أي آثار على قدرة السيادة واستعمال الآلات.

معلومة هامة حول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :

هذا الدواء يحتوي على سريترول، إذا كنت تعاني من عدم تحمل السكريات

نشرة :

فيريلكس 40 ملغ

بروتين سينسيلات الحديد

الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء.

• حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.

• إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات

من طبيبك أو الصيدلاني.

• هذا الدواء تم وصفه إليك شخصيا. لا تناوله شخصا آخر أبدا ولو

في وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك.

• في حالة تفاقم بعض الأعراض الجانبية أو إذا لاحظت آثارا جانبية غير

مدرج في هذه النشرة، اطلب طبيبك أو الصيدلاني عليه.

فهرس النشرة :

1. ما هو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب

استعماله.

2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ

محلول لشرب.

3. كيفية استعمال فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.

4. ما هي التأثيرات الجانبية المحتملة.

5. كيف يتم تخزين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.

6. معلومات إضافية.

1. ما هو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب

استعماله :

المجموعة الصيدلانية العلاجية مضاد لفقر الدم/الحديد.

فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب هو الدواء الذي يوفر الحديد في كريات

الدم الحمراء، لمعالجة نقص الحديد ولعلاج فقر الدم (انخفاض مستوى

هيموغلوبين وعدد وقياس الكريات الحمراء) بسبب نقص الحديد.

2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40

ملغ محلول لشرب :

لا يجب تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب في الحالات

التالية :

• إذا كانت لديك حساسية (حساسية مفرطة) لبروتين سينسيلات

الحديد أو أحد مكونات هذا الدواء.

• إذا كانت لديك حساسية من بروتينات الحليب.

• إذا كنت تعاني من مرض يؤدي إلى تراكم الحديد في الجسم (داء

هيموسيديريتي وداء ترسب الأصبغة الدموية).

• إذا كنت تعاني من التهاب البنكرياس (التهاب البنكرياس) أو تشمع

الكبد (مرض كبدي مزمن يتميز بتشكيل آفات ليفية أو "ندوب" في

أنسجة الكبد وبغير بنيته وفعاليتها العادية) بسبب تراكم الحديد.

التحذيرات الخاصة لفيريلكس 40 ملغ :

• في حالة نقص الحديد أو فقر الدم، استشر طبيبك قبل أن تأخذ هذا الدواء.

FERPLEX 40 mg

Fer protein succinylate

Boîte de 10 Falcons buvables

PPV 60,00 Dhs



6 118001 440016

تناول أو استعمل

إذا كنت تأخذ

الحصول عليها

• مضادات حيوية

• إذا كنت تأخذ

البيوفوسفونات.

• البيبسيلامين عند استعمالها لالتهاب المفاصل (التهاب المفاصل).

• الفاسيتيل دوبايتستعمل لعلاج ارتفاع ضغط الدم.

• تيروكسين يستعمل لعلاج نقص إفراز الدرقية (الغدة الدرقية قليلة النشاط).

• لوفويو و كاريديوبا يستعمل لعلاج مرض الشلل الرعاشي.

• ميكوفينولات موفيتيل يستعمل للوقاية لرفض زرع الأعضاء والأنسجة.

• انخفاض الإنمصاص المعوي للحديد وكذلك فعالية فيريلكس 40 ملغ

محلول لشرب في حالة أخذه مع الأدوية المذكورة أدناه لا بد من الفصل

بين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب والأدوية التالية مدة لا تقل عن

ساعتين قبل تناول :

• مضادات الحموضة تستعمل عادة عند المرضى الذين يعانون من

حموضة المعدة.

• كلورامفينيكول (مضاد حيوي)

• الكوليسترامين يستعمل عند المرضى الذين يعانون من قرح

الكوليسترول في الدم.

• أدوية لعلاج القرحة المعوية أو الجزر المعدي المريئي مثل أوميبرازول

لنزوبرازول وپانتوپرازول.

• مخاطر التداخل في الاختبارات التشخيصية :

• هذا الدواء قد يتداخل مع الفحوصات المختبرية للبحث عن الدم الخفي

في البراز.

تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب مع الأغذية والمشروبات :

بعض الأغذية النباتية والحليب والقهوة والشاي تخفف امتصاص

الحديد، لذلك من الضروري يجب أخذ فيريلكس 40 ملغ عن مدة لا تقل

عن ساعتين عند تناول هذه الأغذية أو عند تناول هذه الأخيرة يجب

الانتظار ساعتين قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ.

زيادة امتصاص مشتقات الحديد بعد تناول عصير الحمضيات

(البرتقال، الليمون وغيرها) الطازج.

الحمل والرضاعة :

إستشر طبيبك أو الصيدلاني قبل أخذ أي دواء.

يؤخذ فيريلكس خلال فترة الحمل والرضاعة لعلاج نقص الحديد، ليس

هناك احتياطات خاصة يجب اتخاذها.

القيادة واستعمال الآلات :

لم يلاحظ أي آثار على قدرة السيادة واستعمال الآلات.

معلومة هامة حول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :

هذا الدواء يحتوي على سريترول، إذا كنت تعاني من عدم تحمل السكريات

نشرة :

فيريلكس 40 ملغ

بروتين سينسيلات الحديد

الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء.

• حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.

• إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات

من طبيبك أو الصيدلاني.

• هذا الدواء تم وصفه إليك شخصيا. لا تناوله شخصا آخر أبدا ولو

في وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك.

• في حالة تفاقم بعض الأعراض الجانبية أو إذا لاحظت آثارا جانبية غير

مدرج في هذه النشرة، اطلب طبيبك أو الصيدلاني عليه.

فهرس النشرة :

1. ما هو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب

استعماله.

2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ

محلول لشرب.

3. كيفية استعمال فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.

4. ما هي التأثيرات الجانبية المحتملة.

5. كيف يتم تخزين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.

6. معلومات إضافية.

1. ما هو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب

استعماله :

المجموعة الصيدلانية العلاجية مضاد لفقر الدم/الحديد.

فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب هو الدواء الذي يوفر الحديد في كريات

الدم الحمراء، لمعالجة نقص الحديد ولعلاج فقر الدم (انخفاض مستوى

هيموغلوبين وعدد وقياس الكريات الحمراء) بسبب نقص الحديد.

2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40

ملغ محلول لشرب :

لا يجب تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب في الحالات

التالية :

• إذا كانت لديك حساسية (حساسية مفرطة) لبروتين سينسيلات

الحديد أو أحد مكونات هذا الدواء.

• إذا كانت لديك حساسية من بروتينات الحليب.

• إذا كنت تعاني من مرض يؤدي إلى تراكم الحديد في الجسم (داء

هيموسيديريتي وداء ترسب الأصبغة الدموية).

• إذا كنت تعاني من التهاب البنكرياس (التهاب البنكرياس) أو تشمع

الكبد (مرض كبدي مزمن يتميز بتشكيل آفات ليفية أو "ندوب" في

أنسجة الكبد وبغير بنيتها وفعاليتها العادية) بسبب تراكم الحديد.

التحذيرات الخاصة لفيريلكس 40 ملغ :

• في حالة نقص الحديد أو فقر الدم، استشر طبيبك قبل أن تأخذ هذا الدواء.

FERPLEX 40 mg

Fer protein succinylate

Boîte de 10 Falcons buvables

PPV 60,00 Dhs



6 118001 440016

تناول أو استعمل

إذا كنت تأخذ

الحصول عليها

• مضادات حيوية

• إذا كنت تأخذ

البيوفوسفونات.

• البيبسيلامين عند استعمالها لالتهاب المفاصل (التهاب المفاصل).

• الفاسيتيل دوبايتستعمل لعلاج ارتفاع ضغط الدم.

• تيروكسين يستعمل لعلاج نقص إفراز الدرقية (الغدة الدرقية قليلة النشاط).

• لوفويو و كاريديوبا يستعمل لعلاج مرض الشلل الرعاشي.

• ميكوفينولات موفيتيل يستعمل للوقاية لرفض زرع الأعضاء والأنسجة.

• انخفاض الإنمصاص المعوي للحديد وكذلك فعالية فيريلكس 40 ملغ

محلول لشرب في حالة أخذه مع الأدوية المذكورة أدناه لا بد من الفصل

بين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب والأدوية التالية مدة لا تقل عن

ساعتين قبل تناول :

• مضادات الحموضة تستعمل عادة عند المرضى الذين يعانون من

حموضة المعدة.

• كلورامفينيكول (مضاد حيوي)

• الكوليسترامين يستعمل عند المرضى الذين يعانون من قرح

الكوليسترول في الدم.

• أدوية لعلاج القرحة المعوية أو الجزر المعدي المريئي مثل أوميبرازول

لنزوبرازول وبيانتوبرازول.

• مخاطر التداخل في الاختبارات التشخيصية :

• هذا الدواء قد يتداخل مع الفحوصات المختبرية للبحث عن الدم الخفي

في البراز.

تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب مع الأغذية والمشروبات :

بعض الأغذية النباتية والحليب والقهوة والشاي تخفف امتصاص

الحديد، لذلك من الضروري يجب أخذ فيريلكس 40 ملغ عن مدة لا تقل

عن ساعتين عند تناول هذه الأغذية أو عند تناول هذه الأخيرة يجب

الانتظار ساعتين قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ.

زيادة امتصاص مشتقات الحديد بعد تناول عصير الحمضيات

(البرتقال، الليمون وغيرها) الطازج.

الحمل والرضاعة :

إستشر طبيبك أو الصيدلاني قبل أخذ أي دواء.

يؤخذ فيريلكس خلال فترة الحمل والرضاعة لعلاج نقص الحديد، ليس

هناك احتياطات خاصة يجب اتخاذها.

القيادة واستعمال الآلات :

لم يلاحظ أي آثار على قدرة السيادة واستعمال الآلات.

معلومة هامة حول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :

هذا الدواء يحتوي على سريترول إذا كنت تعاني من عدم تحمل السكريات

نشرة :

فيريلكس 40 ملغ

بروتين سينسيلات الحديد

الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء.

• حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.

• إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات

من طبيبك أو الصيدلاني.

• هذا الدواء تم وصفه إليك شخصيا. لا تناوله شخصا آخر أبدا ولو

في وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك.

• في حالة تفاقم بعض الأعراض الجانبية أو إذا لاحظت آثارا جانبية غير

مدرج في هذه النشرة، اطلب طبيبك أو الصيدلاني عليه.

فهرس النشرة :

1. ما هو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب

استعماله.

2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ

محلول لشرب.

3. كيفية استعمال فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.

4. ما هي التأثيرات الجانبية المحتملة.

5. كيف يتم تخزين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.

6. معلومات إضافية.

1. **ما هو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب**

استعماله :

المجموعة الصيدلانية العلاجية مضاد لفقر الدم/الحديد.

فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب هو الدواء الذي يوفر الحديد في كريات

الدم الحمراء لمعالجة نقص الحديد ولعلاج فقر الدم (انخفاض مستوى

هيموغلوبين وعدد وقياس الكريات الحمراء) بسبب نقص الحديد.

2. **ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40**

ملغ محلول لشرب :

لا يجب تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب في الحالات

التالية :

• إذا كانت لديك حساسية (حساسية مفرطة) لبروتين سينسيلات

الحديد أو أحد مكونات هذا الدواء.

• إذا كانت لديك حساسية من بروتينات الحليب.

• إذا كنت تعاني من مرض يؤدي إلى تراكم الحديد في الجسم (داء

هيموسيديريني وداء ترسب الأصبغة الدموية).

• إذا كنت تعاني من التهاب البنكرياس (التهاب البنكرياس) أو تشمع

الكبد (مرض كبدي مزمن يتميز بتشكيل آفات ليفية أو "ندوب" في

أنسجة الكبد وبغير بنيته وفعاليتها العادية) بسبب تراكم الحديد.

التحذيرات الخاصة لفيريلكس 40 ملغ :

• في حالة نقص الحديد أو فقر الدم استشر طبيبك قبل أن تأخذ هذا الدواء.

FERPLEX 40 mg

Fer protein succinylate

Boîte de 10 Falcons buvables

PPV 60,00 Dhs



6 118001 440016

تناول أو استعمل

إذا كنت تأخذ

الحصول عليها

• مضادات حيوية

• إذا كنت تأخذ

البيوفوسفونات.

• البيبسيلامين عند استعمالها لالتهاب المفاصل (التهاب المفاصل).

• الفاسيتيل دوبايتستعمل لعلاج ارتفاع ضغط الدم.

• تيروكسين يستعمل لعلاج نقص إفراز الدرقية (الغدة الدرقية قليلة النشاط).

• لوفويو و كاريديوبا يستعمل لعلاج مرض الشلل الرعاشي.

• ميكوفينولات موفيتيل يستعمل للوقاية لرفض زرع الأعضاء والأنسجة.

• انخفاض الإنمصاص المعوي للحديد وكذلك فعالية فيريلكس 40 ملغ

محلول لشرب في حالة أخذه مع الأدوية المذكورة أدناه لا بد من الفصل

بين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب والأدوية التالية مدة لا تقل عن

ساعتين قبل تناول :

• مضادات الحموضة تستعمل عادة عند المرضى الذين يعانون من

حموضة المعدة.

• كلورامفينيكول (مضاد حيوي)

• الكوليسترامين يستعمل عند المرضى الذين يعانون من قرح

الكوليسترول في الدم.

• أدوية لعلاج القرحة المعوية أو الجزر المعدي المريئي مثل أوميبرازول

لنزوبرازول وبيانتوبرازول.

• مخاطر التداخل في الاختبارات التشخيصية :

• هذا الدواء قد يتداخل مع الفحوصات المختبرية للبحث عن الدم الخفي

في البراز.

تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب مع الأغذية والمشروبات :

بعض الأغذية النباتية والحليب والقهوة والشاي تخفف امتصاص

الحديد، لذلك من الضروري يجب أخذ فيريلكس 40 ملغ عن مدة لا تقل

عن ساعتين عند تناول هذه الأغذية أو عند تناول هذه الأخيرة يجب

الانتظار ساعتين قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ.

زيادة امتصاص مشتقات الحديد بعد تناول عصير الحمضيات

(البرتقال، الليمون وغيرها) الطازج.

الحمل والرضاعة :

إستشر طبيبك أو الصيدلاني قبل أخذ أي دواء.

يؤخذ فيريلكس خلال فترة الحمل والرضاعة لعلاج نقص الحديد، ليس

هناك احتياطات خاصة يجب اتخاذها.

القيادة واستعمال الآلات :

لم يلاحظ أي آثار على قدرة السيادة واستعمال الآلات.

معلومة هامة حول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :

هذا الدواء يحتوي على سريترول، إذا كنت تعاني من عدم تحمل السكريات

نشرة :

فيريلكس 40 ملغ

بروتين سينسيلات الحديد

الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء.

• حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.

• إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات

من طبيبك أو الصيدلاني.

• هذا الدواء تم وصفه إليك شخصيا. لا تناوله شخصا آخر أبدا ولو

في وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك.

• في حالة تفاقم بعض الأعراض الجانبية أو إذا لاحظت آثارا جانبية غير

مدرج في هذه النشرة، اطلب طبيبك أو الصيدلاني عليه.

فهرس النشرة :

1. ما هو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب

استعماله.

2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ

محلول لشرب.

3. كيفية استعمال فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.

4. ما هي التأثيرات الجانبية المحتملة.

5. كيف يتم تخزين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.

6. معلومات إضافية.

1. **ما هو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب**

استعماله :

المجموعة الصيدلانية العلاجية مضاد لفقر الدم/الحديد.

فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب هو الدواء الذي يوفر الحديد في كريات

الدم الحمراء، لمعالجة نقص الحديد ولعلاج فقر الدم (انخفاض مستوى

هيموغلوبين وعدد وقياس الكريات الحمراء) بسبب نقص الحديد.

2. **ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40**

ملغ محلول لشرب :

لا يجب تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب في الحالات

التالية :

• إذا كانت لديك حساسية (حساسية مفرطة) لبروتين سينسيلات

الحديد أو أحد مكونات هذا الدواء.

• إذا كانت لديك حساسية من بروتينات الحليب.

• إذا كنت تعاني من مرض يؤدي إلى تراكم الحديد في الجسم (داء

هيموسيديريني وداء ترسب الأصبغة الدموية).

• إذا كنت تعاني من التهاب البنكرياس (التهاب البنكرياس) أو تشمع

الكبد (مرض كبدي مزمن يتميز بتشكيل آفات ليفية أو "ندوب" في

أنسجة الكبد وغير بنيتها وفعاليتها العادية) بسبب تراكم الحديد.

التحذيرات الخاصة لفيريلكس 40 ملغ :

• في حالة نقص الحديد أو فقر الدم، استشر طبيبك قبل أن تأخذ هذا الدواء.

D3NORM[®] 1

Gouttes buvables
Voie orale

FORME ET PRESENTATION :

Gouttes buvables, flacon compte-gouttes de 30 ml.

COMPOSITION :

Huile de soja, Antioxydant : Acétate de vitamine E liquide, Vitamine D3 (5µg/2 gouttes).

PROPRIETES :

D3 NORM[®] 100 UI gouttes buvables renferme de la vitamine D3 (cholécalférol), la forme la plus active de vitamine D.

D3 NORM[®] 100 UI gouttes buvables favorise l'absorption du calcium et du phosphore et contribue au maintien d'une ossature normale et au bon fonctionnement du système immunitaire.

UTILISATIONS :

- Carence en vitamine D

D3NORM[®]

100 UI

GOUTTES BUVABLES



8 051128 632675

Lot: 200885

À consommer
avant le:

01/2024

PFC: 79,50 DH

ROSUVAS[®] SUN 10 mg

Boîte de 30 comprimés pelliculés



leur aptitude n'est pas affectée par la prise de ROSUVASTATIN. Si vous éprouvez des effets secondaires, consultez votre médecin.

- Votre taux de cholestérol.
- Vos risques d'avoir une attaque.
- Facteurs pouvant vous rendre plus vulnérable.

Vous devez vérifier auprès de votre médecin les doses initiales de 5 mg par jour et les origines asiatiques (japonaises).

- Agés de plus de 70 ans.
- Présentez une insuffisance rénale.

- Présen-
Augmen-
votre
rébutez à 5 mg, votre médecin peut
si vous commencez avec 10 mg.
nécessaire. Une période de 4 semaines
à dose maximale quotidienne est de
isque élevé d'avoir une attaque can-

avez été suffisamment baignés avec
vous prenez ROSUVASTATIN
général ou des problèmes de santé
à dose recommandée est de 20 mg
stable si vous avez l'un des facteurs
utilisation chez les enfants et ado
à dose moyenne chez les enfants et
suelle est de 5 mg par jour et volon
baignés avec ROSUVASTATIN

La prise de ROSUVAS[®] SUN ne doit pas être interrompue.

Si vous avez pris plus de ROSUVASTATINE, consultez immédiatement votre médecin. Si vous allez à l'hôpital ou recevez une transfusion, vous subirez des effets secondaires graves.

vous avez d'autres questions sur l'information pharmaceutique, vous pouvez vous adresser à votre pharmacien.

Quels sont les effets indésirables les plus fréquents ? Comme pour tous les médicaments, ce médicament peut provoquer, de façon systématique chez tout le monde, des effets indésirables. Il est important que vous soyez informé de ces effets indésirables.

- Gonflement du visage, des lèvres.
- Démangeaison sévère de la peau.

consultez votre médecin immédiatement.

Veillez lire attentivement l'indiqué de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la lire.

Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes, il pourrait leur être nuisible, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Je ne confie cette notice :
 - à qui ce que ROSUVAS[®]SUN, comprimés pelliculés et dans quel cas est-il utilisé ?
 - Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ROSUVAS[®]SUN comprimés pelliculés ?
 - Comment prendre ROSUVAS[®]SUN comprimés pelliculés ?
 - Quels sont les effets indésirables éventuels ?
 - Comment conserver ROSUVAS[®]SUN comprimés pelliculés ?
 - Informations supplémentaires

Qu'est-ce que ROSUVAS[®]SUN, comprimés pelliculés et dans quel cas est-il utile ?
 C'est un médicament appartenant à la classe pharmacothérapeutique : inhibiteur de l'HMG-CoA réductase, code ATC : C10A07
 ROSUVAS[®]SUN appartient au groupe des médicaments appelés statines.

Indications thérapeutiques :
 ROSUVAS[®]SUN vous a été prescrit parce que :

- Vous avez un taux élevé de cholestérol et/ou
- Vous avez un accident vasculaire cérébral.

ROSUVAS[®]SUN est utile chez les adultes, les adolescents, les enfants âgés

Vous avez d'autres facteurs qui augmentent votre risque d'avoir un accident vasculaire cérébral ou des problèmes de santé liés à ces facteurs ?

est important de continuer de prendre ROSUVASTATIN.
 ROSUVASTATIN est utilisé pour corriger le taux de substances grasses dans le sang appelé lipides, le plus fréquent en cholestérol.
 Il existe deux différents types de cholestérol trouvés dans le sang : le « mauvais cholestérol » (LDL) et le « bon cholestérol » (HDL).
 ROSUVASTATIN peut réduire le « mauvais cholestérol » et augmenter le « bon cholestérol ».

[illegible][illegible][illegible]

En plus, vous ne devez pas prendre 40 mg de ROSUVASTATIN (dosage le plus élevé) si :

- vous avez une insuffisance rénale modérée (en cas de doute, demandez à votre médecin) ;
- vous avez des troubles de la thyroïde ;

Rosuvastatin
10 mg & 20 mg

10 mg & 20 mg

blisters de 10 et 30 comprimés pelliculés

Veillez lire attentivement l'indiqué de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la lire.

Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes, il pourrait leur être nuisible, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Je ne confie cette notice :
 - à qui ce que ROSUVAS[®]SUN, comprimés pelliculés et dans quel cas est-il utilisé ?
 - Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ROSUVAS[®]SUN comprimés pelliculés ?
 - Comment prendre ROSUVAS[®]SUN comprimés pelliculés ?
 - Quels sont les effets indésirables éventuels ?
 - Comment conserver ROSUVAS[®]SUN comprimés pelliculés ?
 - Informations supplémentaires

Qu'est-ce que ROSUVAS[®]SUN, comprimés pelliculés et dans quel cas est-il utile ?
 C'est une classe pharmacothérapeutique : inhibiteur de l'HMG-CoA réductase, code ATC : C10A07
 ROSUVAS[®]SUN appartient au groupe des médicaments appelés statines.

Indications thérapeutiques :
 ROSUVAS[®]SUN vous a été prescrit parce que :

- Vous avez un taux élevé de cholestérol et/ou
- Vous avez un accident vasculaire cérébral.

ROSUVAS[®]SUN est utile chez les adultes, les adolescents, les enfants âgés

Vous avez d'autres facteurs qui augmentent votre risque d'avoir un accident vasculaire cérébral ou des problèmes de santé liés à ces facteurs ?

ne vous en faites pas, car la rosuvastatine est sûre et efficace. Elle permet de réduire le taux de cholestérol total, de LDL (le « mauvais cholestérol ») et de triglycérides, et d'augmenter le taux de HDL (le « bon cholestérol »). Elle agit sur le métabolisme du cholestérol et agit également sur le métabolisme des lipides. Elle agit également sur le métabolisme du cholestérol et agit également sur le métabolisme des lipides. Elle agit également sur le métabolisme du cholestérol et agit également sur le métabolisme des lipides.

[illegible]

Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ROUSVAX[®]SUN comprimés pelliculaires ?

Il est très important de consulter votre médecin avant de prendre ROUSVAX[®]SUN, même si votre taux de cholestérol revient à la normale, car il est important de maintenir à votre taux de cholestérol pendant toute la durée du traitement. ROUSVAX[®]SUN comprimés pelliculaires ne prévient la formation de votre taux de cholestérol dont il s'agit, vous devez donc continuer de prendre votre médicament.

Il est important de savoir que si vous ne prenez pas ROUSVAX[®]SUN comprimés pelliculaires, votre taux de cholestérol peut augmenter et vous devrez arrêter votre traitement à votre médecin vous le dit, ou vous découvrez que vous êtes enceinte.

Il est important de savoir que si vous ne prenez pas ROUSVAX[®]SUN comprimés pelliculaires, votre taux de cholestérol peut augmenter et vous devrez arrêter votre traitement à votre médecin vous le dit, ou vous découvrez que vous êtes enceinte.

Si vous avez des doutes sur l'usage de votre médicament, consultez votre médecin. Les informations contenues dans ce médicament ne remplacent pas les conseils de votre médecin. Si vous avez des doutes, consultez votre médecin.

En plus, vous ne devez pas prendre 40 mg de ROSUVASTATIN (dosage le plus élevé) si :

- vous avez une insuffisance rénale modérée (en cas de doute, demandez à votre médecin) ;
- vous avez des troubles de la thyroïde ;