

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES À LIRE POUR OBTENIR LES REMBOURSEMENTS ET ÉVITER LES REJETS

Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Thérapeutique :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.



MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Déclaration de Maladie

Nº M21- 062228

8 314 3

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 7472 Société :

Actif Pensionné(e) Autre :

Nom & Prénom : AKIL AB DERRAHIM

Date de naissance : 04-10-1958

Adresse : 31 Rue FBN HABDOUS TAÏA RIF

Tél. : 0678275932 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr. BENLIHABIB Aicha
OMNIPRATICIENNE
106 Av. El Joulane Sidi Othmane
Tél: 0522 37 04 08

Date de consultation : 27/03/2021

Nom et prénom du malade : AKIL AB DERRAHIM Age : 63

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : anorexie

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
27/08/2021	C		150.01	<i>DR. BEN HABIB ALI Dr. M'hamed OTHMANE Tel: 0522 37 04 08</i>

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
<i>Pharmacie M'hamed OTHMANE Docteur en Pharmacie M'hamed OTHMANE</i>	27/08/2021	1080.10

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	COEFFICIENT DES TRAVAUX
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
H	25533412	21433552	G	00000000
D	00000000	00000000	B	35533411
G	00000000	11433553	A	
MONTANTS DES SOINS	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			
DATE DU DEVIS				

Dr. ALLALI BENLHABIB Aïcha

Médecine Générale

Experte près les Tribunaux



الدكتورة علالى ابن الحبيب عائشة

الطب العام

خبيرة لدى المحاكم

ب اختصاصية في علم اللكريوبات و الفيروسات

من كلية الطب بنانسي

دبلوم داء السكري

دبلوم التغذية و علاج السمنة

دبلوم الفحص بالصدى

من كلية الطب بمونبولي

CES de Microbiologie et Virologie

de la Faculté de Médecine de Nancy

Diplômée d'Université de Diabétologie

D.U. de Nutrition et Diététique Médicale

D.U. d'Echographie Générale

de la Faculté de Médecine de Montpellier

Casablanca, le

27/08/2021.

الدار البيضاء، في

M R AKIL

ABDERRAHIM

Pharmacie IBNOU KATIR
M'hamed OERMANE
Docteur en Pharmacie

l'anaphylaxie : 80 mg

S.V.

127,70 X 5 = 638,50

10/15 X 4 mois

- ATACAND 8 mg

10/15

X 5 mois

55,00

8 mg

Amoxil 1812 dispersible

10/15

9417

Codoliprane 103X17

S.V.

05 22 37 04 08

106، شارع الجولان سيدى عثمان - الدار

106, Av. El Joulane Sidi Othmane - Casablanca

79.70 x 2

5

A γ x 500 1° (2)

ac [T] \rightarrow $\frac{1}{2}$ T.

Vita C
FFW 11

Vita C1000®

FPU 150H30
EXP 07/2024
LDT 16080 29

15.30 VTC 1st ref 2x lesson

S.V.

Zinaskin

in effect 8x17

$\times 2 \text{ sec}$

87,30 Cardiosfirine 100 mg
neats bid dly
x 3 mo. 11th

S.V.

aspirine 100 mg
bid acq

1 cap. 12
x 3 mol.

Dr. BENHABIB Aicha
OMNIPRACTIQUE
El Djouline 3rd Elman
22/04/08

106 Av. B
Tél: 052

1080.10

سُدَادَةِ ابْنِ كَاتِر
~~M'hamed BENOU KATIR
Doctor en Pharmacie
TIR~~

SYNTHMEDIC
 22 rue soultz biou al aquam roche
 nares casablanca
 ATACAND
 8 mg
 Ble de 30 - Cpr séc
 139/1B DMP 21NRO P.P.V: 127.70 DH
 118001 020536

କାହାର ପାଇଁ ଏହି କାମ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜାଗା ନାହିଁ ।

ਇਹੋ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਵ ④ ਗੁਪਤਾ

ଏହି ଦୂର ତା କୁଟୁମ୍ବୀ କଥାର ଗୀତ ପାଇବିଲା ଏହା ପାଇବାର ପାଇବାର
ପାଇବାର ପିଲାଶା ④ ଏହି ପାଇବା କଥାର କଥାର କଥାର କଥାର
କଥାର କଥାର କଥାର କଥାର କଥାର କଥାର କଥାର କଥାର କଥାର

କୁଳାଳ ପାଇଁ ଏହାର ପାଇଁ ଆମେ କିମ୍ବା

ପ୍ରକାଶକ

ଏହା କୌଣସିଲ୍ ପରିମାଣ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

କାନ୍ତି ପାଇଁ ହାତରେ ଲାଗିଥିଲା କାନ୍ତିର ପାଦରେ ପାଦରେ ପାଦରେ

१८८ |

ଶ୍ରୀ ପାତ୍ର ମହାନ୍ତିର କାଳେ ଏହାର ପରିବାରକୁ ଦେଖିଲୁ କିମ୍ବା ଏହାର ପରିବାରକୁ ଦେଖିଲୁ କିମ୍ବା

କେବୁ କେବୁ ? ହାରି ପାଶାର ④ ଏ ଅନ୍ଧାରେ ଦିନର
ଅନ୍ଧାରେ ଅନ୍ଧାରେ ଅନ୍ଧାରେ ଅନ୍ଧାରେ

፩፻፲፭ ዓ.ም. በ፩፻፲፭ ዓ.ም. ተስፋ ስምን ከፌታ የፌታ ተስፋ ስምን ከፌታ የፌታ

ପ୍ରାଣି ପ୍ରମାଣ କାହାର କାହାର କାହାର ?

SYNTHMEDIC
22 rue zoubier bno al acuan roches
nîmes casablanca ATACAND

8 mg Ble de 30 Capsule
139/18 DMP RINNO P.R.V: 127,70 DH
6 // 118001 020539 //

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد. این دارو برای کنترل خود را در میان افرادی که دارای مشکل های افسوس هستند، بسیار مفید است. این دارو میتواند در مورد افسوس هایی که از طرف دیگران ایجاد شده اند، کمک کند. این دارو میتواند در مورد افسوس هایی که از طرف خود ایجاد شده اند، کمک کند.

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد.

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (پیش از ۸۱ سال). ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد.

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد.

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد) ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد.

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد.

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

SYNTHMEDIC
22 rue zoubier bno al acuan roches
nîmes casablanca ATACAND

8 mg Ble de 30 Capsule
139/18 DMP RINNO P.R.V: 127,70 DH
6 // 118001 020539 //

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد. این دارو برای کنترل خود را در میان افرادی که دارای مشکل های افسوس هستند، بسیار مفید است. این دارو میتواند در مورد افسوس هایی که از طرف دیگران ایجاد شده اند، کمک کند. این دارو میتواند در مورد افسوس هایی که از طرف خود ایجاد شده اند، کمک کند.

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد.

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (پیش از ۸۱ سال). ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد.

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد.

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد) ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد.

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد.

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

SYNTHMEDIC
22 rue zoubier bno al acuan roches
nîmes casablanca ATACAND

8 mg Ble de 30 Capsule
139/18 DMP RINNO P.R.V: 127,70 DH
6 // 118001 020539 //

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد. این دارو برای کنترل خود را در میان افرادی که دارای مشکل های افسوس هستند، بسیار مفید است. این دارو میتواند در مورد افسوس هایی که از طرف دیگران ایجاد شده اند، کمک کند. این دارو میتواند در مورد افسوس هایی که از طرف خود ایجاد شده اند، کمک کند.

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد.

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (پیش از ۸۱ سال). ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد.

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد.

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد) ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد.

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد.

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

SYNTHMEDIC
22 rue zoubier bno al acuan roches
nîmes casablanca ATACAND

8 mg Ble de 30 Capsule
139/18 DMP RINNO P.R.V: 127,70 DH
6 // 118001 020539 //

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد. این دارو برای کنترل خود را در میان افرادی که دارای مشکل های افسوس هستند، بسیار مفید است. این دارو میتواند در مورد افسوس هایی که از طرف دیگران ایجاد شده اند، کمک کند. این دارو میتواند در مورد افسوس هایی که از طرف خود ایجاد شده اند، کمک کند.

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد.

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (پیش از ۸۱ سال). ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد.

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد.

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد) ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد.

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد.

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

• ایا شام پارسیان ۱۰۰٪ داروی میگیرد (از زمانی که ایجاد شد).

Cardioaspirine 100 mg/30cps
Acide acétylsalicylique

P.P.V. : 27,70 DH

Bayer S.A.

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre pharmacien.

- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable mentionné dans cette notice, parlez-en à votre pharmacien ou à votre pharmacien.

6

118Q01 090280



CARDIOASPIRINE

100 mg, comprimés gastro-résistants

Dans cette notice :

1. Qu'est ce que CardioAspirine 100 mg et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations nécessaires à connaître avant de prendre CardioAspirine 100 mg ?
3. Comment prendre CardioAspirine 100 mg ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CardioAspirine 100 mg ?
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST CE QUE CARDIOASPIRINE 100 MG ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

CardioAspirine contient comme principe actif l'acide acétylsalicylique. Ce dernier inhibe, à doses réduites déjà l'agrégation des plaquettes sanguines. Grâce à un entrohane résistant à l'acidité gastrique

319334

6 118001103041

 mg**Tardyferon® 80mg**

30 comprimés pelliculés

PPV : 40.50 DH

Distribué par COOPER PHARMA

41, Rue Mohamed Diouri - Casablanca

Pharmacien Responsable : Amina DAOUDI

Votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

âgés souffrant d'une insuffisance rénale, de diabète et/ou d'augmentation de la tension qui recevaient des médicaments contre ces maladies et une supplémentation en fer pour traiter leur anémie. La consommation importante de thé inhibe l'absorption du fer. Il conseille de ne pas prendre ce médicament en même temps que cette boisson.

Précautions d'emploi

La consommation importante de thé inhibe l'absorption du fer. Il conseille de ne pas prendre ce médicament en même temps que cette boisson.

Autres médicaments et TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé

- Si vous utilisez déjà les médicaments suivants, vous ne devrez pas utiliser TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé sauf si votre médecin le décide. En effet, certains médicaments ne peuvent pas être utilisés en même temps, alors que d'autres médicaments requièrent des changements spécifiques (de dose, de moment d'prise par exemple).
- Si vous prenez des médicaments injectables contenant du fer.
 - Si vous prenez des médicaments contenant de l'acide acétylhydroxamic.
 - Si vous prenez des médicaments contenant de l'acide fluorooxyquinolones).
 - Si vous prenez certains antibiotiques (les cyclines ou les fluoroquinolones).
 - Si vous prenez des médicaments pour traiter une fragilité osseuse (les bisphosphonates, le strontium).
 - Si vous prenez un médicament pour traiter une maladie des articulations (la penicillamine).
 - Si vous prenez un médicament pour traiter une maladie de la thyroïde (la thyroxine).
 - Si vous prenez des médicaments pour traiter la maladie de Parkinson (l'entacapone, la méthyldopa, la levodopa, la carbidopa).
 - Si vous prenez du zinc ou du calcium.
 - Si vous prenez un médicament pour traiter une acidité excessive de votre estomac : topiques gastro-intestinaux, charbon

1. QU'EST-CE QUE TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

319334

6 118001103041

 mg**Tardyferon® 80mg**

30 comprimés pelliculés

PPV : 40.50 DH

Distribué par COOPER PHARMA

41, Rue Mohamed Diouri - Casablanca

Pharmacien Responsable : Amina DAOUDI

Votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

âgés souffrant d'une insuffisance rénale, de diabète et/ou d'augmentation de la tension qui recevaient des médicaments contre ces maladies et une supplémentation en fer pour traiter leur anémie. La consommation importante de thé inhibe l'absorption du fer. Il conseille de ne pas prendre ce médicament en même temps que cette boisson.

Précautions d'emploi

La consommation importante de thé inhibe l'absorption du fer. Il conseille de ne pas prendre ce médicament en même temps que cette boisson.

Autres médicaments et TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé

- Si vous utilisez déjà les médicaments suivants, vous ne devrez pas utiliser TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé sauf si votre médecin le décide. En effet, certains médicaments ne peuvent pas être utilisés en même temps, alors que d'autres médicaments requièrent des changements spécifiques (de dose, de moment d'prise par exemple).
- Si vous prenez des médicaments injectables contenant du fer.
 - Si vous prenez des médicaments contenant de l'acide acétylhydroxamic.
 - Si vous prenez des médicaments contenant de l'acide fluorooxyquinolones).
 - Si vous prenez certains antibiotiques (les cyclines ou les fluoroquinolones).
 - Si vous prenez des médicaments pour traiter une fragilité osseuse (les bisphosphonates, le strontium).
 - Si vous prenez un médicament pour traiter une maladie des articulations (la penicillamine).
 - Si vous prenez un médicament pour traiter une maladie de la thyroïde (la thyroxine).
 - Si vous prenez des médicaments pour traiter la maladie de Parkinson (l'entacapone, la méthyldopa, la levodopa, la carbidopa).
 - Si vous prenez du zinc ou du calcium.
 - Si vous prenez un médicament pour traiter une acidité excessive de votre estomac : topiques gastro-intestinaux, charbon

1. QU'EST-CE QUE TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

319334

6 118001103041

 mg**Tardyferon® 80mg**

30 comprimés pelliculés

PPV : 40.50 DH

Prendre ce
n'les pour vous,
en suivant
la notice ou parDistribué par COOPER PHARMA
41, Rue Mohamed Diouri - Casablanca
Pharmacien Responsable : Amina DAOUDIVeuillez lire
meilleur
médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

âgés souffrant d'une insuffisance rénale, de diabète et/ou d'augmentation de la tension qui recevaient des médicaments contre ces maladies et une supplémentation en fer pour traiter leur anémie. La consommation importante de thé inhibe l'absorption du fer. Il conseille de ne pas prendre ce médicament en même temps que cette boisson.

Précautions d'emploi

- Autres médicaments et TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé**
- Si vous utilisez déjà les médicaments suivants, vous ne devrez pas utiliser TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé sauf si votre médecin le décide. En effet, certains médicaments ne peuvent pas être utilisés en même temps, alors que d'autres médicaments requièrent des changements spécifiques (de dose, de moment d'prise par exemple).
- Si vous prenez des médicaments injectables contenant du fer.
 - Si vous prenez des médicaments contenant de l'acide acétylhydroxamic.
 - Si vous prenez des médicaments contenant le fluoroquinolones).
 - Si vous prenez certains antibiotiques (les cyclines ou les bisphosphonates, le strontium).
 - Si vous prenez des médicaments pour traiter une fragilité osseuse (les articulations [la penicillamine]).
 - Si vous prenez un médicament pour traiter une maladie de la thyroïde (la thyroxine).
 - Si vous prenez des médicaments pour traiter la maladie de Parkinson (l'entacapone, la méthyldopa, la levodopa, la carbidopa).
 - Si vous prenez du zinc ou du calcium.
 - Si vous prenez un médicament pour traiter une acidité excessive de votre estomac : topiques gastro-intestinaux, charbon

1. QU'EST-CE QUE TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

319334

6 118001103041

 mg**Tardyferon® 80mg**

30 comprimés pelliculés

PPV : 40.50 DH

Distribué par COOPER PHARMA

41, Rue Mohamed Diouri - Casablanca

Pharmacien Responsable : Amina DAOUDI

Votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

âgés souffrant d'une insuffisance rénale, de diabète et/ou d'augmentation de la tension qui recevaient des médicaments contre ces maladies et une supplémentation en fer pour traiter leur anémie. La consommation importante de thé inhibe l'absorption du fer. Il conseille de ne pas prendre ce médicament en même temps que cette boisson.

Précautions d'emploi

La consommation importante de thé inhibe l'absorption du fer. Il conseille de ne pas prendre ce médicament en même temps que cette boisson.

Autres médicaments et TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé

- Si vous utilisez déjà les médicaments suivants, vous ne devrez pas utiliser TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé sauf si votre médecin le décide. En effet, certains médicaments ne peuvent pas être utilisés en même temps, alors que d'autres médicaments requièrent des changements spécifiques (de dose, de moment d'prise par exemple).
- Si vous prenez des médicaments injectables contenant du fer.
 - Si vous prenez des médicaments contenant de l'acide acétylhydroxamic.
 - Si vous prenez des médicaments contenant de l'acide fluorooxyquinolones).
 - Si vous prenez certains antibiotiques (les cyclines ou les fluoroquinolones).
 - Si vous prenez des médicaments pour traiter une fragilité osseuse (les bisphosphonates, le strontium).
 - Si vous prenez un médicament pour traiter une maladie des articulations (la penicillamine).
 - Si vous prenez un médicament pour traiter une maladie de la thyroïde (la thyroxine).
 - Si vous prenez des médicaments pour traiter la maladie de Parkinson (l'entacapone, la méthyldopa, la levodopa, la carbidopa).
 - Si vous prenez du zinc ou du calcium.
 - Si vous prenez un médicament pour traiter une acidité excessive de votre estomac : topiques gastro-intestinaux, charbon

1. QU'EST-CE QUE TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Codoliprane®

PARACETAMOL ET CODEINE


comprimé sécable

IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT

COMPOSITION

Paracétamol
Phosphate de codeine hémibyle
(Quantité correspondant à codeine mg)

Exipients : gelatine, acide stéarique



Ce médicament NE DOIT GÉNÉRALEMENT PAS ÊTRE UTILISÉ, sauf avis contraire de votre médecin avec des médicaments contenant de la buprénorphine, de la nalbuphine ou de la pentazocine. EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE SPÉCIALES

En cas de maladie chronique (au long cours) des bronches ou des poumons s'accompagnant d'expectoration, en cas de maladie du foie ou d'insuffisance rénale ainsi que chez les sujets âgés, un avis médical est indispensable. Ne pas utiliser ce médicament de façon prolongée en raison du risque de dépendance.

PRÉCAUTION D'EMPLOI

La prise de boissons alcoolisées durant le traitement est déconseillée.
EN CAS DE DOUCE NE PAS HESITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, Notamment avec la buprénorphine, la nalbuphine ou la pentazocine, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Ce médicament contient du paracétamol et de la codéine. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées (cf. posologie).

AZIX®

Az

COMPOSITION ET PRÉSENTATION

Comprimé 500 mg sécable, boîte de

INDICATIONS THERAPEUTIQUES

Traitements des infections dues aux

- infections respiratoires hautes pharyngite;
- infections respiratoires basses (y compris les sinusites);
- infections odontostomatologiques;
- infections cutanées;
- infections des tissus mous;
- urétrites et cervicites non gonococciques (chlamydia trachomatis).

CONTRE-INDICATIONS :

- Antécédents d'allergie à l'azithromycine et aux macrolides.
- Insuffisance hépatique sévère.

MISES EN GARDE :

- Toute manifestation allergique (éruption cutanée, démangeaison ...) en cours de traitement doit être signalée immédiatement à votre médecin.
- Signaler au médecin traitant toute allergie ou manifestation allergique survenue lors de traitements par les antibiotiques de la famille des macrolides.
- Ce médicament ne doit pas être utilisé chez les patients présentant une maladie hépatique.
- En l'absence de données, l'association aux dérivés de l'ergot de seigle n'est pas recommandée.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Prévenir le médecin traitant en cas de :

Insuffisance hépatique, antécédents allergiques, manifestations cutanées d'origine allergique, prise concomitante d'autres médicaments, grossesse, allaitement.

EFFETS INDESIRABLES :

- Troubles digestifs : nausées, vomissements, diarrhées et douleurs abdominales.
- Manifestations allergiques; prurit, rash cutané, oedème de Quincke.

POSOLOGIE :

Se conformer à la prescription médicale.

Adulte et enfant de plus de 45 kg : 500 mg par jour, 1 comprimé de 500 mg en une prise par jour pendant 3 jours.

MODE D'ADMINISTRATION :

Azix peut être pris pendant ou en dehors des repas.

TABLEAU A (LISTE I).



82, Allée des Casuarinas - Ag. Sbaâl - Casablanca

S. Bachouchi - Pharmacien Responsable

AZIX®

Az

COMPOSITION ET PRÉSENTATION

Comprimé 500 mg sécable, boîte de

INDICATIONS THERAPEUTIQUES

Traitements des infections dues aux

- infections respiratoires hautes pharyngite;
- infections respiratoires basses (y compris les sinusites);
- infections odontostomatologiques;
- infections cutanées;
- infections des tissus mous;
- urétrites et cervicites non gonococciques (chlamydia trachomatis).

CONTRE-INDICATIONS :

- Antécédents d'allergie à l'azithromycine et aux macrolides.
- Insuffisance hépatique sévère.

MISES EN GARDE :

- Toute manifestation allergique (éruption cutanée, démangeaison ...) en cours de traitement doit être signalée immédiatement à votre médecin.
- Signaler au médecin traitant toute allergie ou manifestation allergique survenue lors de traitements par les antibiotiques de la famille des macrolides.
- Ce médicament ne doit pas être utilisé chez les patients présentant une maladie hépatique.
- En l'absence de données, l'association aux dérivés de l'ergot de seigle n'est pas recommandée.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Prévenir le médecin traitant en cas de :

Insuffisance hépatique, antécédents allergiques, manifestations cutanées d'origine allergique, prise concomitante d'autres médicaments, grossesse, allaitement.

EFFETS INDESIRABLES :

- Troubles digestifs : nausées, vomissements, diarrhées et douleurs abdominales.
- Manifestations allergiques; prurit, rash cutané, oedème de Quincke.

POSOLOGIE :

Se conformer à la prescription médicale.

Adulte et enfant de plus de 45 kg : 500 mg par jour, 1 comprimé de 500 mg en une prise par jour pendant 3 jours.

MODE D'ADMINISTRATION :

Azix peut être pris pendant ou en dehors des repas.

TABLEAU A (LISTE I).



82, Allée des Casuarinas - Ag. Sidi Abdellah - Casablanca

S. Bachouchi - Pharmacien Responsable

PPV : 55,00 DH
LOT : 646247
PER : 08/22



Amoxil 500mg et Amoxil 1g

boîte de 12 et 24.

Amoxicilline

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit, à vous ou à votre enfant. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Quel contenu cette notice ?

- Qu'est-ce que Amoxil et dans quels cas est-il utilisé ?
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Amoxil ?
- Comment prendre Amoxil ?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver Amoxil ?
- Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE AMOXIL ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique - code ATC : J01CA04.

Qu'est-ce que AMOXIL ?

AMOXIL est un antibiotique. Le principe actif est l'amoxicilline. Celui-ci appartient à un groupe de médicaments appelés « pénicillines ».

Dans quels cas AMOXIL est-il utilisé ?

AMOXIL est utilisé pour traiter des infections causées par des bactéries dans différentes parties du corps.

AMOXIL peut également être utilisé en association à d'autres médicaments pour traiter les ulcères de l'estomac.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE AMOXIL ?

Ne prenez jamais AMOXIL :

- si vous êtes allergique à l'amoxicilline, à la pénicilline ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- si vous avez déjà présenté une réaction allergique à un antibiotique. Ceci peut inclure une éruption cutanée ou un gonflement du visage ou de la gorge.

Ne prenez pas AMOXIL si vous êtes dans l'une des situations mentionnées ci-dessus. En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AMOXIL.

Avertissements et précautions :

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre AMOXIL si vous :

- souffrez de mononucléose infectieuse (fièvre, maux de gorge, ganglions enflés et fatigue extrême)
- avez des problèmes rénaux
- n'urinez pas régulièrement.

En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AMOXIL.

Tests sanguins et urinaires :

Si vous devez effectuer :

- des analyses d'urine (dosage du glucose) ou des analyses de sang pour explorer le fonctionnement de votre foie,
- un dosage d'estriol (utilisé pendant la grossesse pour vérifier que le bébé se développe normalement).

Informez votre médecin ou votre pharmacien que vous prenez AMOXIL. En effet, AMOXIL peut influer sur les résultats de ces tests.

Autres médicaments et AMOXIL :

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourrez prendre tout autre médicament.

- Si vous prenez de l'allopurinol (utilisé dans le traitement de la goutte) avec AMOXIL, le risque de réaction cutanée allergique est plus élevé.
- Si vous prenez du probénécide (utilisé dans le traitement de la goutte), votre médecin peut décider d'adapter votre dose d'AMOXIL.
- Si vous prenez des médicaments destinés à empêcher la coagulation du sang (tels que la warfarine), vous pourrez avoir besoin d'effectuer des analyses sanguines supplémentaires.
- Si vous prenez d'autres antibiotiques (tels que les tétracyclines) AMOXIL peut être moins efficace.
- Si vous prenez du méthotrexate (utilisé dans le traitement de cancer et du psoriasis sévère) AMOXIL peut provoquer une augmentation des effets indésirables.

Grossesse et allaITEMENT :

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines :

Amoxil peut provoquer des effets indésirables (comme des réactions allergiques, des vertiges et des convulsions) susceptibles de réduire votre capacité à conduire. Ne conduisez pas et n'utilisez pas de machines à moins que vous vous sentiez bien.

AMOXIL contient de l'aspartam :

L'aspartam (E951) est une source de phénylalanine. Celle-ci peut être nocive pour les patients ayant une maladie appelée « phénylcétoneurie ».

3. COMMENT PRENDRE AMOXIL ?

VEillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

- Faire dissoudre complètement chaque comprimé dans un verre d'eau et bien remuer le mélange jusqu'à ce qu'il soit homogène. Avalez immédiatement le mélange.
- Répartissez les prises de manière régulière au cours de la journée ; elles doivent être espacées d'au moins 4 heures.

Posologie habituelle :

Enfants pesant moins de 40 kg :

Toutes les posologies sont déterminées en fonction du poids de l'enfant en kilogrammes.

- Votre médecin vous indiquera la quantité d'AMOXIL que vous devez administrer à votre enfant.
- La posologie habituelle est de 40 mg à 90 mg par kilogramme de poids corporel et par jour, à administrer en deux ou trois prises.
- La dose maximale recommandée est de 100 mg par kilogramme de poids corporel et par jour.

Adultes, patients âgés et enfants pesant 40 kg ou plus :

La posologie habituelle d'AMOXIL est de 250 mg à 500 mg trois fois par jour ou 750 mg à 1 g toutes les 12 h, selon la sévérité et le type d'infection.

- Infections sévères : 750 mg à 1 g trois fois par jour.
- Infection des voies urinaires : 3 g deux fois par jour pendant un jour.
- Maladie de Lyme (infection transmise par des parasites appelés tiques) : érythème migrant isolé (phase précoce - éruption cutanée circulaire rouge ou rose) : 4 g par jour, manifestations systémiques (phase tardive - avec des symptômes plus graves ou quand la maladie est étendue à tout le corps) : jusqu'à 6 g par jour.
- Ulcère de l'estomac : 750 mg ou 1 g deux fois par jour pendant 7 jours avec d'autres antibiotiques et médicaments destinés à traiter les ulcères de l'estomac.
- Pour prévenir les infections cardiaques en cas de chirurgie. La posologie varie selon le type de chirurgie. D'autres médicaments peuvent également être administrés simultanément. Votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère pourra vous donner plus de détails.
- La dose maximale recommandée est de 6 g par jour.

Problèmes rénaux :

Si vous souffrez de problèmes rénaux, la posologie pourra être diminuée par rapport à la posologie habituelle.

Pendant combien de temps faut-il prendre AMOXIL ?

- Vous devez continuer de prendre AMOXIL aussi longtemps que votre médecin vous l'a prescrit, même si vous vous sentez mieux. Toutes les doses sont importantes pour combattre l'infection. Si certaines bactéries devaient survivre, elles pourraient être à l'origine d'une réapparition de l'infection.
- Une fois que vous avez fini votre traitement, si vos symptômes persistent, consultez de nouveau le médecin.

Des mycoses (infections à levures apparaissant sur les zones humides du corps qui peuvent causer des douleurs, des démangeaisons et des pertes blanches) peuvent se développer si AMOXIL est utilisé pendant une longue période. Si c'est votre cas, informez-en votre médecin.

Si vous prenez AMOXIL pendant une longue période, votre médecin pourra réaliser des analyses supplémentaires pour surveiller que vos reins, votre foie et votre sang fonctionnent normalement.

Si vous avez pris plus de AMOXIL que vous n'auriez dû :

Si vous avez pris trop d'AMOXIL cela peut entraîner des maux de ventre (nausées, vomissements ou diarrhée) ou la formation de cristaux dans les urines rendant celles-ci troublées, provoquant des douleurs en urinant. Consultez votre médecin dès que possible. Apportez le médicament pour le montrer à votre médecin.