

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

0 Réclamation	: contact@mupras.com
0 Prise en charge	: pec@mupras.com
0 Adhésion et changement de statut	: adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

N° W21-615628

830h0

<input checked="" type="checkbox"/> Maladie	<input type="checkbox"/> Dentaire	<input type="checkbox"/> Optique	<input type="checkbox"/> Autres
Cadre réservé à l'adhérent (e)			
Matricule :	4527	Société :	
<input type="checkbox"/> Actif	<input type="checkbox"/> Pensionné(e)	<input checked="" type="checkbox"/> Autre : RAM Retraité	
Nom & Prénom :		HAFIDI Abdellatif	
Date de naissance :		19/07/56	
Adresse :		.39 LOT AIN DIBAB II CASA	
Tél. :		0661194676 Total des frais engagés : 350,- + 253,60 Dhs	
Cadre réservé au Médecin			
Cachet du médecin :			
Date de consultation : 13/07/2021			
Nom et prénom du malade : 124 HAFIDI Nasir			
Lien de parenté : <input type="checkbox"/> Lui-même <input type="checkbox"/> Conjoint			
Nature de la maladie : Affection digestive			
En cas d'accident préciser les causes et circonstances :			
Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.			
J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.			
Fait à : CASABLANCA			
Signature de l'adhérent(e) : H. A. M.			

Le : 07/09/2021

H. A. M.

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
13/07/21	Q3		300.00 Dhs 50.00 Dhs	35722684 IN 8851 MARAALI 2025/07/13

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE CHAMA Dr. KH. BBOUCH Malika 92, Rue Elzaria Sidi El Kacem Eljadida Tel: 077 22 88 59 - Casab	13/07/2021	253,60

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ORF.

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr. Souad BENABDALLAH ép.LAZRAK

Gastro-entérologue

Spécialiste

des Maladies de l'Appareil Digestif

(Foie. Vésicule. Pancréas. Estomac, Intestins.

Hémorroïdes

Endoscopie digestive

Echographie abdominale



Ex. Gastro Entérologue au CHU Avicenne Rabat
et l'Hôpital Ben Msik Sidi Othmane - Casa

الدكتورة سعاد بنعبد الله الازرق

اختصاصية في :

أمراض الجهاز الهضمي

(الكبد، المريء، المعدة، الأمعاء، البواسير)

الكشف الداخلي للجهاز الهضمي

الفحص بالصدى

طبيبة سابقا يقسم أمراض الجهاز الهضمي
بمستشفى بن مسيك سيدي عثمان - الدار البيضاء
و مستشفى السوسي بالرباط

Casablanca, le : 13/07/2020 الدار البيضاء في :

ج.م

HAFIZI

Mon.9

3 x 68,60
ا) Hépatitis

PHARMACIE CHAMA
Dr. KHBAROUCH Maimouna
92, Rue El Adarasa
Sidi Maârif 10200 Casablanca
TEL: 05 22 24 52 00

covlu

x 2

2) Ponstyl

13,20
17,30

ep

24 x 2 11

2) Mon.9
253,60

44 + 14
58 x 2 11

48 x 2 11

Dr. BENABDALLAH Souad
gastro-epatolog
30, Rue
Tél: 05.22.25.88.62 / Fax: 05.22.98.90.12

Résidence Bensaid - 30, Rue du Marché, 2ème étage - Maârif - Casablanca - (en Face Galerie Benomar)

إقامة بن تععید ، 30 زنقة المارشمي - الطابق الثاني - المعاريف - الدار البيضاء (امام مركز بن عمر)

Tel : 05 22 25.88.62 / 0522.98.90.12 - Fax : 05.22 98.90.12

HEPANAT®

le dieci erbe

Composition par comprimé de 400 mg :

Rhamnus purshiana écorce 85,4 mg. Jus d'aloë ferox 64 mg. Foeniculum vulgare graines 53,4 mg. Cassia angustifolia feuilles 42,7 mg. Glycyrrhiza glabra racine 16 mg. Gentiana lutea racine 16 mg. Taraxacum officinale racine 10,7 mg. Rhamnus alpinus écorce 10,7 mg. Rheum palmatum racine 10,7 mg. Marrubium vulgare sommités fleuries 10,7 mg. Maltodextrine ; agent de charge : Cellulose microcristalline ; antiagglomérants : sels de magnésium d'acides gras, dioxyde de silicium; agents de revêtement : Hydroxypropylméthylcellulose, acides gras, cellulose microcristalline.

Propriétés :

Confort digestif et intestinal

Conseils d'utilisation :

2 à 4 comprimés par jour

Précautions d'emploi :

- Ne pas dépasser la dose journalière recommandée
- Ne pas utiliser pendant la grossesse

Présentations :

- Boite de 20 comprimés
- Boite de 40 comprimés

Tenir hors de la portée des enfants

Conserver le produit dans un endroit sec à l'abri de la lumière et de l'humidité

Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substituts d'un régime alimentaire varié.

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

Produit Fabriqué par **ESI srl**
Via delle Industrie 1 Albissola Marina (SV)
www.esi.it
Importé et Distribué par **ESNAPHARM** - 7, Rue A
Maârif extension - Casablanca



HEPANAT®

le dieci erbe

Composition par comprimé de 400 mg :

Rhamnus purshiana écorce 85,4 mg. Jus d'aloë ferox 64 mg. Foeniculum vulgare graines 53,4 mg. Cassia angustifolia feuilles 42,7 mg. Glycyrrhiza glabra racine 16 mg. Gentiana lutea racine 16 mg. Taraxacum officinale racine 10,7 mg. Rhamnus alpinus écorce 10,7 mg. Rheum palmatum racine 10,7 mg. Marrubium vulgare sommités fleuries 10,7 mg. Maltodextrine ; agent de charge : Cellulose microcristalline ; antiagglomérants : sels de magnésium d'acides gras, dioxyde de silicium; agents de revêtement : Hydroxypropylméthylcellulose, acides gras, cellulose microcristalline.

Propriétés :

Confort digestif et intestinal

Conseils d'utilisation :

2 à 4 comprimés par jour

Précautions d'emploi :

- Ne pas dépasser la dose journalière recommandée
- Ne pas utiliser pendant la grossesse

Présentations :

- Boîte de 20 comprimés
- Boîte de 40 comprimés

Tenir hors de la portée des enfants

Conserver le produit dans un endroit sec à l'abri de la lumière et de l'humidité

Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substituts d'un régime alimentaire varié.

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE,

Produit Fabriqué par **ESI srl**
Via delle Industrie 1 Albissola Marina (S)
www.esi.it

Importé et Distribué par **ESNAPHARM** - 7, Rue Ab
Maârif extension - Casablanca

هيبانات

40

قرص

A consommer de

préférence avant fin :

Lot n°

68.60 DH

02/2024

X042A

SYSTÈME DE GESTION QUALITÉ
CERTIFIÉ ISO 9001:2015
PAR CERTIQUALITY

Produit fabriqué par ESI srl
Via delle Industrie 1 Albissola Marina (S) ITALY esi.it
Importé et distribué par ESNAPHARM 7, Rue Abdelmajid
Benjelloun - Maârif extension - Casablanca

HEPANAT®

le dieci erbe

Composition par comprimé de 400 mg :

Rhamnus purshiana écorce 85,4 mg. Jus d'aloë ferox 64 mg. Foeniculum vulgare graines 53,4 mg. Cassia angustifolia feuilles 42,7 mg. Glycyrrhiza glabra racine 16 mg. Gentiana lutea racine 16 mg. Taraxacum officinale racine 10,7 mg. Rhamnus alpinus écorce 10,7 mg. Rheum palmatum racine 10,7 mg. Marrubium vulgare sommités fleuries 10,7 mg. Maltodextrine ; agent de charge : Cellulose microcristalline ; antiagglomérants : sels de magnésium d'acides gras, dioxyde de silicium; agents de revêtement : Hydroxypropylméthylcellulose, acides gras, cellulose microcristalline.

Propriétés :

Confort digestif et intestinal

Conseils d'utilisation :

2 à 4 comprimés par jour

Précautions d'emploi :

- Ne pas dépasser la dose journalière recommandée
- Ne pas utiliser pendant la grossesse

Présentations :

- Boîte de 20 comprimés
- Boîte de 40 comprimés

Tenir hors de la portée des enfants

Conserver le produit dans un endroit sec à l'abri de la lumière et de l'humidité

Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substituts d'un régime alimentaire varié.

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE,

Produit Fabriqué par **ESI srl**
Via delle Industrie 1 Albissola Marina (S)
www.esi.it

Importé et Distribué par **ESNAPHARM** - 7, Rue Ab
Maârif extension - Casablanca

هيبانات

40

قرص

A consommer de

préférence avant fin :

Lot n°

68.60 DH

02/2024

X042A

SYSTÈME DE GESTION QUALITÉ
CERTIFIÉ ISO 9001:2015
PAR CERTIQUALITY

Produit fabriqué par ESI srl
Via delle Industrie 1 Albissola Marina (S) ITALY esi.it
Importé et distribué par ESNAPHARM 7, Rue Abdelmajid
Benjelloun - Maârif extension - Casablanca

MORIDIL®

FORMES ET PRESENTATIONS :

- Suppositoires : Boîte de 12 suppositoires.
- Crème : Tube de 20 g.

COMPOSITION :

• Suppositoires :	Par suppositoire	Par boîte
- Carraghénates	0,3 g	3,6 g
- Dioxyde de titane	0,2 g	2,4 g
- Oxyde de zinc	0,4 g	4,8 g
- Talc	0,2 g	2,4 g
- Excipients q.s.p	1 suppositoire	12 suppositoires.
• Crème :	Par tube	Par 100 g
- Carraghénates	0,5 g	2,5 g
- Dioxyde de titane	0,4 g	2,0 g
- Oxyde de zinc	0,4 g	2,0 g
- Lidocaïne	0,4 g	2,0 g
- Excipients q.s.p	20 g	100 g
- Excipients à effet notoire : Acide sorbique - Parahydroxybenzoate de méthyle.		

PROPRIETES :

- Crème : Anesthésique local - Topique en proctologie.
- Suppositoire : protecteur et cicatrisant (système cardiovasculaire).

MORIDIL® est un mucoprotecteur et lubrifiant de la muqueuse anorectale. Il protège la muqueuse anorectale des agressions mécaniques ou chimiques.

INDICATIONS :

Traitement symptomatique des douleurs, prurits et sensations congestives au cours des poussées hémorroïdaires et autres affections anales.

CONTRE-INDICATIONS :

- Manifestations ou antécédents allergiques à l'un des composants de MORIDIL®, notamment à la lidocaïne contenue dans la crème.

EFFETS INDESIRABLES :

Crème : réactions au site de l'application : brûlures, érythème, irritation, douleur ...

POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI :

- Suppositoires : 1 à 2 suppositoires par jour.

- Crème : 1 à 4 applications par jour. La durée de traitement ne doit pas excéder 7 jours.

MISES EN GARDE/PRECAUTIONS D'EMPLOI :

L'administration de MORIDIL® ne dispense pas du traitement spécifique de la maladie anale.

Le traitement doit être de courte durée.

Si les symptômes ne disparaissent pas rapidement, le traitement doit être interrompu et un examen proctologique est indispensable.

La crème : contient du parahydroxybenzoate de méthyle et peut provoquer des réactions allergiques (éventuellement retardées).

En cas de doute, demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

MORIDIL® est un médicament : ne pas laisser à la portée des enfants.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES :

Il n'existe aucune interaction médicamenteuse significative à ce jour.

GROSSESSE/ALLAITEMENT :

MORIDIL® est à utiliser avec prudence chez la femme enceinte ou qui allait, faute de données cliniques exploitables.

SURDOSSAGE :

Exceptionnellement des cas d'ulcérations anales ont été rapportés avec une durée de traitement prolongée de la crème.

Dans ce cas une surveillance en milieu spécialisé devra être maintenue durant plusieurs heures en raison de l'absorption retardée. Des traitements symptomatiques doivent être instaurés.

CONSERVATION :

A conserver à une température ne dépassant pas 25° C.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage.

Révision : Janvier 2018.



LABORATOIRES PHARMACAL
Casablanca

MORIDIL®

FORMES ET PRÉSENTATIONS :

- Suppositoires : Boîte de 12 suppositoires.
- Crème : Tube de 20 g.

COMPOSITION :

• Suppositoires :	Par suppositoire	Par boîte
- Carraghénates	0,3 g	3,6 g
- Dioxyde de titane	0,2 g	2,4 g
- Oxyde de zinc	0,4 g	4,8 g
- Talc	0,2 g	2,4 g
- Excipients q.s.p	1 suppositoire	12 suppositoires.
• Crème :	Par tube	Par 100 g
- Carraghénates	0,5 g	2,5 g
- Dioxyde de titane	0,4 g	2,0 g
- Oxyde de zinc	0,4 g	2,0 g
- Lidocaïne	0,4 g	2,0 g
- Excipients q.s.p	20 g	100 g
- Excipients à effet notoire : Acide sorbique - Parahydroxybenzoate de méthyle.		

PROPRIÉTÉS :

- Crème : Anesthésique local - Topique en proctologie.
- Suppositoire : protecteur et cicatrisant (système cardiovasculaire).

MORIDIL® est un mucoprotecteur et lubrifiant de la muqueuse anorectale. Il protège la muqueuse anorectale des agressions mécaniques ou chimiques.

INDICATIONS :

Traitements symptomatiques des douleurs, prurits et sensations congestives au cours des poussées hémorroïdaires et autres affections anales.

CONTRE-INDICATIONS :

- Manifestations ou antécédents allergiques à l'un des composants de MORIDIL®, notamment à la lidocaïne contenue dans la crème.

EFFETS INDESIRABLES :

Crème : réactions au site de l'application : brûlures, érythème, irritation, douleur ...

POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI :

- Suppositoires : 1 à 2 suppositoires par jour.
- Crème : 1 à 4 applications par jour. La durée de traitement ne doit pas excéder 7 jours.

MISES EN GARDE/PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

L'administration de MORIDIL® ne dispense pas du traitement spécifique de la maladie anale.

Le traitement doit être de courte durée.

Si les symptômes ne disparaissent pas rapidement, le traitement doit être interrompu et un examen proctologique est indispensable.

La crème : contient du parahydroxybenzoate de méthyle et peut provoquer des réactions allergiques (éventuellement retardées).

En cas de doute, demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

MORIDIL® est un médicament : ne pas laisser à la portée des enfants.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES :

Il n'existe aucune interaction médicamenteuse significative à ce jour.

GROSSESSE/ALLAITEMENT :

MORIDIL® est à utiliser avec prudence chez la femme enceinte ou qui allaite, faute de données cliniques exploitables.

SURDOSAGE :

Exceptionnellement des cas d'ulcérations anales ont été rapportés avec une durée de traitement prolongée de la crème.

Dans ce cas une surveillance en milieu spécialisé devra être maintenue durant plusieurs heures en raison de l'absorption retardée. Des traitements symptomatiques doivent être instaurés.

CONSERVATION :

A conserver à une température ne dépassant pas 25° C.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage.

Révision : Janvier 2018.



MORIDIL®

FORMES ET PRESENTATIONS :

- Suppositoires : Boîte de 12 suppositoires.
- Crème : Tube de 20 g.

COMPOSITION :

• Suppositoires :	Par suppositoire	Par boîte
- Carraghénates	0,3 g	3,6 g
- Dioxyde de titane	0,2 g	2,4 g
- Oxyde de zinc	0,4 g	4,8 g
- Talc	0,2 g	2,4 g
- Excipients q.s.p	1 suppositoire	12 suppositoires.
• Crème :	Par tube	Par 100 g
- Carraghénates	0,5 g	2,5 g
- Dioxyde de titane	0,4 g	2,0 g
- Oxyde de zinc	0,4 g	2,0 g
- Lidocaïne	0,4 g	2,0 g
- Excipients q.s.p	20 g	100 g
- Excipients à effet notoire : Acide sorbique - Parahydroxybenzoate de méthyle.		

PROPRIETES :

- Crème : Anesthésique local - Topique en proctologie.
- Suppositoire : protecteur et cicatrisant (système cardiovasculaire).

MORIDIL® est un mucoprotecteur et lubrifiant de la muqueuse anorectale. Il protège la muqueuse anorectale des agressions mécaniques ou chimiques.

INDICATIONS :

Traitements symptomatiques des douleurs, prurits et sensations congestives au cours des poussées hémorroïdaires et autres affections anales.

CONTRE-INDICATIONS :

- Manifestations ou antécédents allergiques à l'un des composants de MORIDIL®, notamment à la lidocaïne contenue dans la crème.

EFFETS INDESIRABLES :

Crème : réactions au site de l'application : brûlures, érythème, irritation, douleur ...

POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI :

- Suppositoires : 1 à 2 suppositoires par jour.

- Crème : 1 à 4 applications par jour. La durée de traitement ne doit pas excéder 7 jours.

MISES EN GARDE/PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

L'administration de MORIDIL® ne dispense pas du traitement spécifique de la maladie anale.

Le traitement doit être de courte durée.

Si les symptômes ne disparaissent pas rapidement, le traitement doit être interrompu et un examen proctologique est indispensable.

La crème : contient du parahydroxybenzoate de méthyle et peut provoquer des réactions allergiques (éventuellement retardées).

En cas de doute, demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

MORIDIL® est un médicament : ne pas laisser à la portée des enfants.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES :

Il n'existe aucune interaction médicamenteuse significative à ce jour.

GROSSESSE/ALLAITEMENT :

MORIDIL® est à utiliser avec prudence chez la femme enceinte ou qui allaita, faute de données cliniques exploitables.

SURDOSAGE :

Exceptionnellement des cas d'ulcérations anales ont été rapportés avec une durée de traitement prolongée de la crème.

Dans ce cas une surveillance en milieu spécialisé devra être maintenue durant plusieurs heures en raison de l'absorption retardée. Des traitements symptomatiques doivent être instaurés.

CONSERVATION :


A conserver à une température ne dépassant pas 25° C.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage.

MORIDIL® Suppositoires Bte/12 - AMM N° : 173 DMP/21/EXP.

MORIDIL® Crème Tube de 20 g - AMM N° : 1072 DMP/21/AO.

Révision : Janvier 2018.



LABORATOIRES PHAR

مخابرات فارما - Casablanca - Maroc

NMRZAZVFA01