

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééductions.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Déclaration de Maladie

N° W21-643519

8382



Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Matricule : 05477

Société : RAM

Actif

Pensionné(e)

Autre :

ADLI

Mohamed

Date de naissance :

15/07/1964

Adresse :

Quartier des Hôpitaux, Rue d'Arménie
Tunis 9, App 70, Casablanca

Tél. : 0664027673

Total des frais engagés : 1424,02 Dhs

Docteur Ali ET KOHEN

CHIRURGIEN ORTHOPÉDISTE ET RHEUMATOLOGUE
Membre de la Société Française et Internationale
de Chirurgie Orthopédique et Rhumatologique
178 Bd. Zerktouni 1er Etage - CASABLANCA
Tel. : 22.14.43 / 22.11.64
Hausse : 02 17.40.93

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

26 JUIL. 2021

Date de consultation :

Nom et prénom du malade :

Dr Mohamed ADLI

Age :

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca

Le : 26/07/21

Signature de l'adhérent(e) :



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
6 JUIL 2022	9		3000	INP : 091057125

INP : 091057125

EXECUTION DES ORDONNANCES


ANALYSES - RADIOGRAPHIES

AUXILIAIRES MEDICAUX


Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

VIOLET ADHERENT

* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.



O.D.F
PROTHESES DENTAIRES





DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
D	
00000000	00000000
25533411	11433553

(Création, remont, adjonction)

VISA ET GACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

		COEFFICIENT DES TRAVAUX													
		MONTANTS DES SOINS													
		DEBUT D'EXECUTION													
		FIN D'EXECUTION													
O.D.F PROTHESES DENTAIRES		DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">H</td> <td style="text-align: center;">25533412</td> <td style="text-align: center;">21433552</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: center;">00000000</td> <td style="text-align: center;">00000000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">B</td> <td style="text-align: center;">00000000</td> <td style="text-align: center;">00000000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">G</td> <td style="text-align: center;">35533411</td> <td style="text-align: center;">11433553</td> </tr> </table>		H	25533412	21433552	D	00000000	00000000	B	00000000	00000000	G	35533411	11433553
H	25533412	21433552													
D	00000000	00000000													
B	00000000	00000000													
G	35533411	11433553													
		COEFFICIENT DES TRAVAUX													
		MONTANTS DES SOINS													
		DATE DU DEVIS													
		DATE DE L'EXECUTION													
VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS															
VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION															

Docteur Ali EL KOHEN

Chirurgien Orthopédiste Traumatologue
Ancien Interne Des Hopitaux de marseille

Chirurgie De La Hanche ,du Genou ,
De La Main Et Du Pied
Traumatologie Du Sport .arthroscopie

Mesotherapy

Membre Du Collège De La Main De Boston(U.S.A)
Membre De la Société Française Et Internationale
De Chirurgie Orthopédique Et Traumatologique
Expert Assermenté Près Les Tribunaux

Tél: 05 22 22 11 64 - 05 22 22 14 43

Urgence : 06 61 17 20 93

E-mail : Aelkohen@menara.ma



الدكتور علي الكohen

خريج كلية الطب بمارسيليا (فرنسا)
جراح سابق بمستشفيات مرسيليا

اختصاصي في جراحة العظام و المفاصل
جراحة الورك و الركبة اليد و الرجل

علاج الجروح الرياضية التنظير الباطني للمفاصل

عضو مثبت بالجمعية الفرنسية و العالمية
لجراحة العظام و المفاصل
خبير محلف لدى المحاكم

الهاتف: 05 22 22 14 43 \ 05 22 22 11 64

المستعجلات : 06 61 17 20 93

Casablanca, le : 26 JUIL. 2021

Dr Roland AOU

176,00³
1/ ANOR 20g R S
Agé / Senne gels 3 mois
Froid AX
Afield n° 05 et 07 gels 2 ml
149,00²
1124,00



ALI EL KOHEN TRAUMATO
CHIRURGIEN ORTHOPÉDISTE
378, شارع الزرقطوني - الطبق الأول - الدار البيضاء - فوق المطعم الصيني عش السنونو
378 , Bd, Zerhtouni - 1er Etage Casablanca-au Dessus Du Restaurant Chinois Nid D'hirondelle

- Si vous ne pouvez pas tenir debout ou assise bien droite pendant au moins 30 minutes
- Si votre médecin vous a informé que vous avez un taux faible de calcium dans le sang
- Si vous avez une insuffisance rénale sévère

Si vous pensez correspondre à l'un de ces cas, ne prenez pas ANOR comprimé. Informez d'abord votre médecin et suivez son conseil.

Enfants et adolescents

ANOR ne doit pas être administré aux enfants et aux adolescents.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Il est important d'informer votre médecin avant de prendre ANOR si :

- Vous souffrez de problèmes rénaux
- Vous avez des allergies
- Vous avez des difficultés à avaler ou des problèmes digestifs
- Votre médecin vous a dit que vous aviez un œsophage de Barrett (maladie associée à une modification des cellules qui recouvrent la partie inférieure de l'œsophage)
- Vous prenez des anti-inflammatoires ou de l'aspirine
- Vous avez un taux de calcium bas dans le sang
- Vous avez une affection des gencives et vous n'êtes pas suivis régulièrement par votre dentiste

Un examen dentaire pourra vous être conseillé avant de débuter le traitement par ANOR si :

- Vous avez un cancer
- Vous êtes traitée par chimiothérapie ou radiothérapie
- Vous prenez des corticoïdes (tels que prednisone ou dexaméthasone)
- Vous êtes ou avez été fumeuse (car ceci peut augmenter le risque de problèmes dentaires).

Il est important de maintenir une bonne hygiène bucco-dentaire lorsque vous êtes traitée par ANOR. Vous devrez avoir des examens

Pour une efficacité optimale d'ANOR, suivez les instructions suivantes avec attention.

Il est très important que vous suiviez les étapes 1, 2, 3, et 4 pour faciliter un passage rapide du comprimé d'ANOR jusqu'à l'estomac afin de réduire le risque d'irritation de votre œsophage :

1) Au lever et avant de prendre vos premiers aliments, boissons ou autres médicaments, avalez votre comprimé d'ANOR 10 mg entier, uniquement avec un grand verre d'eau du robinet ou de l'eau minérale faiblement minéralisée en calcium et en magnésium (minimum 200 ml) et pour ANOR 70 mg, uniquement avec de l'eau du robinet (minimum 200 ml).

- Pas de café ou de thé
- Pas de jus de fruit ou de lait

- Ne pas croquer ni laisser dissoudre le comprimé dans votre bouche
2) Après avoir avalé votre comprimé, ne vous allongez pas, restez en position bien droite (assise, debout, ou en marchant) pendant au moins 30 minutes. Ne vous allongez pas jusqu'à l'absorption des premiers aliments de la journée.

3) Ne prenez pas ANOR au coucher ou avant de vous lever pour la journée.

4) Si vous ressentez une difficulté ou une douleur pour avaler, une douleur dans la poitrine, l'apparition ou l'aggravation de brûlures d'estomac, arrêtez de prendre ANOR et prévenez votre médecin.

5) Après avoir avalé votre comprimé d'ANOR, attendez au moins 30 minutes avant de prendre vos premiers aliments, boissons ou autres médicaments de la journée, y compris les antiacides, le calcium et les vitamines. ANOR n'est efficace que si vous le prenez à jeun.

SURDOSAGE

Si par erreur vous prenez trop de comprimés, buvez un grand verre de lait et contactez immédiatement votre médecin. Ne vous faites pas vomir et ne vous allongez pas.

la mâchoire ou mobilité dentaire. Chacun de ces signes peut être révélateur d'une détérioration de l'os de la mâchoire (ostéonécrose) généralement associée à une cicatrisation retardée et une infection faisant suite à une extraction dentaire.

Contactez votre médecin ou votre dentiste si vous avez l'un de ces symptômes

- Une fracture inhabituelle de l'os de la cuisse peut rarement survenir particulièrement chez des patients traités au long cours pour l'ostéoporose.

Contactez votre médecin si vous ressentez une douleur, une faiblesse ou un inconfort au niveau de la cuisse, de la hanche ou de l'aine car cela peut être un signe précoce d'une possible fracture de l'os de la cuisse

- Ulcères de la bouche après avoir croqué ou sucé les comprimés. Informez votre médecin ou votre pharmacien rapidement de ces symptômes ou de n'importe quel autre symptôme inhabituel.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre phar

Anor®

Boîte de 4 comprimés



6 118000 092711

176,00



Laboratoires Pharma 21
21, Rue des Asphodèles - Casablanca
Yasmine LAHOU FILALI - Pharmacien Responsable

- Si vous ne pouvez pas tenir debout ou assise bien droite pendant au moins 30 minutes
- Si votre médecin vous a informé que vous avez un taux faible de calcium dans le sang
- Si vous avez une insuffisance rénale sévère

Si vous pensez correspondre à l'un de ces cas, ne prenez pas ANOR comprimé. Informez d'abord votre médecin et suivez son conseil.

Enfants et adolescents

ANOR ne doit pas être administré aux enfants et aux adolescents.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Il est important d'informer votre médecin avant de prendre ANOR si :

- Vous souffrez de problèmes rénaux
- Vous avez des allergies
- Vous avez des difficultés à avaler ou des problèmes digestifs
- Votre médecin vous a dit que vous aviez un œsophage de Barrett (maladie associée à une modification des cellules qui recouvrent la partie inférieure de l'œsophage)
- Vous prenez des anti-inflammatoires ou de l'aspirine
- Vous avez un taux de calcium bas dans le sang
- Vous avez une affection des gencives et vous n'êtes pas suivis régulièrement par votre dentiste

Un examen dentaire pourra vous être conseillé avant de débuter le traitement par ANOR si :

- Vous avez un cancer
- Vous êtes traitée par chimiothérapie ou radiothérapie
- Vous prenez des corticoïdes (tels que prednisone ou dexaméthasone)
- Vous êtes ou avez été fumeuse (car ceci peut augmenter le risque de problèmes dentaires).

Il est important de maintenir une bonne hygiène bucco-dentaire lorsque vous êtes traitée par ANOR. Vous devrez avoir des examens

Pour une efficacité optimale d'ANOR, suivez les instructions suivantes avec attention.

Il est très important que vous suiviez les étapes 1, 2, 3, et 4 pour faciliter un passage rapide du comprimé d'ANOR jusqu'à l'estomac afin de réduire le risque d'irritation de votre œsophage :

1) Au lever et avant de prendre vos premiers aliments, boissons ou autres médicaments, avalez votre comprimé d'ANOR 10 mg entier, uniquement avec un grand verre d'eau du robinet ou de l'eau minérale faiblement minéralisée en calcium et en magnésium (minimum 200 ml) et pour ANOR 70 mg, uniquement avec de l'eau du robinet (minimum 200 ml).

- Pas de café ou de thé
- Pas de jus de fruit ou de lait

- Ne pas croquer ni laisser dissoudre le comprimé dans votre bouche
2) Après avoir avalé votre comprimé, ne vous allongez pas, restez en position bien droite (assise, debout, ou en marchant) pendant au moins 30 minutes. Ne vous allongez pas jusqu'à l'absorption des premiers aliments de la journée.

3) Ne prenez pas ANOR au coucher ou avant de vous lever pour la journée.

4) Si vous ressentez une difficulté ou une douleur pour avaler, une douleur dans la poitrine, l'apparition ou l'aggravation de brûlures d'estomac, arrêtez de prendre ANOR et prévenez votre médecin.

5) Après avoir avalé votre comprimé d'ANOR, attendez au moins 30 minutes avant de prendre vos premiers aliments, boissons ou autres médicaments de la journée, y compris les antiacides, le calcium et les vitamines. ANOR n'est efficace que si vous le prenez à jeun.

SURDOSAGE

Si par erreur vous prenez trop de comprimés, buvez un grand verre de lait et contactez immédiatement votre médecin. Ne vous faites pas vomir et ne vous allongez pas.

la mâchoire ou mobilité dentaire. Chacun de ces signes peut être révélateur d'une détérioration de l'os de la mâchoire (ostéonécrose) généralement associée à une cicatrisation retardée et une infection faisant suite à une extraction dentaire.

Contactez votre médecin ou votre dentiste si vous avez l'un de ces symptômes

- Une fracture inhabituelle de l'os de la cuisse peut rarement survenir particulièrement chez des patients traités au long cours pour l'ostéoporose.

Contactez votre médecin si vous ressentez une douleur, une faiblesse ou un inconfort au niveau de la cuisse, de la hanche ou de l'aine car cela peut être un signe précoce d'une possible fracture de l'os de la cuisse

- Ulcères de la bouche après avoir croqué ou sucé les comprimés. Informez votre médecin ou votre pharmacien rapidement de ces symptômes ou de n'importe quel autre symptôme inhabituel.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre phar-

Anor®

Boîte de 4 comprimés



6 118000 092711

176,00



Laboratoires Pharma 21
21, Rue des Asphodèles - Casablanca
Yasmine LAHOU FILALI - Pharmacien Responsable

- Si vous ne pouvez pas tenir debout ou assise bien droite pendant au moins 30 minutes
- Si votre médecin vous a informé que vous avez un taux faible de calcium dans le sang
- Si vous avez une insuffisance rénale sévère

Si vous pensez correspondre à l'un de ces cas, ne prenez pas ANOR comprimé. Informez d'abord votre médecin et suivez son conseil.

Enfants et adolescents

ANOR ne doit pas être administré aux enfants et aux adolescents.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Il est important d'informer votre médecin avant de prendre ANOR si :

- Vous souffrez de problèmes rénaux
- Vous avez des allergies
- Vous avez des difficultés à avaler ou des problèmes digestifs
- Votre médecin vous a dit que vous aviez un œsophage de Barrett (maladie associée à une modification des cellules qui recouvrent la partie inférieure de l'œsophage)
- Vous prenez des anti-inflammatoires ou de l'aspirine
- Vous avez un taux de calcium bas dans le sang
- Vous avez une affection des gencives et vous n'êtes pas suivis régulièrement par votre dentiste

Un examen dentaire pourra vous être conseillé avant de débuter le traitement par ANOR si :

- Vous avez un cancer
- Vous êtes traitée par chimiothérapie ou radiothérapie
- Vous prenez des corticoïdes (tels que prednisone ou dexaméthasone)
- Vous êtes ou avez été fumeuse (car ceci peut augmenter le risque de problèmes dentaires).

Il est important de maintenir une bonne hygiène bucco-dentaire lorsque vous êtes traitée par ANOR. Vous devrez avoir des examens

Pour une efficacité optimale d'ANOR, suivez les instructions suivantes avec attention.

Il est très important que vous suiviez les étapes 1, 2, 3, et 4 pour faciliter un passage rapide du comprimé d'ANOR jusqu'à l'estomac afin de réduire le risque d'irritation de votre œsophage :

1) Au lever et avant de prendre vos premiers aliments, boissons ou autres médicaments, avalez votre comprimé d'ANOR 10 mg entier, uniquement avec un grand verre d'eau du robinet ou de l'eau minérale faiblement minéralisée en calcium et en magnésium (minimum 200 ml) et pour ANOR 70 mg, uniquement avec de l'eau du robinet (minimum 200 ml).

- Pas de café ou de thé
- Pas de jus de fruit ou de lait

- Ne pas croquer ni laisser dissoudre le comprimé dans votre bouche
2) Après avoir avalé votre comprimé, ne vous allongez pas, restez en position bien droite (assise, debout, ou en marchant) pendant au moins 30 minutes. Ne vous allongez pas jusqu'à l'absorption des premiers aliments de la journée.

3) Ne prenez pas ANOR au coucher ou avant de vous lever pour la journée.

4) Si vous ressentez une difficulté ou une douleur pour avaler, une douleur dans la poitrine, l'apparition ou l'aggravation de brûlures d'estomac, arrêtez de prendre ANOR et prévenez votre médecin.

5) Après avoir avalé votre comprimé d'ANOR, attendez au moins 30 minutes avant de prendre vos premiers aliments, boissons ou autres médicaments de la journée, y compris les antiacides, le calcium et les vitamines. ANOR n'est efficace que si vous le prenez à jeun.

SURDOSAGE

Si par erreur vous prenez trop de comprimés, buvez un grand verre de lait et contactez immédiatement votre médecin. Ne vous faites pas vomir et ne vous allongez pas.

la mâchoire ou mobilité dentaire. Chacun de ces signes peut être révélateur d'une détérioration de l'os de la mâchoire (ostéonécrose) généralement associée à une cicatrisation retardée et une infection faisant suite à une extraction dentaire.

Contactez votre médecin ou votre dentiste si vous avez l'un de ces symptômes

- Une fracture inhabituelle de l'os de la cuisse peut rarement survenir particulièrement chez des patients traités au long cours pour l'ostéoporose.

Contactez votre médecin si vous ressentez une douleur, une faiblesse ou un inconfort au niveau de la cuisse, de la hanche ou de l'aine car cela peut être un signe précoce d'une possible fracture de l'os de la cuisse

- Ulcères de la bouche après avoir croqué ou sucé les comprimés. Informez votre médecin ou votre pharmacien rapidement de ces symptômes ou de n'importe quel autre symptôme inhabituel.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre phar

Anor®

Boîte de 4 comprimés



6 118000 092711

176,00



Laboratoires Pharma 21
21, Rue des Asphodèles - Casablanca
Yasmine LAHOU FILALI - Pharmacien Responsable

FLEXIMAX

FORME ET PRESENTATION :

Boîte de 30 et 60 gélules.

COMPOSITION (par gélule) :

Substance active: Cartilage de requin 250mg, Extrait sec d'Harpagophytum 200mg, Agent de charge: Amidon de Maïs, Anti-agglomérant: Stéarate de Magnésium, Lubrifiant: Talc, Capsule végétale en HPMC

PROPRIETES :

FLEXIMAX améliore la qualité du cartilage grâce à la combinaison du cartilage de requin et de l'Harpagophytum et permet ainsi un bien-être articulaire.

CONSEILS D'UTILISATION :

2 Gélules par jour.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Femmes enceintes ou allaitantes, demandez conseil à votre médecin.

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée

Ne pas laisser à la portée des enfants

A conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité

Fabriqué et Distribué par HEALTH INNOVATION

Food supplement, is not a medecine.

ONSSA N°: CAPV.59.217.19

N°Enregistrement au ministère de la santé:
DA20202002567DMP/20UCA/MA V2

LOT: 2103010
FAB: 03/2021
EXP: 03/2024
PVC: 149.00DH

FLEXIMAX

FORME ET PRESENTATION :

Boîte de 30 et 60 gélules.

COMPOSITION (par gélule) :

Substance active: Cartilage de requin 250mg, Extrait sec d'Harpagophytum 200mg, Agent de charge: Amidon de Maïs, Anti-agglomérant: Stéarate de Magnésium, Lubrifiant: Talc, Capsule végétale en HPMC

PROPRIETES :

FLEXIMAX améliore la qualité du cartilage grâce à la combinaison du cartilage de requin et de l'Harpagophytum et permet ainsi un bien-être articulaire.

CONSEILS D'UTILISATION :

2 Gélules par jour.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Femmes enceintes ou allaitantes, demandez conseil à votre médecin.

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée

Ne pas laisser à la portée des enfants

A conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité

Fabriqué et Distribué par HEALTH INNOVATION

Food supplement, is not a medecine.

ONSSA N°: CAPV.59.217.19

N°Enregistrement au ministère de la santé:
DA20202002567DMP/20UCA/MA V2

LOT: 2103010
FAB: 03/2021
EXP: 03/2024
PVC: 149.00DH

FLEXIMAX

FORME ET PRESENTATION :

Boîte de 30 et 60 gélules.

COMPOSITION (par gélule) :

Substance active: Cartilage de requin 250mg, Extrait sec d'Harpagophytum 200mg, Agent de charge: Amidon de Maïs, Anti-agglomérant: Stéarate de Magnésium, Lubrifiant: Talc, Capsule végétale en HPMC

PROPRIETES :

FLEXIMAX améliore la qualité du cartilage grâce à la combinaison du cartilage de requin et de l'Harpagophytum et permet ainsi un bien-être articulaire.

CONSEILS D'UTILISATION :

2 Gélules par jour.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Femmes enceintes ou allaitantes, demandez conseil à votre médecin.

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée

Ne pas laisser à la portée des enfants

A conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité

Fabriqué et Distribué par HEALTH INNOVATION

Food supplement, is not a medecine.

ONSSA N°: CAPV.59.217.19

N°Enregistrement au ministère de la santé:
DA20202002567DMP/20UCA/MA V2

LOT: 2103010
FAB: 03/2021
EXP: 03/2024
PVC: 149.00DH

FLEXIMAX

FORME ET PRESENTATION :

Boîte de 30 et 60 gélules.

COMPOSITION (par gélule) :

Substance active: Cartilage de requin 250mg, Extrait sec d'Harpagophytum 200mg, Agent de charge: Amidon de Maïs, Anti-agglomérant: Stéarate de Magnésium, Lubrifiant: Talc, Capsule végétale en HPMC

PROPRIETES :

FLEXIMAX améliore la qualité du cartilage grâce à la combinaison du cartilage de requin et de l'Harpagophytum et permet ainsi un bien-être articulaire.

CONSEILS D'UTILISATION :

2 Gélules par jour.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Femmes enceintes ou allaitantes, demandez conseil à votre médecin.

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée

Ne pas laisser à la portée des enfants

A conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité

Fabriqué et Distribué par HEALTH INNOVATION

Food supplement, is not a medecine.

ONSSA N°: CAPV.59.217.19

N°Enregistrement au ministère de la santé:
DA20202002567DMP/20UCA/MA V2

LOT: 2103010
FAB: 03/2021
EXP: 03/2024
PVC: 149.00DH