

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR TIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

ditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

tique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

entaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

Nº P19- 052995

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 2987

Société : RAM

83310

Actif

Pensionné(e)

Autre : Retraite

Nom & Prénom : KHOURAJSSI MOUSTAFA

Date de naissance : 1956

Adresse : SLOT Almaghrib JADID - Lissasta - CASA
APPT N° 1

Tél. : 0661081125

Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : / /

Nom et prénom du malade : SOUKRI BOUASSI

Age : 59 ans

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie : Etat grippal + fièvre + mal D.

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Signature de l'adhérent(e) :

Le : 11/09/2011

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE ANN 3212 Ourcq 95 22 98 38 12 GARANTIE 1 AN - Tél: 01 32 20 00 24	ANN 3212 Ourcq 95 22 98 38 12 -3 0024	MONTANT MASSIM 19650 TÉL: 09 63 10 55 52 TÉL: 09 20 42 97 90 00 24

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important:

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan d

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES		DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE		
		H 25533412 00000000 D 00000000 35533411	G 21433552 00000000 00000000 11433553	COEFFICIENT DES TRAVAUX
		[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession		
				MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

ORDONNANCE

CMT Le : 11/09/21

Mme Sarker Sana

5630

D-cure



180,00 T/100ml Vfle 3 flacons

- Doliprane 500 mg



14,30 T/100ml

- Fluorofen 500 mg



89,90 T/100ml



196,50 T/100ml

PHARMACIE ANNASSIM
Le Habiba N°82/2 Gafsa
Tunisie - NCA - Tel: 09 22 90 39 12
INPE: 093010552
ICE: 002042097600024





ZAVIT®

Tonus

Lot :

A consommer de
préférence avant le :
PPC : 89,90 DH

LOT 19_352
12/2022

Solution huileuse buvable

Ergo Maroc

Fabriqué par

SMB
 SMB TECHNOLOGY S.A.
 39 rue du Parc Industriel,
 B-6900 MARCHÉ-EN-FAMENNE, Belgique

6
118001320080

D-CURE · AMPOULE

25 000 جمیلیکیں

Digitized by srujanika@gmail.com

A CONSEIL :
Ces son embalage d'origine à l'air de la
limaille et une température ne dépassez
pas 25°C.
Hors de la poche des enfants.

Exceptions... asp..... ml
Incidences... la notice spéciale.
Lire attentivement la notice avant utilisation.

SMB

4 ampoules buvables

PPV: 56,30 DH
LOT: 21A05D
EXP: 01/2023

24

MCP210MA004118
26092200

- pour les enfants de 2 à 7 ans (environ 8 à 13 ans) : 1 comprimé par prise, à renouveler si besoin au bout de 6 heures, sans dépasser 4 comprimés par jour.
- pour les enfants de 4 à 11 ans (environ 12 à 15 ans) : 1 comprimé par prise, à renouveler si besoin au bout de 4 heures, sans dépasser 6 comprimés par jour.
- pour les adultes et enfants de plus de 12 ans : la posologie conseillée est de 1 à 2 comprimés par prise, à renouveler en cas de besoin au bout de 4 heures minimum. Il n'est généralement pas nécessaire de dépasser 3 g de paracétamol par jour, soit 8 comprimés par jour.
- NE JAMAIS PRENDRE PLUS DE 4 g DE PARACÉTAMOL PAR JOUR, (en tenant compte de tous les médicaments contenant du paracétamol dans leur formule).
- FREQUENCE ET MOMENTS AUXOULES LE MEDICAMENT DOIT ETRE ADMINISTRE toutes les médicaments contenant du paracétamol ou de l'aspirine.
- Les prises systématiques permettent d'éviter les oscillations de douleur ou de fièvre ; elles doivent être espacées, y compris la nuit, de 4 heures minimum.
- chez l'enfant, elles doivent être espacées de 4 heures minimum.
- MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION :
- Votre enfant, comme l'adulte, doit avoir une dissolution complète du comprimé dans un grand verre d'eau.
- QUELLES SONT LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES AVANT DE PRENDRE D'abord la partie C, comprenez-vous ?
- VOS (OU VOTRE ENFANT) NE DEVEZ PAS PRENDRE ce médicament si :
 - vous (ou votre enfant) souffrez d'une maladie grave du foie,
 - vous (ou votre enfant) souffrez d'un des constitutants du comprimé effervescent,
 - vous (ou votre enfant) êtes allergique au paracétamol ou à l'un des constitutants du comprimé effervescent.

COURSE A L'ADULTE ET A L'ENFANT A PARTIR DE 27 KG POUR LES ENFANTS PESENT MOINS DE 27 KG, IL EXISTE D'AUTRES PRÉSENTATIONS DE PHARMACIEN : DEMANDEZ CONSEIL A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Chez l'enfant : il est important de respecter les posologies définies en fonction du poids de l'enfant. Si vous ne connaissez pas le poids de l'enfant, il faut le peser afin de lui donner la dose la mieux adaptée.

La dose quotidienne de paracétamol recommandée est d'environ 60 mg/kg/jour, à répartir en 4 ou 6 prises, soit environ 15 mg/kg toutes les 6 heures ou 10 mg/kg toutes les 4 heures.

SE CONFORMER STRICTEMENT A LA PRESCRIPTION MÉDICALE.

A titre informatif, la posologie est :

QUE MEDICAMENT ?

soortique = 150 mg, pour un comprimé effervescent.

Orange vitamine C®

P P V 1 8 D H O O
P E R 1 2 / 2 3
P E R 1 3 5 1 7

18.00



- pour les enfants de 27 à 40 kg (environ 8 à 13 ans) : 1 comprimé par prise, à renouveler si besoin au bout de 6 heures, sans dépasser 4 comprimés par jour.
- pour les enfants de 4 à 15 ans) : 1 comprimé par prise, à renouveler si besoin au bout de 4 heures, sans dépasser 6 comprimés par jour.
- pour les adultes et enfants de 1 à 2 comprimés par prise, à renouveler au bout de 4 heures minimum. Il n'est généralement pas nécessaire de dépasser 3 g de paracétamol par jour, soit 8 comprimés par jour.
- NE JAMAIS PRENDRE PLUS DE 4 g DE PARACÉTAMOL PAR JOUR, (en tenant compte de tous les médicaments contenant du paracétamol dans leur formule).
- FREQUENCE ET MOMENTS AUXOULES LE MEDICAMENT DOIT ETRE ADMINISTRE Les prises systématiques permettent d'éviter les oscillations de douleur ou de fièvre ; elles doivent être espacées, Y compris la nuit, de chez l'enfant, elles doivent être espacées de 4 heures minimum.
- MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION : Voie orale. Boire immédiatement après dissolution complète du comprimé dans un grand verre d'eau.
- QUELLES SONT LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES AVANT DE PRENDRE Doltiprane Vous (ou votre enfant) devriez être au paracétamol ou à l'un des constitutants du comprimé effervescent.
- vous (ou votre enfant) souffrez d'une maladie grave du foie,
- vous (ou votre enfant) souffrez de calcul rénal.

COURSE A L'ADULTE ET A L'ENFANT A PARTIR DE 27 KG POUR LES ENFANTS PESENT MOINS DE 27 KG, IL EXISTE D'AUTRES PRESENTATIONS DE PHARMACIE DEMANDE CONSUL A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIE.
Chez l'enfant : il est important de respecter les posologies definies en fonction du poids de l'enfant Si vous ne connaissez pas le poids de l'enfant, il faut le peser afin de lui donner la dose la mieux adaptee.

La dose quotidienne de paracétamol recommandée est d'environ 60 mg/kg/jour, à répartir en 4 ou 6 prises, soit environ 15 mg/kg toutes les 6 heures ou 10 mg/kg toutes les 4 heures.

SE CONFORMER STRICTEMENT A LA PRESCRIPTION MEDICALE.

A titre informatif, la posologie est :

QUE MEDICAMENT ?

soorifique = 150 mg, pour un comprimé effervescent.

mol 500 mg + Vitamine C 150 mg

1

LOT : 191611
 UT AV : 11/2022
 PPV : 14, 30 DH

de Chlorphénamine

médicament.

is d'informations à votre médecin ou à votre
 aîs à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes
 fet indésirable non mentionné dans cette notice,

UTAVI : LOT N° : PPV (DH) :

Composition du médicament :**Principes actifs :**

Paracétamol	240,00mg
Maléate de chlorphénamine	3,20mg
Acide ascorbique	100,00 mg
Excipients	q.s.p une gélule

Excipients : Silice colloïdale, talc, stéarate de magnésium.

Classe pharmaco-thérapeutique :

ANTALGIQUE ANTIPYRÉTIQUE.

ANTIHISTAMINIQUE INHIBITEUR DES RECEPTEURS H1

Indications thérapeutiques :

Ce médicament contient du paracétamol, un antihistaminique, la chlorphénamine et de la vitamine C.

Il est indiqué pour le traitement symptomatique de l'écoulement nasal lors d'un rhume avec maux de tête et/ou fièvre chez l'adulte et l'enfant de plus de 12 ans.

Posologie

RESERVE A L'ADULTE ET A L'ENFANT DE PLUS DE 12 ANS.

La posologie usuelle est de :

1 gélule par prise, à renouveler en cas de besoin, au bout de 4 heures, sans dépasser 5 gélules par jour.

Mode et voie d'administration**voie orale**

Les gélules sont à avaler telles quelles avec une boisson (par exemple : eau, lait, jus de fruit).

Durée du traitement

La durée habituelle du traitement est de 5 jours.

Si la fièvre ne diminue pas au bout de 3 jours ou si les signes cliniques s'aggravent, ne continuez pas votre traitement sans l'avis de votre médecin.

Devant les signes cliniques généraux d'infection, une antibiothérapie par voie générale doit être envisagée.

Fréquence d'administration

Les prises de ce médicament doivent être espacées de 4 heures au minimum.

En cas de maladie grave des reins (insuffisance rénale sévère), les prises seront espacées de 8 heures minimum.

Compte tenu de l'effet sédatif de ce médicament, il est préférable de commencer le traitement le soir.

Contre-indications :

Ne prenez jamais RHINOFEERAL, gélule dans les cas suivants :

- Allergie connue au paracétamol ou aux antihistaminiques,
- Maladie grave du foie,
- Difficulté pour uriner d'origine prostatique ou autre,
- Glaucome.

Ce médicament ne doit GENERALEMENT PAS ETRE UTILISE pendant l'allaitement.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Effets indésirables :

Comme tous les médicaments, RHINOFEERAL, gélule est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Certains effets indésirables nécessitent **D'ARRETER IMMEDIATEMENT LE TRAITEMENT ET D'AVERTIR UN MEDECIN.**

Dans certains cas rares, il est possible que survienne une éruption ou une rougeur cutanée ou une réaction allergique pouvant se manifester par un brusque gonflement du visage et de cou ou par un malaise brutal avec chute de la pression artérielle. Il faut immédiatement arrêter le traitement, avertir votre médecin et ne plus jamais reprendre de médicaments contenant du paracétamol.

Exceptionnellement des modifications biologiques nécessitant un contrôle du bilan sanguin ont pu être observées : taux anormalement bas de certains globules blancs ou de certaines cellules du sang comme les plaquettes pouvant se traduire par des saignements de nez ou de gencives. Dans ce cas, consultez un médecin.

D'autres effets indésirables peuvent survenir :

- Somnolence, baisse de vigilance plus marquées en début de traitement,
- Baisse de la mémoire ou de la concentration, vertiges (plus fréquents chez le sujet âgé),
- Incordination motrice,
- Sécheresse de la bouche, troubles de l'accommodation, rétention d'urine, constipation, palpitations, baisse de pression