

## RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

### Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

### Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

### Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

### Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

### Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

### Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

### Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

### Adresses Mails utiles

- |                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| 0 Réclamation                      | : contact@mupras.com  |
| 0 Prise en charge                  | : pec@mupras.com      |
| 0 Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

## Déclaration de Maladie

N° W21-644753

84206



Mutuelle de Prévoyance  
& d'Actions Sociales  
de Royal Air Maroc

### Maladie

### Dentaire

### Optique

### Autres

Cadre réservé à l'adhérent(e)

4820

Société

Autre

Bolouet Asphalte

Matricule :

Actif

Pensionné(e)

Nom & Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

Tél. :

Total des frais engagés : ..... Dhs

Dr Omar HAJJI

Oncologue Médical

Salaj3 Bd. La Grande Ceinture Ain Diab

Casa-Anfa - Tél : 0520 66 68 90/91/92

Fax : 0522 64 81 52 / 0522 79 75 94

Cachet du médecin :

Date de consultation :

Nom et prénom du malade :

Lien de parenté :

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Signature de l'adhérent(e) :

Le : 09/09/2021

Autorisation CNDP N° : A-A-215/2019

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
31/8/2011	C1		<p><b>Dr. Omar</b> Chirurgien-Dentiste Salaaj Bd. La Grande Ceinture Ain Diab Casa-Anfa - Tel: 0522 66 68 90/91/92 Fax: 0522 64 81 52 / 0522 79 75 94</p>	Hajji INF

## ~~EXECUTION DES ORDONNANCES~~

EXÉCUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE YASMINA 77 RUE BNOU NAFIS HAY Yasmina Berrechid Tél: 05 22 53 31 88	03-08-21	515,80

## **ANALYSES - RADIOGRAPHIES**

ANALYSES - RADIOPHYSIES			
Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
 <b>LABORATOIRE DE RADILOGIE</b> <b>SIDI ABDELLAH</b> <b>CASABLANCA</b> <b>MAROC</b> 09/09/2022	31-08-2021	B 850 P T 100	1000 Dhs

#### AUXILIAIRES MEDICAUX

AUXILIAIRES MEDICAUX						Montant détaillé des Honoraires	
Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre					
		A M	P C	I M	I V		

## **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### **Important :**

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP : <input type="text"/>
				<input type="text"/> COEFFICIENT DES TRAVAUX
				<input type="text"/> MONTANTS DES SOINS
				<input type="text"/> DEBUT D'EXECUTION
				<input type="text"/> FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			<input type="text"/> COEFFICIENT DES TRAVAUX
	H	25533412 00000000	21433552 00000000	<input type="text"/> MONTANTS DES SOINS
D	G	35533411	11433553	<input type="text"/> DATE DU DEVIS
B				<input type="text"/> DATE DE L'EXECUTION
	<b>[Création, remont, adjonction]</b> Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

RADIOOTHERAPIE CONFORMATIONNELLE ET DOSIMETRIE 3D • RADIOTHERAPIE PAR MODULATION D'INTENSITE : IMRT • RAPID-ARC •  
RADIO-CHIRURGIE STEREOTAXIQUE • CURIETHERAPIE HAUT DEBIT • MEDECINE NUCLEAIRE • ONCOLOGIE MEDICALE • ONCO. HEMATOLOGIE  
GREFFE DE MOELLE OSSEUSE • RADIOLoGIE • CHIRURGIE CARCINOLOGIQUE • CHIRURGIE REPARATRICE ET ESTHETIQUE • SOINS INTENSIFS  
REANIMATION ET TRAITEMENT DE LA DOULEUR • SOINS PALLIATIFS • RADIOFREQUENCE • DEPISTAGE ET DIAGNOSTIC DES TUMEURS

Dr BELACH Mohamed 31/814

30/00x6

Dolman

Salaj

30-100

Lyrica 3x

LYRICA 75MG 66 gélules  
P.P.V : 307DH00

Laboratoires Pfizer S.A. Maroc



28-80

Vitamix 3x

Section Oncologique Hajji  
Bd. La Grande Ceinture Ain Diab  
3, Bd. La Grande Ceinture Ain Diab  
Anfa - Tel : 0522 64 81 52 / 0522 79 75 94  
Fax : 0522 22 79 75 94  
INPE : 091071013

515,80

DR OMAR HAJJI  
Oncologue Médical  
Salaj 3 Bd. La Grande Ceinture Ain Diab  
Casab-Anfa - Tel : 0520 66 68 90/91/92  
Fax : 0522 64 81 52 / 0522 79 75 94  
091071043

PHARMACIE YASMINOU  
77 RUE YASMINOU  
HAY Yasmina B  
Tél: 0522 53

# فيتافنفرين قوي 100 ملغ

## بنفوتيامين

6. مواطن الاستعمال:  
 لا يجب استعمال هذا الدواء في الحالات التالية:  
 - الأطفال أقل من 8 سنوات.  
 - أشخاص دوى الحساسية لفينوفيتامين.  
 على المuron لا يجب استعمال هذا الدواء خلال الرضاعة باستثناء إذا ارتأى طبيبك غير ذلك في حالة الشك من الضروري استشارة طبيبك أو صيدليكم.

7. الآثار الغير مرغوب فيها:  
 لا تترددوا في استشارة طبيبك أو صيدليكم والإشارة إلى أي آثر غير مرغوب فيه خاصة الآثار التي لا تتضمنها هذه النشرة.

8. الاحتياطات خاصة:  
 بسبب تواجد اللكتون والسكروز لا ينصح بأخذ هذا الدواء في حالة حساسية للفركتوز و تواجد الغالاكتوز بكثرة في الدم ناتج عن مرض خلقي أو أعراض عدم امتصاص اللاكتوز والغالاكتوز أو نقص في لكتاز (أمراض أيضية نادرة). قائمة السواع الذي من الواجب معرفته لاستعمال بدون خطر عند بعض المرضى:  
 اللاكتون والسكروز  
 .احتياطات الاستعمال:

- في حالة الشك، لا تترددوا في استشارة طبيبك أو صيدليكم

9. التفاعلات الدوائية:  
 لغرض تفادي تفاعلات بين الأدوية يتعين إطلاع طبيبك أو صيدليكم على أي علاج آخر تأخذونه

10. الحمل-الرضاعة:  
 ينصح بعدم أخذ فيتافنفرين<sup>\*</sup> قوي عند المرأة المرضعة و الحامل، في حالة اكتشاف الحمل أثناء العلاج بفينوفيريل قوي أطلاعوا طبيبك على العموم يتعين خلال الحمل أو الرضاعة استشارة طبيبك أو صيدليكم قبل استعمال أي دواء.

.....الآلات:

- PPV      حالة الإفراط في الجرعة:

- LOT      حالة نسبان أو الإفراط في الجرعة

PER      ن على الغلاف الخارجي

الـ

2012

ن العوام  
البيضاء

1. الشكل والتقديم:  
 علبة تحتوي على 30 قرصاً ملبيساً.

- احتفظ بهذه النشرة فقد تحتاج إلى قرائتها مجدداً.  
 - إذا كانت لديك أي أسئلة إضافية أو أي شكوك، استشر الطبيب أو الصيدلي للززيد من المعلومات.  
 - لقد وصف هذا الدواء لك لأن شخصياً لا يجد به إعانته للأخرين فقد يؤديهم حتى لو كانت عوارضهم مثل عوارضك

2. التركيب النوعي والكمي:  
 بنفوتيامين ..... 100 ملغ  
 السواغ ..... ما يكفي لقرص واحد  
 قائمة السواغ الذي من الواجب معرفته لاستعمال بدون خطر عند بعض المرضى: اللاكتون والسكروز

3. الصنف الصيدلي والعلاجي:  
 ينتمي بنفوتيامين إلى مجموعة الأدوية ذات التأثير على الجهاز الهضمي والمتبلل الغذائي.

4. الوصف:  
 علاج البري بري،  
 الوقاية من نقص الفيتامين B1 الناتج عن انخفاض في الاستهلاك الغذائي على سبيل المثال : سوء الامتصاص، الحمية الغذائية الغنية بالبروتينات، التغذية بالحقن. وبالاشتراك مع غيرها من الفيتامينات.

- يُنصح به الأشخاص الذين يشكون من التهاب الكحولية، و يتعاطون للمشروبات الكحولية، ينصح به في حالة التهاب الأعصاب، يستخدم بتركيزات عالية في بعض متلازمات المقدار/طريقة الاستعمال:

- المقدار: 2 إلى 4 أقراص خلال 24 ساعة.  
 في جميع الحالات يتعين التقديم بوصفة طبيبك طريقة الاستعمال:

- عن طريق الفم  
 مدة العلاج: تقدموا بوصفة طبيبك

28,80



# DOLTRAM®

37,5 mg/325 mg

Tramadol/Paracétamol

Comprimé pelliculé, boîte de

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament:

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques; cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## Composition :

Les substances actives sont:

Chlorhydrate de tramadol	37,50 mg
Paracétamol	325,00 mg

Pour un comprimé pelliculé:

Noyau: cellulose en poudre, amidon prégelatinisé, carboxyméthylamidon sodique, amidon de maïs, stéarate de magnésium.

Pelliculage: Opadry jaune, Cire de carnauba.

Liste des excipients à effet notable : sans objet

## Indications thérapeutiques :

DOLTRAM® est une association de 2 antalgiques, le tramadol et le paracétamol, qui agissent ensemble pour soulager vos douleurs.

DOLTRAM® est indiqué dans le traitement des douleurs modérées à intenses lorsque votre médecin pense qu'une association de tramadol et de paracétamol est nécessaire.

DOLTRAM® est réservé à l'adulte et l'adolescent à partir de 12 ans.

## Posologie :

### Mode et voie d'administration.

Les comprimés sont destinés à la voie orale.

Les comprimés doivent être avalés tels quels avec une boisson en quantité suffisante. Ils ne doivent pas être fractionnés, mordus.

## Durée du traitement.

Prenez toujours DOLTRAM® en respectant strictement les instructions de votre médecin. En cas d'incertitude, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

## Fréquence d'administration.

DOLTRAM® ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans.

Sauf prescription contraire de votre médecin, la dose initiale recommandée chez l'adulte et l'adolescent de plus de 12 ans est de 2 comprimés.

Des doses supplémentaires peuvent être administrées en fonction des besoins; se conformer à la prescription médicale.

L'intervalle entre les prises doit être au minimum de 6 heures.

Ne pas prendre plus de 8 comprimés de DOLTRAM® par jour.

Votre médecin peut augmenter le délai entre les prises:

- si vous avez plus de 75 ans; une maladie du rein; une maladie du foie.
- Il est conseillé de prendre DOLTRAM® pour une durée la plus courte possible.

## Contre-indications :

Ne prenez jamais DOLTRAM®, comprimé pelliculé:

- si vous avez eu une réaction allergique (par exemple: éruption cutanée, gonflement du visage, sifflement ou difficultés respiratoire) après avoir pris du tramadol ou du paracétamol ou tout autre composant de DOLTRAM®.
- en cas d'intoxication aiguë par l'alcool, par les somnifères, par d'autres médicaments contre la douleur ou des médicaments psychotropes (médicaments qui agissent sur l'humeur et les émotions),
- si vous prenez en même temps des Inhibiteurs de la Monoamine Oxydase (médicaments utilisés pour le traitement de la dépression ou la maladie de Parkinson) ou si vous en avez pris au cours des deux semaines précédant le traitement par DOLTRAM®.

- si vous avez une maladie grave du foie,
- si vous avez une épilepsie non contrôlée par un traitement.

## Effets indésirables :

Comme tous les médicaments, DOLTRAM®, comprimé pelliculé

Très Fréquents (plus de 1 patient sur 10):

- nausées, sensation de vertige, somnolence.

Fréquents (moins de 1 patient sur 10, mais plus de 1 patient)

- vomissements, digestion difficile (constipation, ballonnements)
- démangeaisons, sueurs, maux de tête, tremblements,

confusion, troubles du sommeil, modifications de l'humeur.

Peu Fréquents (moins de 1 patient sur 100, mais plus de 1 patient)

- augmentation de la pression artérielle, troubles du rythme cardiaque, éruptions, urticaire par exemple, picotements

membres, bourdonnements d'oreille, contractures musculaires, difficultés à avaler, sang dans les selles, frissons

Rares (moins de 1 patient sur 1000, mais plus de 1 patient)

convulsions, difficulté à coordonner les mouvements, d

transitoire [syncope]. Diminution du taux de sucre dans le

Les effets indésirables suivants ont été rapportés chez le

tramadol ou du paracétamol. Contactez votre médecin

DOLTRAM®, comprimé pelliculé :

- sensation de faiblesse lorsque vous vous levez après une modification de l'appétit, faiblesse musculaire, respiration

l'activité, modification de la perception, aggravation d'un asth

• dans de rares cas, une éruption cutanée, signe de réaction all

visage et du cou, des difficultés respiratoires ou une diminution de la pression artérielle et un arrêt temporaire de

concernés, arrêtez votre traitement et consultez immédiatement votre médecin. Vous ne devez pas continuer de prendre ce

traitement.

... de ... des effets indésirables.

30,00

R.P.V 300400  
PER 06124  
L.G. 81705



# DOLTRAM®

37,5 mg/325 mg

Tramadol/Paracétamol

Comprimé pelliculé, boîte de

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament:

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques; cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## Composition :

Les substances actives sont:

Chlorhydrate de tramadol	37,50 mg
Paracétamol	325,00 mg

Pour un comprimé pelliculé:

Noyau: cellulose en poudre, amidon prégelatinisé, carboxyméthylamidon sodique, amidon de maïs, stéarate de magnésium.

Pelliculage: Opadry jaune, Cire de carnauba.

Liste des excipients à effet notable : sans objet

## Indications thérapeutiques :

DOLTRAM® est une association de 2 antalgiques, le tramadol et le paracétamol, qui agissent ensemble pour soulager vos douleurs.

DOLTRAM® est indiqué dans le traitement des douleurs modérées à intenses lorsque votre médecin pense qu'une association de tramadol et de paracétamol est nécessaire.

DOLTRAM® est réservé à l'adulte et l'adolescent à partir de 12 ans.

## Posologie :

### Mode et voie d'administration.

Les comprimés sont destinés à la voie orale.

Les comprimés doivent être avalés tels quels avec une boisson en quantité suffisante. Ils ne doivent pas être fractionnés, mordus.

## Durée du traitement.

Prenez toujours DOLTRAM® en respectant strictement les instructions de votre médecin. En cas d'incertitude, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

## Fréquence d'administration.

DOLTRAM® ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans.

Sauf prescription contraire de votre médecin, la dose initiale recommandée chez l'adulte et l'adolescent de plus de 12 ans est de 2 comprimés.

Des doses supplémentaires peuvent être administrées en fonction des besoins; se conformer à la prescription médicale.

L'intervalle entre les prises doit être au minimum de 6 heures.

Ne pas prendre plus de 8 comprimés de DOLTRAM® par jour.

Votre médecin peut augmenter le délai entre les prises:

- si vous avez plus de 75 ans; une maladie du rein; une maladie du foie.
- Il est conseillé de prendre DOLTRAM® pour une durée la plus courte possible.

## Contre-indications :

Ne prenez jamais DOLTRAM®, comprimé pelliculé:

- si vous avez eu une réaction allergique (par exemple: éruption cutanée, gonflement du visage, sifflement ou difficultés respiratoire) après avoir pris du tramadol ou du paracétamol ou tout autre composant de DOLTRAM®.
- en cas d'intoxication aiguë par l'alcool, par les somnifères, par d'autres médicaments contre la douleur ou des médicaments psychotropes (médicaments qui agissent sur l'humeur et les émotions),
- si vous prenez en même temps des Inhibiteurs de la Monoamine Oxydase (médicaments utilisés pour le traitement de la dépression ou la maladie de Parkinson) ou si vous en avez pris au cours des deux semaines précédant le traitement par DOLTRAM®.

- si vous avez une maladie grave du foie,
- si vous avez une épilepsie non contrôlée par un traitement.

## Effets indésirables :

Comme tous les médicaments, DOLTRAM®, comprimé pelliculé

Très Fréquents (plus de 1 patient sur 10):

- nausées, sensation de vertige, somnolence.

Fréquents (moins de 1 patient sur 10, mais plus de 1 patient)

- vomissements, digestion difficile (constipation, ballonnements)
- démangeaisons, sueurs, maux de tête, tremblements,

confusion, troubles du sommeil, modifications de l'humeur.

Peu Fréquents (moins de 1 patient sur 100, mais plus de 1 patient)

- augmentation de la pression artérielle, troubles du rythme cardiaque, éruptions, urticaire par exemple, picotements

membres, bourdonnements d'oreille, contractures musculaires, difficultés à avaler, sang dans les selles, frissons

Rares (moins de 1 patient sur 1000, mais plus de 1 patient)

convulsions, difficulté à coordonner les mouvements, d

transitoire [syncope]. Diminution du taux de sucre dans le

Les effets indésirables suivants ont été rapportés chez le

tramadol ou du paracétamol. Contactez votre médecin

DOLTRAM®, comprimé pelliculé :

- sensation de faiblesse lorsque vous vous levez après une modification de l'appétit, faiblesse musculaire, respiration

l'activité, modification de la perception, aggravation d'un asth

• dans de rares cas, une éruption cutanée, signe de réaction all

visage et du cou, des difficultés respiratoires ou une diminution de la pression artérielle et un arrêt temporaire de

concernés, arrêtez votre traitement et consultez immédiatement votre médecin. Vous ne devez pas continuer de prendre ce

traitement.

... de ... des effets indésirables.

30,00

R.P.V 300400  
PER 06124  
L.G. 81705



# DOLTRAM®

37,5 mg/325 mg

Tramadol/Paracétamol

Comprimé pelliculé, boîte de

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament:

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques; cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## Composition :

Les substances actives sont:

Chlorhydrate de tramadol	37,50 mg
Paracétamol	325,00 mg

Pour un comprimé pelliculé:

Noyau: cellulose en poudre, amidon prégelatinisé, carboxyméthylamidon sodique, amidon de maïs, stéarate de magnésium.

Pelliculage: Opadry jaune, Cire de carnauba.

Liste des excipients à effet notable : sans objet

## Indications thérapeutiques :

DOLTRAM® est une association de 2 antalgiques, le tramadol et le paracétamol, qui agissent ensemble pour soulager vos douleurs.

DOLTRAM® est indiqué dans le traitement des douleurs modérées à intenses lorsque votre médecin pense qu'une association de tramadol et de paracétamol est nécessaire.

DOLTRAM® est réservé à l'adulte et l'adolescent à partir de 12 ans.

## Posologie :

Mode et voie d'administration.

Les comprimés sont destinés à la voie orale.

Les comprimés doivent être avalés tels quels avec une boisson en quantité suffisante. Ils ne doivent pas être fractionnés, mordus.

## Durée du traitement.

Prenez toujours DOLTRAM® en respectant strictement les instructions de votre médecin. En cas d'incertitude, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

## Fréquence d'administration.

DOLTRAM® ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans.

Sauf prescription contraire de votre médecin, la dose initiale recommandée chez l'adulte et l'adolescent de plus de 12 ans est de 2 comprimés.

Des doses supplémentaires peuvent être administrées en fonction des besoins; se conformer à la prescription médicale.

L'intervalle entre les prises doit être au minimum de 6 heures.

Ne pas prendre plus de 8 comprimés de DOLTRAM® par jour.

Votre médecin peut augmenter le délai entre les prises:

- si vous avez plus de 75 ans; une maladie du rein; une maladie du foie.
- Il est conseillé de prendre DOLTRAM® pour une durée la plus courte possible.

## Contre-indications :

Ne prenez jamais DOLTRAM®, comprimé pelliculé:

- si vous avez eu une réaction allergique (par exemple: éruption cutanée, gonflement du visage, sifflement ou difficultés respiratoire) après avoir pris du tramadol ou du paracétamol ou tout autre composant de DOLTRAM®.
- en cas d'intoxication aiguë par l'alcool, par les somnifères, par d'autres médicaments contre la douleur ou des médicaments psychotropes (médicaments qui agissent sur l'humeur et les émotions),
- si vous prenez en même temps des Inhibiteurs de la Monoamine Oxydase (médicaments utilisés pour le traitement de la dépression ou la maladie de Parkinson) ou si vous en avez pris au cours des deux semaines précédant le traitement par DOLTRAM®.

\* si vous avez une maladie grave du foie,

\* si vous avez une épilepsie non contrôlée par un traitement.

## Effets indésirables :

Comme tous les médicaments, DOLTRAM®, comprimé pelliculé

Très Fréquents (plus de 1 patient sur 10):

\* nausées, sensation de vertige, somnolence.

Fréquents (moins de 1 patient sur 10, mais plus de 1 patient)

\* vomissements, digestion difficile (constipation, ballonnements)

\* démangeaisons, sueurs, maux de tête, tremblements,

\* confusion, troubles du sommeil, modifications de l'humeur

Peu Fréquents (moins de 1 patient sur 100, mais plus de 1 patient)

\* augmentation de la pression artérielle, troubles du rythme

cutanées (éruptions, urticaire par exemple), picotements

membres, bourdonnements d'oreille, contractions musculaires, difficultés à avaler, sang dans les selles, frissons

Rares (moins de 1 patient sur 1000, mais plus de 1 patient)

\* convulsions, difficulté à coordonner les mouvements, d

transitoire [syncope]. Diminution du taux de sucre dans le

Les effets indésirables suivants ont été rapportés chez le

tramadol ou du paracétamol. Contactez votre médecin

DOLTRAM®, comprimé pelliculé :

\* sensation de faiblesse lorsque vous vous levez après une

modification de l'appétit, faiblesse musculaire, respiration

\* l'activité, modification de la perception, aggravation d'un asth

\* dans de rares cas, une éruption cutanée, signe de réaction all

visage et du cou, des difficultés respiratoires ou une diminution de la pression artérielle et un arrêt temporaire de

concernés, arrêtez votre traitement et consultez immédiatement votre médecin. Vous ne devez pas continuer de prendre ce

traitement.

30,00

R.P.V 300400  
PER 06124  
L.G. 81705



# DOLTRAM®

37,5 mg/325 mg

Tramadol/Paracétamol

Comprimé pelliculé, boîte de

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament:

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques; cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## Composition :

Les substances actives sont:

Chlorhydrate de tramadol	37,50 mg
Paracétamol	325,00 mg

Pour un comprimé pelliculé:

Noyau: cellulose en poudre, amidon prégelatinisé, carboxyméthylamidon sodique, amidon de maïs, stéarate de magnésium.

Pelliculage: Opadry jaune, Cire de carnauba.

Liste des excipients à effet notable : sans objet

## Indications thérapeutiques :

DOLTRAM® est une association de 2 antalgiques, le tramadol et le paracétamol, qui agissent ensemble pour soulager vos douleurs.

DOLTRAM® est indiqué dans le traitement des douleurs modérées à intenses lorsque votre médecin pense qu'une association de tramadol et de paracétamol est nécessaire.

DOLTRAM® est réservé à l'adulte et l'adolescent à partir de 12 ans.

## Posologie :

### Mode et voie d'administration.

Les comprimés sont destinés à la voie orale.

Les comprimés doivent être avalés tels quels avec une boisson en quantité suffisante. Ils ne doivent pas être fractionnés, mordus.

## Durée du traitement.

Prenez toujours DOLTRAM® en respectant strictement les instructions de votre médecin. En cas d'incertitude, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

## Fréquence d'administration.

DOLTRAM® ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans.

Sauf prescription contraire de votre médecin, la dose initiale recommandée chez l'adulte et l'adolescent de plus de 12 ans est de 2 comprimés.

Des doses supplémentaires peuvent être administrées en fonction des besoins; se conformer à la prescription médicale.

L'intervalle entre les prises doit être au minimum de 6 heures.

Ne pas prendre plus de 8 comprimés de DOLTRAM® par jour.

Votre médecin peut augmenter le délai entre les prises:

- si vous avez plus de 75 ans; une maladie du rein; une maladie du foie.
- Il est conseillé de prendre DOLTRAM® pour une durée la plus courte possible.

## Contre-indications :

Ne prenez jamais DOLTRAM®, comprimé pelliculé:

- si vous avez eu une réaction allergique (par exemple: éruption cutanée, gonflement du visage, sifflement ou difficultés respiratoire) après avoir pris du tramadol ou du paracétamol ou tout autre composant de DOLTRAM®.
- en cas d'intoxication aiguë par l'alcool, par les somnifères, par d'autres médicaments contre la douleur ou des médicaments psychotropes (médicaments qui agissent sur l'humeur et les émotions),
- si vous prenez en même temps des Inhibiteurs de la Monoamine Oxydase (médicaments utilisés pour le traitement de la dépression ou la maladie de Parkinson) ou si vous en avez pris au cours des deux semaines précédant le traitement par DOLTRAM®.

- si vous avez une maladie grave du foie,
- si vous avez une épilepsie non contrôlée par un traitement.

## Effets indésirables :

Comme tous les médicaments, DOLTRAM®, comprimé pelliculé

Très Fréquents (plus de 1 patient sur 10):

- nausées, sensation de vertige, somnolence.

Fréquents (moins de 1 patient sur 10, mais plus de 1 patient)

- vomissements, digestion difficile (constipation, ballonnements)
- démangeaisons, sueurs, maux de tête, tremblements,

confusion, troubles du sommeil, modifications de l'humeur.

Peu Fréquents (moins de 1 patient sur 100, mais plus de 1 patient)

- augmentation de la pression artérielle, troubles du rythme cardiaque, éruptions, urticaire par exemple, picotements

membres, bourdonnements d'oreille, contractures musculaires, difficultés à avaler, sang dans les selles, frissons

Rares (moins de 1 patient sur 1000, mais plus de 1 patient)

convulsions, difficulté à coordonner les mouvements, d

transitoire [syncope]. Diminution du taux de sucre dans le

Les effets indésirables suivants ont été rapportés chez le

tramadol ou du paracétamol. Contactez votre médecin

DOLTRAM®, comprimé pelliculé :

- sensation de faiblesse lorsque vous vous levez après une modification de l'appétit, faiblesse musculaire, respiration

l'activité, modification de la perception, aggravation d'un asth

• dans de rares cas, une éruption cutanée, signe de réaction all

visage et du cou, des difficultés respiratoires ou une diminution de la pression artérielle et un arrêt temporaire de

concernés, arrêtez votre traitement et consultez immédiatement votre médecin. Vous ne devez pas continuer de prendre ce

traitement.

30,00

R.P.V 300400  
PER 06124  
L.G. 81705



dain du

ez

je,

de

# DOLTRAM®

37,5 mg/325 mg

Tramadol/Paracétamol

Comprimé pelliculé, boîte de

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament:

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques; cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## Composition :

Les substances actives sont:

Chlorhydrate de tramadol	37,50 mg
Paracétamol	325,00 mg

Pour un comprimé pelliculé:

Noyau: cellulose en poudre, amidon prégelatinisé, carboxyméthylamidon sodique, amidon de maïs, stéarate de magnésium.

Pelliculage: Opadry jaune, Cire de carnauba.

Liste des excipients à effet notable : sans objet

## Indications thérapeutiques :

DOLTRAM® est une association de 2 antalgiques, le tramadol et le paracétamol, qui agissent ensemble pour soulager vos douleurs.

DOLTRAM® est indiqué dans le traitement des douleurs modérées à intenses lorsque votre médecin pense qu'une association de tramadol et de paracétamol est nécessaire.

DOLTRAM® est réservé à l'adulte et l'adolescent à partir de 12 ans.

## Posologie :

Mode et voie d'administration.

Les comprimés sont destinés à la voie orale.

Les comprimés doivent être avalés tels quels avec une boisson en quantité suffisante. Ils ne doivent pas être fractionnés, mordus.

## Durée du traitement.

Prenez toujours DOLTRAM® en respectant strictement les instructions de votre médecin. En cas d'incertitude, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

## Fréquence d'administration.

DOLTRAM® ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans.

Sauf prescription contraire de votre médecin, la dose initiale recommandée chez l'adulte et l'adolescent de plus de 12 ans est de 2 comprimés.

Des doses supplémentaires peuvent être administrées en fonction des besoins; se conformer à la prescription médicale.

L'intervalle entre les prises doit être au minimum de 6 heures.

Ne pas prendre plus de 8 comprimés de DOLTRAM® par jour.

Votre médecin peut augmenter le délai entre les prises:

- si vous avez plus de 75 ans; une maladie du rein; une maladie du foie.

Il est conseillé de prendre DOLTRAM® pour une durée la plus courte possible.

## Contre-indications :

Ne prenez jamais DOLTRAM®, comprimé pelliculé:

- si vous avez eu une réaction allergique (par exemple: éruption cutanée, gonflement du visage, sifflement ou difficultés respiratoire) après avoir pris du tramadol ou du paracétamol ou tout autre composant de DOLTRAM®.
- en cas d'intoxication aiguë par l'alcool, par les somnifères, par d'autres médicaments contre la douleur ou des médicaments psychotropes (médicaments qui agissent sur l'humeur et les émotions),
- si vous prenez en même temps des Inhibiteurs de la Monoamine Oxydase (médicaments utilisés pour le traitement de la dépression ou la maladie de Parkinson) ou si vous en avez pris au cours des deux semaines précédant le traitement par DOLTRAM®.

\* si vous avez une maladie grave du foie,

\* si vous avez une épilepsie non contrôlée par un traitement.

## Effets indésirables :

Comme tous les médicaments, DOLTRAM®, comprimé pelliculé

Très Fréquents (plus de 1 patient sur 10):

\* nausées, sensation de vertige, somnolence.

Fréquents (moins de 1 patient sur 10, mais plus de 1 patient)

\* vomissements, digestion difficile (constipation, ballonnements)

\* démangeaisons, sueurs, maux de tête, tremblements,

\* confusion, troubles du sommeil, modifications de l'humeur

Peu Fréquents (moins de 1 patient sur 100, mais plus de 1 patient)

\* augmentation de la pression artérielle, troubles du rythme

cutanées (éruptions, urticaire par exemple), picotements

membres, bourdonnements d'oreille, contractions musculaires, difficultés à avaler, sang dans les selles, frissons

Rares (moins de 1 patient sur 1000, mais plus de 1 patient)

\* convulsions, difficulté à coordonner les mouvements, d

transitoire [syncope]. Diminution du taux de sucre dans le

Les effets indésirables suivants ont été rapportés chez le

tramadol ou du paracétamol. Contactez votre médecin

DOLTRAM®, comprimé pelliculé :

\* sensation de faiblesse lorsque vous vous levez après une

modification de l'appétit, faiblesse musculaire, respiration

\* l'activité, modification de la perception, aggravation d'un asth

\* dans de rares cas, une éruption cutanée, signe de réaction all

visage et du cou, des difficultés respiratoires ou une diminution de la pression artérielle et un arrêt temporaire de

concernés, arrêtez votre traitement et consultez immédiatement votre médecin. Vous ne devez pas continuer de prendre ce

traitement.

... de ... des effets indésirables

30,00

R P V 3 0 0 4 0 0  
P E R 0 6 / 2 4  
L O I 8 1 7 0 5



dain du

ez

je,

de

# DOLTRAM®

37,5 mg/325 mg

Tramadol/Paracétamol

Comprimé pelliculé, boîte de

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament:

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques; cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## Composition :

Les substances actives sont:

Chlorhydrate de tramadol	37,50 mg
Paracétamol	325,00 mg

Pour un comprimé pelliculé:

Noyau: cellulose en poudre, amidon prégelatinisé, carboxyméthylamidon sodique, amidon de maïs, stéarate de magnésium.

Pelliculage: Opadry jaune, Cire de carnauba.

Liste des excipients à effet notable : sans objet

## Indications thérapeutiques :

DOLTRAM® est une association de 2 antalgiques, le tramadol et le paracétamol, qui agissent ensemble pour soulager vos douleurs.

DOLTRAM® est indiqué dans le traitement des douleurs modérées à intenses lorsque votre médecin pense qu'une association de tramadol et de paracétamol est nécessaire.

DOLTRAM® est réservé à l'adulte et l'adolescent à partir de 12 ans.

## Posologie :

### Mode et voie d'administration.

Les comprimés sont destinés à la voie orale.

Les comprimés doivent être avalés tels quels avec une boisson en quantité suffisante. Ils ne doivent pas être fractionnés, mordus.

## Durée du traitement.

Prenez toujours DOLTRAM® en respectant strictement les instructions de votre médecin. En cas d'incertitude, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

## Fréquence d'administration.

DOLTRAM® ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans.

Sauf prescription contraire de votre médecin, la dose initiale recommandée chez l'adulte et l'adolescent de plus de 12 ans est de 2 comprimés.

Des doses supplémentaires peuvent être administrées en fonction des besoins; se conformer à la prescription médicale.

L'intervalle entre les prises doit être au minimum de 6 heures.

Ne pas prendre plus de 8 comprimés de DOLTRAM® par jour.

Votre médecin peut augmenter le délai entre les prises:

- si vous avez plus de 75 ans; une maladie du rein; une maladie du foie.
- Il est conseillé de prendre DOLTRAM® pour une durée la plus courte possible.

## Contre-indications :

Ne prenez jamais DOLTRAM®, comprimé pelliculé:

- si vous avez eu une réaction allergique (par exemple: éruption cutanée, gonflement du visage, sifflement ou difficultés respiratoire) après avoir pris du tramadol ou du paracétamol ou tout autre composant de DOLTRAM®.
- en cas d'intoxication aiguë par l'alcool, par les somnifères, par d'autres médicaments contre la douleur ou des médicaments psychotropes (médicaments qui agissent sur l'humeur et les émotions),
- si vous prenez en même temps des Inhibiteurs de la Monoamine Oxydase (médicaments utilisés pour le traitement de la dépression ou la maladie de Parkinson) ou si vous en avez pris au cours des deux semaines précédant le traitement par DOLTRAM®.

- si vous avez une maladie grave du foie,
- si vous avez une épilepsie non contrôlée par un traitement.

## Effets indésirables :

Comme tous les médicaments, DOLTRAM®, comprimé pelliculé

Très Fréquents (plus de 1 patient sur 10):

- nausées, sensation de vertige, somnolence.

Fréquents (moins de 1 patient sur 10, mais plus de 1 patient)

- vomissements, digestion difficile (constipation, ballonnements)
- démangeaisons, sueurs, maux de tête, tremblements,

confusion, troubles du sommeil, modifications de l'humeur.

Peu Fréquents (moins de 1 patient sur 100, mais plus de 1 patient)

- augmentation de la pression artérielle, troubles du rythme cardiaque, éruptions, urticaire par exemple, picotements
- membres, bourdonnements d'oreille, contractures musculaires, difficultés à avaler, sang dans les selles, frissons

Rares (moins de 1 patient sur 1000, mais plus de 1 patient)

convulsions, difficulté à coordonner les mouvements, d

transitoire [syncope]. Diminution du taux de sucre dans le

Les effets indésirables suivants ont été rapportés chez le

tramadol ou du paracétamol. Contactez votre médecin

DOLTRAM®, comprimé pelliculé :

sensation de faiblesse lorsque vous vous levez après une

modification de l'appétit, faiblesse musculaire, respiration

l'activité, modification de la perception, aggravation d'un asth

• dans de rares cas, une éruption cutanée, signe de réaction all

visage et du cou, des difficultés respiratoires ou une diminution de la pression artérielle et un arrêt temporaire de

concernés, arrêtez votre traitement et consultez immédiatement votre médecin. Vous ne devez pas continuer de prendre ce

traitement.

30,00

R.P.V 300400  
PER 06124  
L.G. 81705



dain du

ez

je,

de

RADIOOTHERAPIE CONFORMATIONNELLE ET DOSIMETRIE 3D • RADIOTHERAPIE PAR MODULATION D'INTENSITE : IMRT • RAPID-ARC •  
 RADIO-CHIRURGIE STEREOTAXIQUE • CURIETHERAPIE HAUT DEBIT • MEDECINE NUCLEAIRE • ONCOLOGIE MEDICALE • ONCO. HEMATOLOGIE  
 GREFFE DE MOELLE OSSEUSE • RADILOGIE • CHIRURGIE CARCINOLOGIQUE • CHIRURGIE REPARATRICE ET ESTHETIQUE • SOINS INTENSIFS  
 REANIMATION ET TRAITEMENT DE LA DOULEUR • SOINS PALLIATIFS • RADIOFREQUENCE • DEPISTAGE ET DIAGNOSTIC DES TUMEURS

NOM & PRÉNOM :

Beldioui Djamel

Date :

31/01/11

AGE :

ORGANISME GESTIONNAIRE :

MIVPRES

N° ADMISSION :

### BILANS BIOLOGIQUES

HEMOGRAMME : NFS + plq

BILAN D'HÉMOSTASE : TP  PDF  TCK  Fibrinogène  INR  D-dimères

### BILAN BIOCHIMIQUE :

Ionogramme Complet  Na+  Mg+  Protéines  Fer sérique  Glycémie à jeun

Reserve alcaline  K+  Ca++  Albumine  Ferritine  Cl-  Ph

EPP  Triglycerides  Cholest.total  HDL  LDL  Urée + creat

Clairance de la créatinine  Bilirub. totale  Bilirubine directe  ALAT  ASAT

Ph. alcalines  LDH  GammaGT  Hemoculture  ECBU

CRP  PCT  CPK  CPKmb  TROPONINE

### MARQUEURS TUMORAUX

ACE  CA19-9  CA15-3  CEA  AFP  Thyroglobuline

PSA  Calcitonine  NSE  CA125  β2-microglobuline  β-HCG

### AUTRES:



MEDECIN



# مختبر التحاليل الطبية الرگراچي

## LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES REGAGUI

S. MESTASSI  
Biogiste Diplomé de la faculté  
De Médecine et de Pharmacie  
de Clermont Ferrand

**FACTURE N° : 2108312026**

Casablanca le 31-08-2021

**Mr Mohammed BELOUCH**

Date de l'examen : 31-08-2021

INPE :

Caisse : **MUPRAS**



Analyses :

### Récapitulatif des analyses

CN	Analyse	Val	Clefs
9105	Forfait traitement échantillon sanguin	E11.5	E
0216	Numération formule	B80	B

TOTAL DOSSIER : 100 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de : cent dirhams





S. MESTASSI  
 Biologiste Diplômé de la faculté  
 De Médecine et de Pharmacie  
 de Clermont Ferrand



Né (e) le: 01-01-1955, âgé (e) de : 66 ans  
 Enregistré le: 31-08-2021 à 09:53  
 Edité le: 31-08-2021 à 10:05  
 Prélèvement : reçu  
 Le : 31-08-2021 à 09:50

**Mr Mohammed BELOUCH**

Référence : 2108312026

Prescrit par : Dr HAJJI Omar

## HEMATOCYTOLOGIE

### Numération formule sanguine

(Cytométrie en flux et Impédance Beckman Coulter)

#### Numération

Hématies	3.35	10 <sup>6</sup> /mm <sup>3</sup>	(4.50–6.20)
Hémoglobine	10.0	g/dl	(13.0–16.6)
Hématocrite	30.0	%	(40.0–52.0)
– VGM	90	fL	(80–98)
– TCMH	30	pg	(27–33)
– CCMH	33	g/dl	(32–36)
Leucocytes	7 400	/mm <sup>3</sup>	(4 000–10 000)

#### Formule leucocytaire

Polynucléaires Neutrophiles	70.7	%	
	5 232	mm <sup>3</sup>	(1 800–7 500)
Polynucléaires Eosinophiles	6.5	%	
	481	/mm <sup>3</sup>	(0–700)
Polynucléaires Basophiles	0.0	%	
	0	/mm <sup>3</sup>	(0–200)
Lymphocytes	13.6	%	
	1 006	/mm <sup>3</sup>	(1 000–4 000)
Monocytes	9.2	%	
	681	/mm <sup>3</sup>	(100–1 000)
Plaquettes	303	10 <sup>3</sup> /mm <sup>3</sup>	(150–500)
VPM	9.8	fl	(6.0–12.0)



Compte rendu imprimé en **recto verso** ; prière de tourner la page si nécessaire

Page **1** sur **1**

Angle Bd. Sidi Abderrahmane et Bd. A. Boutaleb – Casablanca – Tél. 0522 90 09 67 – 89 28 06 – Fax 0522 90 09 27

ICE 00164322300003 – IF 51452915 – Patente 35003829 – CNSS 2565507 – N° Autor. Ex. 21753 INP 093002863

E-mail: lamregragui@gmail.com