

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Diagnostique et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com
Prise en charge : pec@mupras.com
Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge
Casablanca 20000 - Tél : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° M21- 0051883

☐ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☒ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1053 Société : R.A.M.
☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre : Retraité
Nom & Prénom : K.H. DIOU - Khadija
Date de naissance : 29/02/1948 CASSA
Adresse : 342 Bd Oued Oum Rakia ouf
Tél : 066226446 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin : Dr. M. BOUZOUBAA CARDIOLOGUE
Date de consultation : 31/08/2021
Nom et prénom du malade : Khadija Khadja Age :
Lien de parenté : ☐ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant
Nature de la maladie : H7A - M30
En cas d'accident préciser les causes et circonstances :
Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Signature de l'adhérent(e) : Le : 31/08/2021

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
31/08/2021	C.E.C.G.		3000hs	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	31/08/2021	2800, Jd

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
	31/08/2021	echographie	8000hs
	31/08/21	B.1040	1500hs

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.


Important :

Veillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan d

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient															
				COEFFICIENT DES TRAVAUX														
				MONTANTS DES SOINS														
				DEBUT D'EXECUTION														
				FIN D'EXECUTION														
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE <table border="1"> <tr> <td colspan="2">H</td> </tr> <tr> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>G</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> <tr> <td colspan="2">B</td> </tr> </table> <p>(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession</p>			H		25533412	21433552	00000000	00000000	D	G	00000000	00000000	35533411	11433553	B		COEFFICIENT DES TRAVAUX
H																		
25533412	21433552																	
00000000	00000000																	
D	G																	
00000000	00000000																	
35533411	11433553																	
B																		
				MONTANTS DES SOINS														
				DATE DU DEVIS														
				DATE DE L'EXECUTION														

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION



CABINET DE CARDIOLOGIE ET D'EXPLORATIONS CARDIO-VASCULAIRES

Le 31/08/2021

باسم الشافي


Mme KHIDIQUI KHADIJA

37,8097

1/ SECTRAL 200



1/2 CP / J Matin




39,3014

2/ TENSEMIDE 5



1/2 CP / J Matin



27,7017

3/ CARDIO-ASPIRINE



1 CP / J Midi

4/ CALCINIB 5

1 CP / J Midi

108,00123

5/ RAMIPRIL WIN 10



1 CP / J Soir

97,6098

6/ NOCOL 20



1 CP / J Soir

2800,50

Traitement de 3... Mois

TRAITEMENT A NE PAS ARRETER JUSQU'A LA PROCHAINE VISITE.

صيدلية المنال
Pharmacie El Manni
Dr. El Manni
320 Bd. Oum El Farah, Casablanca
Tél: 05 22 27 29 29

الدكتور محمد بوزوع

أمراض القلب والشرابين

Dr. M. BOUZOUBAÂ

CARDIOLOGUE

Echocardiographie Doppler Couleur

Echo Doppler Veineux et Artériel

Holter Tensionnel

Holter Rythmique

Epreuve d'Effort

Urgences Cardiologiques

NOCOL®

COMPOSITIONS :
Simvastatine (DCI)
Excipients q.s.

1 comprimé

cardiovasculaire).

patients ayant des antécédents de

patients diabétiques sans antécédents coronariens ni cérébro-vasculaires ayant un haut risque

avant (hypertension, âge ≥ 65 ans, créatinine élevée, tabagisme présent ou passé), avec ou

b et III) en complément d'un régime adapté et assidu. Pour ces indications, la poursuite

céridermie isolée (types I, IV et V) : la simvastatine n'est pas indiquée.

minases.
Interaction).

consultez votre médecin ou de votre pharmacien.

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

Précaution en cas de :

musculaires, augmentant avec la dose, une évaluation précise du rapport efficacité/sécurité sera

ment 80 mg.

NOCOL nécessite d'interrompre le traitement (grossesse/allaitement)

entre-indiqué en cas de galactosémie congénitale, de syndrome de malabsorption du glucose

s élévations modérées (inférieures à 3 fois la limite supérieure des valeurs normales) des

it par la simvastatine. Ces élévations, survenues peu de temps après l'instauration du traitement,

d'aucune symptomatologie clinique. L'interruption du traitement n'a pas été nécessaire. Une

le doit conduire à l'arrêt du traitement. Il est recommandé de pratiquer des tests fonctionnels

indiqué cliniquement. Chez les patients dont la dose est augmentée à 80 mg, des tests

posologiques, 3 mois après l'ajustement à 80 mg, puis périodiquement ensuite (par exemple,

s transaminases augmentent ; chez ces patients, les dosages devront être répétés rapidement

des transaminases, en particulier au-delà de 3 fois la limite supérieure de la normale et si cette

ents consommant d'importantes quantités d'alcool et/ou présentant un antécédent de maladie hépatique.

ues de créatine phosphokinase (CPK) d'origine musculaire sont communément observées chez les

atuellement pas de retentissement clinique.

se s'associe rarement à la survenue d'atteintes musculaires. Devant des signes cliniques évocateurs

ou faiblesse musculaire), un dosage de la CPK d'origine musculaire sera pratiqué.

ient présentant des myalgies diffuses, une sensibilité musculaire douloureuse et/ou une élévation

ars à 5 fois la normale) ; dans ces conditions, le traitement doit être arrêté

s inhibiteurs de l'HMG Co-A réductase sont augmentés par l'association à des médicaments qui

nt administrés seuls, tels que les fibrates.

gué secondaire à la myoglobulinurie ont été rapportés.

destra être interrompu ou arrêté en cas de survenue d'un facteur prédisposant à l'apparition d'une

e (infection aiguë sévère, hypotension, intervention chirurgicale majeure, traumatisme majeur,

riques sévères, épilepsie non contrôlée).

pas été établies, la simvastatine n'est pas recommandée chez l'enfant. De plus, il n'existe pas

t d'hypercholestérolémie familiale homozygote.

utilisation d'une dose supérieure à 40 mg ne devrait être envisagée après 70 ans que sous une

Associations contre-indiquées :

- Antiprotéases (ampénavir, indinavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir) : risque majoré d'effets indésirables (dose-dépendants) à type de rhabdomyolyses

(diminution du métabolisme hépatique de l'hypocholestérolémiant). Utiliser une autre statine.

- Itraconazole, kétoconazole (par extrapolation à partir de l'itraconazole) : risque majoré d'effets indésirables (dose-dépendants) à type de rhabdomyolyses

par diminution du métabolisme hépatique de l'hypocholestérolémiant. Utiliser une autre statine ou interrompre le traitement hypocholestérolémiant pendant

la durée du traitement par l'itraconazole (ou le kétoconazole).

- Delavirdine : risque majoré d'effets indésirables (dose-dépendants) à type de rhabdomyolyse (diminution du métabolisme hépatique de

l'hypocholestérolémiant). Utiliser une autre statine.

راميبيريل وين® راميبيريل

قرص قابل للكسر

يرجى الاطلاع على هذه النشرة بأكملها قبل
• احتفظ بهذه النشرة، قد تحتاج إلى قراءتها
• إذا كانت لديك أسئلة أخرى، إذا كان لديك
• لقد تم وصف هذا الدواء لك بشكل شخصي
• مشابهة، لأنك قد تسبب الضرر له.
• إذا أصبحت أحد الأعراض غير المرغوب
• مذكور في هذه النشرة، تحدث عن ذلك مع

1. ما هو راميبيريل وين، قرص قابل للكسر
2. ما المعلومات الضرورية قبل تناول راميبيريل وين
3. كيف يمكن تناول راميبيريل وين، قرص قابل للكسر
4. ما هي التأثيرات غير المرغوب
5. ما هي المعلومات الإضافية

راميبيريل وين، قرص قابل للكسر يحتوي على
أنزيم التحليل.

يصح باستخدام راميبيريل وين، قرص قابل للكسر
• لعلاج ضغط الدم المرتفع.

• إذا كنت تعاني من حساسية (حساسية مغ)
الموجودة بـراميبيريل وين، قرص قابل للكسر
• علامات الحساسية يمكن أن تشمل طفح جلدي

• إذا كنت حاملاً لأكثر من 3 أشهر كما
بدية الحمل (انظر فقرة الحمل والرضاعة).

Ramipril Win® Ramipril

5 mg 10 mg

Ramipril Win, comprimé sécable

tégralité de cette

voir besoin de la relire.
si vous avez un doute, de

ellement prescrit. Ne le
lentiques, cela pourrait l
grave ou si vous remar
à votre médecin ou à v

é sécable et dans quels cas est-il utilisé ?
re avant de prendre Ramipril Win, comprimé sécable ?
rimé sécable ?
uels ?

Comment conserver Ramipril Win, comprimé sécable ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE RAMIPRIL WIN, comprimé sécable EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique

Ramipril Win, comprimé sécable contient un médicament appartenant à un groupe de médicaments appelés IEC (inhibiteurs de l'enzyme de conversion).
Ramipril Win, comprimé sécable agit en :

- Diminuant la production par votre organisme de substance qui agit sur la pression artérielle,
- Faisant se relâcher et se dilater vos vaisseaux sanguins,
- Facilitant à votre cœur le pompage du sang à travers l'organisme.

Indications thérapeutiques

Ramipril Win, comprimé sécable peut être utilisé :

- Pour traiter une pression artérielle élevée (hypertension).
- Pour réduire le risque d'avoir une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral.
- Pour réduire le risque ou retarder l'aggravation de problème de diabète.
- Pour traiter votre cœur lorsqu'il ne peut pas pomper une quantité suffisante de sang (insuffisance cardiaque).
- En traitement à la suite d'une crise cardiaque (infarctus du myocarde).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE RAMIPRIL WIN, comprimé sécable ?

Contre-indications

Ne prenez jamais Ramipril Win, comprimé sécable

- Si vous présentez une allergie (hypersensibilité) au ramipril ou à l'un des autres composants contenus dans Ramipril Win, comprimé sécable.
- Informations supplémentaires.
- Les signes d'une réaction allergique peuvent inclure un gonflement de la gorge ou de la langue, un gonflement de la gorge ou de la langue, un gonflement de la gorge ou de la langue, un gonflement de la gorge ou de la langue, un gonflement de la gorge ou de la langue.
- Si vous avez déjà présenté une réaction allergique grave appelée « angioedème ». Les signes comportent des démangeaisons, une urticaire, des marques rouges sur les mains, les pieds et les lèvres, des difficultés à respirer et à avaler.
- Si vous suivez une dialyse ou tout autre type de traitement par machine utilisée, Ramipril Win, comprimé sécable pourrait être contre-indiqué.
- Si vous avez des problèmes rénaux ou du fait de la réduction de la fonction rénale.
- Si vous êtes enceinte depuis plus de 3 mois. Il est également préférable d'éviter de prendre

Vérifiez auprès de votre médecin.

Si vous souffrez d'une maladie rénale, votre médecin pourra vous prescrire une dose plus faible.

Si vous souffrez d'une maladie rénale, votre médecin pourra vous prescrire une dose plus faible.

Si vous souffrez d'une maladie rénale, votre médecin pourra vous prescrire une dose plus faible.

Si vous souffrez d'une maladie rénale, votre médecin pourra vous prescrire une dose plus faible.

Si vous souffrez d'une maladie rénale, votre médecin pourra vous prescrire une dose plus faible.

Si vous souffrez d'une maladie rénale, votre médecin pourra vous prescrire une dose plus faible.

Si vous souffrez d'une maladie rénale, votre médecin pourra vous prescrire une dose plus faible.

Si vous souffrez d'une maladie rénale, votre médecin pourra vous prescrire une dose plus faible.

Si vous souffrez d'une maladie rénale, votre médecin pourra vous prescrire une dose plus faible.

Si vous souffrez d'une maladie rénale, votre médecin pourra vous prescrire une dose plus faible.

Si vous souffrez d'une maladie rénale, votre médecin pourra vous prescrire une dose plus faible.

Si vous souffrez d'une maladie rénale, votre médecin pourra vous prescrire une dose plus faible.

Si vous souffrez d'une maladie rénale, votre médecin pourra vous prescrire une dose plus faible.

Si vous souffrez d'une maladie rénale, votre médecin pourra vous prescrire une dose plus faible.

Si vous souffrez d'une maladie rénale, votre médecin pourra vous prescrire une dose plus faible.

Si vous souffrez d'une maladie rénale, votre médecin pourra vous prescrire une dose plus faible.

Si vous souffrez d'une maladie rénale, votre médecin pourra vous prescrire une dose plus faible.

Si vous souffrez d'une maladie rénale, votre médecin pourra vous prescrire une dose plus faible.

Si vous souffrez d'une maladie rénale, votre médecin pourra vous prescrire une dose plus faible.

1. DENOMINATION :

TENSEMIDE® 2,5 mg, 5 mg, 10 mg comprimés

Donnée de 30 comprimés

Cl : torasémide

LOT: 12220002

PER: 09/2023

PPU: 39,30 DH

livement cette notice avant de
ment.

Si vous remarquez des effets indésirables, vous pourriez avoir besoin de la
refaire.

LOT: 12220002

PER: 09/2023

PPU: 39,30 DH

autre question, si vous avez un
information à votre médecin ou à

Si vous n'avez pas été personnellement prescrit. Ne
prenez pas un autre, même en cas de
symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si les effets indésirables deviennent graves ou si vous
résistez à la prise de ce médicament, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

LOT: 12220001

PER: 03/2023

PPU: 39,30 DH

TENSEMIDE® 2,5 mg, 5 mg et 10 mg

Tenir hors la portée et la vue

• Composition en substance active :

TENSEMIDE® 2,5 mg : chaque comprimé contient 2,5 mg de
torasémide

que comprimé contient 5 mg de

LOT: 12220002

PER: 09/2023

PPU: 39,30 DH

que comprimé contient 10 mg de

• Composition en excipient :

Les excipients sont : lactose monohydraté, amidon de maïs,
silice colloïdale et stéarate de magnésium.

• Liste des excipients à effet notoire :

Lactose monohydraté, amidon de maïs.

3. CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE OU TYPE D'ACTIVITE

TENSEMIDE® 2,5 mg, 5 mg et 10 mg comprimés est un
médicament diurétique (augmente l'élimination de l'urine) et il
appartient au groupe des « diurétiques de l'anse : sulfamides,
monodrogues ».

4. INDICATIONS THERAPEUTIQUES

TENSEMIDE® 2,5 mg est indiqué pour le traitement de
l'hypertension.

TENSEMIDE® 5 mg, 10 mg sont indiqués pour :

- l'œdème (rétention de liquide) dû à une insuffisance
cardiaque congestive, maladie rénale ou hépatique.
- hypertension.

5. POSOLOGIE :

Conformez-vous strictement aux instructions d'administration
à moins qu'il vous soit recommandé par votre médecin de
suivre d'autres instructions différentes. Rappelez-vous de
prendre votre médicament. La durée de traitement avec
TENSEMIDE® 2,5 mg, 5 mg et 10 mg vous sera indiquée
par votre médecin. Veuillez ne pas interrompre votre

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés
dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre
pharmacien.

8. MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :

• maladie hépatique grave étant donné que le torasémide peut
précipiter l'apparition d'un coma.

• chez les sujets présentant des faibles niveaux de sodium ou
potassium sanguin, ou encore un faible volume sanguin.

• trouble cardiaque spécialement chez les sujets traités avec
les glucosides digitaliques, étant donné qu'ils augmentent le
risque de survenue des arythmies cardiaques.

• la goutte ou diabète mellitus.

• insuffisance rénale ou des problèmes urinaires.

• baisse de la tension artérielle (hypotension)).

• en absence de données sur la sécurité et l'efficacité chez les
enfants, l'utilisation de ce médicament chez ce groupe de
patients doit être évitée.

♦ Informations importantes sur les composants de TENSEMIDE® 2,5 mg, 5 mg et 10 mg, comprimés

Ce médicament contient du lactose. Si vous présentez une
intolérance à certains sucres, demandez l'avis de votre
médecin avant la prise de ce médicament. Ce médicament ne
contient pas de gluten.

9. INTERACTIONS :

♦ Interaction avec d'autres médicaments :

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si
vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament,
même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.
De plus, veuillez signaler à votre médecin en cas d'utilisation
d'un de ces médicaments pouvant interagir avec le
torasémide :

- Les glucosides cardiaques comme la digoxine
(médicaments pour le cœur), antihypertenseurs (en particulier
les IECA), théophylline (médicaments pour le traitement de
l'asthme), étant donné que l'effet de ces médicaments peut
augmenter.

- Minéralocorticoïdes, glucocorticoïdes et les laxatifs : le
torasémide peut augmenter l'élimination du potassium produit
par ces médicaments.

- Antibiotiques du groupe des aminoglycosides : peuvent
augmenter la toxicité au niveau du rein et de l'ouïe.

- Cisplatine (médicament pour le traitement du cancer), lithium
(médicament antidépresseur), salicylates, acide
éthacrynique, étant donné que le torasémide peut augmenter
la toxicité de ces médicaments.

- Médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens (par
exemple ibuprofène, indométacine), probenecid (médicament
antigoutteux), colestyramine (médicaments destinés à
diminuer le cholestérol dans le sang) : peuvent diminuer l'effet
de torasémide.

- Médicaments pour le traitement du diabète : le torasémide
peut diminuer l'effet de ces médicaments.

♦ Interaction de TENSEMIDE® 2,5 mg, 5 mg et 10 mg comprimés avec les aliments et boissons :

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Cardioaspirine 100 mg/30cps
Acide acétylsalicylique

P.P.V. : 27,70 DH

Bayer S.A.



Cardioaspirine 100 mg/30cps
Acide acétylsalicylique

P.P.V. : 27,70 DH

Bayer S.A.



Cardioaspirine 100 mg/30cps
Acide acétylsalicylique

P.P.V. : 27,70 DH

Bayer S.A.



soin de la relire.

z plus d'informations à votre médecin ou à votre pharma-

t prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même
irrait lui être nocif.

grave ou si vous remarquez un effet indésirable non
votre médecin ou à votre pharmacien.

ARDIOASPIRINE®

100 mg, comprimés gastro-résistants

Cardioaspirine 100 mg/30cps
Acide acétylsalicylique

P.P.V. : 27,70 DH

Bayer S.A.



Mode d'emploi :

1. Qu'est ce que CardioAspirine 100 mg et dans quel cas est-il utilisé ?

Cardioaspirine 100 mg/30cps
Acide acétylsalicylique

P.P.V. : 27,70 DH

Bayer S.A.



as informations nécessaires à connaître avant de prendre CardioAspirine 100 mg ?

ndre CardioAspirine 100 mg ?

s effets indésirables éventuels ?

server CardioAspirine 100 mg ?

supplémentaires

QUE CARDIOASPIRINE 100 MG ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Cardioaspirine 100 mg/30cps
Acide acétylsalicylique

P.P.V. : 27,70 DH

Bayer S.A.



CardioAspirine contient comme principe actif l'acide acétylsalicylique. Ce dernier inhibe, à doses réduites
des plaquettes sanguines. Grâce à un enrobage résistant à l'acidité gastrique, le
dissout que dans l'intestin grêle. C'est pour cette raison que CardioAspirine ménage la
mue.

à doit être pris que selon la prescription du médecin.

est indiqué pour:

des thromboses artérielles après des opérations sur les artères coronaires (pontage et
d'une sténose des artères coronaires);

des attaques cérébrales, suite à l'apparition de signes précurseurs (accidents ischémiques
AIT);

des thromboses artérielles (caillots sanguins dans les vaisseaux coronaires) suite à un
phylaxie secondaire de l'infarctus);

de l'infarctus du myocarde chez les patients chez lesquels le médecin a constaté un risque
de complications concomitantes telles que hypertension artérielle, diabète sucré, taux de lipides

Cardioaspirine 100 mg/30cps
Acide acétylsalicylique

P.P.V. : 27,70 DH

Bayer S.A.





SECTRAL® 200mg

LOT : 9MA011V
PER : 12 2021

SECTRAL 200 MG
CP PEL B20

P.P.V. : 37DH80



Si
: cette notice avant

soin de la reli
un doute, der
crit. Ne le d
symptômes
indésirable
le non men
u à votre p.

pelliculé et dans quels

LOT : 9MA011V
PER : 12 2021

SECTRAL 200 MG
CP PEL B20

P.P.V. : 37DH80



Classe pharmacothérapeutique

Ce médicament contient une substance active, l'acébutolol qui appartient à la famille des bêta-bloquants.

Indications thérapeutiques

Ces médicaments sont utilisés pour diminuer la tension artérielle et traiter certaines maladies du cœur.

Ce médicament est utilisé : • pour diminuer la tension artérielle, • pour traiter certains troubles du rythme cardiaque, • pour prévenir les crises douloureuses d'angine de poitrine qui surviennent lors d'un effort, l'angine de poitrine (angor) est responsable de l'apparition d'une douleur localisée dans la poitrine qui peut irradier vers l'épaule gauche et la mâchoire, • après une crise cardiaque (infarctus du myocarde).

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SECTRAL 200 mg, comprimé pelliculé ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament
Informations importantes concernant certains composants de SECTRAL 200 mg, comprimé pelliculé :

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Contre-indications

SECTRAL 200 MG
CP PEL B20

P.P.V. : 37DH80



imé pelliculé dans les cas
ce active (l'acébutolol), ou
bêta-bloquants), ou à l'un
Vous trouverez la liste des

combrenement sévère des
hypertension chronique
Si votre cœur fonctionne mal (insuffisance cardiaque)
malgré l'utilisation d'un traitement. • Si vous avez une défaillance grave du cœur (choc cardiogénique). • Si vous avez des troubles de l'activité électrique du cœur pouvant entraîner un ralentissement des

LOT : 21E001
PER : 02 2024

SECTRAL 200 MG
CP PEL B20

P.P.V. : 37DH80



SECTRAL 200 MG
CP PEL B20

P.P.V. : 37DH80



vous n'avez pas de pacemaker (bloc d et troisième degré). • Si vous souffrez de forme d'angine de poitrine que l'angor irration au repos d'une douleur dans la manière irrégulière. • Si votre cœur 15 à 50 battements par minute). • Si vous phénomène de Raynaud (problème de circulation du sang au niveau des doigts) ou d'artérite (troubles de la circulation du sang dans les artères des jambes). • Si vous avez un taladie de la glande située au-dessus on artérielle basse (hypotension). • Si lergique grave. • Si votre sang est trop des respirations rapides (acidose • Si vous êtes allergique au blé car ce n de blé.

n garde spéciales
200 mg, comprimé pelliculé :

Mises en garde spéciales

Vous ne devez jamais arrêter brutalement votre traitement sans avoir demandé, au préalable, l'avis de votre médecin car un arrêt brutal peut mettre votre vie en danger.

Précautions d'emploi : • Si vous devez être opéré, prévenez votre anesthésiste que vous prenez ce médicament.

Vous devez aussi prévenir votre médecin : • Si vous êtes diabétique : vous devrez surveiller très attentivement votre taux de sucre dans le sang au début du traitement pour détecter d'éventuelles hypoglycémies. • Si vous avez une maladie des reins (insuffisance rénale) ou une maladie du foie (insuffisance hépatique). • Si vous avez une maladie de la peau (psoriasis). • Si vous avez déjà eu des allergies. • Si vous souffrez d'un phénomène de Raynaud (problème de circulation du sang au niveau des doigts), ou d'artérite (troubles de la circulation du sang dans les artères des jambes). • Si vous avez une thyroïde trop active qui entraîne de l'anxiété, des tremblements, de la sueur, des palpitations, une augmentation de l'appétit et une perte de poids (thyrotoxicose).

Interactions avec d'autres médicaments

Prise d'autres médicaments : Sauf avis contraire de votre médecin, vous ne devez pas prendre Sectar en même temps que du diltiazem ou du vérapamil (médicaments pour le cœur) ou du flingolind (médicament pour le traitement de la sclérose en plaques).

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.


Grossesse et allaitement

Grossesse : Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Vous ne devez pas prendre Sectar pendant le 1er trimestre de votre grossesse à moins que votre médecin ne décide que ce traitement soit essentiel pour vous.

Si ce traitement est pris en fin de grossesse, une surveillance médicale du nouveau-né est nécessaire pendant quelques jours, car certains

LOT : 21E001
PER : 02 2024



مختبر التحليلات الطبية
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE
ORBIO

Dr.Said EL HAFIANE : Pharmacien Biologiste, Ancien interne des hôpitaux de Nancy (France)

FACTURE N : 210800795

CASABLANCA le 31-08-2021

Mme Khadija KHIDIUI

Demande N° 2108312042

Date de l'examen : 31-08-2021

Analyses :

Récapitulatif des analyses

CN	Analyse	Val	Clefs
PS	Prélèvement sang adulte	E10	E
	Créatinine	B30	B
	Transaminase GOT (ASAT)	B50	B
	Transaminase GPT (ALAT)	B50	B
	Urée	B30	B
0119	Hémoglobine glycosylée	B100	B
0154	Ferritine	B250	B
0216	Numération formule	B80	B
0439	Vitamine D	B450	B

Total des B : 1040

TOTAL DOSSIER : 1150.00DH

Arrêtée la présente facture à la somme de : mille cent cinquante dirhams

LABORATOIRE
Analyses
Dr. Said EL HAFIANE
199 Bd Oum Rabii - Casablanca
Tél : +212 (0)5 22 90 90 44
N° ICE : 001698908000008

RIB BMCI : 013 78 001091 000 38 30013 648


Recto - Verso

www.orbio.ma - HORAIRES D'OUVERTURE

du Lundi au Vendredi de 7h30 à 18h30 / le Samedi 8h00 à 13h00

199 , Boulevard Oum Rabii , EL OULFA Casablanca Tél.: +212 (0)5 22 90 90 44 / Fax : +212 (0)5 22 90 90 42 / Email : contact@orbio.ma

T P : 36046873 - I.F : 15240654 - CNSS : 9115842 - ICE : 001698908000008



مختبر التحليلات الطبية

LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE

ORBIO

Dr.Said EL HAFIANE : Pharmacien Biologiste, Ancien interne des hôpitaux de Nancy (France)

A Casablanca, le Mercredi 01 Septembre 2021

Dossier N° : 2108312042

Mme Khadija KHIDIQUI

Né(e) le : 22-02-1948

Prélevé le : au labo 31-08-2021 12:51

Prescription : Dr. M. BOUZOUBAË

Mme Khadija KHIDIQUI
CASABLANCA



HEMATOLOGIE

HEMOGRAMME

Hématies :

(Sang total, cytométrie en flux, Sysmex XT 1800i)

Hémoglobine :

Hématocrite :

VGM :

TCMH :

CCMH :

RDW :

Leucocytes :

Poly. Neutrophiles :

Soit:

Poly. Eosinophiles :

Soit:

Poly. Basophiles :

Soit:

Lymphocytes :

Soit:

Monocytes :

Soit:

Plaquettes

(Sang total, cytométrie en flux, Sysmex XT 1800i)

4.730	T/l	(4.100-5.400)	23-04-2021
4 730 000	/mm ³	(4 100 000-5 400 000)	4.510
13.7	g/100 ml	(11.5-16.0)	12.7
40.8	%	(37.0-47.0)	39.3
86.3	μ3	(80.0-100.0)	87.1
29.0	pg	(>27.0)	28.2
33.6	g/100 ml	(31.0-36.5)	32.3
15.3	%	(0.0-18.5)	15.3
5 600.0	/mm ³	(4 000.0-10 500.0)	5 810.0
47.7	%		47.1
2 671	/mm ³	(1 700-6 300)	2 737
1.3	%		2.4
73	/mm ³	(10-730)	139
0.4	%		0.3
22	/mm ³	(0-150)	17
42.9	%		39.4
2 402	/mm ³	(1 100-3 330)	2 289
7.7	%		10.8
431	/mm ³	(220-880)	627
300 000	/mm ³	(150 000-400 000)	285 000

LABORATOIRE ORBIO
Analyses Médicales
Dr. SAID EL HAFIANE
199 Bd Oum Rabii - Casablanca
Tél : 05.22.90.90.44
N° ICE : 001698908000000

Page 1 sur 3

Recto - Verso

www.orbio.ma - HORAIRES D'OUVERTURE
du Lundi au Vendredi de 7h30 à 18h30 / le Samedi 8h00 à 13h00

199 , Boulevard Oum Rabii , EL OULFA Casablanca Tél.: +212 (0)5 22 90 90 44 / Fax : +212 (0)5 22 90 90 42 / Email : contact@orbio.ma

T.P : 36046873 - I.F : 15240654 - CNSS : 9115842 - ICE : 0016989080000008

BIOCHIMIE SANGUINE

Sang tube sec, gel, héparine

Ferritine

(Chimiluminescence, Beckman coulter)

11.6 ng/ml

(30.0–400.0)

06-07-2020

13.8

HbA1c :

(Méthode H.P.L.C Biorad D10, certifiée par les sociétés internationales de standardisation (IFCC), sang total)

7.1 %

(4.0–6.5)

23-03-2021

7.5


Intervalles de références selon l'ANAES :

4.0 – 6.0 % : état non diabétique ou diabète très bien équilibré.

6.1 – 6.5 % : diabète bien équilibré.

6.6 – 8.0 % : diabète à surveiller. Modification du traitement à envisager en fonction de l'état clinique et du résultat du prochain contrôle d'HbA1c.

Sup. à 8 % : diabète non équilibré. Modification du traitement recommandé si un résultat équivalent est retrouvé lors du prochain dosage.

**Créatinine**

(Cinétique)

10.2 mg/l


(5.1–13.0)

04-07-2020

8.3

90.3 μ mol/l

(45.1–115.0)



مختبر التحليلات الطبية

LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE
ORBIO

Dr.Said EL HAFIANE : Pharmacien Biologiste, Ancien interne des hôpitaux de Nancy (France)

2108312042 – Mme Khadija KHIDIOUI

Clairance – MDRD

(Clairance créatinine estimée : patient type Caucasiens)

MDRD estimée pour un patient de type NON caucasien:

57 ml/mn

04-07-2020

72

69 ml/mn

87

Intervalle de références

- 60 < DFG < 80 ml/mn : F.R à évaluer en fonction de l'âge du patient.
- 30 < DFG < 60ml/mn : I.R modérée
- 10 < DFG < 30ml/mn : IR sévère
- DFG < 10ml/mn : IR terminale

Urée

(Urée GLDH)

0.39 g/l

(0.17-0.50)

09-01-2020

0.33

6.49 mmol/l

(2.83-8.33)

Transaminases GOT (ASAT)

(IFCC sans PP 37°)

19 U/l

(8-45)

23-03-2021

25

Transaminases GPT (ALAT)

(IFCC sans PP 37°)

14 U/l

(5-55)

23-03-2021

15

MARQUEURS – VITAMINES

Sang tubes sec, gel

25-OH-Vitamine D (D2+D3)

(ELISA, Alegria Orgentec)

70.7 nmol/l

(75.0-250.0)

23-04-2021

37.0

28.3 ng/ml

(30.0-100.0)

Déficient < 50 nmol/l

Insuffisant 50 à 74.5 nmol/l

Suffisant 75 à 250 nmol/l

Toxicité potentielle > 250

Validé biologiquement par le Dr EL HAFIANE Said

LABORATOIRE ORBIO

Analyses Médicales

Dr Said EL HAFIANE

199 Bd Oum Rabii - Casablanca

Tél : 05.22.90.90.44

N° ICE : 001698908000008

Page 3 sur 3

Recto - Verso

www.orbio.ma - HORAIRES D'OUVERTURE

du Lundi au Vendredi de 7h30 à 18h30 / le Samedi 8h00 à 13h00

199 , Boulevard Oum Rabii , EL OULFA Casablanca Tél.: +212 (0)5 22 90 90 44 / Fax : +212 (0)5 22 90 90 42 / Email : contact@orbio.ma

T P : 36046873 - I.F : 15240654 - CNSS : 9115842 - ICE : 001698908000008

CABINET DE CARDIOLOGIE
EXPLORATIONS CARDIO-VASCULAIRES
Dr M.BOUZOUBAA


Le 31/08/2021

BIOLOGIE

Nom/ Prénom:... **Mme KHIDIQUI KHADIJA**

- ❖ Créatininémie
- ❖ Urée sanguine
- ❖ GOT- GPT
- ❖ Hg glyquée
- ❖ NFS
- ❖ Vit D2/D3
- ❖ FERRITINE

LABORATOIRE CARDIO
Analyses Médicales
199 Bd Oum Rabii - Casablanca
Tel : 05 22 90 90 44
N° ICE : 901698908000008


Dr. M. BOUZOUBAA
CARDIOLOGUE
13, Bd Ain Taoujtate (en face Clinique Badr)
Rés. Ilias - Bourgogne - Casablanca
Tel : 05 22 27 20 20 - Fax : 05 22 27 15 15


Mme KHIDIQUI Khadija
22-02-1948 F



2108312042

A coller sur l'ordonnance

ORDO



CABINET DE CARDIOLOGIE ET D'EXPLORATIONS CARDIO-VASCULAIRES

... 31/08/2021 باسم الشافعي

الدكتور محمد بوزوبا
أمراض القلب والشرابيين

Dr. M. BOUZOUBAÂ
CARDIOLOGUE

NOTE D'HONORAIRES

J'ai l'honneur de présenter mes meilleures salutations

à Mme KHIDIOUI KHADIJA

Et lui adresse selon l'usage, ma note d'honoraires,

Consultation + ECG = 300 DH

Echodoppler cardiaque = 800 DH

soit la somme de : 1100 DH (Mille cent DHs).

Echocardiographie Doppler Couleur

Echo Doppler Veineux et Artériel


Holter Tensionnel

Holter Rythmique

Epreuve d'Effort

Urgences Cardiologiques

Dr. M. BOUZOUBAÂ
CARDIOLOGUE
13, Bd Aïn Taoujtate (en face Clinique Badr)
Rés. N°6 - Bourgogne - Casablanca
Tél : 05 22 27 20 20 - Fax : 05 22 27 15 15 - cardiobouzoubaa@gmail.com



CABINET DE CARDIOLOGIE ET D'EXPLORATIONS CARDIO-VASCULAIRES

Le 31/08/2021

باسم الشافي

Mme KHIDIQUI KHADIJA

ECHO-DOPPLER CARDIAQUE

- VG non dilaté, non hypertrophié, de fonction systolique conservée, contractilité globale conservée (FE au simpson à 65 %), anomalie de la fonction diastolique à type de trouble de la relaxation VG.
- OG non dilatée, libre d'Echo.
- Cavités droites non dilatées, PAPS à 12 mmHg.
- Structures valvulaires d'ouvertures correctes, sans fuites hémodynamiquement significatives.
- Péricarde sec.
- VCI à 14 mm.

Au total :

- VG de fonction systolique et contractilité globale conservée (FE au simpson à 65%), trouble relaxation VG.
- Pas d'HTAP.
- Pas de thrombus intracavitaire visible ce jour.

Dr. M. BOUZOUBAÂ
CARDIOLOGUE

13, Bd Ain Taoujtate (en face Clinique Badr)
Boulevard Ilias, N°6 - Bourgogne - Casablanca
Tél : 05 22 27 20 20 - Fax : 05 22 27 15 15

الدكتور محمد بوزوبع
أمراض القلب والشرائين

Dr. M. BOUZOUBAÂ
CARDIOLOGUE

Echocardiographie Doppler Couleur

Echo Doppler Veineux et Artériel

Holter Tensionnel

Holter Rythmique

Epreuve d'Effort

Urgences Cardiologiques

Sectral

$$37,80 \times 7 = 264,60$$

lansémid

$$39,30 \times 4 = 157,20$$

Cordis - aspirino

$$27,70 \times 7 = 193,90$$

Ramipril

$$108,00 \times 13 = 1404,00$$

Nacol

$$97,60 \times 8 = 780,80$$

total :

$$\underline{2800,50}$$

Résultats mesures:

QRS : ms
QT/QTcB : / ms
PQ : ms
P : ms
RR/PP : / ms
P/QRS/T : / degrés
QTd/QTcBd : ms
Sokolow : mV
NK :

Interprétation:

Rapport non confirmé

