

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR OBTENIR LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Recommandations générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

■ L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

© 2019 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données



Déclaration de Maladie

N° M21- 064548

NB: 87842

☐ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 2725 Société :

☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :

Nom & Prénom : HARTOUN EL MILLOUJIA

Date de naissance :

Adresse :

Tél. : 0672 83 64 91 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr MIKOU A.
ENDOCRINOLOGIE DIABETE
39, BD. RAHAL EL MESKINI - CASA
TEL: 022 31 16 30 - FAX: 022 31 06 71

Date de consultation : 07/10/2022

Nom et prénom du malade : DARIF EL MILLOUJIA Age :

Lien de parenté : ☐ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : Diabète


En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : / /


Signature de l'adhérent(e) :



RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
07/10/2021	CS		250,00	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Prescripteur	Date	Montant de la Facture
	7/10/2021	858,10

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient													
				Coefficient DES TRAVAUX												
				MONTANTS DES SOINS												
				DEBUT D'EXECUTION												
				FIN D'EXECUTION												
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE															
	H <table><tr><td>25533412</td><td>21433552</td></tr><tr><td>00000000</td><td>00000000</td></tr><tr><td>D</td><td>G</td></tr><tr><td>00000000</td><td>00000000</td></tr><tr><td>35533411</td><td>11433553</td></tr><tr><td>B</td><td>B</td></tr></table>			25533412	21433552	00000000	00000000	D	G	00000000	00000000	35533411	11433553	B	B	Coefficient DES TRAVAUX
	25533412	21433552														
	00000000	00000000														
	D	G														
	00000000	00000000														
	35533411	11433553														
	B	B														
	(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			MONTANTS DES SOINS												
			DATE DU DEVIS													

Docteur MIKOU Abdelhaq

Diplômé de la faculté de
Médecine de Toulouse

Spécialiste en

Endocrinologie - Diabète

Maladies de la nutrition

Obésité - Maigreur - Maladies du Cholestérol

- Goitre -

Sur Rendez-vous

Membre de :

SFD

EASD

MGSD

Société Francophone du Diabète

Association Européenne pour l'Etude du Diabète

Groupe Méditerranéen pour l'Etude du Diabète

Casablanca, le 7 OCT. 2021

الدكتور ميكو عبد الحق

خريج كلية الطب بتولوز

اختصاصي في

أمراض الغدد، مرض السكر

السمنة و أمراض الكلى

بالموعد

PHARMACIE JERRADA
61, Bd Abdelrahim Bouabid
Oasis - CASABLANCA
Tel.: 05.22.31.16.30 / 05.22.31.16.30

Dr DARIFI El Triand

Traitement
Pour 3 Mois

Dabne Mixtan 100 mg 3x 85.00

18 v 8.00

8 v 6.00

3x 38.10

Glycan 813 1x 10.00

Epyca 10

1x 6.00

Baryteva 10 4x 5.00

3x 22.70

DR MIKOU A.
ENDOCRINOLOGIE DIABETE
39, BD. RAHAL EL MESKINI - CASA
TEL: 05.22.31.16.30 - FAX: 05.22.31.06.74

858.10

PHARMACIE JERRADA
61, Bd Abdelrahim Bouabid
Oasis - CASABLANCA
Tel.: 23.54.48 / 05.22.31.16.30

39, شارع رحال المسكيني - الطابق (2) - الدار البيضاء - الهاتف (عيادة) : 05 22 31 16 30 - 05 22 31 06 74
39, Bd Rahal El Meskini - 2ème étage - Casablanca - Tél. : 05 22 31 16 30 - Tél./Fax : 05 22 31 06 74
e-mail: familemikou@gmail.com

LOT:

PER:

PPV:

22,70

LOT:

PER:

PPV:

22,70

LOT:

PER:

PPV:

22,70

LGT 211010

EIP 05 2010

PPV 80 00

85,00

LOT 211010

EIP 05 2010

PPV 80 00

95,00

LOT 201410

EIP 05 2010

EIP 05 2010

سوليس

Docteur MIKOU Abdelhaq

Diplômé de la faculté de
Médecine de Toulouse
Spécialiste en
Endocrinologie - Diabète
Maladies de la nutrition

Obésité - Maigreur - Maladies du Cholestérol
- Goitre -

Sur Rendez-vous

Membre de :

- SFD
- EASD
- MGSD

Société Francophone du Diabète
Association Européenne pour l'Etude du Diabète
Groupe Méditerranéen pour l'Etude du Diabète

Casablanca, le 07/10/2021

M. IDARFI et Famille

- Insuline Nix
1844 li
0845 li

- Glycine 800
100 li

- Glycine
100 li

- Bayetun 4 li
100 li

tlb-po
3

Dr MIKOU A.
ENDOCRINOLOGIE DIABETE
39, Bd. RAHAL EL MESKINI - CASA
TEL: B. 022 31 16 30 - FAX: 022 31 06 74

100

GLYCAN®

1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

a) dénomination commerciale

1. GLYCAN-500, comprimé

2. GLYCAN 850 Retard

b) Com

1. Chlor

2. Chlor

c) Form

1. GLYC

2. GLYC

d) Clas

A02 : A

LYCAN®

Ret

ormine chlorhydrate

PPV 38.10 DH

LOT C599 PER 06/24

GLYCAN® Retard 850

60 comprimés enrobés

pelliculé.



tailière de 100.

6 118000 180203

2. DAN comprimés enrobés dosés

GLYC

Les diabètes de l'adulte, en particulier quand il y a surcharge pondérale, et lorsque le régime prescrit ne suffit pas pour corriger seul ces diabètes non traités à l'insuline, ou devenus résistants à l'insuline, il peut être prescrit en complément de l'insuline dans certains cas, et peut aussi être associé à d'autres antidiabétiques oraux sulfonylurés.

3. ATTENTION!

a) Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament?

- Une défaillance des reins, même modérée, avec augmentation de la créatinine dans le sang,
- Une infection avec fièvre élevée (urinaire, respiratoire, ...),
- Une insuffisance hépatique, cardiaque, ou respiratoire,
- En cas de vomissements ou de diarrhées persistantes,
- Quand le diabète est déséquilibré, et/ou quand des vomissements, des douleurs abdominales, des crampes musculaires, accompagnent une grande fatigue et un malaise général,
- Avant et quelques jours après une opération chirurgicale avec anesthésie, ou une urographie veineuse ou une angiographie.
- En cas d'usage concomitant de l'antigonadotrope Danazol (DANATROL®), ou en cas de grossesse ou d'allaitement, bien informer le médecin prescripteur.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

b) Précautions d'emploi

- L'élimination du GLYCAN est surtout urinaire : il faut donc boire assez d'eau de manière à maintenir une diurèse correcte, et surveiller la créatinine du sang toutes les 8 semaines.
- Un régime alimentaire hypocalorique et hypoglycémique reste impératif ainsi que le maintien d'une activité physique d'entretien pour lutter contre la sédentarité, quelque soit l'âge.
- En cas d'hospitalisation inopinée, la prise de GLYCAN sera signalée avant tout acte diagnostique invasif ou thérapeutique.

إيبكا® 50 مغ، 75 مغ و150 مغ

مضادات الإضطراب

لا يجب تناول إيبكا، كبسولات في الحالات التالية
إذا كان لديك حساسية من بريجابالين أو إحدى المواد المستخدمة في تركيبة هذا الدواء.
في أي من الحالات التالية

Ерґа® 50 mg
Pragabalin
14 capsules

PROMOPHARM S.A



Lot n°: 1864
Date de fab.: 05/20
Date d'exp.: 05/22

إيبكا® 50 مغ، 75 مغ و150 مغ

بريجابالين 50 مغ، 75 مغ و150 مغ

السواك

موتوبيرات الأكتون: نشأ القرع مسوق الطبق

سواك ذات مقعول معروف

كثير

مجموعه الصبيلة العلاجية

بريجابالين ينتمي إلى فئة الأدوية المستخدمة في علاج الصداع، ألم الاعتلال العصبي واضطراب القلق

العام عند البالغين.

دواعي الاستعمال

ينصح هذا الدواء في علاج

ألم الاعتلال العصبي المحيطي والمركزي يستخدم إيبكا لعلاج الألم طويل الأمد الناجم عن تلف الأعصاب.

أعراض مختلفة مثل مرض السكري أو الفشل الكلوي، الشقيقة يمكن أن يؤدي إلى ألم الاعتلال العصبي

المحيطي. يمكن وصف الأدوية التالية كما شعور بتهار، والحرق، والنفطان، والشمول، والشم.

ألم شديد، التشنج، وخز، وخز، وطفح الحساسية، ويمكن أيضا أن يرتبط ألم الاعتلال العصبي

والمركزي مع تغيرات في المزاج، واضطراب النوم، والتعب، ويمكن أن يكون له تأثير على الأداء البدني

والأداء الوظيفي ونوعية الحياة عموما.

دواء الصداع يستخدم إيبكا لعلاج نوع معين من الصداع بالتهابات المزمنة مع أو بدون تميم ثانوي عند

البالغين. سوف يصف الطبيب إيبكا المساعدة في علاج الصداع عندما تستعصي تماما السيطرة

والعلاج الحالي. يجب أن تؤخذ إيبكا بالإضافة إلى العلاج الحالي. إيبكا لا ينبغي أن تستخدم وحده،

وكن ينبغي أن يستخدم دائما جنبا إلى جنب مع العلاج الآخر المضاد للصداع.

اضطراب القلق المعجم يستخدم إيبكا لعلاج اضطراب القلق معجم التحكم الذي يسبب أيضا الأرق أو الشعور

بالإفراط أو الحمى، والشعور بالتعب، وصعوبة التركيز أو فقدان الذاكرة، والتعب، وتوتر

العضلات واضطرابات النوم. وهذا يختلف من الضغوط وتوترات الحياة اليومية.

الجرعة

يجب الامتناع لوصفة الطبيب.

استشر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت غير متأكد.

سيتم تحديد الجرعات من قبل الطبيب المعالج الذي لا بد أن تتفق بنوع وصفته الطبية.

كيفية أخذ الدواء

عن طريق الفم.

تهدئة الاستعمال

خلال علاج ألم الاعتلال العصبي المحيطي والمركزي، الصداع أو اضطراب القلق المعجم

يجب تناول عدد الكبسولات الذي يصفه الطبيب.

الجرعة المعتادة، إذا تم تحديدها حسب حالتك، ما بين 150 مغ و 600 مغ يوميا.

طبيبك سوف يقرر لك ما إذا كان يجب أن تؤخذ إيبكا مرتين أو ثلاث مرات في اليوم.

في حالة مرتين في اليوم يجب أخذ إيبكا مرة في الصباح ومرة في المساء، في الوقت نفسه تقريبا

كل يوم.

في حالة ثلاث جرعات يوميا، يجب أخذ إيبكا مرة واحدة في الصباح، ومرة واحدة في الظهر، ومرة

في المساء، في الوقت نفسه تقريبا كل يوم.

إذا كنت تشعر بأن تأثير إيبكا قوي جدا أو ضعيف جدا، استشر طبيبك أو الصيدلي. إذا كنت مريضا

فتنا أكثر من 65 سنة يجب أن تؤخذ إيبكا بشكل عادي إلا في حالات أمراض الكلى.

في نصف الطبيب وقت أخذ و / أو جرعة مختلفة لدى مريض الكلى.

إبكا كبسولة مع الماء. اتبع إيبكا حتى يخبرك طبيبك بالتوقف.

الخطوة الأولى

الألم الجانبي شائعة، والتي قد تكون سببها

فقدان الشهية، وفقدان الوزن، وانخفاض نسبة السكر في الدم، وارتفاع مستويات السكر في الدم

تغير في الشخصية، والحمى، والكتلة، والإفراط، تقب المزاج، صعوبة إيجاد الكلمات، الفوضى، الأحلام

غير طبيعية، نوبات الهلع والألم، والتغيرات العنصرية، ضعف الوظيفة العقلية، صعوبة التركيز،

وزيادة الرغبة الجنسية، مشاكل الوظيفة الجنسية بما في ذلك الفشل في تحقيق هزة الجماع، وتناثر

القلق.

عدم وضوح الرؤية، حركات العين غير طبيعية، وعدم وضوح الرؤية بما في ذلك الرؤية الثقب، ومضات من

الضوء، والحركات، انخفاض ردود الأعمال، غيبوبة، والوخة عند الوقوف، وحساسية الجلد.

وفقدان التوازن، حرمان، هزة خلال الحركات، وانخفاض الوظيفة وفقدان الوعي، والإفراط، وزيادة

الحساسية للضوء، والشعور بالتعب.

جفاف العين، عين متشنجة، ألم في العين، وضعف العين، عين دامعة، تهيج العين

اضطرابات إفراز عيني متشنجة، وزيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم وارتفاع ضغط الدم، والتغيرات في

نضج القلب فشل القلب.

احمرار في الوجه.

صعوبة في التنفس والتشنج والتعب الجاف، واستحسان الآف

زيادة الطمأنينة، وجع، وخدر حول الفم

التورم، والطفح الجلدي، والقيح، حمى، الخوف، وتورم المفاصل، وتصلب العضلات، والإفراط بما في ذلك

ألم في العضلات، وآلام المفاصل.

ألم الكلى

صعوبة التبول أو وليس البول

الشعور بالضيق، والغثاس، خفق الصدر

ازدياد التغيرات في نتائج فحص الدم والكبد وزيادة الكرياتينين، فسفوكالسيوم، وزيادة الأنتين،

الأنتين، استراتيجي، تنطفيء عند انخفاض الحساسية، قلة الصفات، وزيادة الكرياتينين في الدم.

وانخفاض البوتاسيوم في الدم

فقدان الشهية، وتورم في الوجه، والحمى، والحمى، سيلان الأنف، والسعال، والتهدير

ألم المثلث

برودة اليدين والقدمين

فقدان قد يؤثر على ما يصل إلى 1 في 1000

اضطرابات الدم والوراثية تتراوح ضعف إدرار الدم، سقوط الرؤية وفقدان البصر

انسداد حدة العين، الحول

عرق بارد، نقص القلب، وتورم في اللسان

التهاب البنكرياس

صعوبة في البلع

حركة بطيئة أو تقطيل من الجسم

صعوبة في الكتابة بشكل صحيح

تراكم السوائل في البطن

الموتال في الرئتين

إيبكا® 50 مغ، 75 مغ و150 مغ

مضادات الإضطراب

لا يجب تناول إيبكا، كبسولات في الحالات التالية
إذا كان لديك حساسية من بريجابالين أو إحدى المواد المستخدمة في تركيبة هذا الدواء.
في أي من الحالات التالية

Ерґа® 50 mg
Pragabalin
14 capsules

PROMOPHARM S.A



Lot n°: 1864
Date de fab.: 05/20
Date d'exp.: 05/22

إيبكا® 50 مغ، 75 مغ و150 مغ

بريجابالين 50 مغ، 75 مغ و150 مغ

السواك

موتوبيرات الأكتون: نشأ القرع مسوق الطبق

سواك ذات مقعول معروف

كثير

مجموعه الصبيلة العلاجية

بريجابالين ينتمي إلى فئة الأدوية المستخدمة في علاج الصداع، ألم الاعتلال العصبي واضطراب القلق

العام عند البالغين.

دواعي الاستعمال

ينصح هذا الدواء في علاج

ألم الاعتلال العصبي المحيطي والمركزي يستخدم إيبكا لعلاج الألم طويل الأمد الناجم عن تلف الأعصاب.

أعراض مختلفة مثل مرض السكري أو الفشل الكلوي، الشقيقة يمكن أن يؤدي إلى ألم الاعتلال العصبي

المحيطي. يمكن وصف الأدوية التالية كما شعور بتهار، والحرق، والنفطان، والشمول، والشم.

ألم شديد، التشنج، وخز، وخز، وطفح الحساسية، ويمكن أيضا أن يرتبط ألم الاعتلال العصبي

والمركزي مع تغيرات في المزاج، واضطراب النوم، والتعب، ويمكن أن يكون له تأثير على الأداء البدني

والأداء الوظيفي ونوعية الحياة عموما.

دواء الصداع يستخدم إيبكا لعلاج نوع معين من الصداع بالتهابات المزمنة مع أو بدون تميم ثانوي عند

البالغين. سوف يصف الطبيب إيبكا المساعدة في علاج الصداع عندما تستعصي تماما السيطرة

والعلاج الحالي. يجب أن تؤخذ إيبكا بالإضافة إلى العلاج الحالي. إيبكا لا ينبغي أن تستخدم وحده،

وكن ينبغي أن يستخدم دائما جنبا إلى جنب مع العلاج الآخر المضاد للصداع.

اضطراب القلق المعجم يستخدم إيبكا لعلاج اضطراب القلق معجم التحكم الذي يسبب أيضا الأرق أو الشعور

بالإفراط أو الحمى، والشعور بالتعب، وصعوبة التركيز أو فقدان الذاكرة، والتعب، وتوتر

العضلات واضطرابات النوم. وهذا يختلف من الضغوط وتوترات الحياة اليومية.

الجرعة

يجب الامتناع لوصفة الطبيب.

استشر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت غير متأكد.

سيتم تحديد الجرعات من قبل الطبيب المعالج الذي لا بد أن تتفق بنوع وصفته الطبية.

كيفية أخذ الدواء

عن طريق الفم.

تهدئة الاستعمال

خلال علاج ألم الاعتلال العصبي المحيطي والمركزي، الصداع أو اضطراب القلق المعجم

يجب تناول عدد الكبسولات الذي يصفه الطبيب.

الجرعة المعتادة، إذا تم تحديدها حسب حالتك، ما بين 150 مغ و 600 مغ يوميا.

طبيبك سوف يقرر لك ما إذا كان يجب أن تؤخذ إيبكا مرتين أو ثلاث مرات في اليوم.

في حالة مرتين في اليوم يجب أخذ إيبكا مرة في الصباح ومرة في المساء، في الوقت نفسه تقريبا

كل يوم.

في حالة ثلاث جرعات يوميا، يجب أخذ إيبكا مرة واحدة في الصباح، ومرة واحدة في الظهر، ومرة

في المساء، في الوقت نفسه تقريبا كل يوم.

إذا كنت تشعر بأن تأثير إيبكا قوي جدا أو ضعيف جدا، استشر طبيبك أو الصيدلي. إذا كنت مريضا

فتنا أكثر من 65 سنة يجب أن تؤخذ إيبكا بشكل عادي إلا في حالات أمراض الكلى.

في نصف الطبيب وقت أخذ و / أو جرعة مختلفة لدى مريض الكلى.

إبكا كبسولة مع الماء. اتبع إيبكا حتى يخبرك طبيبك بالتوقف.

الخطوة الأولى

الألم الجانبي شائعة، والتي قد تكون سببها

فقدان الشهية، وفقدان الوزن، وانخفاض نسبة السكر في الدم، وارتفاع مستويات السكر في الدم

تغير في الشخصية، والحمى، والكتلة، والإفراط، تقب المزاج، صعوبة إيجاد الكلمات، الفوضى، الأحلام

غير طبيعية، نوبات الهلع والألم، والتغيرات العنصرية، ضعف الوظيفة العقلية، صعوبة التركيز،

وزيادة الرغبة الجنسية، مشاكل الوظيفة الجنسية بما في ذلك الفشل في تحقيق هزة الجماع، وتناثر

القلق.

عدم وضوح الرؤية، حركات العين غير طبيعية، وعدم وضوح الرؤية بما في ذلك الرؤية الثقب، ومضات من

الضوء، والحركات، انخفاض ردود الأعمال، غيبوبة، والوخة عند الوقوف، وحساسية الجلد.

وفقدان التوازن، حرمان، هزة خلال الحركات، وانخفاض الوظيفة وفقدان الوعي، والإفراط، وزيادة

الحساسية للضوء، والشعور بالتعب.

جفاف العين، عين متشنجة، ألم في العين، وضعف العين، عين دامعة، تهيج العين

اضطرابات إفراز عيني متشنجة، وزيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم وارتفاع ضغط الدم، والتغيرات في

نضج القلب فشل القلب.

احمرار في الوجه.

صعوبة في التنفس والتشنج والتعب الجاف، واستحسان الآف

زيادة الطمأنينة، وجع، وخدر حول الفم

التورم، والطفح الجلدي، والقيح، حمى، الخوف، وتورم المفاصل، وتصلب العضلات، والإفراط بما في ذلك

ألم في العضلات، وآلام المفاصل.

ألم الكلى

صعوبة التبول أو وليس البول

الشعور بالضيق، والغثاس، خفق الصدر

ازدياد التغيرات في نتائج فحص الدم والكلى وزيادة الكرياتينين، فسفوكالسيوم، وزيادة الأنتين،

الأنتين، استراتيجي، تنطفيح عند انخفاض الحساسية، قلة الصفات، وزيادة الكرياتينين في الدم.

وانخفاض البوتاسيوم في الدم

فقدان الشهية، وتورم في الوجه، والحمى، والكتلة، سيلان الأنف، والسعال، والتهدير

ألم المثلث

برودة اليدين والقدمين

فقدان قد يؤثر على ما يصل إلى 1 في 1000

اضطرابات الدم والورقة تتراوح ضعف إدرار الدم، سقوط الرؤية وفقدان البصر

انسداد حدة العين، الحول

عرق بارد، نقص القلب، وتورم في الكلى

التهاب البنكرياس

صعوبة في البلع

حركة بطيئة أو تقطيل من الجسم

صعوبة في الكتابة بشكل صحيح

تراكم السوائل في البطن

الموائيل في الرئتين

