

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR OBTENIR LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Consignes générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Maladie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com
Prise en charge : pec@mupras.com
Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge
Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie
N° P19-0027648

☐ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 3038 Société : Reliance

☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :

Nom & Prénom : MOUROUFI Mohamed

Date de naissance :

Adresse : Résidence EL YAMMA IMME 1 apt 1088 MEHA BERRECHID

Tél. : 05 22 30 73 61 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr ESSOUBI Abderrahim
Omnipraticien
128, Bd Mohamed V Berrechid
Tél: 05 22 33 75 70
06 50 43 56 34

Date de consultation : 14 OCT 2021

Nom et prénom du malade : MOUROUFI Mohamed Age : 73

Lien de parenté : ☒ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : D.M.I.

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : BERRECHID Le : 14 OCT 2021

Signature de l'adhérent(e) :

[illegible]

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	14/10/2021	



[illegible][illegible]

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :



Veillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient															
				CCEFFICIENT DES TRAVAUX MONTANTS DES SOINS DEBUT D'EXECUTION FIN D'EXECUTION														
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU CCEFFICIENT MASTICATOIRE			CCEFFICIENT DES TRAVAUX MONTANTS DES SOINS DATE DU DEVIS DATE DE L'EXECUTION														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <th>D</th> <th>G</th> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> <tr> <th colspan="2">B</th> </tr> </tbody> </table>				H		25533412	21433552	00000000	00000000	D	G	00000000	00000000	35533411	11433553	B	
	H																	
	25533412	21433552																
	00000000	00000000																
	D	G																
	00000000	00000000																
	35533411	11433553																
	B																	
	(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession																	

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan

SOINS DENTAIRES		Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
					CCEFFICIENT DES TRAVAUX
					MONTANTS DES SOINS
					DEBUT D'EXECUTION
					FIN D'EXECUTION
O.D.F. PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU CCEFFICIENT MASTICATOIRE				
	H 2553341221433552 0000000000000000 DG 0000000000000000 3553341111433553 B				CCEFFICIENT DES TRAVAUX
					MONTANTS DES SOINS
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession				DATE DU DEVIS
					DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr. Abderrahim ESSOUBI

OMNIPRATICIEN
ECHOGRAPHIE GENERALE

INPE : 061062402

الدكتور عبد الرحيم السوبي

الطب العام
الفحص بالصدى

14 OCT. 2021

Berrechid, le

Nom : *MOUZOUMÉ*
Mohamed
Pds :
TA : *160/9*

201.00 x 2
- DAPLUM 1000
22.50 x 2
Venoxyl
2x1ms
2x1ms

PHARMACIE LAYALI
alla Sana CHABBOUBA
Docteur en Pharmacie
LAYALI
128, Bd Mohamed V Berrechid
TEL: 05-22-32-42-30

Dr. ESSOUBI
128, Bd Mohamed V Berrechid
Tél: 05 22 33 75 70
06 50 43 56 34
Abderrahim

AR pour
160

PHARMACIE LAYALI
alla Sana CHABBOUBA
Docteur en Pharmacie
LAYALI
128, Bd Mohamed V Berrechid
TEL: 05-22-32-42-30

801,00

دافلون 1000 ملغ

أقراص ملبسة جزيئات الفلافونويد الدقيقة المنقاة

اقرأ بدهقة مجمل هذه النشرة قبل أخذ الدواء، لأنها تحتوي على معلومات هامة من أجلك.

- يجب أن تتناول هذا الدواء ملتزماً ودوماً بالتعليمات الواردة في هذه النشرة أو حسب تعليمات طبيبك أو الصيدلاني.
- احتفظ بهذه النشرة. فقد تحتاج لقراءتها ثانية.
- تحدث إلى الصيدلاني إذا كنت بحاجة لمعلومات أو نصيحة.
- إذا ظهرت أي تأثيرات غير مرغوب فيها، تحدث إلى طبيبك أو الصيدلاني. هذا ينطبق أيضاً على جميع التأثيرات الجانبية حتى وإن لم يرد ذكرها في هذه النشرة.
- يجب أن تتحدث مع طبيبك إذا لم تتحسن أعراض مرضك أو إذا تراجعت حالتك الصحية.

في هذه النشرة:

1. ما هو دافلون 1000 ملغ، أقراص ملبسة ولماذا يستعمل؟
2. ما هي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أن تتناول دافلون 1000 ملغ، أقراص ملبسة؟
3. كيف تتناول دافلون 1000 ملغ، أقراص ملبسة؟
4. ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟
5. كيف يحفظ دافلون 1000 ملغ، أقراص ملبسة؟
6. محتويات العبوة ومعلومات أخرى.

1. ما هو دافلون 1000 ملغ، أقراص ملبسة ولماذا يستعمل؟

المجموعة الصيدلانية العلاجية: وإلي للأوعية الدموية (دواء يعمل على الأوعية الدموية الشريانية / فلافونويد حيوي) ورمز التصنيف الصيدلاني العلاجي: C05CA53.ATC. الجهاز القلبي الوعائي. إن هذا الدواء مقو ويهدئ (يزيد نوتر الأوعية) كما أنه يقلل للأوعية الدموية (أي أنه يحسن يزيد مقاومة الأوعية الدموية الشريانية الدقيقة).

يوصى باستعماله لعلاج الأعراض الوظيفية الناجمة عن نوبة الواسير.

إذا استمرت اضطرابات الواسير لأكثر من 15 يوماً، فمن الأساسي أن تستشير طبيبك.

2. ما هي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أن تتناول دافلون 1000 ملغ، أقراص ملبسة؟

لا تتناول دافلون 1000 ملغ أقراص ملبسة: إذا كان لديك حساسية مفرطة تجاه جزيئات الفلافونويد الدقيقة المنقاة، أو تجاه أي من المكونات الأخرى لهذا الدواء.

استشر طبيبك أو الصيدلاني قبل تناول دافلون 1000 ملغ، أقراص ملبسة.

الأطفال

لا ينطبق.

الأدوية الأخرى ودافلون 1000 ملغ، أقراص ملبسة

استشر طبيبك أو الصيدلاني إذا كنت تتناول حالياً أو تناولت مؤخراً أو قد تتناول أي دواء آخر.

تناول دافلون 1000 ملغ، أقراص ملبسة مع الطعام والشراب

لا ينطبق.

الحمل والإرضاع

إذا كنت حاملاً أو مرضعاً، أو كنت تعتقدين بأنك حامل أو تخططين للحمل، فاستشري طبيبك أو الصيدلاني قبل أخذ هذا الدواء.

الحمل:

كإجراء احتياطي، يفضل تجنب استعمال دافلون 1000 ملغ أثناء الحمل.

الإرضاع:

نظراً لعدم توفر بيانات كافية حول مرور الدواء في حليب الأم، يوصى بعدم إرضاع الطفل أثناء تناول هذا الدواء.

قيادة السيارات واستعمال الآلات

لا ينطبق.

دافلون 1000 ملغ، أقراص ملبسة تحتوي على

لا ينطبق.

3. كيف تتناول دافلون 1000 ملغ، أقراص ملبسة؟

احرص دوماً على تناول هذا الدواء مع الأنترام مع البطارية التي أشار بها طبيبك أو الصيدلاني. في حال الشك، استشر طبيبك أو الصيدلاني.

اضطرابات الدوران الوريدي: الجرعة الاعتيادية هي قرص يومياً خلال وجبة الطعام.

نوبات الواسير: الجرعة الاعتيادية هي 3 أقراص يومياً في الأيام الأربعة الأولى، ثم 2 أقراص يومياً في الأيام الثلاثة التالية.

في حال أخذت دافلون 1000 ملغ، أقراص ملبسة أكثر من اللازم:

استشر فوراً طبيبك أو الصيدلاني. البيانات المتوفرة عن فرط جرعة دافلون 1000 ملغ محدودة، ولكن الأعراض قد تشمل الإسهال، الغثيان، ألم البطن، الحكة والطفح.

لا ينطبق.

4. ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟

إذا كانت لديك أي أسئلة حول استعمال هذا الدواء، فاطلب المزيد من المعلومات من طبيبك أو الصيدلاني.

يصفى معدل حدوث التأثيرات الجانبية الممكنة والمذكورة أدناه استناداً إلى النظام التالي:

- الشائعة جداً (تصيب أكثر من 1 من أصل 10 مستعملين)
- الشائعة (تصيب 1 إلى 10 من أصل 100 مستعمل)
- الغير شائعة (تصيب 1 إلى 10 من أصل 1000 مستعمل)
- النادرة (تصيب 1 إلى 10 من أصل 10000 مستعمل)
- النادرة جداً (تصيب أقل من 1 من أصل 10000 مستعمل)
- نسبة غير معروفة (عدم توفر أية معطيات تشير إلى نسبة تلك الاحتمالات)

قد تشمل التأثيرات الجانبية:

- الشائعة: إسهال، غثاس الواسير، غثيان، نفخة.
- الغير شائعة: التهاب القولون.
- النادرة: شعور بالدوخة، صداع، نوبت، طفح، حكة، شرى.
- الغير معروفة: ألم بطني، ودوخة مزعولة في الوجه، في الجفون، في الشفتين. وبشكل استثنائي، ودوخة وعالية (كونيك).

إذا أصبحت أي آثار جانبية، تحدث إلى طبيبك أو الصيدلاني. هذا ينطبق أي آثار جانبية يمكنها حتى وإن لم يرد ذكرها في هذه النشرة. يمكن أيضاً الإبلاغ عن التأثيرات الجانبية مباشرة عن طريق نظام الإبلاغ الوطني. عند الإبلاغ عن الآثار الجانبية تلتفت شاعده بتقدم مزيد من المعلومات عن سلامة هذا الدواء.

5. كيف يحفظ دافلون 1000 ملغ، أقراص ملبسة؟

احتفظ به بعيداً عن مرمى الأطفال ومتناول أيديهم.

لا تستعمل دافلون 1000 ملغ، أقراص ملبسة بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المبين على العلبة. يستند تاريخ انتهاء الصلاحية إلى آخر يوم من الشهر المذكور.

لا ترم الدواء في المجاري أو مع النفايات المنزلية اسأل الصيدلاني عن كيفية التخلص من الأدوية الغير مستعملة. فإن هذه الاحتياطات تساهم في حماية البيئة.

6. محتويات العبوة ومعلومات أخرى

ما هي مكونات دافلون 1000 ملغ، أقراص ملبسة؟

المواد الفعالة هي:

جزيئات الفلافونويد الدقيقة المنقاة.

بحسب كمية تعامل:

بالمئات 90 بالمائة.....

للفلافونويد على شكل هسبيردين: 10 بالمائة.....

متوسط الطرولة.....

لكل قرص مشي.....

والمكونات الأخرى هي:

كاربو كسيد هيدرات، الصودي، سليلوز دقيق البلور، جلوتين، ستيارات المنيروبين، نالك.

غلاف القرص: نالي أكسيد التيتاني (E171)، غليسيرول، لوري سولفات الصوديوم، ماكروغول 6000، هيدروكسيد أكسيد الحديد الأصفر (E172)، أكسيد الحديد الأحمر (E172)، ستيارات المنيروبين.

كيف يتولد دافلون 1000 ملغ، أقراص ملبسة وما هي محتويات العبوة الخارجية؟

يتوفر هذا الدواء على شكل أقراص ملبسة. غلب تحتوي على 15 قرص ملبس.

السلوك الصحي:

اضطرابات الدوران الوريدي:

تجنب الجرس أو الزقوف طويلاً، قد يمنع ذلك قليلاً من على سريرك.

تجنب التعرض لأشعة الشمس والحفارة.

تأكد من مظهر غطائي صحي ومتوازن وتراجعاً لنشاطك البدني بانتظام (لشي وكوب الدراجات ...) وتجنب زيادة الوزن.

تجنب اللزس الضيقة: ارتداء الحجاب أو جوارب الضغط وغسل سابقاك بالماء البارد لأن هذا يعزز الدورة الدموية.

الواسير:

اشرب 1.5 إلى 2 لتر من الماء يومياً. واستهلك الأطعمة الغنية بالألياف لتجنب الإمساك (الفواكه والخضروات والفواكه والخضروات الكاملة، وتجنب الدهون والقهوة والكحول والأطعمة الغنية بالتوابل).

مارس الرياضة بانتظام لتعظيم تدفق الدم، وتجنب ارتداء الأحذية الضيقة.

آخر تاريخ تمت فيه المصادقة على هذه النشرة الداخلية هو: يناير 2019

سرفيه المغرب

SERVIER MAROC
Immi. ZEVACO, Lot FATH 4
Bd Abdelhadi BOUALLEB
20180 Casablanca

SERVIER

238500000-02

801,00

دافلون 1000 ملغ

أقراص ملبسة جزيئات الفلافونويد الدقيقة المنقاة

اقرأ بدقة مجمل هذه النشرة قبل أخذ الدواء، لأنها تحتوي على معلومات هامة من أجلك.

- يجب أن تتناول هذا الدواء ملتزماً ودوماً بالتعليمات الواردة في هذه النشرة أو حسب تعليمات طبيبك أو الصيدلاني.
- احتفظ بهذه النشرة. فقد تحتاج لقراءتها ثانية.
- تحدث إلى الصيدلاني إذا كنت بحاجة لمعلومات أو نصيحة.
- إذا ظهرت أي تأثيرات غير مرغوب فيها، تحدث إلى طبيبك أو الصيدلاني. هذا ينطبق أيضاً على جميع التأثيرات الجانبية حتى وإن لم يرد ذكرها في هذه النشرة.
- يجب أن تتحدث مع طبيبك إذا لم تتحسن أعراض مرضك أو إذا تراجعت حالتك الصحية.

في هذه النشرة:

1. ما هو دافلون 1000 ملغ، أقراص ملبسة ولماذا يستعمل؟
2. ما هي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أن تتناول دافلون 1000 ملغ، أقراص ملبسة؟
3. كيف تتناول دافلون 1000 ملغ، أقراص ملبسة؟
4. ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟
5. كيف يحفظ دافلون 1000 ملغ، أقراص ملبسة؟
6. محتويات العبوة ومعلومات أخرى.

1. ما هو دافلون 1000 ملغ، أقراص ملبسة ولماذا يستعمل؟

المجموعة الصيدلانية العلاجية: وإلي للأوعية الدموية (دواء يعمل على الأوعية الدموية الشريانية / فلافونويد حيوي) ورمز التصنيف الصيدلاني العلاجي: C05CA53.ATC: الجهاز القلبي الوعائي. إن هذا الدواء مقو ويهدئ (يزيد نوتر الأوعية) كما أنه يقلل للأوعية الدموية (أي أنه يحسن يزيد مقاومة الأوعية الدموية الشريانية الدقيقة).

يوصى باستعماله لعلاج الأعراض الوظيفية الناجمة عن نوبة الواسير.

إذا استمرت اضطرابات الواسير لأكثر من 15 يوماً، فمن الأساسي أن تستشير طبيبك.

2. ما هي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أن تتناول دافلون 1000 ملغ، أقراص ملبسة؟

لا تتناول دافلون 1000 ملغ أقراص ملبسة: إذا كان لديك حساسية مفرطة تجاه جزيئات الفلافونويد الدقيقة المنقاة، أو تجاه أي من المكونات الأخرى لهذا الدواء أو المكونات الأخرى.

استشر طبيبك أو الصيدلاني قبل تناول دافلون 1000 ملغ، أقراص ملبسة.

الأطفال

لا ينطبق.

الأدوية الأخرى ودافلون 1000 ملغ، أقراص ملبسة

استشر طبيبك أو الصيدلاني إذا كنت تتناول حالياً أو تناولت مؤخراً أو قد تتناول أي دواء آخر.

تناول دافلون 1000 ملغ، أقراص ملبسة مع الطعام والشراب

لا ينطبق.

الحمل والإرضاع

إذا كنت حاملاً أو مرضعاً، أو كنت تعتقدين بأنك حامل أو تتخططين للحمل، فاستشيري طبيبك أو الصيدلاني قبل أخذ هذا الدواء.

الحمل

كإجراء احتياطي، يفضل تجنب استعمال دافلون 1000 ملغ أثناء الحمل.

الإرضاع

نظراً لعدم توفر بيانات كافية حول مرور الدواء في حليب الأم، يوصى بعدم إرضاع الطفل أثناء تناول هذا الدواء.

قيادة السيارات واستعمال الآلات

لا ينطبق.

دافلون 1000 ملغ، أقراص ملبسة تحتوي على

لا ينطبق.

3. كيف تتناول دافلون 1000 ملغ، أقراص ملبسة؟

احرص دوماً على تناول هذا الدواء مع الأنترام مع البطارية التي أشار بها طبيبك أو الصيدلاني. في حال الشك، استشر طبيبك أو الصيدلاني.

اضطرابات الدوران الوريدي: الجرعة الاعتيادية هي قرص يومياً خلال وجبة الطعام.

نوبات الواسير: الجرعة الاعتيادية هي 3 أقراص يومياً في الأيام الأربعة الأولى، ثم 2 أقراص يومياً في الأيام الثلاثة التالية.

في حال أخذت دافلون 1000 ملغ، أقراص ملبسة أكثر من اللازم:

استشر فوراً طبيبك أو الصيدلاني. البيانات المتوفرة عن فرط جرعة دافلون 1000 ملغ محدودة، ولكن الأعراض قد تشمل الإسهال، الغثيان، ألم البطن، الحكة والطفح.

لا ينطبق.

إذا توفقت عن تناول دافلون 1000 ملغ، أقراص ملبسة

لا ينطبق.

4. ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟

إذا كانت لديك أي أسئلة حول استعمال هذا الدواء، فاطلب المزيد من المعلومات من طبيبك أو الصيدلاني.

ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟ يجب أن يسبب هذا الدواء آثاراً جانبية، رغم أنها لا تحدث عند كافة الأفراد.

يصفى معدل حدوث التأثيرات الجانبية الممكنة والمذكورة أدناه استناداً إلى النظام التالي:

- الشائعة جداً (تصيب أكثر من 1 من أصل 10 مستعملين)
- الشائعة (تصيب 1 إلى 10 من أصل 100 مستعمل)
- الغير شائعة (تصيب 1 إلى 10 من أصل 1000 مستعمل)
- النادرة (تصيب 1 إلى 10 من أصل 10000 مستعمل)
- النادرة جداً (تصيب أقل من 1 من أصل 10000 مستعمل)
- نسبة غير معروفة (عدم توفر أية معطيات تشير إلى نسبة تلك الاحتمالات)

قد تشمل التأثيرات الجانبية:

- الشائعة: إسهال، غثاس الواسير، غثيان، نفخة.
- الغير شائعة: التهاب القولون.
- النادرة: شعور بالدوخة، صداع، نوبت، طفح، حكة، شرى.
- الغير معروفة: ألم بطني، ودوخة مزعولة في الوجه، في الجفون، في الشفتين. وبشكل استثنائي، ودوخة وعالية (كونيك).

إذا أصبحت بأي آثار جانبية، تحدث إلى طبيبك أو الصيدلاني. هذا ينطبق أي آثار جانبية يمكنها حتى وإن لم يرد ذكرها في هذه النشرة. يمكن أيضاً الإبلاغ عن التأثيرات الجانبية مباشرة عن طريق نظام الإبلاغ الوطني. عند الإبلاغ عن الآثار الجانبية تلتفت شاعر بتقدم مزيد من المعلومات عن سلامة هذا الدواء.

5. كيف يحفظ دافلون 1000 ملغ، أقراص ملبسة؟

احتفظ به بعيداً عن مرمى الأطفال ومتناول أيديهم. لا تستعمل دافلون 1000 ملغ، أقراص ملبسة بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المبين على العلبة. يستند تاريخ انتهاء الصلاحية إلى آخر يوم من الشهر المذكور.

لا ترم الدواء في المجاري أو مع النفايات المنزلية اسأل الصيدلاني عن كيفية التخلص من الأدوية الغير مستعملة. فإن هذه الاحتياطات تساهم في حماية البيئة.

6. محتويات العبوة ومعلومات أخرى

ما هي مكونات دافلون 1000 ملغ، أقراص ملبسة؟

المواد الفعالة هي:

جزيئات الفلافونويد الدقيقة المنقاة.

كمية تعادل:

900 ملغاً 90 بالمائة

للفلافونويد على شكل هسبيردين 10 بالمائة

متوسط الطرقة

لكل قرص ملبس

والمكونات الأخرى هي:

كاربو كسيد هيدرات، الصودي، سليلوز دقيق البلور، جلوتين، ستيارات المنيروبين، نالك.

غلاف القرص: نالي أكسيد التيتاني (E171)، غليسيرول، لوري سولفات الصوديوم، ماكروغول 6000، هيدروكسيد الأكسيد الأصفر (E172)، أكسيد الحديد الأحمر (E172)، ستيارات المنيروبين.

كيف يتناول دافلون 1000 ملغ، أقراص ملبسة وما هي محتويات العبوة الخارجية؟

يتوفر هذا الدواء على شكل أقراص ملبسة. غلب تحتوي على 15 قرص ملبس.

السلوك الصحي:

اضطرابات الدوران الوريدي:

تجنب الجرس أو الوقوف طويلاً، قد يمنع قلباً من غير سريرك.

تجنب التعرض لأشعة الشمس والحفارة.

تأكد من مظهر ظفرك، ومزاجك ونمط نشاطك اليومي (النشوي وركوب الدراجات ...)

زيادة الوزن

تجنب اللزس الضيقة: ارتداء الحجاب أو جوارب الضغط وغسل سابقاك بالماء البارد لأن هذا يعزز الدورة الدموية.

الواسير:

اشرب 1.5 إلى 2 لتر من الماء يومياً، واستهلك الأطعمة الغنية بالألياف لتجنب الإمساك (الفواكه والخضروات والفواكه والخضروات الكاملة، وتجنب الدهون والقهوة والأطعمة الغنية بالتوابل).

مارس الرياضة بانتظام لتعظيم تدفق الدم، وتجنب ارتداء الأشياء الضيقة.

آخر تاريخ تمت فيه المصادقة على هذه النشرة الداخلية هو: يناير 2019

سرفيه المغرب

SERVIER MAROC
Immi. ZEVACO, Lot FATH 4
Bd Abdelhadi BOUALLEB
20180 Casablanca

VENOXYL

GEL

COMPOSITION :

- Aqua
- Alcohol denat
- Carbomer
- Arachis Hypogaea
- Menthol
- Triethanolamine
- Benzophénone 4
- CI 42090-
- CI 19140



PROPRIETES :

VENOXYL GEL, grâce à l'originalité de ses actions synergiques, lutte efficacement contre :

- * lourdeur et pesanteur des jambes
- * Sensation de chaleur des jambes
- * Mauvaise circulation

VENOXYL GEL par son action décongestionnante apporte aux jambes fatiguées une sensation immédiate de fraîcheur, hydrate et redonne élasticité à la peau.

CONSEILS D'UTILISATION :

- * Prendre une noix de **VENOXYL GEL** pour chaque jambe dans le creux de votre main
- * Etaler **VENOXYL GEL** en remontant de la cheville à la cuisse jusqu'à absorption complète du produit
- * Pour un meilleur résultat, il est recommandé d'appliquer **VENOXYL GEL** 2 fois par jour
- * Convient à tous les types de peaux
- * Ne tâche pas.

PRECAUTION D'EMPLOI :

- * Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 30 mois.

PRESENTATION :

Tube de 40 ml

USAGE EXTERNE

LABORATOIRES



CARILENE

LABORATOIRES CARILENE

7, RUE du CHANT DES OISEAUX

78360 MONTESSON

FRANCE

VENOXYL

GEL

COMPOSITION :

- Aqua
- Alcohol denat
- Carbomer
- Arachis Hypogaea
- Menthol
- Triethanolamine
- Benzophénone 4
- CI 42090-
- CI 19140



PROPRIETES :

VENOXYL GEL, grâce à l'originalité de ses actions synergiques, lutte efficacement contre :

- * lourdeur et pesanteur des jambes
- * Sensation de chaleur des jambes
- * Mauvaise circulation

VENOXYL GEL par son action décongestionnante apporte aux jambes fatiguées une sensation immédiate de fraîcheur, hydrate et redonne élasticité à la peau.

CONSEILS D'UTILISATION :

- * Prendre une noix de **VENOXYL GEL** pour chaque jambe dans le creux de votre main
- * Etaler **VENOXYL GEL** en remontant de la cheville à la cuisse jusqu'à absorption complète du produit
- * Pour un meilleur résultat, il est recommandé d'appliquer **VENOXYL GEL** 2 fois par jour
- * Convient à tous les types de peaux
- * Ne tâche pas.

PRECAUTION D'EMPLOI :

- * Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 30 mois.

PRESENTATION :

Tube de 40 ml

USAGE EXTERNE

LABORATOIRES



CARILENE

LABORATOIRES CARILENE

7, RUE du CHANT DES OISEAUX

78360 MONTESSON

FRANCE