

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR VER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

soins générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 03070 Société : RAM

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

HILALI Lhoussarne

91716

Date de naissance :

01/01/52

Adresse : 494 Cor. Remaches El Bous SFB CASA

Tél. : 0619645767 Total des frais engagés : 33.51 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation :

10 NOV. 2021

Nom et prénom du malade :

Hilali Araf

Age : HANDICAPÉ

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Mohammedia

Le : 08/11/2022

Signature de l'adhérent(e) :



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
08/01/2021			300,00 DHS	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	08/11/2023	3051,00 DHS

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Cœfficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MÉDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				Coefficient DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DÉBUT D'EXÉCUTION
				FIN D'EXÉCUTION

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

	H
25533412	21433552
00000000	00000000

The diagram shows the human mandible (lower jawbone) in an upright position. The teeth are numbered from 1 to 8 on both the upper and lower arches. A coordinate system is overlaid on the diagram, with the vertical axis labeled 'H' at the top, the horizontal axis labeled 'D' on the left, and the diagonal axis labeled 'G' on the right. The numbers 1 through 8 are placed near their respective teeth to indicate their position and number.

(Création, remont, adjonction)

Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Said ARSALANE

Psychiatre

Ancien Médecin du
Centre Psychiatrique Universitaire
Bnou Rochd - Casablanca

الدكتور سعيد أرسلان

طبيب نفسي

طبيب سابق بالمركز النفسي
الجامعي بن رشد - الدار البيضاء

Mohammedia, le 08 NOV 2021 المحمدية. في:

Hibeli

AFM F

33900x9.

Solish 200

1

-

1

15
20

3390

9.11.2.

5830

Dr. Said ARSALANE
PSYCHIATRE
Rue de Bagdad 2ème étage
Mohammedia Tel: 0523 32 95 98

RV: 08/02/2022

210h

13, Rue de BAGDAD 2ème étage
Mohammedia
Tél.: 0523 32 95 98

E-Mail : arsalane psy@yahoo.fr

13. زنقة بغداد الطابق الثاني
المحمدية
الهاتف: 0523 32 95 98

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR
Solian® 200 mg, comprimé pelliculé séable

amisulpride

SANO 

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que Solian et dans quels cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Solian
3. Comment prendre Solian
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Solian
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE SOLIAN ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ

Solian appartient à une famille de médicaments appelés antipsychotiques. Ce médicament est utilisé pour traiter les personnes souffrant de schizophrénie. La schizophrénie est une maladie mentale caractérisée par certains troubles psychiques et du comportement, comme par exemple des hallucinations ou de l'agitation.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE SOLIAN

Contre-indications :

Ne prenez jamais Solian :

- si vous souffrez de diabète ou si vous présentez des facteurs de risque de diabète.

- si vous avez des antécédents d'hyperprolactinémie (quantité excessive de prolactine dans le sang) ou une tumeur dépendante (hormone provoquant la sécrétion de lait).

Surveiller étroitement pendant le traitement des troubles d'origine hypophysaire. Dans

Pendant le traitement, si vous présentez une augmentation de la conscience, accompagnée d'une

immédiatement votre traitement et consultez votre médecin.

En cas de survenue d'une infection ou d'une fièvre il

ra être amené à vous faire pratiquer immédiatement une perturbation des globules blancs (nombre de globules blancs) mise en évidence sur le

tableau 4. « Quels sont les effets indésirables, é

utilez chez l'enfant

- Ce médicament ne doit pas être utilisé chez l'enfant jusqu'à 15 ans.

- L'utilisation de ce médicament n'est pas recommandée entre 15 et 18 ans.

(Ce médicament ne doit pas être arrêté brutalement car cela peut provoquer l'apparition d'un phénomène de sevrage. Celui-ci se caractérise par l'apparition de signes tels que insomnie, nausées, vomissements, mais on peut observer également des mouvements anormaux et la réapparition de troubles psychotiques.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Vous ne devez jamais prendre ce médicament avec la cabergoline, le quinagolide (médicaments utilisés dans les troubles de la lactation), le clorazepate, l'escitalopram (médicaments pour traiter l'anxiété ou la dépression), la dompéridone (médicament pour traiter les nausées et les vomissements), l'hydroxyzine (médicament pour traiter l'anxiété ou l'urticaire).

Vous devez éviter de prendre ce médicament avec :

- certains médicaments utilisés dans le traitement de la maladie de Parkinson (amantadine, apomorphine, bromocriptine, entacapone, lisuride, pergolide, piribedil, pramipexole, rasagiline, ropinirole, rotigotine, selegiline, lopapone).

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat R.P.1.
Ain sebaâ Casablanca
SOLIAN 200mg cp séc B 30
339,00 DH
PPV : 6 116001 081271



NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Sollai 200 mg, comprimé pelliculé sécable

SANOFI

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire. Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnerz jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice

1. Qui est-ce que Solian et dans quels cas est-il utilisé?
 2. Quelles sont les informations à connaître avant de faire appel à Solian?
 3. Comment prendre Solian?
 4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
 5. Comment conserver Solian?
 6. Informations supplémentaires

1. OU'EST-CE QUE SOLVAN ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ

Solan appartient à une famille de médicaments appelés antipsychotiques. Ce médicament est utilisé pour traiter les personnes souffrant de schizophrénie. La schizophrénie est une maladie mentale caractérisée par certains troubles psychiques et du comportement, comme par exemple des hallucinations ou de l'agitation.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE SOLIAN

Contraindications:

- Si vous êtes allergique à la substance active (l'insulpride) ou à l'un de ses

Prise ou utilisation d'autres médicaments

L'utilisation de ce médicament n'est pas recommandée entre 15 et 18 ans. Ce médicament ne doit pas être arrêté brutalement car cela peut provoquer l'apparition d'un phénomène de sevrage. Celui-ci se caractérise par l'apparition de signes tels que insomnie, nausées, vomissements, mais on peut observer également des mouvements anormaux et la réapparition de troubles psychotiques.

Utilisation chez l'enfant

du nombre de globules blancs) mise en évidence sur la voir rubrique 4. « Quels sont les effets indésirables éventuels ? »

nofi-aventis Maroc
rte de Rabat -R.P.1.
sébab Casablanca
OLIAN 200mg, cp séc B 30
PV : 339,00 DH
118001 081271

- si vous souffrez de diabète ou si vous présentez des facteurs de risque de diabète.
- si vous avez des antécédents d'hyperprolactinémie (quantité excessive de prolactine dans le sang) ou une histoire d'endocrinopathie.



NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR
Solian® 200 mg, comprimé pelliculé séable

amisulpride

SANO 

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que Solian et dans quels cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Solian
3. Comment prendre Solian
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Solian
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE SOLIAN ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ

Solian appartient à une famille de médicaments appelés antipsychotiques. Ce médicament est utilisé pour traiter les personnes souffrant de schizophrénie. La schizophrénie est une maladie mentale caractérisée par certains troubles psychiques et du comportement, comme par exemple des hallucinations ou de l'agitation.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE SOLIAN

Contre-indications :

Ne prenez jamais Solian :

- si vous souffrez de diabète ou si vous présentez des facteurs de risque de diabète.

- si vous avez des antécédents d'hyperprolactinémie (quantité excessive de prolactine dans le sang) ou une tumeur dépendante (hormone provoquant la sécrétion de lait).

Surveiller étroitement pendant le traitement des troubles d'origine hypophysaire. Dans

Pendant le traitement, si vous présentez une augmentation de la conscience, accompagnée d'une

immédiatement votre traitement et consultez votre médecin.

En cas de survenue d'une infection ou d'une fièvre il

ra être amené à vous faire pratiquer immédiatement une perturbation des globules blancs (nombre de globules blancs) mise en évidence sur le

tableau 4. « Quels sont les effets indésirables, é

Utilisation chez l'enfant
- Ce médicament ne doit pas être utilisé chez l'enfant jusqu'à 15 ans.

- L'utilisation de ce médicament n'est pas recommandée entre 15 et 18 ans. Ce médicament ne doit pas être arrêté brutalement car cela peut provoquer l'apparition d'un phénomène de sevrage. Celui-ci se caractérise par l'apparition de signes tels que insomnie, nausées, vomissements, mais on peut observer également des mouvements anormaux et la réapparition de troubles psychotiques.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Vous ne devez jamais prendre ce médicament avec la cabergoline, le quinagolide (médicaments utilisés dans les troubles de la lactation), le clorazepate, l'escitalopram (médicaments pour traiter l'anxiété ou la dépression), la dompéridone (médicament pour traiter les nausées et les vomissements), l'hydroxyzine (médicament pour traiter l'anxiété ou l'urticaire).

Vous devez éviter de prendre ce médicament avec :

- certains médicaments utilisés dans le traitement de la maladie de Parkinson (amantadine, apomorphine, bromocriptine, entacapone, lisuride, pergolide, piribedil, pramipexole, rasagiline, ropinirole, rotigotine, selegiline, lopapone).

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat R.P.1.
Ain sebâ Casablanca
SOLIAN 200mg cp séc B 30
339,00 DH
PPV : 6 116001 081271



NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR
Solian® 200 mg, comprimé pelliculé séable

amisulpride

SANO 

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que Solian et dans quels cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Solian
3. Comment prendre Solian
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Solian
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE SOLIAN ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ

Solian appartient à une famille de médicaments appelés antipsychotiques. Ce médicament est utilisé pour traiter les personnes souffrant de schizophrénie. La schizophrénie est une maladie mentale caractérisée par certains troubles psychiques et du comportement, comme par exemple des hallucinations ou de l'agitation.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE SOLIAN

Contre-indications :

Ne prenez jamais Solian :

- si vous souffrez de diabète ou si vous présentez des facteurs de risque de diabète.

- si vous avez des antécédents d'hyperprolactinémie (quantité excessive de prolactine dans le sang) ou une tumeur dépendante (hormone provoquant la sécrétion de lait).

Surveiller étroitement pendant le traitement des troubles d'origine hypophysaire. Dans

Pendant le traitement, si vous présentez une augmentation de la conscience, accompagnée d'une

immédiatement votre traitement et consultez votre médecin.

En cas de survenue d'une infection ou d'une fièvre il

ra être amené à vous faire pratiquer immédiatement une perturbation des globules blancs (nombre de globules blancs) mise en évidence sur le

tableau 4. « Quels sont les effets indésirables, é

utilez chez l'enfant

- Ce médicament ne doit pas être utilisé chez l'enfant jusqu'à 15 ans.

- L'utilisation de ce médicament n'est pas recommandée entre 15 et 18 ans.

(Ce médicament ne doit pas être arrêté brutalement car cela peut provoquer l'apparition d'un phénomène de sevrage. Celui-ci se caractérise par l'apparition de signes tels que insomnie, nausées, vomissements, mais on peut observer également des mouvements anormaux et la réapparition de troubles psychotiques.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Vous ne devez jamais prendre ce médicament avec la cabergoline, le quinagolide (médicaments utilisés dans les troubles de la lactation), le clorazepate, l'escitalopram (médicaments pour traiter l'anxiété ou la dépression), la dompéridone (médicament pour traiter les nausées et les vomissements), l'hydroxyzine (médicament pour traiter l'anxiété ou l'urticaire).

Vous devez éviter de prendre ce médicament avec :

- certains médicaments utilisés dans le traitement de la maladie de Parkinson (amantadine, apomorphine, bromocriptine, entacapone, lisuride, pergolide, piribedil, pramipexole, rasagiline, ropinirole, rotigotine, selegiline, lopapone).

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat R.P.1.
Ain sebâ Casablanca
SOLIAN 200mg cp séc B 30
339,00 DH
PPV : 6 116001 081271



NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR
Solian® 200 mg, comprimé pelliculé séable
amisulpride

SANO 

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que Solian et dans quels cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Solian
3. Comment prendre Solian
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Solian
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE SOLIAN ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ

Solian appartient à une famille de médicaments appelés antipsychotiques. Ce médicament est utilisé pour traiter les personnes souffrant de schizophrénie. La schizophrénie est une maladie mentale caractérisée par certains troubles psychiques et du comportement, comme par exemple des hallucinations ou de l'agitation.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE SOLIAN

Contre-indications :

Ne prenez jamais Solian :

- si vous souffrez de diabète ou si vous présentez des facteurs de risque de diabète.

- si vous avez des antécédents d'hyperprolactinémie (quantité excessive de prolactine dans le sang) ou une tumeur dépendante (hormone provoquant la sécrétion de lait).

Surveiller étroitement pendant le traitement des troubles d'origine hypophysaire. Dans

Pendant le traitement, si vous présentez une augmentation de la conscience, accompagnée d'une

immédiatement votre traitement et consultez votre médecin.

En cas de survenue d'une infection ou d'une fièvre il

ra être amené à vous faire pratiquer immédiatement une perturbation des globules blancs (nombre de globules blancs) mise en évidence sur le

tableau 4. « Quels sont les effets indésirables, é

utilez chez l'enfant

- Ce médicament ne doit pas être utilisé chez l'enfant jusqu'à 15 ans.

- L'utilisation de ce médicament n'est pas recommandée entre 15 et 18 ans.

(Ce médicament ne doit pas être arrêté brutalement car cela peut provoquer l'apparition d'un phénomène de sevrage. Celui-ci se caractérise par l'apparition de signes tels que insomnie, nausées, vomissements, mais on peut observer également des mouvements anormaux et la réapparition de troubles psychotiques.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Vous ne devez jamais prendre ce médicament avec la cabergoline, le quinagolide (médicaments utilisés dans les troubles de la lactation), le clorpromazine, l'escitalopram (médicaments pour traiter l'anxiété ou la dépression), la dompéridone (médicament pour traiter les nausées et les vomissements), l'hydroxyzine (médicament pour traiter l'anxiété ou l'urticaire).

Vous devez éviter de prendre ce médicament avec :

- certains médicaments utilisés dans le traitement de la maladie de Parkinson (amantadine, apomorphine, bromocriptine, entacapone, lisuride, pergolide, piribedil, pramipexole, rasagiline, ropinirole, rotigotine, selegiline,

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat R.P.1.
Ain sebâ Casablanca
SOLIAN 200mg cp séc B 30
339,00 DH
PPV : 6 116001 081271



NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR
Solian® 200 mg, comprimé pelliculé séable

amisulpride

SANO 

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que Solian et dans quels cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Solian
3. Comment prendre Solian
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Solian
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE SOLIAN ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ

Solian appartient à une famille de médicaments appelés antipsychotiques. Ce médicament est utilisé pour traiter les personnes souffrant de schizophrénie. La schizophrénie est une maladie mentale caractérisée par certains troubles psychiques et du comportement, comme par exemple des hallucinations ou de l'agitation.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE SOLIAN

Contre-indications :

Ne prenez jamais Solian :

- si vous souffrez de diabète ou si vous présentez des facteurs de risque de diabète.

- si vous avez des antécédents d'hyperprolactinémie (quantité excessive de prolactine dans le sang) ou une tumeur dépendante (hormone provoquant la sécrétion de lait).

Surveiller étroitement pendant le traitement des troubles d'origine hypophysaire. Dans

Pendant le traitement, si vous présentez une augmentation de la conscience, accompagnée d'une

immédiatement votre traitement et consultez votre médecin.

En cas de survenue d'une infection ou d'une fièvre il

ra être amené à vous faire pratiquer immédiatement une perturbation des globules blancs (nombre de globules blancs) mise en évidence sur le

tableau 4. « Quels sont les effets indésirables, é

utilez chez l'enfant

- Ce médicament ne doit pas être utilisé chez l'enfant jusqu'à 15 ans.

- L'utilisation de ce médicament n'est pas recommandée entre 15 et 18 ans.

(Ce médicament ne doit pas être arrêté brutalement car cela peut provoquer l'apparition d'un phénomène de sevrage. Celui-ci se caractérise par l'apparition de signes tels que insomnie, nausées, vomissements, mais on peut observer également des mouvements anormaux et la réapparition de troubles psychotiques.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Vous ne devez jamais prendre ce médicament avec la cabergoline, le quinagolide (médicaments utilisés dans les troubles de la lactation), le clorazepate, l'escitalopram (médicaments pour traiter l'anxiété ou la dépression), la dompéridone (médicament pour traiter les nausées et les vomissements), l'hydroxyzine (médicament pour traiter l'anxiété ou l'urticaire).

Vous devez éviter de prendre ce médicament avec :

- certains médicaments utilisés dans le traitement de la maladie de Parkinson (amantadine, apomorphine, bromocriptine, entacapone, lisuride, pergolide, piribedil, pramipexole, rasagiline, ropinirole, rotigotine, sélegiline, lopapone).

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat R.P.1.
Ain sebâ Casablanca
SOLIAN 200mg cp séc B 30
339,00 DH
PPV : 6 116001 081271



NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Solal 200 mg, comprimé pelliculé sécable

SANOFI

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament

- garder cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire. Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnerz jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice

1. Qui est-ce que Solian et dans quels cas est-il utilisé?
 2. Quelles sont les informations à connaître avant de faire appel à Solian?
 3. Comment prendre Solian?
 4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
 5. Comment conserver Solian?
 6. Informations supplémentaires

1. OU'EST-CE QUE SOLVAN ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ

Solan appartient à une famille de médicaments appelés antipsychotiques. Ce médicament est utilisé pour traiter les personnes souffrant de schizophrénie. La schizophrénie est une maladie mentale caractérisée par certains troubles psychiques et du comportement, comme par exemple des hallucinations ou de l'agitation.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE SOLIAN

Contraindications:

- Si vous êtes allergique à la substance active (l'insulpride) ou à l'un de ses

Prise ou utilisation d'autres médicaments

L'utilisation de ce médicament n'est pas recommandée entre 15 et 18 ans. Ce médicament ne doit pas être arrêté brutalement car cela peut provoquer l'apparition d'un phénomène de sevrage. Celui-ci se caractérise par l'apparition de signes tels que insomnie, nausées, vomissements, mais on peut observer également des mouvements anormaux et la réapparition de troubles psychotiques.

Utilisation chez l'enfant

En cas de survenue d'une infection ou d'une fièvre il
ra être amené à vous faire pratiquer immédiatement
un médicament pour provoquer une perturbation des
globules blancs mise en évidence sur le
tableau de l'analyse sanguine. Veuillez faire immédiatement votre traitement et consultez votre
médecin ou votre pharmacien. Il sera alors possible de faire la constatation nécessaire.

A standard linear barcode is located in the bottom right corner of the page, with the number '081271' printed below it.

ue de

Vous devez éviter de prendre ce médicament avec :
- certains médicaments utilisés dans le traitement de l'amaigrissement : morphine, bromocriptine, estacate,

- certains médicaments utilisés dans le traitement du

é la maladie de Parkinson



NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Solal 200 mg, comprimé pelliculé sécable

SANOFI

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament

- garder cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire. Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnerz jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice

1. Qui est-ce que Solian et dans quels cas est-il utilisé?
 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Solian?
 3. Comment prendre Solian?
 4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
 5. Comment conserver Solian?
 6. Informations supplémentaires

1. OU'EST-CE QUE SOLVAN ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ

Solan appartient à une famille de médicaments appelés antipsychotiques. Ce médicament est utilisé pour traiter les personnes souffrant de schizophrénie. La schizophrénie est une maladie mentale caractérisée par certains troubles psychiques et du comportement, comme par exemple des hallucinations ou de l'agitation.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE SOLIAN

Contre-indications :

- Si vous êtes allergique à la substance active (l'acrylate de sodium), ne prenez jamais Juniors Jouran.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

L'utilisation de ce médicament n'est pas recommandée entre 15 et 18 ans. Ce médicament ne doit pas être arrêté brutalement car cela peut provoquer l'apparition d'un phénomène de sevrage. Celui-ci se caractérise par l'apparition de signes tels que insomnie, nausées, vomissements, mais on peut observer également des mouvements anormaux et la réapparition de troubles psychotiques.

Utilisation chez l'enfant

du nombre de globules blancs), mise en évidence sur la voir rubrique 4. « Quels sont les effets indésirables éventuels ? »

hafi-aventis Maroc
Rue de Rabat -R.P.1.
sebâ Casablanca
OLIAN 200mg, cp séc B 30
PV : 339,00 DH
118001 081271

- si vous souffrez de diabète ou si vous présentez des facteurs de risque de diabète.
- si vous avez des antécédents d'hyperprolactinémie (quantité excessive de prolactine dans le sang) ou une histoire d'endocrinopathie.

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR
Solian® 200 mg, comprimé pelliculé séable

amisulpride

SANO 

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que Solian et dans quels cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Solian
3. Comment prendre Solian
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Solian
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE SOLIAN ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ

Solian appartient à une famille de médicaments appelés antipsychotiques. Ce médicament est utilisé pour traiter les personnes souffrant de schizophrénie. La schizophrénie est une maladie mentale caractérisée par certains troubles psychiques et du comportement, comme par exemple des hallucinations ou de l'agitation.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE SOLIAN

Contre-indications :

Ne prenez jamais Solian :

- si vous souffrez de diabète ou si vous présentez des facteurs de risque de diabète.

- si vous avez des antécédents d'hyperprolactinémie (quantité excessive de prolactine dans le sang) ou une tumeur dépendante (hormone provoquant la sécrétion de lait).

Surveiller étroitement pendant le traitement des troubles d'origine hypophysaire. Dans

Pendant le traitement, si vous présentez une augmentation de la conscience, accompagnée d'une

immédiatement votre traitement et consultez votre médecin.

En cas de survenue d'une infection ou d'une fièvre il

ra être amené à vous faire pratiquer immédiatement une perturbation des globules blancs (nombre de globules blancs) mise en évidence sur le

tableau 4. « Quels sont les effets indésirables, é

Utilisation chez l'enfant
- Ce médicament ne doit pas être utilisé chez l'enfant jusqu'à 15 ans.

- L'utilisation de ce médicament n'est pas recommandée entre 15 et 18 ans. Ce médicament ne doit pas être arrêté brutalement car cela peut provoquer l'apparition d'un phénomène de sevrage. Celui-ci se caractérise par l'apparition de signes tels que insomnie, nausées, vomissements, mais on peut observer également des mouvements anormaux et la réapparition de troubles psychotiques.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Vous ne devez jamais prendre ce médicament avec la cabergoline, le quinagolide (médicaments utilisés dans les troubles de la lactation), le clorazepate, l'escitalopram (médicaments pour traiter l'anxiété ou la dépression), la dompéridone (médicament pour traiter les nausées et les vomissements), l'hydroxyzine (médicament pour traiter l'anxiété ou l'urticaire).

Vous devez éviter de prendre ce médicament avec :

- certains médicaments utilisés dans le traitement de la maladie de Parkinson (amantadine, apomorphine, bromocriptine, entacapone, lisuride, pergolide, piribedil, pramipexole, rasagiline, ropinirole, rotigotine, selegiline, lopapone).

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat R.P.1.
Ain sebaâ Casablanca
SOLIAN 200mg cp séc B 30
339,00 DH
PPV : 6 116001 081271

