

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR TIVR LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Récommandations générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie. La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Pathologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.



## Déclaration de Maladie

Nº P19- 0040832

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

### Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 10028

Société : RAM

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : RAGASS Larken

Date de naissance : 21.01.1935


Adresse : 15 Ettardhaane, Rue 1 Immane 28 n° 1 20240  
El Oulfa Casablanca

Tél. : 06 66 89 66 46

Total des frais engagés : 1285,60 Dhs

### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 15/10/2014

Nom et prénom du malade : RAGASS Larken Age :

Lien de parenté :  Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie : Occlusion

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca

Le : 15/11/2014

Signature de l'adhérent(e) :

## **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
6/15/2009	5	1359.00 181		Dr. Dr. Arifoglu Dermatologist 102 Bld. Ouaïd Residence Selma "Eggs" Tél.: 05 22 89

## **EXECUTION DES ORDONNANCES**

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	15/10/21	93560

#### **ANALYSES - RADIOGRAPHIES**

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Cœfficients	Montant des Honoraires

#### AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

## **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### **Important :**

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan d

O.D.F  
PROTHESES DENTAIRES

## DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
00000000	00000000
35533411	11433553

[Création, remont, adjonction]  
fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

## COEFFICIENT DES TRAVAUX

## MONTANTS DES SOINS

DEBUT  
D'EXECUTION

FIN  
D'EXECUTION

Coefficient  
de travail

## MONTANTS DES COINS

**DATE DU  
DEVIS**

# Docteur Amina LATIFI EP HALLI

- DERMATOLOGIE VENEROLOGIE

Ex. Médecin chef de l'hôpital Ain Chock

■ Maladies de la Peau, Cheveux, Ongles

■ Maladies Sexuellement Transmissibles

■ Cosmétologie ■ Allergologie

■ Chirurgie de la peau ■ laser



الدكتورة أمينة لطيفي حرم هلي

اختصاصية في الأمراض الجلدية والتاليسية

طبيبة رئيسية سابقاً بمستشفى عين الشق

■ أمراض الجلد والشعر والأظافر ■ أمراض الحساسية

■ الأمراض التاليسية ■ التجميل

■ العلاج بالليزر ■ جراحة الجلد والأظافر

Casablanca le : ٢٠١٥ - ١٥ - ٢٠١٤ الدار البيضاء في :

Bo Gas Lotées

LADOLAHOU SOUHAITA

Lot : 016

EXP : MAI 2023

PPV : 29,00 DH

- lava del esteril. delen alto

2900 Monahan di Ilem d'essa aray  
estre proq

8780 - Dermofise uree

1000 leon reut lotes

6600

- Connexion extra cuir

26000 onsta uree

500

Monah di  
Connexion extra

meleengue +1 nyspl  
di onsta uree

mes pds occlus) per  
sones

19900

- tarfine Cpa 200mg

1000 200mg 1000

102, Bd Oum Rabii Hay Mazola. Résidence selma 1er étage - Oulfa - Casablanca - Tél : 05 22 89 76 52 GSM : 06 60 74 36 36

06 60 74 36 36 شارع أم الربيع حي مازولا إقامة سلمى الطابق الأول - الألفة - الدار البيضاء - الهاتف : 05 22 89 76 52 المحمول :

- xerisel 30 wees preel

19870 1-ml flacon de preel




- anti Gas adult Sackets

97.60 1 sachet 30g sur le remis



93560

Doctor Animal ~~HALLI~~ HALLI  
Dr med vét - Venerologie  
403, Bd Cheikh Errahbi Hay Mazola  
Rabat 10000 - Rabat - Casablanca  
Tél : 02 22 46 12 52



Granulés par voie orale

20 sachets à usage unique

# Anti Gas®

Soulage le système gastro-intestinal de  
ADULTS ✓ Pression ✓ Ballonnement ✓ Inconfort

## INDICATIONS

**Anti Gas® Adults** est un dispositif médical qui soulage de façon naturelle la douleur abdominale causée par la flatulence. Le mouvement de la musculature de la voie gastro-intestinale est une cause fréquente de douleur abdominale. Des processus simples tels que l'ingestion d'air et le (par exemple aliments avec fibres) ou en consommant des boissons gazeuses et créées et accumulées (réaction appelée flatulence) dans le tractus intestinal

LOT

21-008

97 60

97 60

97 60

97 60

97 60

97 60

97 60

97 60

97 60

**Anti Gas® Adults** est un dispositif médical qui soulage de façon naturelle la douleur abdominale causée par la flatulence. Le mouvement de la musculature de la voie gastro-intestinale est une cause fréquente de douleur abdominale. Des processus simples tels que l'ingestion d'air et le (par exemple aliments avec fibres) ou en consommant des boissons gazeuses et créées et accumulées (réaction appelée flatulence) dans le tractus intestinal pour les tests de diagnostic (par exemple endoscopie, rayons X et échographie).

**Anti Gas® Adults** ne contient ni sucre, ni sel, ni gluten (aromatisé à la menthe). Il convient aux diabétiques et aux enfants de plus de six ans.

**Chaque sachet contient : 125 mg de Siméthicone**

**Excipients:** Isomalt, Talc, Aïrone, Maltodextrine

€ € 2265

DISPOSITIF MEDICAL

## INSTRUCTIONS

# TERFINE 250mg PROMOPHARM®

## Terbinafine

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Elle contient des informations importantes sur votre traitement et votre maladie.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin d'en parler à votre pharmacien.

### 1. IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT

#### Dénomination :

TERFINE 250mg PROMOF

#### Composition :

Terbinafine (DCI) .....

Sous forme de chlorhydrate de terbinafine ..... 281,28mg

**Excipients** : Carboxyméthylcellulose sodique (type A), cellulose microcristalline, hypromellose, silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium.

#### Forme pharmaceutique :

Comprimé. Boîtes de 7 ; 14 et 28.

### 2. QU'EST-CE QUE TERFINE 250MG PROMOPHARM® COMPRIME ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE?

#### Classe pharmaco thérapeutique :

Agent oral antifongique.

#### Indications

Il est indiqué dans le traitement de certaines infections provoquées par des champignons de la peau et des ongles.

### 3. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE TERFINE 250MG PROMOPHARM® COMPRIME?

#### Ne prenez jamais ce médicament dans les cas suivants :

- Allergie connue à la terbinafine ou à l'un des constituants,
- Maladie grave du foie,
- Maladie grave des reins.

Ce médicament ne doit généralement pas être utilisé, sauf avis contraire de votre médecin en cas d'allaitement.

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec TERFINE 250mg PROMOPHARM® comprimé:

#### Mises en garde spéciales :

Il est nécessaire D'ARRÊTER IMMEDIATEMENT LE TRAITEMENT et de consulter le plus rapidement possible un médecin ou un service d'urgence en cas :

- d'éruption de pustules blanchâtres caractérisée par la survenue brutale d'un érythème associé à une fièvre,

- d'éruption cutanée rapidement extensive, disséminée ou touchant les muqueuses,

- d'allergie de type plus général, de prurit (démangeaison), de fièvre, d'angine ou autre infection, de fatigue importante d'urines foncées, de selles décolorées, d'ictère (jaunisse). En cas d'insuffisance rénale et d'insuffisance hépatique prévenir votre médecin.

L'utilisation de ce médicament par voie orale n'est pas recommandée chez l'enfant.

#### Précautions d'emploi :

Dans de rares cas, ce médicament peut provoquer une irritation ou une perte réversible du goût.

Le médicament est déconseillé chez les personnes utilisant leur des fins professionnelles.

S DE DOUCE, NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

#### Prise ou utilisation d'autres médicaments

AVANT D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSieurs MÉDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT VOTRE AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MEDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

(En particulier : traitements antituberculeux).

#### Interaction avec les aliments et les boissons

Sans objet.

#### Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse et l'allaitement.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT, DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MÉDICAMENT.

#### Effet sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Sans objet.

Liste des excipients à effet notable

Sans objet

### 4. COMMENT PRENDRE CE MÉDICAMENT?

Instructions pour un bon usage

Sans objet

#### Posologie :

#### CE MÉDICAMENT VOUS A ÉTÉ PERSONNELLEMENT DELIVRÉ DANS UNE SITUATION PRÉCISE :

- IL NE PEUT ÊTRE ADAPTE À UN AUTRE CAS,

- NE PAS LE CONSEILLER À UNE AUTRE PERSONNE.

DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER STRICTEMENT À L'ORDONNANCE DU MEDECIN.

Fabricant de pommade :  
Hersteller der Salbe:  
Produttore della pomata:  
Fabrikant van de zalf:  
Fabricante de la pomada:  
Fabricante da pomada:  
Κατασκευαστής της αλοιφής:



PIERRE FABRE MEDICAL DEVICES  
29, avenue du Sidobre  
81106 Castres Cedex  
France

Fabricant des pansements :  
Hersteller der Pflaster :  
Produttore dei cerotti :  
Fabrikant van de pleister :  
Fabricante de apósitos :  
Fabricante dos penso adesivos :  
Κατασκευαστής των εμπλάστρων :



AVERY DENNISON MEDICAL LTD  
IDA Business Park,  
Ballinalee Road,  
Longford N39 DX73  
Ireland

# ONYSTER®

FR

Notice d'instruction : Onyster®, pommade  
Dispositif médical

Que contient Onyster® ?

1 tube de 10 g de pommade contenant :  
Urée, Lanoline, Vaseline blanche  
21 pansements



Dans quel cas Onyster®

Onyster®, pommade, e  
local des mycoses des o

Maiphar dans le cadre du traitemen  
Bd Alkemia N° 6. QL. pends chez l'adulte.  
Sidi Bernoussi, Casablanca

Comment fonctionne On

De par sa composition  
de fragiliser exclusiven

ON'YSTER PT UREE DM 10G  
PPC : 260,00 DH

permet  
au champignon) qui as  
Cette fragilisation permet un acolement sélectif de la partie  
pathologique de l'ongle, rendant aisément son découpage et donc son  
élimination, en vue d'un traitement antifongique ultérieur.

Comment utiliser Onyster® ?

- Appliquer une fois par jour sur l'ongle infecté la quantité nécessaire  
de pommade pour recouvrir intégralement la surface de l'ongle  
(sans dépasser afin de ne pas limiter l'adhérence du pansement).  
Maintenir en place sous pansement occlusif fourni avec la  
pommade, pendant 24 h. Se référer au schéma en dernière page.

325929

# DERMOFIX® Crème

## Sertaconazole

### Composition :

Sertaconazole nitrate .....	2 g
Excipients (dont E218 & Acide sorbique) .....	100 g

### Propriétés :

Le Sertaconazole est un anti-mycosique à usage topique. Son spectre d'activité s'avère très large :  
- levures pathogènes (Candida albicans, C. krusei, C. parapsilosis, Pithrosporum orbiculaires)  
- dermatophytes (Trichophyton, Epidermophyton, Microsporum)  
- champignons opportunistes filamentés (Aspergillus, Penicillium, Cladophialophora)  
- germes résistants à d'autres anti-mycosiques  
- bactéries gram+ (Staphylococcus et Streptococcus)

LOT 21001  
PER 05/24  
PTV 87DH30

→ 87,30

### Indications thérapeutiques :

Traitements topiques des mycoses superficielles de la peau telles que les onychomycoses : Tinea pedis (pied d'athlète), Tinea cruris (Eczéma marginé de Hebra), Tinea corporis (Herpès circiné), Tinea barbae (Sycosis), et Tinea manus, Candidoses (Minillose) et Pityriasis versicolor (Pityrosporum orbiculare).

### Effets indésirables :

Le Sertaconazole présente une innocuité totale et une excellente tolérance : aucun cas de toxicité ou de réaction de photosensibilité n'a été relevé. Seul un érythème léger peut survenir lors des premières applications n'entraînant jamais la suspension du traitement.

### Conditions particulières d'emploi :

Dermofix ne convient pas à l'usage ophtalmique.

Après l'application dermique de grandes quantités, on ne détecte pas de niveaux plasmatiques. Malgré cela, son innocuité n'a pas été démontrée chez le nouveau-né et chez la femme enceinte ou allaitante.

### Posologie usuelle, voie et mode d'administration :

Voie topique.

Appliquer la crème une fois par jour (de préférence le soir) ou deux fois (matin et soir), doucement et uniformément, en essayant de couvrir 1 cm de peau saine (environ) autour de la zone à traiter.

La durée du traitement varie d'un patient à l'autre en fonction de l'agent étiologique et de la localisation de l'infection.

En général, on recommande quatre semaines de traitement afin d'assurer une guérison clinique et microbiologique complète et d'éviter ainsi toute récidive, cette guérison clinico-microbiologique peut apparaître entre deux et quatre semaines de traitement.

Pityriasis versicolor : 2 semaines

Dermatophytose : 2 à 4 semaines

Candidose : 2 à 4 semaines

### Formes et autres présentations :

Dermofix® crème 2% tube de 30 g

Dermofix® poudre flacon de 30 g

Dermofix® Solution 2% flacon de 30 ml

Dermofix® Gel 2% flacon de 50 g

Dermofix® Gel 2% flacon de 100 g

Gyno-dermofix® 300 mg boîte de 1 ovule.

### Liste I (Tableau A)

PROMOPHARM S.A.  
Z.I. du Sahel, Had Soualem - Maroc  
S/L FERRER INTERNATIONAL

# Canesten® Extra



Bifonazole

Crème 1%

## Forme et Présentation Pharmaceutiques

Canesten® Extra Crème : tube de 15 g de crème pour application locale.

764,00

## Composition :

Principe actif : Bifonazole

1 g de crème contient 0,01 g de

Excipients : alcool benzyllique

polysorbate 60, eau purifiée, mo

## Propriétés :

Le bifonazole est un antifongi imidazolé.

Son spectre d'action comprend Jermatophytes, les levures et les moisissures. Il est également actif sur d'autres champignons comme Malassezia furfur et des bactéries tel que Corynebacterium minutissimum.

Le bifonazole agit en inhibant la synthèse de l'ergostérol à deux niveaux, ce qui le distingue des autres dérivés azolés qui n'agissent qu'à un seul niveau. Cette inhibition conduit à des altérations structurelles et fonctionnelles de la membrane cytoplasmique.

## Indications :

Dermatophytoses :

- Traitement des dermatophytoses de la peau glabre : herpès circiné;
- Traitement des intertrigos des grands plis : eczéma marginé de Hébra, intertrigos génitaux et cruraux ;
- Traitement des intertrigos des orteils : pied d'athlète ;
- Traitement d'appoint d'onyxis dermatophytique : un traitement antifongique est alors nécessaire.

## Candidoses :

Les candidoses rencontrées en clinique humaine sont habituellement dues à Candida albicans. Cependant, la mise en évidence d'un candida sur la peau ne peut constituer en soi une indication.

- Traitement des intertrigos des grands plis : génitaux, cruraux, interfessiers, axillaire et sous-mammaires;
- Traitement des intertrigos des petits plis : interdigitaux, interorteils;
- Traitement des perlèches, vulvites et anites;
- Traitement d'appoint d'onyxis ou périonyxie. Un traitement systémique antifongique peut être discuté.

Dans certains cas, et en particulier dans les mycoses de la sphère péri-buccale et péri-anogénitale, il est recommandé de traiter simultanément le tube digestif.

- pityriasis versicolor.

## Contre-indications :

Le traitement par Canesten® Extra Crème est contre-indiqué en cas de :

- Hypersensibilité au bifonazole.
- Hypersensibilité à l'alcool cétostéarylique ou à l'un des autres constituants.

## Mises en garde et précautions d'emploi :

Aucune étude approfondie n'a été réalisée chez l'enfant.

Les données cliniques recueillies ne laissent présager aucun effet nocif chez l'enfant.

Toutefois, le bifonazole ne doit être utilisé chez le nourrisson que sous surveillance médicale.

Eviter le contact avec les yeux.

Fabricant de pommade :  
Hersteller der Salbe:  
Produttore della pomata:  
Fabrikant van de zalf:  
Fabricante de la pomada:  
Fabricante da pomada:  
Κατασκευαστής της αλοιφής:



PIERRE FABRE MEDICAL DEVICES  
29, avenue du Sidobre  
81106 Castres Cedex  
France

Fabricant des pansements :  
Hersteller der Pflaster :  
Produttore dei cerotti :  
Fabrikant van de pleister :  
Fabricante de apósitos :  
Fabricante dos penso adesivos :  
Κατασκευαστής των εμπλάστρων :



AVERY DENNISON MEDICAL LTD  
IDA Business Park,  
Ballinalee Road,  
Longford N39 DX73  
Ireland

# ONYSTER®

Pierre Fabre  
DERMATOLOGIE

FR

Notice d'instruction : Onyster®, pommade  
Dispositif médical

#### Que contient Onyster® ?

1 tube de 10 g de pommade contenant :  
Urée, Lanoline, Vaseline blanche  
21 pansements



#### Dans quel cas Onyster®

Onyster®, pommade, e local des mycoses des ongles.

#### Comment fonctionne Onyster® ?

De par sa composition (qui permet de fragiliser exclusivement au champignon) qui assouplit et décolle sélectif de la partie pathologique de l'ongle, rendant aisément son découpage et donc son élimination, en vue d'un traitement antifongique ultérieur.

#### Comment utiliser Onyster® ?

- Appliquer une fois par jour sur l'ongle infecté la quantité nécessaire de pommade pour recouvrir intégralement la surface de l'ongle (sans dépasser afin de ne pas limiter l'adhérence du pansement). Maintenir en place sous pansement occlusif fourni avec la pommade, pendant 24 h. Se référer au schéma en dernière page.

Maphar dans le cadre du traitement  
Bd Alkimia N° 6, QL. Sidi Bernoussi, Casablanca  
ON'STER PT UREE DM 10G  
PPC : 260,00 DH

permet  
(dues  
son lit.

325929