

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR OBTENIR LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Informations générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 10578 Société : 93010

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : MAJHOUZI MBAREK

Date de naissance : 10/03/1960

Adresse : A.KID EL ALLAM N°8 HAY MOULAY RACHID II

BOURNAZIL CASA

Tél. : 06.10.38.35.35 Total des frais engagés : 12.49,000 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 22 Nov 2021

Nom et prénom du malade : SARLAZI SALIMA Age :

Lien de parenté :  Lui-même  Conjoint  Enfant

Nature de la maladie : 225 + flaccidité ips

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASA Le : 23/11/2021

Signature de l'adhérent(e) : [Signature]



### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
22 Nov 2021			150.25	<i>Dr. Rachid Attam - Casablanca MEDECIN - Av. Colonel Nid Attam - Casablanca Tél : 05 22 72 42 42 en dessus BMCE Bourse</i>

### EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
<i>Boutaleb Benhannani Maroc</i>	22/11/21	1099.00

### ANALYSES - RADIographies

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

### AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A	M	P	C	

### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

#### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	COEFFICIENT DES TRAVAUX	
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE				MONTANTS DES SOINS
	H	25533412	21433552		
		00000000	00000000		
	D	00000000	00000000		
		35533411	11433553		
	G				
	B				
[Création, remont, adjonction]	Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession				DATE DU DEVIS
DATE DE L'EXECUTION					VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

# DR.RACHID SAIR MEDECIN

- Diplôme universitaire de Diabetologie
- université montpellier France
- Diplôme en soins avancés en cardiologie
- université de montréal-Canada
- Licencié du Conseil Médical du Canada (LCMC)
- Echographie - ECG



الدكتور رشيد ساير  
طبيب

- دبلوم جامعي في أمراض السكري
- جامعة مونبولي - فرنسا
- دبلوم رعاية صحية متقدمة لأمراض القلب
- جامعة مونتريال - كندا
- ارتفاع الضغط الدموي - أمراض القلب والشرايين
- طبيب مجاز من طرف المجلس الطبي الكندي
- الفحص بالصدى - التخطيط الكهربائي للقلب

casablanca le : 22 Nove 2021

الدار البيضاء في :

ساعة ساخنة

٦٧٤ = د Glucophage ٥٠١٥  
٢٤ ٢ - ٤ - ٢٠٢٢

٣٩٥ = د Glucophage ٥٠١١٢  
٢٤ ٠ - ٢ - ٢٠٢٢

٩٣٥ = د So close ١٩  
٢٤ ١ - ٢ - ٢٠٢٢

٣٦٤ = د Kopenza ٢٤  
٢٤ ٤ - ٤ - ٢٠٢٢

T = ١٠٩٩,٢

Glucovance 500 mg/5 mg  
Comprimés pelliculés B/30

PPV: 47.40 DH




Glucovance 500 mg/5 mg  
Comprimés pelliculés B/30

PPV: 47.40 DH

Dr. Rachid  
MEDECIN

73, Av. Colonel Akid Allam 1er étage  
deserts BMCE BOURNAZEL Casablanca  
73, 227242

05 40 13 12 91 / 05 22 72 42 42 شارع العقيد العلام - الطابق الاول (فوق بنا BMCE) بورنازيل - البيضاة - الهاتف :  
73, Av. Colonel Akid Allam 1 étage (En dessus BMCE) - Bournazel - casablanca - tel : 05 40 13 12 91 / 05 22 72 42 42



# **SOCLAV 100 mg/ 12,5 mg Nourrisson,**

poudre pour suspension

buvable, boîte de 1 flacon de 30 ml.

# **SOCLAV 100 mg/ 12,5 mg Enfant,**

poudre pour suspension buvable,

boîte de 1 flacon de 60 ml.

# **SOCLAV 500 mg/ 62,5 mg Enfant,**

poudre pour suspension buvable

en sachet-dose, boîtes de 12 et de 16.

# **SOCLAV 1 g/ 125 mg Adulte,**

poudre pour suspension buvable

en sachet-dose, boîtes de 12, 16 et de 24.

## **Amoxicilline / Acide clavulanique : 8/1**

**Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.**

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.

- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.

- Ce médicament vous a été personnellement prescrit (ou a été prescrit à votre enfant). Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous présentez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

### Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE SOCLAV ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE SOCLAV ?

3. COMMENT PRENDRE SOCLAV ?

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

5. COMMENT CONSERVER SOCLAV ?

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES.

### 1. QU'EST-CE QUE SOCLAV ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

SOCLAV est un antibiotique qui tue les bactéries responsables des infections. Il contient deux molécules différentes, appelées amoxicilline et acide clavulanique. L'amoxicilline appartient à un groupe de médicaments appelés « pénicillines », qui peuvent parfois arrêter d'être efficaces (être inactives). L'autre constituant actif (l'acide clavulanique) empêche cette inactivation.

SOCLAV est utilisé chez les nourrissons, les enfants et les adultes pour traiter les infections suivantes :

- Infections de l'oreille moyenne et des sinus,
- Infections des voies respiratoires,
- Infections des voies urinaires,
- Infections de la peau et des tissus mous, incluant les infections dentaires,
- Infections des os et des articulations.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE SOCLAV ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre / donner ce médicament à votre enfant.

#### Ne prenez / ne donnez jamais SOCLAV à votre enfant :

- Si vous êtes / votre enfant est allergique (hypersensibilité) à l'amoxicilline, à l'acide clavulanique, à la pénicilline ou à l'un des autres composants contenus dans SOCLAV (dont la liste est fournie à la rubrique 6).

- Si vous avez / votre enfant a déjà présenté une réaction allergique grave (d'hypersensibilité) à un autre antibiotique. Ceci peut inclure une éruption cutanée ou un gonflement du visage ou du cou.
- Si vous avez / votre enfant a déjà eu des problèmes au foie ou développé un ictere (jaunissement de la peau) lors de la prise d'un antibiotique.

Ne prenez / ne donnez pas SOCLAV si vous êtes dans l'une des situations mentionnées ci-dessus.

En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre / d'administrer SOCLAV.

#### Faites attention avec SOCLAV :

Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ce médicament si vous ou votre enfant :

- Souffrez / souffriez de mononucléose infectieuse,
- Êtes / est traité(e) pour des problèmes au foie ou aux reins,
- N'urinez / n'urinez par régulièrement.

En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre SOCLAV.

Dans certains cas, votre médecin pourra rechercher le type de bactérie responsable de l'infection. Selon les résultats, il pourra vous prescrire / prescrire à votre enfant un dosage différent de SOCLAV ou un autre médicament.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose.

#### Réactions nécessitant une attention particulière

SOCLAV peut aggraver certaines maladies ou engendrer des effets secondaires graves, notamment des réactions allergiques, des convulsions et une inflammation du gros intestin. Lorsque vous prenez ou votre enfant prend SOCLAV, vous devez surveiller certains symptômes afin de réduire les risques. Voir « Réactions nécessitant une attention particulière », à la rubrique 4.

#### Tests sanguins et urinaires

Si vous effectuez / votre enfant effectue des analyses de sang (nombre de globules rouges ou explorations fonctionnelles hépatiques) ou des analyses d'urine (dosage du glucose), vous devez informer le médecin ou l'infirmière(r) que vous prenez / qu'il prend SOCLAV. En effet, SOCLAV peut influer sur les résultats de ces types de tests.

#### Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre / votre enfant prend, a récemment pris ou pourra prendre un autre médicament, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Cela inclut les médicaments vendus sans ordonnance, et aussi les produits à base de plantes.

Si vous prenez / votre enfant prend de l'allopurinol (en traitement de la goutte) avec SOCLAV, le risque de réaction cutanée allergique est plus élevé.

Si vous prenez / votre enfant prend du probénécide (en traitement de la goutte), votre médecin peut décider d'ajuster la dose de SOCLAV.

Si des médicaments destinés à empêcher la coagulation du sang (tels que la warfarine) sont pris avec SOCLAV, des analyses sanguines supplémentaires peuvent être requises.

SOCLAV peut influer sur l'action du méthotrexate (un médicament utilisé pour traiter le cancer ou les maladies rhumatismales).

SOCLAV peut influer sur l'action du mycophénolate moféti (traitement pour prévenir le rejet de greffe d'organes).

#### Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

#### Conduite de véhicules et utilisation de machines :

SOCLAV peut provoquer des effets indésirables susceptibles de

réduire  
Ne co-  
sente:

Liste  
• SO-  
Adulte  
contie  
phén)

93,00

avec une maladie appelée « phényletiazine ».

• SOCLAV contient de la maltodextrine (glucose). Si votre médecin vous a dit que vous avez / votre enfant a une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre / donner ce médicament à votre enfant.

### 3. COMMENT PRENDRE SOCLAV ?

Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

#### Posologie

**Adultes et enfants de 40 kg et plus :**

**SOCLAV 1 g/ 12,5 mg Adulte :**

Dose habituelle : 1 sachet trois fois par jour.

Dose inférieure : 1 sachet deux fois par jour.

**Enfants pesant moins de 40 kg :**

**SOCLAV 100 mg/ 12,5 mg NOURRISSON :**

**SOCLAV 100 mg/ 12,5 mg ENFANT :**

**SOCLAV 500 mg/ 62,5 mg ENFANT :**

Toutes les doses sont établies en fonction du poids de l'enfant en kilogrammes.

- Votre médecin vous indiquera la quantité de SOCLAV à administrer à votre bébé ou enfant.
- Dose habituelle : 40 mg/5 kg à 80 mg/10 mg par kg de poids corporel et par jour, en trois fois.

**SOCLAV 100 mg/ 12,5 mg NOURRISSON et SOCLAV 100 mg/ 12,5 mg ENFANT :**

Une seringue graduée en plastique peut vous être fournie. Vous devrez l'utiliser pour administrer la dose correcte à votre bébé ou enfant.

#### Patients souffrant de problèmes rénaux et hépatiques :

• En cas de problèmes rénaux, une adaptation de la posologie peut être nécessaire. Le médecin pourra prescrire un dosage différent ou un autre médicament.

• En cas de problèmes au foie, des analyses de sang plus fréquentes pourront être nécessaires afin de vérifier le fonctionnement de votre foie.

#### Comment prendre SOCLAV ?

**SOCLAV 100 mg/ 12,5 mg NOURRISSON, poudre pour suspension buvable :**

**SOCLAV 100 mg/ 12,5 mg ENFANT, poudre pour suspension buvable :**

Agitez toujours le flacon avant chaque utilisation.

- Donnez ce médicament à votre enfant au début d'un repas ou un peu avant.
- Répartissez les prises de manière régulière au cours de la journée : elles doivent être espacées d'au moins 4 heures. N'administrez pas 2 doses en 1 heure.

• Ne donnez pas SOCLAV à votre enfant pendant plus de 2 semaines. Si les symptômes de votre enfant persistent, consultez de nouveau un médecin.

**SOCLAV 500 mg/ 62,5 mg ENFANT, poudre pour suspension buvable en sachet-dose :**

**SOCLAV 1 g/ 125 mg Adulte, poudre pour suspension buvable en sachet-dose :**

- Juste avant la prise de SOCLAV, ouvrez le sachet et mélangez son contenu dans un demi-verre d'eau.
- Le mélange doit être pris au début d'un repas ou un peu avant.

• Répartissez les prises de manière régulière au cours de la journée : elles doivent être espacées d'au moins 4 heures. N'administrez pas / Ne donnez pas deux doses en une heure.

• SOCLAV ne doit pas être pris pendant plus de 2 semaines. Si les symptômes persistent, il faut consulter de nouveau un médecin.

LOT : 3779  
UT. AV: 09-24  
P.P.V : 36 DH 40

كوي

## بريدنيزولون

المرجو قراءة كامل هذه النشرة الدوائية بتمعن قبل استخدام هذا الدواء.

المرجو الاحتفاظ بهذه النشرة الدوائية في حال دعت الحاجة إلى إعادة قرائتها.

إن كان لديكم أي سؤال أو انتابكم أي شك، المرجو الاستشارة مع الطبيب أو الصيدلي قبل الحصول على المزيد من المعلومات. تم وصف هذا الدواء لكم شخصياً، لذا يتوجب عدم منح هذا الدواء لأي شخص آخر حتى في حال تطابق الأعراض لأن من شأن ذلك إلحاق المضر به.

في حال ازدادت شدة الآثار غير المستحبة أو برأز غير مستحب لم يتم الاشارة إليه بهذه النشرة الدوائية، المرجو إشعار الطبيب أو الصيدلي بذلك.

## التقديم

كوبيريد 5 ملغ قرص فوار، علبة من قارورة واحدة تحتوي على 30 قرصاً فواراً

كوبيريد 20 ملغ قرص فوار، علبة من قارورة واحدة تحتوي على 20 قرصاً فواراً

## التركيبة

المادة العجوية : بريدينوزولون  
كوبيريد 5 ملغ قرص فوار

يعتبر على 5 ملغ من بريدينوزولون على شكل ميسنسلفونيزوات صوديوم

كوبيريد 20 ملغ قرص فوار

يعتبر على 20 ملغ من بريدينوزولون على شكل ميسنسلفونيزوات صوديوم

## السواغات:

كوبيريد 5 ملغ ..... الكمية الكافية لقرص واحد فوار  
كوبيريد 20 ملغ ..... الكمية الكافية لقرص واحد فوار

## إيجيبيات الاستعمال

خلال فترة العلاج، يمكن للطبيب أن ينصح باتباع نظام غذائي بنسبة قليلة من الملح والسكر وغنى بالبروتينات.

يحتوي هذا الدواء على مادة الصوديوم. يُؤخذ بعین الاعتبار من قبل المرضى الذين يرافقون نسبة الصوديوم في الطعام. في حال العلاج لفترات طويلة، يمكن وصف مقويات من الكالسيوم وفينامين (D).

يحتوي كوبيريد 5 ملغ قرص فوار على 8 ملغ من الصوديوم في قرص واحد فوار.

يحتوي كوبيريد 20 ملغ قرص فوار على 32 ملغ من الصوديوم في قرص واحد فوار.

هذا الدواء يحتوي على اللاكتوز. لا ينصح باستخدامه لدى المرضى الذين يعانون من عدم قابلية للجالاكتوز، ونقص اللاكتاز لاب أو سوء امتصاص الجلوكوز أو جلاكتوز (مرض وراثي نادر). في حال انتابكم الشك، لا تترددوا في الاستشارة مع الطبيب أو الصيدلي.

## التفاعلات مع أدوية أخرى

تجنب تناول هذا الدواء رفقة لقاح حي موهن أو جرعات من حمض الأسيتيك ساليسيليك المضاد للالتهاب (أكثر من أو تساوي 1 غ لكل جرعة وأكثر من أو تساوي 3 غ في اليوم) إن كنت تتناول أو قد تناولت مؤخراً دواء آخر بما في ذلك دواء مستخدم دون وصفة طبية، استشر الطبيب أو الصيدلي.

## التفاعلات مع الأطعمة والأشربة

لا يوجد أي موضوع.

## التفاعلات مع منتجات الأعشاب أو الطب البديل

لا يوجد أي موضوع.

## الحمل والإرضاع

الحمل

لا يستخدم هذا الدواء أثناء الحمل إلا للضرورة. في حال اكتشاف المريضة أنها حبلى أثناء العلاج، المرجو الاستشارة مع الطبيب لأنه ضعف العضلات، وغمق الأوتار وخصوصاً عند تناول الدواء رفقة اضطراب الدورة الشهرية.

## فترقة العلاج

يتم تحديدها من قبل الطبيب.  
انتهاء العلاج لفترات طويلة، لا تتوقف عن العلاج فجأة، ولكن اتبع توصيات الطبيب لتخفيف الجرعة.

## جرعة زائدة

لا يوجد أي موضوع.

تعليمات في حال نسيان تناول جرعة واحدة أو عدة جرعات يجب استخدام هذا الدواء بانتظام لضمان فعاليته. لكن في حال عدم تناول جرعة معينة، واصل العلاج بكيفية طبيعية.

## خطر الإصابة بمتلازمة الانسحاب

لا يوجد أي موضوع.

## الأثار الغير المستحبة

كباقي الأدوية، يمكن لکوبيريد قرص فوار التسبب في ظهور آعراض غير مستحبة لا يعاني منها كل المرضى الذين يتناولون هذا الدواء.

عند استخدام هذا الدواء، من الضروري اتباع التوصيات بما في ذلك الجمية. لكن يمكن أن يتسبب في آثار غير مستحبة تبعاً للجرعة ومدة العلاج

## الأثار الأكثر شيوعاً:

· تغير على مستوى بعض المؤشرات البيولوجية (الملح والسكر والبوتاسيوم) يمكن أن يحتاج إلى حمية أو علاج تكميلي.

· ظهور كدمات.

· ارتفاع ضغط الدم، واحتباس السوائل والملح يمكن أن يؤدي إلى فشل القلب.

· اضطرابات المزاج: الإثارة، والنشوة، واضطرابات النوم.

· متلازمة كوشينغ: يمكن لتناول السيتريوديدات أن يتسبب في زيادة الوزن، وتورم واحمرار في الوجه، والنمو المفرط للشعر.

· هشاشة العظام والكسور.

· آلام في العظام على مستوى مفصل الورك (تنفس العظم).

· آثار نادرة جداً:

· خطر إفراز غير كافية من الغدة الكظرية.

· تأخر النمو لدى الطفل.

· اضطراب الدورة الشهرية.

· ضعف العضلات، وغمق الأوتار وخصوصاً عند تناول الدواء رفقة اضطراب الدورة الشهرية.