

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- 0 Réclamation : contact@mupras.com
- 0 Prise en charge : pec@mupras.com
- 0 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Déclaration de Maladie

N° W19-572545

95338



Maladie

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 0258

Actif

Pensionné(e)

Nom & Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

Tél. : 0697581411

Dentaire

Société :

Autre :

MERNISSI DRISS

01.07.1940

Rue Allal Ben Abdellah - 6ème Etage

BP 10 - Casablanca

4385,30 Dhs

Optique

Autres

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation :

Nom et prénom du malade :

Lien de parenté :

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :


Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Signature de l'adhérent(e) :

Le : 07/09/2021

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
			9	INP : 0311192023  Dr. AROUS SALIM Professeur Assistant Service de Cardiologie Hôpital Rachid Casablanca

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
 PHARMACIE SOURCE EL MOUSSA 7, Rue Alia Attia - Bourjane, Casablanca - Tel. 05 23 22 00 00	27/08/21	1385,30

ANALYSES - RADIGRAPHIES			
Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX						Montant détaillé des Honoraires	
Cachet et signature du Particulier	Date des Soins	Nombre					
		A M	P C	I M	I V		



Hôpital sans Tabac
Fumer Tue

مستشفى بدون تدخين
التدخين يقتل

Casablanca, le : 27/09/2021

ORDONNANCE

Docteur :

PHARMACIE LA SOURCE
Melle EL MOUAD MOUNA
Docteur en Pharmacie
7, Rue Ain Asserdouna, C.I.L
Casablanca - Tél: 05 22 36 24 85

448.00 x 4

1792.91 Coral au 75mg 150

160 x 215 69.00 x 5

345.00 21 Glucuronor 30mg 150

160/5 40.50 x 5

202.50 31 Yandy fior 80mg 70

160/5 210 + 126.80

327.80 41 NO-002 50mg 150

160/5

150 mg de fior

Dr. AROUS SALIM
Professeur Assistant
Service de Cardiologie
Chu Ibn Rochd Casablanca

222⁹
5/ Augustin 19 75
315

6/ Trajetta (mg 374.00 x 4
1496.00 1cp/1) 75
4385.30

Dr. ACCUS SALIM
Professeur Assistant
Service de Cardiologie
Chu Ibn Rochd Casablanca

PHARMACIE LA SOURCE

Melle EL MOUNNI MOUNA

Docteur en Pharmacie

7, Rue Ain Assoudoune, C.I.L
Casablanca - Tel: 05 22 36 24 85



més pelliculés

et cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Il est important que vous pourriez avoir des questions, irrégulièrement, et que ce soit toujours à propos de ce médicament. Si, même si le médicament n'a jamais eu d'effet indésirable, il peut s'appliquer aussi à tout autre médicament.

Il est important de savoir dans quel cas est-il

important de connaître avant

les informations à connaître avant de prendre ce médicament. Les informations à connaître avant de prendre ce médicament sont les suivantes : les effets indésirables éventuels, les interactions avec d'autres médicaments, les contre-indications et les autres informations.

Il est important de savoir dans quel cas



PPV : 374 DH 00
10010704/01

relire.



PPV : 374 DH 00
10010704/01



PPV : 374 DH 00
10010704/01

symptômes d'estomac, tension



PPV : 374 DH 00
10010704/01

des cloques ou appelle parfois la peau. Le médecin peut vous prescrire Trajenta.

Les lésions cutanées diabétiques

NO-DEP® 50mg

Sertraline

**COMPOSITION :**

Sertraline chlorhydrate

Excipients : Cellulose microcristalline, Dioxyde de titane, Eau purifiée, Amyglycolate sodique, Stéarate de magnésium, Talc, HPMC E-15, Indigo carmine, Propylène glycol, Eau purifiée.

FORMES ET PRÉSENTATION :

NO-DEP 50 mg, comprimé

CLASSE PHARMACOTHÉRAPEUTIQUE :

Le composant actif de NO-DEP est la Sertraline. La Sertraline appartient à un groupe de médicaments appelés Inhibiteurs Sélectifs de la Recapture de la Sérotonine (ISS). Les ISS sont utilisés pour traiter la dépression et/ou des troubles anxieux.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

- Episodes dépressifs majeurs
- Prévention des récidives
- Troubles paniques
- Troubles obsessionnels
- Trouble anxiété sociale
- Etat de stress post-traumatique

60 Compr.

s.

LOT : 300

PER : OCT 2022

PPV : 201 DH 00

La Sertraline est ainsi que chez les patients pédiatriques âgés de 6 à 17 ans.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION :

Les comprimés de sertraline doivent être pris entièrement pendant ou en dehors des repas.

Prenez votre médicament une fois par jour, le matin ou le soir.

La dose habituelle est:

Adultes:

Dépression et trouble obsessionnel compulsif:

Dans la dépression et le TOC, la dose efficace habituelle est de 50 mg/jour.

La dose quotidienne peut être augmentée par tranches de 50 mg sur une période de plusieurs semaines. La dose maximale recommandée est de 200 mg/jour.

Trouble panique, trouble anxiété sociale et état de stress post-traumatique:

Dans le trouble panique, le trouble anxiété sociale et le trouble de stress post-traumatique, le traitement doit être débuté à la dose de 25 mg/jour, qui est augmentée à 50 mg par jour après une semaine.

La dose quotidienne peut ensuite être augmentée par tranches de 50 mg sur une période de plusieurs semaines. La dose maximale

NO-DEP® 50mg

Sertraline

**COMPOSITION :****Sertraline chlorhydrate (DCI)****Excipients :** Cellulose microcristalline, Amidon de maïs, Amylose, Dioxyde de titane, Propylène glycol, Alcool isopropylique**FORMES ET PRÉSENTATIONS :**

NO-DEP 50 mg, comprimés pelliculés sécables, Boîte de 15,

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

Le composant actif de NO-DEP® est la sertraline. La sertraline est la Recapture de la Sérotonine (ISRS); ces médicaments sont utilisés

**INDICATIONS THERAPEUTIQUES :**

- Episodes dépressifs majeurs.
- Prévention des récidives d'épisodes dépressifs mineurs.
- Troubles panique, avec ou sans agoraphobie.
- Troubles obsessionnels compulsifs (TOC) chez l'adulte.
- Trouble anxiété sociale.
- Etat de stress post-traumatique (ESPT).

**POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION :**

Les comprimés de sertraline peuvent être administrés pendant ou en dehors des repas.

Prenez votre médicament une fois par jour, le matin ou le soir.

La dose habituelle est:

Adultes:

Dépression et trouble obsessionnel compulsif:

Dans la dépression et le TOC, la dose efficace habituelle est de 50 mg/jour.

La dose quotidienne peut être augmentée par tranches de 50 mg sur une période de plusieurs semaines. La dose maximale recommandée est de 200 mg/jour.

Trouble panique, trouble anxiété sociale et état de stress post-traumatique:

Dans le trouble panique, le trouble anxiété sociale et le trouble de stress post-traumatique, le traitement doit être débuté à 25 mg/jour, qui est augmentée à 50 mg par jour après une semaine.

Magnésium, Talc, HPMC E-15, Indigo carmine

médicaments appelés Inhibiteurs Sélectifs de la Recapture de la Sérotonine (ISRS) et/ou des troubles anxieux.

enfants et adolescents de 6 à 17 ans.

GLURENOR comprimés 30 mg

Gliquidone

CATEGORIE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

Sulfamide Hypoglycémiant. Antidiabétique Oral.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES

Traitement du diabète sucré (type II) non insulinodépendant lorsqu'les mesures diététiques et physiques ne suffisent pas à eux seuls pour un contrôle adéquat de la glycémie.

CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité au principe actif, aux sulfonylurées en général ou à l'un des excipients.

Les sulfonylurées sont contre-indiquées dans le diabète de type I (insulinodépendant), acidocétosique, le coma et le pré-coma diabétique, les états prédiabétiques, la grossesse et l'allaitement, en cas de fonction rénale ou hépatique gravement compromise ou en cas d'insuffisance surrenalienne.

PRÉCAUTIONS D'USAGE

L'usage des hypoglycémiants oraux du groupe des sulfonylurées doit être limité aux patients adultes atteints de diabète sucré de type II symptomatique et non cétonique, qui ne peut être contrôlé par un régime et à qui l'administration d'insuline n'est pas indiquée.

En cas de manifestations hypoglycémiques (voies effets indésirables) administrer des hydrates de carbone; dans les cas les plus graves, qui rarement peuvent déboucher sur la perte de conscience, il faut effectuer une perfusion lente i.v. de solution glucosée.

En cas de traumatismes, d'interventions chirurgicales, de maladies infectieuses et de fièvre, il peut s'avérer nécessaire d'instaurer temporairement la thérapie insulinique pour maintenir un contrôle métabolique approprié.

Les patients doivent apprendre à reconnaître les premiers symptômes de l'hypoglycémie (qui sont, en général, le mal de tête, l'irritabilité et la dépression, les troubles du sommeil, les tremblements, la forte transpiration) afin de pouvoir avertir en temps utile leur médecin, qui doit être aussi informé en cas de fièvre ou de troubles digestifs intercurrents.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

L'activité hypoglycémiant des sulfonylurées peut être augmentée par le dicumarol et ses dérivés, par les inhibiteurs des mono amino oxydases, par les bêta-bloquants, par les sulfamidiques, par le phénylbutazone et ses dérivés, par le chloramphénicol, par les tétracyclines, par la cyclophosphamide, par le probénécide, le phényramidol, les tuberculostatiques et par les salicylates; elle peut être au contraire diminuée par les sympathicomimétiques, la chlorpromazine, les corticostéroïdes, les contraceptifs oraux et les hormones thyroïdiennes, les diurétiques thiazidiques et les préparations d'acide nicotinique.

Il faut également agir avec prudence lors de l'administration simultanée de bêta-bloquants.

Chez les patients traités avec des sulfonylurées, il faut tenir compte de la possibilité d'un effet antabuse après ingestion de boissons alcoolisées.

Informer votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez ou si vous avez pris récemment tout autre type de médicament, même ceux sans prescription médicale.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Le traitement aux sulfonylurées de patients ayant un déficit en G6PD peut entraîner une anémie hémolytique.

Le Gliquidone doit donc être utilisé avec précaution chez ces patients et doit être considéré une alternative thérapeutique.

Le médicament contient du lactose, en cas d'intolérance à certains sucre, informer votre médecin traitant avant de prendre ce médicament.

Grossesse et allaitement**Grossesse**

Glurenor est contre-indiqué pendant la grossesse. Dans ce cas le traitement à l'insuline est instauré.

Les patientes voulant programmer une grossesse doivent en informer leur médecin.

Demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre n'importe quel médicament.


Allaitement

Comme il n'existe pas de données sur le passage du gliquidone dans le lait maternel, Glurenor ne doit pas être pris par les femmes qui allaitent.

*** VIGNETTE**

GLURENOR® 30 mg
60 comprimés O
PPV 69DH

physique ne suffisent pas à eux seuls pour un contrôle adéquat de la



GLURENOR comprimés 30 mg

Gliquidone

CATEGORIE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

Sulfamide Hypoglycémiant. Antidiabétique Oral.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES

Traitement du diabète sucré (type II) non insulinodépendant lorsque le régime alimentaire et la prise d'insuline ne suffisent pas à eux seuls pour un contrôle adéquat de la glycémie.

CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité au principe actif, aux sulfonylurées en général ou à l'acarbose. Les sulfonylurées sont contre-indiquées dans le diabète de type I (insuline) et l'allaitement, en cas de fonction rénale ou hépatique gravement compromise.

PRÉCAUTIONS D'USAGE

L'usage des hypoglycémiants oraux du groupe des sulfonylurées doit être limité au diabète sucré de type II symptomatique et non cétogénique, qui ne peut être contrôlé par un régime et à qui l'administration d'insuline n'est pas nécessaire. En cas de manifestations hypoglycémiantes (voir effets indésirables) administrer de l'acide glucose. En cas de traumatismes, d'interventions chirurgicales, de maladies infectieuses maintenir un contrôle métabolique approprié.

Les patients doivent apprendre à reconnaître les premiers symptômes de l'hypoglycémie (tremblements, la forte transpiration) afin de pouvoir avertir en temps utile leur médecin ou leur pharmacien.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

L'activité hypoglycémiant des sulfonylurées peut être augmentée par le dicumarol, les sulfaamides, par le phénylbutazone et ses dérivés, par le chloramphénicol, les tuberculostatiques et par les salicylates ; elle peut être au contraire diminuée par les sels de cuivre, les diurétiques thiazidiques et les préparations d'acide nicotinique. Il faut également agir avec prudence lors de l'administration simultanée de bêta-bloquants.

Chez les patients traités avec des sulfonylurées, il faut tenir compte de la possibilité d'un accès à l'insuline. Informer votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez ou si vous avez pris récemment.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Le traitement aux sulfonylurées de patients ayant un déficit en G6PD peut entraîner une anémie. Le Gliquidone doit donc être utilisé avec précaution chez ces patients et doit être considéré comme un médicament contenant du lactose, en cas d'intolérance à certains sucres, informer votre pharmacien.

Grossesse et allaitement**Grossesse**

Glurenore est contre-indiqué pendant la grossesse. Dans ce cas le traitement à l'insuline est instauré.

Les patientes voulant programmer une grossesse doivent en informer leur médecin.

Demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre n'importe quel médicament.

Allaitement

Comme il n'existe pas de données sur le passage du gliquidone dans le lait maternel, Glurenore ne doit pas être pris par les femmes qui allaitent.

*** VIGNETTE**

GLURENOR® 30 mg
60 comprimés O
PPV 69DH

*** VIGNETTE**

GLURENOR® 30 mg
60 comprimés O
PPV 69DH

*** VIGNETTE**

GLURENOR® 30 mg
60 comprimés O
PPV 69DH

*** VIGNETTE**

GLURENOR® 30 mg
60 comprimés O
PPV 69DH

du comprimé sont: hypromellose (E464), dioxyde de titane (E171), macrogol 6000, glycérol (E422), stéarate de magnésium (E470B), oxyde de fer jaune (E172), oxyde de fer rouge (E172).

Qu'est-ce que Coralan et contenu de l'emballage extérieur?

Les comprimés de Coralan 5 mg sont des comprimés de couleur saumon, de forme oblongue, pelliculés, comportant une barre de sécabilité et gravés avec « 5 » sur une face et  sur l'autre.

Les comprimés Coralan 7,5 mg sont des comprimés de couleur saumon, de forme triangulaire, pelliculés et ~~gravés~~ sur une face et  sur l'autre.

Les comprimés sont thermoformées Alu

Les Laboratoires Servier

Fabricant



MXGS0058



6 118001 130047

CORALAN 5 mg

Date de 06/2014

uettes

PPV : 448DH00

Les Laboratoires Servier

SERVIER MAROC

Lot Fath 4 – Imm ZEVACO

Rte d'Azemmour – 20180 Casablanca

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est:
novembre 2014

Coralan® 5 mg

Ivabradine

comprimés pelliculés

Coralan® 7,5 mg

Ivabradine

lent cette notice avant de prendre ce médicament car elle

Vous pourriez avoir besoin de la relire.

des questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.

Il a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres

identiques aux vôtres.

quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin

qui n'a pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

MXGS0058



6 118001 130047

CORALAN 5 mg

Boîte de 56 comprimés

PPV:448DH00

jour vous.

si les signes

à tout effet

NOTICE ?

et dans quel cas est-il utilisé ?

pourriez-vous connaître avant de prendre Coralan ?

lan ?

désirables éventuels ?

ralan ?

et autres informations ?

Informations sur l'insuffisance cardiaque chronique

L'insuffisance

lorsque votre

reste de l'or

respiratoires

MXGS0058



6 118001 130047

CORALAN 5 mg

Boîte de 56 comprimés

PPV : 448DH00

ui apparaît
ng dans le
difficultés
chevilles.

diaque de
i cœur en
quelles une
est susceptible de se produire. De cette manière,
de poitrine,
tionnement
cardiaques
fréquence
ique et le

AN ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Le médicament pour le cœur utilisé dans :

l'angine stable ou « angine » qui provoque des douleurs thoraciques) chez

la fréquence cardiaque supérieure ou égale à

les patients adultes présentant une fréquence cardiaque supérieure ou égale à 60 battements par minute et qui ne peuvent pas prendre de médicaments pour le cœur.

Il est utilisé en association aux bêta-bloquants et aux anti-angineux efficacement contrôlés par les

MXGS0058



6 118001 130047

CORALAN 5 mg

Boîte de 56 comprimés

PPV : 448DH00

VANT DE

2. QUELLES SONT LES PRINCIPALES MANIÈRES DE PRENDRE CORALAN ?

Ne prenez jam-

► si vous êtes a-

contenus dans ce médicament (voir

la rubrique 4). Les composants



valable 3 mois

Mlle 0258

Le 27/09/2021

DECLARATION DE MALADIE CHRONIQUE

(À adresser au médecin conseil de la MUPRAS sous pli confidentiel)

Je soussigné :

Dr. A. A. S. SALI
Professeur A. A. S. SALI
Service de Cardiologie
CHU Hassan II Casablanca

Certifie que Mlle, Mme, M. :

Driss MERNISI

Présente

Embarque à l'annexe symptôme cardiaque

Nécessitant un traitement d'une durée de :

Chir

Dont ci-joint ordonnance :

(à défaut noter le traitement prescrit)

site : www.mupras.com // mail : reclamation@mupras.com // phone : 0522-22-78-14 ou 0522-22-78-15 / fax : 0522-22-78-18

Adresse : 6ème étage, Angle Rue Allal BENABDELLAH et Rue Fakir Mohammed (ex Rue Heintz) - Casablanca