

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.



Declaration de Maladie

N° W21-637332

ND: 98313

couleur

☐ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 9622 Société : RAM

☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :

Nom & Prénom : SATTI Abderrahman

Date de naissance : 1959

Adresse : AV. 9 AVRIL RUE SANABIL ZKTOU NOS TETOUAN

Tél. : 0688563133 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr. HASNOUNI ALAOUI RACHID
Médecin Neuro Psychiatre
Bd. Allal Al Fassi, n 1, Tétouan
Tél: 05 39 97 25 83

Date de consultation : 21/12/2021

Nom et prénom du malade : BAKKALI NAJMA Age: 57 ans

Lien de parenté : ☐ Lui-même ☒ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : ECV dépressif

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :

Autorisation CNDP N° : A-A-215/2019

VOLET ADHERENT

Déclaration de maladie N° W21-637332

Remplissez ce volet, découpez le et conservez le.
Il sera nécessaire de le présenter pour toute réclamation ultérieure.

Coupon à conserver par l'adhérent(e).

Matricule :

Nom de l'adhérent(e) :

Total des frais engagés :

Date de dépôt :


Adresses Mails utiles

- 0 Réclamation : contact@mupras.com
- 0 Prise en charge : pec@mupras.com
- 0 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakhri et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél : 05 22 20 45 45 (L.G) Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
21/12/21	C	1	250DH	INP : 16114155 Dr. HABOUNI ALAQUI RAC Médecin Neuro Psych 1 Tét

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	21 12 81	397,80 DH

[illegible][illegible]



* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP :
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F. PROTHESES DENTAIRES 	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE H 25533412 00000000 D 21433552 00000000 00000000 35533411 B G 00000000 11433553			COEFFICIENT DES TRAVAUX
	(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dossier N° :

Durée de traitement :

02 mois

Dr. HASNOUNI ALAOUI RACHID

Médecin Neuro Psychiatre

Avenue Allal Al Fassi N° 1
(Près clinique Rif) - Tétouan
Tél.: 212 05 39 97 25 83



الدكتور حسنوني علاوي رشيد
طبيب اختصاصي في الأمراض

النفسية والعصبية
شارع علال الفاسي رقم 1
قرب مصحة الريف - تطوان
الهاتف: 05 39 97 25 83

Nom : Bakkali Naima.

Tétouan, le : 21/12/2021.

TA : 13/12/21
N° D'Ordre : 1355
Date : 21/12/21

163,20 x 1 = 326,40
* Serdep 20mg : cp

PHARMACIE AL-MILAYA
N° D'Ordre : 1355
Date : 21/12/21

35,70 x 1 = 35,70
* Alprozolam 5 : cp

Après 10 jours

T = 357,80

R V 02 mois

Dr. HASNOUNI ALAOUI RACHID
Médecin Neuro Psychiatre
2d. Allal Al Fassi, n° 1, Tétouan
Tél: 05 39 97 25 83

ملاحظة : المرجو احضار هذه الوصفة في الزيارة المقبلة

INFORMATIONS

mais on peut observer également une agitation, une irritabilité, des maux de tête, un engourdissement ou des picotements des extrémités, une sensibilité anormale au bruit, à la lumière ou aux contacts physiques, etc...

Les modalités de l'arrêt du traitement doivent être définies avec votre médecin.

La diminution très PROGRESSIVE des doses et l'espacement des prises représentent la meilleure prévention de ce phénomène de sevrage. Cette période sera d'autant plus longue que le traitement aura été prolongé.

Malgré la décroissance progressive des doses, un phénomène de REBOND sans gravité peut se produire, avec réapparition TRANSITOIRE des symptômes (anxiété) qui avaient justifié la mise en route du traitement.

Des troubles de mémoire ainsi que des altérations des fonctions psychomotrices sont susceptibles d'apparaître dans les heures qui suivent la prise du médicament. Chez certains sujets, ce médicament peut provoquer des réactions contraires à l'effet

Si une ou plusieurs de ces réactions surviennent, contactez le plus rapidement possible votre médecin.

Les benzodiazépines et produits apparentés doivent être utilisés avec prudence chez le sujet âgé, en raison du risque de somnolence et/ou de relâchement musculaire qui peuvent favoriser les chutes, avec des conséquences souvent graves dans cette population.

En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares).

Précautions d'emploi

La prise de ce médicament nécessite un suivi médical renforcé notamment en cas d'insuffisance hépatique, de maladie chronique du foie, d'alcoolisme et d'insuffisance respiratoire.

ALPRAZ, comprimé sécable ?

Contre-indications

Si votre médecin vous a informé(e) d'une

intolérance au sucre, contactez le avant

de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais ALPRAZ, comprimé

sécable dans les cas suivants :

- allergie connue à cette classe de produits

ou à l'un des composants du médicament,

- insuffisance respiratoire grave,

- syndrome d'apnée du sommeil (pauses

respiratoires pendant le sommeil),

- insuffisance hépatique grave,

- myasthénie (maladie caractérisée par

une tendance excessive à la fatigue

musculaire).

En cas de doute, il est indispensable de

demandez l'avis de votre médecin ou de

votre pharmacien.

Précautions d'emploi et Mises en garde

spéciales

Ce traitement médicamenteux ne peut à

lui seul résoudre les difficultés liées à une

anxiété. Il convient de demander conseil

à votre médecin. Il vous indiquera les

conduites pouvant aider à la lutte contre

'l'anxiété.

Mises en garde

Si une perte d'efficacité survient lors de

'l'utilisation répétée du médicament,

l'augmentation pas la dose.

Risque de DEPENDANCE : ce traitement

peut entraîner, surtout en cas d'utilisation

prolongée, un état de dépendance physique

et psychique. Divers facteurs semblent

favoriser la survenue de la dépendance :

- durée du traitement,

- dose,

- antécédents d'autres dépendances

médicamenteuses ou non, y compris

alcoolique.

La dépendance peut survenir même en

'l'absence de ces facteurs favorisants.

Pour plus d'information, parlez-en à

votre médecin ou à votre pharmacien.

Arrêter BRUTALEMENT ce traitement peut

ALPRAZ, comprimé sécable ?

Contre-indications

Si votre médecin vous a informé(e) d'une

intolérance au sucre, contactez le avant

de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais ALPRAZ, comprimé

sécable dans les cas suivants :

- allergie connue à cette classe de produits

ou à l'un des composants du médicament,

- insuffisance respiratoire grave,

- syndrome d'apnée du sommeil (pauses

respiratoires pendant le sommeil),

- insuffisance hépatique grave,

- myasthénie (maladie caractérisée par

une tendance excessive à la fatigue

musculaire).

En cas de doute, il est indispensable de

demandez l'avis de votre médecin ou de

votre pharmacien.

Précautions d'emploi et Mises en garde

spéciales

Ce traitement médicamenteux ne peut à

lui seul résoudre les difficultés liées à une

anxiété. Il convient de demander conseil

à votre médecin. Il vous indiquera les

conduites pouvant aider à la lutte contre

'l'anxiété.

Mises en garde

Si une perte d'efficacité survient lors de

'l'utilisation répétée du médicament,

l'augmentation pas la dose.

Risque de DEPENDANCE : ce traitement

peut entraîner, surtout en cas d'utilisation

prolongée, un état de dépendance physique

et psychique. Divers facteurs semblent

favoriser la survenue de la dépendance :

- durée du traitement,

- dose,

- antécédents d'autres dépendances

médicamenteuses ou non, y compris

alcoolique.

La dépendance peut survenir même en

'l'absence de ces facteurs favorisants.

Pour plus d'information, parlez-en à

votre médecin ou à votre pharmacien.

Arrêter BRUTALEMENT ce traitement peut

ALPRAZ, comprimé sécable ?

Contre-indications

Si votre médecin vous a informé(e) d'une

intolérance au sucre, contactez le avant

de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais ALPRAZ, comprimé

sécable dans les cas suivants :

- allergie connue à cette classe de produits

ou à l'un des composants du médicament,

- insuffisance respiratoire grave,

- syndrome d'apnée du sommeil (pauses

respiratoires pendant le sommeil),

- insuffisance hépatique grave,

- myasthénie (maladie caractérisée par

une tendance excessive à la fatigue

musculaire).

En cas de doute, il est indispensable de

demandez l'avis de votre médecin ou de

votre pharmacien.

Précautions d'emploi et Mises en garde

spéciales

Ce traitement médicamenteux ne peut à

lui seul résoudre les difficultés liées à une

anxiété. Il convient de demander conseil

à votre médecin. Il vous indiquera les

conduites pouvant aider à la lutte contre

'l'anxiété.

Mises en garde

Si une perte d'efficacité survient lors de

'l'utilisation répétée du médicament,

l'augmentation pas la dose.

Risque de DEPENDANCE : ce traitement

peut entraîner, surtout en cas d'utilisation

prolongée, un état de dépendance physique

et psychique. Divers facteurs semblent

favoriser la survenue de la dépendance :

- durée du traitement,

- dose,

- antécédents d'autres dépendances

médicamenteuses ou non, y compris

alcoolique.

La dépendance peut survenir même en

'l'absence de ces facteurs favorisants.

Pour plus d'information, parlez-en à

votre médecin ou à votre pharmacien.

Arrêter BRUTALEMENT ce traitement peut

ALPRAZ, comprimé sécable ?

Contre-indications

Si votre médecin vous a informé(e) d'une

intolérance au sucre, contactez le avant

de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais ALPRAZ, comprimé

sécable dans les cas suivants :

- allergie connue à cette classe de produits

ou à l'un des composants du médicament,

- insuffisance respiratoire grave,

- syndrome d'apnée du sommeil (pauses

respiratoires pendant le sommeil),

- insuffisance hépatique grave,

- myasthénie (maladie caractérisée par

une tendance excessive à la fatigue

musculaire).

En cas de doute, il est indispensable de

demandez l'avis de votre médecin ou de

votre pharmacien.

Précautions d'emploi et Mises en garde

spéciales

Ce traitement médicamenteux ne peut à

lui seul résoudre les difficultés liées à une

anxiété. Il convient de demander conseil

à votre médecin. Il vous indiquera les

conduites pouvant aider à la lutte contre

'l'anxiété.

Mises en garde

Si une perte d'efficacité survient lors de

'l'utilisation répétée du médicament,

l'augmentation pas la dose.

Risque de DEPENDANCE : ce traitement

peut entraîner, surtout en cas d'utilisation

prolongée, un état de dépendance physique

et psychique. Divers facteurs semblent

favoriser la survenue de la dépendance :

- durée du traitement,

- dose,

- antécédents d'autres dépendances

médicamenteuses ou non, y compris

alcoolique.

La dépendance peut survenir même en

'l'absence de ces facteurs favorisants.

Pour plus d'information, parlez-en à

votre médecin ou à votre pharmacien.

Arrêter BRUTALEMENT ce traitement peut

ALPRAZ, comprimé sécable ?

Contre-indications

Si votre médecin vous a informé(e) d'une

intolérance au sucre, contactez le avant

de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais ALPRAZ, comprimé

sécable dans les cas suivants :

- allergie connue à cette classe de produits

ou à l'un des composants du médicament,

- insuffisance respiratoire grave,

- syndrome d'apnée du sommeil (pauses

respiratoires pendant le sommeil),

- insuffisance hépatique grave,

- myasthénie (maladie caractérisée par

une tendance excessive à la fatigue

musculaire).

En cas de doute, il est indispensable de

demandez l'avis de votre médecin ou de

votre pharmacien.

Précautions d'emploi et Mises en garde

spéciales

Ce traitement médicamenteux ne peut à

lui seul résoudre les difficultés liées à une

anxiété. Il convient de demander conseil

à votre médecin. Il vous indiquera les

conduites pouvant aider à la lutte contre

'l'anxiété.

Mises en garde

Si une perte d'efficacité survient lors de

'l'utilisation répétée du médicament,

l'augmentation pas la dose.

Risque de DEPENDANCE : ce traitement

peut entraîner, surtout en cas d'utilisation

prolongée, un état de dépendance physique

et psychique. Divers facteurs semblent

favoriser la survenue de la dépendance :

- durée du traitement,

- dose,

- antécédents d'autres dépendances

médicamenteuses ou non, y compris

alcoolique.

La dépendance peut survenir même en

'l'absence de ces facteurs favorisants.

Pour plus d'information, parlez-en à

votre médecin ou à votre pharmacien.

Arrêter BRUTALEMENT ce traitement peut

ALPRAZ, comprimé sécable ?

Contre-indications

Si votre médecin vous a informé(e) d'une

intolérance au sucre, contactez le avant

de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais ALPRAZ, comprimé

sécable dans les cas suivants :

- allergie connue à cette classe de produits

ou à l'un des composants du médicament,

- insuffisance respiratoire grave,

- syndrome d'apnée du sommeil (pauses

respiratoires pendant le sommeil),

- insuffisance hépatique grave,

- myasthénie (maladie caractérisée par

une tendance excessive à la fatigue

musculaire).

En cas de doute, il est indispensable de

demandez l'avis de votre médecin ou de

votre pharmacien.

Précautions d'emploi et Mises en garde

spéciales

Ce traitement médicamenteux ne peut à

lui seul résoudre les difficultés liées à une

anxiété. Il convient de demander conseil

à votre médecin. Il vous indiquera les

conduites pouvant aider à la lutte contre

'l'anxiété.

Mises en garde

Si une perte d'efficacité survient lors de

'l'utilisation répétée du médicament,

l'augmentation pas la dose.

Risque de DEPENDANCE : ce traitement

peut entraîner, surtout en cas d'utilisation

prolongée, un état de dépendance physique

et psychique. Divers facteurs semblent

favoriser la survenue de la dépendance :

- durée du traitement,

- dose,

- antécédents d'autres dépendances

médicamenteuses ou non, y compris

alcoolique.

La dépendance peut survenir même en

'l'absence de ces facteurs favorisants.

Pour plus d'information, parlez-en à

votre médecin ou à votre pharmacien.

Arrêter BRUTALEMENT ce traitement peut

ALPRAZ, comprimé sécable ?

Contre-indications

Si votre médecin vous a informé(e) d'une

intolérance au sucre, contactez le avant

de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais ALPRAZ, comprimé

sécable dans les cas suivants :

INFORMATIONS

mais on peut observer également une agitation, une irritabilité, des maux de tête, un engourdissement ou des picotements des extrémités, une sensibilité anormale au bruit, à la lumière ou aux contacts physiques, etc...

Les modalités de l'arrêt du traitement doivent être définies avec votre médecin.

La diminution très PROGRESSIVE des doses et l'espacement des prises représentent la meilleure prévention de ce phénomène de sevrage. Cette période sera d'autant plus longue que le traitement aura été prolongé.

Malgré la décroissance progressive des doses, un phénomène de REBOND sans gravité peut se produire, avec réapparition TRANSITOIRE des symptômes (anxiété) qui avaient justifié la mise en route du traitement.

Des troubles de mémoire ainsi que des altérations des fonctions psychomotrices sont susceptibles d'apparaître dans les heures qui suivent la prise du médicament. Chez certains sujets, ce médicament peut provoquer des réactions contraires à l'effet

Si une ou plusieurs de ces réactions surviennent, contactez le plus rapidement possible votre médecin.

Les benzodiazépines et produits apparentés doivent être utilisés avec prudence chez le sujet âgé, en raison du risque de somnolence et/ou de relâchement musculaire qui peuvent favoriser les chutes, avec des conséquences souvent graves dans cette population.

En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares).

Précautions d'emploi

La prise de ce médicament nécessite un suivi médical renforcé notamment en cas d'insuffisance hépatique, de maladie chronique du foie, d'alcoolisme et d'insuffisance respiratoire.

ALPRAZ, comprimé sécable ?

Contre-indications

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance au sucre, contactez le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais ALPRAZ, comprimé sécable dans les cas suivants :

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Précautions d'emploi et Mises en garde spéciales

Le traitement médicamenteux ne peut à lui seul résoudre les difficultés liées à une anxiété. Il convient de demander conseil à votre médecin. Il vous indiquera les conduites pouvant aider à la lutte contre l'anxiété.

Mises en garde

Si une perte d'efficacité survient lors de l'utilisation répétée du médicament, l'augmentation pas la dose.

Risque de DEPENDANCE : ce traitement peut entraîner, surtout en cas d'utilisation prolongée, un état de dépendance physique et psychique. Divers facteurs semblent favoriser la survenue de la dépendance : - durée du traitement,

ALPRAZ, comprimé sécable ?

Contre-indications

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance au sucre, contactez le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais ALPRAZ, comprimé sécable dans les cas suivants :

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Précautions d'emploi et Mises en garde spéciales

Le traitement médicamenteux ne peut à lui seul résoudre les difficultés liées à une anxiété. Il convient de demander conseil à votre médecin. Il vous indiquera les conduites pouvant aider à la lutte contre l'anxiété.

Mises en garde

Si une perte d'efficacité survient lors de l'utilisation répétée du médicament, l'augmentation pas la dose.

Risque de DEPENDANCE : ce traitement peut entraîner, surtout en cas d'utilisation prolongée, un état de dépendance physique et psychique. Divers facteurs semblent favoriser la survenue de la dépendance : - durée du traitement,

alcooolique.

[illegible]

[illegible]