

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR OBTENIR LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

tions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com
Prise en charge : pec@mupras.com
Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Nº M21- 064416

202505

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 7887

Société : R.A.M.

Actif

Pensionné(e)

Autre : Retraite

Nom & Prénom : SABBAUGH TAMOU


Date de naissance : 01-01-1958

Adresse : RESIDENCE WAFA 04 TIN 44 APP N° 12

...WALFA (WAM) CASABLANCA

Tél. : 06 75471030 Total des frais engagés : 250,00 t. 1 Dhs

Cadre réservé au Médecin



Cachet du médecin :

Date de consultation : 03/01/2022

Nom et prénom du malade : SABBAUGH TAMOU Age :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Lien de parenté :

Nature de la maladie : réfraction + hémilevator post - opératoire

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca

Le : 03/01/2022

Signature de l'adhérent(e) :

INPE: 091032508

VOLET ADHÉRENT

Déclaration de maladie Nº M21-64416

Remplissez ce volet, découpez-le et conservez-le.

Il sera nécessaire de le présenter pour toute réclamation ultérieure.

Coupon à conserver par l'adhérent(e).

Matricule : 7887

Nom de l'adhérent(e) : SABBAUGH TAMOU

Total des frais engagés : 250,00 t. 1

Date de dépôt :

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Péclement des Actes
03/01/2022		6.3	250 DH	Dr. Ait Moulay Youssef Ophthalmologiste Al Wifan Fecara , Lot N° 55 - Residence 3 ème Etage Bureau N° 7 Della - Casablanca 22 65 84 88 - GSM : +212 398 82 87

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	مبلغ الفاتورة
الونام PHARMACIE HAYEL WIAM & 252 BD QUED SEBOUDOULEFA ASABIA 1060 TÉL: 05 22 91 17 31	31.01.2022	1026.10

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

VOLET ADHERENT

* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION

Diagram illustrating the numbering of teeth in a dental arch. The upper arch has teeth numbered 1 through 8 from left to right. The lower arch has teeth numbered 8 through 1 from left to right. The diagram is centered with a vertical axis (H to B) and a horizontal axis (D to G).

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
D	
00000000	00000000
35533411	11433553

(Création, remont, adjonction)
ctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS


VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXÉCUTION



Al Wiffaq Ferrara 1, Lot N° 65, Résidence Aya,
3 ème Étage, Bureau N°7, Oulfa, Casablanca
Tél : 05 22 65 84 88 - Gsm : 06 23 98 82 87

الوفاق فيرارا 1، تجزئة 65 | قامة آية، الطابق
الثالث، مكتب رقم 7، الالفة، الدارالبيضاء

الهاتف : 05 22 65 84 88 - النقال : 06 23 98 82 87



Casablanca le 03 janvier 2022

Mme SABBAGH Tamou

36,60

1/ CHIBROXINE: COLLYRE num1

1 goutte 4 fois jour, dans l'œil gauche, pendant 15 jours

28,60 x 2

2/ CHIBROCADRON COLLYRE num2

1 goutte/heure pendant 7 jours

puis 1 goutte 6 fois par jour pendant 5 jours

puis 1 goutte 4 fois par jour pendant 5 jours

puis 1 goutte 2 fois par jour pendant 5 jours,

gauche

99,50 x 8

3/ OCUYAL GEL (0.3%)

1 goutte 4 à 6 fois par jour, dans les deux yeux

3 mois

41,00 x 2

4/ Gel larmes num2

1 goutte 3 à 4 fois / jour, dans les deux yeux

54,00

5/ TOBRADEX: COLLYRE

1 goutte 4 fois par jour, dans l'œil droit, pendant 15 jours



Dr. Ait Moulay Latifa
Ophtalmologiste

Al Wiffaq Ferrara 1, Lot N° 65, Résidence
Aya, 3 ème Etage, Bureau N°7, Oulfa - Casablanca
Tél: 05 22 65 84 88 - Gsm: 06 23 98 82 87

OUCYAL GEL

Gouttes oculaires en gel lubrifiantes et apaisantes à base d'

PRÉSENTATION ET CONTENU

Gouttes oculaires stériles en flacon de 10 ml ou monodose

INDICATIONS

OcuYal Gel est indiqué dans l'humidification et le rafraîchissement des yeux, les symptômes générés suite à une longue période d'instabilité du film lacrymal. OcuYal Gel protège, humidifie et lubrifie la cornée, il soulage l'irritation des yeux ou la sensation de sécheresse aiguë oculaire liée à un manque de larmes, facteurs environnementaux (poussière, pollution, pollens), ménopause, interventions chirurgicales et utilisation prolongée de lentilles de contact.

OcuYal Gel, grâce à l'acide hyaluronique, est également recommandé pour lubrifier et hydrater toute sorte de lentilles de contact, améliorant ainsi le confort pendant l'utilisation.

PRÉCAUTIONS

- Le produit reste stérile jusqu'à la première ouverture
- Ne pas utiliser le produit après la date de péremption
- Ne pas utiliser si la bague d'inviolabilité du flacon a été endommagée avant ouverture
- Bien refermer le flacon après utilisation
- Utiliser dans un délai de 30 jours après ouverture
- Ne pas utiliser le produit en cas d'hypersensibilité à l'un de ses composants
- Eviter tout contact entre le compte-gouttes et une surface quelconque
- Ne pas congeler, tenir éloigner des sources de chaleur et des rayons directs du soleil
- Tenir hors de portée des enfants
- Ne pas ingérer.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Suspendre l'utilisation du produit et contacter un spécialiste en cas d'altérations de la vision, rougeurs ou irritations oculaires persistantes.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION

EN CAS DE SÉCHERESSE OCULAIRE:

Instiller une ou deux gouttes dans l'œil lorsque le besoin se fait ressentir.

POUR LES PORTEURS DE LENTILLES DE CONTACT:

Mettre une goutte d'OcuYal Gel à l'intérieur de la lentille de contact avant application. Il est possible d'instiller le produit sur la lentille de contact également pendant l'utilisation, si l'application elle-même s'avère source de gêne (sensation de corps étranger dans l'œil).

EFFETS INDESIRABLES

Aucun connu.

Dispositif médical

 SCHALCON S.p.A.
Viale Enrico Ortolani, 195
00125 ROMA Italy


0477





01161G803 Rev0 10.11.20

OUCYAL GEL

Gouttes oculaires en gel lubrifiantes et apaisantes à base d'

PRÉSENTATION ET CONTENU

Gouttes oculaires stériles en flacon de 10 ml ou monodose

INDICATIONS

OcuYal Gel est indiqué dans l'humidification et le rafraîchissement des yeux, les symptômes générés suite à une longue période d'instabilité du film lacrymal. OcuYal Gel protège, humidifie et lubrifie la cornée, il soulage l'irritation des yeux ou la sensation de sécheresse aiguë oculaire liée à un manque de larmes, facteurs environnementaux (poussière, pollution, pollens), ménopause, interventions chirurgicales et utilisation prolongée de lentilles de contact.

OcuYal Gel, grâce à l'acide hyaluronique, est également recommandé pour lubrifier et hydrater toute sorte de lentilles de contact, améliorant ainsi le confort pendant l'utilisation.

PRÉCAUTIONS

- Le produit reste stérile jusqu'à la première ouverture
- Ne pas utiliser le produit après la date de péremption
- Ne pas utiliser si la bague d'inviolabilité du flacon a été endommagée avant ouverture
- Bien refermer le flacon après utilisation
- Utiliser dans un délai de 30 jours après ouverture
- Ne pas utiliser le produit en cas d'hypersensibilité à l'un de ses composants
- Eviter tout contact entre le compte-gouttes et une surface quelconque
- Ne pas congeler, tenir éloigner des sources de chaleur et des rayons directs du soleil
- Tenir hors de portée des enfants
- Ne pas ingérer.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Suspendre l'utilisation du produit et contacter un spécialiste en cas d'altérations de la vision, rougeurs ou irritations oculaires persistantes.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION

EN CAS DE SÉCHERESSE OCULAIRE:

Instiller une ou deux gouttes dans l'œil lorsque le besoin se fait ressentir.

POUR LES PORTEURS DE LENTILLES DE CONTACT:

Mettre une goutte d'OcuYal Gel à l'intérieur de la lentille de contact avant application. Il est possible d'instiller le produit sur la lentille de contact également pendant l'utilisation, si l'application elle-même s'avère source de gêne (sensation de corps étranger dans l'œil).

EFFETS INDESIRABLES

Aucun connu.

Dispositif médical

 SCHALCON S.p.A.
Viale Enrico Ortolani, 195
00125 ROMA Italy


0477





01161G803 Rev0 10.11.20

OUCYAL GEL

Gouttes oculaires en gel lubrifiantes et apaisantes à base d'

PRÉSENTATION ET CONTENU

Gouttes oculaires stériles en flacon de 10 ml ou monodose

INDICATIONS

OcuYal Gel est indiqué dans l'humidification et le rafraîchissement des yeux, les symptômes générés suite à une longue période d'instabilité du film lacrymal. OcuYal Gel protège, humidifie et lubrifie la cornée, il soulage l'irritation des yeux ou la sensation de sécheresse aiguë oculaire liée à un manque de larmes, facteurs environnementaux (poussière, pollution, pollens), ménopause, interventions chirurgicales et utilisation prolongée de lentilles de contact.

OcuYal Gel, grâce à l'acide hyaluronique, est également recommandé pour lubrifier et hydrater toute sorte de lentilles de contact, améliorant ainsi le confort pendant l'utilisation.

PRÉCAUTIONS

- Le produit reste stérile jusqu'à la première ouverture
- Ne pas utiliser le produit après la date de péremption
- Ne pas utiliser si la bague d'inviolabilité du flacon a été endommagée avant ouverture
- Bien refermer le flacon après utilisation
- Utiliser dans un délai de 30 jours après ouverture
- Ne pas utiliser le produit en cas d'hypersensibilité à l'un de ses composants
- Eviter tout contact entre le compte-gouttes et une surface quelconque
- Ne pas congeler, tenir éloigner des sources de chaleur et des rayons directs du soleil
- Tenir hors de portée des enfants
- Ne pas ingérer.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Suspendre l'utilisation du produit et contacter un spécialiste en cas d'altérations de la vision, rougeurs ou irritations oculaires persistantes.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION

EN CAS DE SÉCHERESSE OCULAIRE:

Instiller une ou deux gouttes dans l'œil lorsque le besoin se fait ressentir.

POUR LES PORTEURS DE LENTILLES DE CONTACT:

Mettre une goutte d'OcuYal Gel à l'intérieur de la lentille de contact avant application. Il est possible d'instiller le produit sur la lentille de contact également pendant l'utilisation, si l'application elle-même s'avère source de gêne (sensation de corps étranger dans l'œil).

EFFETS INDESIRABLES

Aucun connu.

Dispositif médical

 SCHALCON S.p.A.
Viale Enrico Ortolani, 195
00125 ROMA Italy


0477





01161G803 Rev0 10.11.20

OUCYAL GEL

Gouttes oculaires en gel lubrifiantes et apaisantes à base d'

PRÉSENTATION ET CONTENU

Gouttes oculaires stériles en flacon de 10 ml ou monodose

INDICATIONS

OcuYal Gel est indiqué dans l'humidification et le rafraîchissement des yeux, les symptômes générés suite à une longue période d'instabilité du film lacrymal. OcuYal Gel protège, humidifie et lubrifie la cornée, il soulage l'irritation des yeux ou la sensation de sécheresse aiguë oculaire liée à un manque de larmes, facteurs environnementaux (poussière, pollution, pollens), ménopause, interventions chirurgicales et utilisation prolongée de lentilles de contact.

OcuYal Gel, grâce à l'acide hyaluronique, est également recommandé pour lubrifier et hydrater toute sorte de lentilles de contact, améliorant ainsi le confort pendant l'utilisation.

PRÉCAUTIONS

- Le produit reste stérile jusqu'à la première ouverture
- Ne pas utiliser le produit après la date de péremption
- Ne pas utiliser si la bague d'inviolabilité du flacon a été endommagée avant ouverture
- Bien refermer le flacon après utilisation
- Utiliser dans un délai de 30 jours après ouverture
- Ne pas utiliser le produit en cas d'hypersensibilité à l'un de ses composants
- Eviter tout contact entre le compte-gouttes et une surface quelconque
- Ne pas congeler, tenir éloigner des sources de chaleur et des rayons directs du soleil
- Tenir hors de portée des enfants
- Ne pas ingérer.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Suspendre l'utilisation du produit et contacter un spécialiste en cas d'altérations de la vision, rougeurs ou irritations oculaires persistantes.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION

EN CAS DE SÉCHERESSE OCULAIRE:

Instiller une ou deux gouttes dans l'œil lorsque le besoin se fait ressentir.

POUR LES PORTEURS DE LENTILLES DE CONTACT:

Mettre une goutte d'OcuYal Gel à l'intérieur de la lentille de contact avant application. Il est possible d'instiller le produit sur la lentille de contact également pendant l'utilisation, si l'application elle-même s'avère source de gêne (sensation de corps étranger dans l'œil).

EFFETS INDESIRABLES

Aucun connu.

Dispositif médical

 SCHALCON S.p.A.
Viale Enrico Ortolani, 195
00125 ROMA Italy


0477





01161G803 Rev0 10.11.20

OUCYAL GEL

Gouttes oculaires en gel lubrifiantes et apaisantes à base d'

PRÉSENTATION ET CONTENU

Gouttes oculaires stériles en flacon de 10 ml ou monodose

INDICATIONS

OcuYal Gel est indiqué dans l'humidification et le rafraîchissement des yeux, les symptômes générés suite à une longue période d'instabilité du film lacrymal. OcuYal Gel protège, humidifie et lubrifie la cornée, il soulage l'irritation des yeux ou la sensation de sécheresse aiguë oculaire liée à un manque de larmes, facteurs environnementaux (poussière, pollution, pollens), ménopause, interventions chirurgicales et utilisation prolongée de lentilles de contact.

OcuYal Gel, grâce à l'acide hyaluronique, est également recommandé pour lubrifier et hydrater toute sorte de lentilles de contact, améliorant ainsi le confort pendant l'utilisation.

PRÉCAUTIONS

- Le produit reste stérile jusqu'à la première ouverture
- Ne pas utiliser le produit après la date de péremption
- Ne pas utiliser si la bague d'inviolabilité du flacon a été endommagée avant ouverture
- Bien refermer le flacon après utilisation
- Utiliser dans un délai de 30 jours après ouverture
- Ne pas utiliser le produit en cas d'hypersensibilité à l'un de ses composants
- Eviter tout contact entre le compte-gouttes et une surface quelconque
- Ne pas congeler, tenir éloigner des sources de chaleur et des rayons directs du soleil
- Tenir hors de portée des enfants
- Ne pas ingérer.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Suspendre l'utilisation du produit et contacter un spécialiste en cas d'altérations de la vision, rougeurs ou irritations oculaires persistantes.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION

EN CAS DE SÉCHERESSE OCULAIRE:

Instiller une ou deux gouttes dans l'œil lorsque le besoin se fait ressentir.

POUR LES PORTEURS DE LENTILLES DE CONTACT:

Mettre une goutte d'OcuYal Gel à l'intérieur de la lentille de contact avant application. Il est possible d'instiller le produit sur la lentille de contact également pendant l'utilisation, si l'application elle-même s'avère source de gêne (sensation de corps étranger dans l'œil).

EFFETS INDESIRABLES

Aucun connu.

Dispositif médical

 SCHALCON S.p.A.
Viale Enrico Ortolani, 195
00125 ROMA Italy


0477





01161G803 Rev0 10.11.20

OUCYAL GEL

Gouttes oculaires en gel lubrifiantes et apaisantes à base d'

PRÉSENTATION ET CONTENU

Gouttes oculaires stériles en flacon de 10 ml ou monodose

INDICATIONS

OcuYal Gel est indiqué dans l'humidification et le rafraîchissement des yeux, les symptômes générés suite à une longue période d'instabilité du film lacrymal. OcuYal Gel protège, humidifie et lubrifie la cornée, il soulage l'irritation des yeux ou la sensation de sécheresse aiguë oculaire liée à un manque de larmes, facteurs environnementaux (poussière, pollution, pollens), ménopause, interventions chirurgicales et utilisation prolongée de lentilles de contact.

OcuYal Gel, grâce à l'acide hyaluronique, est également recommandé pour lubrifier et hydrater toute sorte de lentilles de contact, améliorant ainsi le confort pendant l'utilisation.

PRÉCAUTIONS

- Le produit reste stérile jusqu'à la première ouverture
- Ne pas utiliser le produit après la date de péremption
- Ne pas utiliser si la bague d'inviolabilité du flacon a été endommagée avant ouverture
- Bien refermer le flacon après utilisation
- Utiliser dans un délai de 30 jours après ouverture
- Ne pas utiliser le produit en cas d'hypersensibilité à l'un de ses composants
- Eviter tout contact entre le compte-gouttes et une surface quelconque
- Ne pas congeler, tenir éloigner des sources de chaleur et des rayons directs du soleil
- Tenir hors de portée des enfants
- Ne pas ingérer.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Suspendre l'utilisation du produit et contacter un spécialiste en cas d'altérations de la vision, rougeurs ou irritations oculaires persistantes.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION

EN CAS DE SÉCHERESSE OCULAIRE:

Instiller une ou deux gouttes dans l'œil lorsque le besoin se fait ressentir.

POUR LES PORTEURS DE LENTILLES DE CONTACT:

Mettre une goutte d'OcuYal Gel à l'intérieur de la lentille de contact avant application. Il est possible d'instiller le produit sur la lentille de contact également pendant l'utilisation, si l'application elle-même s'avère source de gêne (sensation de corps étranger dans l'œil).

EFFETS INDESIRABLES

Aucun connu.

Dispositif médical

 SCHALCON S.p.A.
Viale Enrico Ortolani, 195
00125 ROMA Italy


0477





01161G803 Rev0 10.11.20

OUCYAL GEL

Gouttes oculaires en gel lubrifiantes et apaisantes à base d'

PRÉSENTATION ET CONTENU

Gouttes oculaires stériles en flacon de 10 ml ou monodose

INDICATIONS

OcuYal Gel est indiqué dans l'humidification et le rafraîchissement des yeux, les symptômes générés suite à une longue période d'instabilité du film lacrymal. OcuYal Gel protège, humidifie et lubrifie la cornée, il soulage l'irritation des yeux ou la sensation de sécheresse aiguë oculaire liée à un manque de larmes, facteurs environnementaux (poussière, pollution, pollens), ménopause, interventions chirurgicales et utilisation prolongée de lentilles de contact.

OcuYal Gel, grâce à l'acide hyaluronique, est également recommandé pour lubrifier et hydrater toute sorte de lentilles de contact, améliorant ainsi le confort pendant l'utilisation.

PRÉCAUTIONS

- Le produit reste stérile jusqu'à la première ouverture
- Ne pas utiliser le produit après la date de péremption
- Ne pas utiliser si la bague d'inviolabilité du flacon a été endommagée avant ouverture
- Bien refermer le flacon après utilisation
- Utiliser dans un délai de 30 jours après ouverture
- Ne pas utiliser le produit en cas d'hypersensibilité à l'un de ses composants
- Eviter tout contact entre le compte-gouttes et une surface quelconque
- Ne pas congeler, tenir éloigner des sources de chaleur et des rayons directs du soleil
- Tenir hors de portée des enfants
- Ne pas ingérer.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Suspendre l'utilisation du produit et contacter un spécialiste en cas d'altérations de la vision, rougeurs ou irritations oculaires persistantes.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION

EN CAS DE SÉCHERESSE OCULAIRE:

Instiller une ou deux gouttes dans l'œil lorsque le besoin se fait ressentir.

POUR LES PORTEURS DE LENTILLES DE CONTACT:

Mettre une goutte d'OcuYal Gel à l'intérieur de la lentille de contact avant application. Il est possible d'instiller le produit sur la lentille de contact également pendant l'utilisation, si l'application elle-même s'avère source de gêne (sensation de corps étranger dans l'œil).

EFFETS INDESIRABLES

Aucun connu.

Dispositif médical

 SCHALCON S.p.A.
Viale Enrico Ortolani, 195
00125 ROMA Italy


0477





01161G803 Rev0 10.11.20

OUCYAL GEL

Gouttes oculaires en gel lubrifiantes et apaisantes à base d'

PRÉSENTATION ET CONTENU

Gouttes oculaires stériles en flacon de 10 ml ou monodose

INDICATIONS

OcuYal Gel est indiqué dans l'humidification et le rafraîchissement des yeux, les symptômes générés suite à une longue période d'instabilité du film lacrymal. OcuYal Gel protège, humidifie et lubrifie la cornée, il soulage l'irritation des yeux ou la sensation de sécheresse aiguë oculaire liée à un manque de larmes, facteurs environnementaux (poussière, pollution, pollens), ménopause, interventions chirurgicales et utilisation prolongée de lentilles de contact.

OcuYal Gel, grâce à l'acide hyaluronique, est également recommandé pour lubrifier et hydrater toute sorte de lentilles de contact, améliorant ainsi le confort pendant l'utilisation.

PRÉCAUTIONS

- Le produit reste stérile jusqu'à la première ouverture
- Ne pas utiliser le produit après la date de péremption
- Ne pas utiliser si la bague d'inviolabilité du flacon a été endommagée avant ouverture
- Bien refermer le flacon après utilisation
- Utiliser dans un délai de 30 jours après ouverture
- Ne pas utiliser le produit en cas d'hypersensibilité à l'un de ses composants
- Eviter tout contact entre le compte-gouttes et une surface quelconque
- Ne pas congeler, tenir éloigner des sources de chaleur et des rayons directs du soleil
- Tenir hors de portée des enfants
- Ne pas ingérer.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Suspendre l'utilisation du produit et contacter un spécialiste en cas d'altérations de la vision, rougeurs ou irritations oculaires persistantes.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION

EN CAS DE SÉCHERESSE OCULAIRE:

Instiller une ou deux gouttes dans l'œil lorsque le besoin se fait ressentir.

POUR LES PORTEURS DE LENTILLES DE CONTACT:

Mettre une goutte d'OcuYal Gel à l'intérieur de la lentille de contact avant application. Il est possible d'instiller le produit sur la lentille de contact également pendant l'utilisation, si l'application elle-même s'avère source de gêne (sensation de corps étranger dans l'œil).

EFFETS INDESIRABLES

Aucun connu.

Dispositif médical

 SCHALCON S.p.A.
Viale Enrico Ortolani, 195
00125 ROMA Italy


0477



01161G803 Rev0 10.11.20