

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR TIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

ditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

rmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

ologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

que :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

ducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

aire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

adie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 [LG] - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

Nº M21- 067942

Optique 102418 Autres

Maladie

Dentaire

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 2102 Société : R.A.M

Actif Pensionné(e) Autre :

Nom & Prénom : LAHOU KASSI Foued

Date de naissance : 15/07/1952

Adresse : 19 RUE LOH CEN 80 Arjouna 829,90 Dhs

Tél. : 06 55 04 21 86 Total des frais engagés :

Autorisation CNPD N° : A-A-215 / 2019

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 03/02/22

Nom et prénom du malade : LAHOU KASSI Foued Age : 61/2

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : Maladie Respiratoire

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASA Le : 1/1/2022

Signature de l'adhérent(e) :



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
03.02.22	Chirurgie		250	DR. GADDAW
				11/02/2022
				DR. GADDAW
				DR. GADDAW
				DR. GADDAW

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
DR. GADDAW	03.02.22	473,90

ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
DR. GADDAW	03.02.22	Radiographie	100 DH

AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	Coefficient des Travaux
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			Coefficient des Travaux
	H 25533412 00000000	D 00000000 35533411	G 21433552 00000000	MONTANTS DES SOINS
	B 00000000 11433553			DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION


VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr. GADDAR Wassil

PNEUMOLOGUE

Asthme - Allergies
Pathologie du Sommeil
Arrêt du Tabac
Spirométrie - Bronchoscopie
Tests Cutanés
Maladies professionnelles



الدكتور كثيل واصل
اختصاصي في أمراض الجهاز التنفسي

الحقيقة - الحساسية

أمراض النوم - الإقلاع عن التدخين

الفحص بالمنظار - فحص وظائف الرئة

اختبار الحساسية

الأمراض المهنية

Casablanca le : 03/02/22

✓ LATHOR KASSI FOVAD

67.90

1- Toulidex Sirup



GTIN 1890111724889
LOT IB10791
EXP 07/2023
S/N 93042026744918

PPV: 225 DH 00

25,- 165x 3/ij val +

2- Foralant 400

1 B - 0 - 1B

Ag.

3- Oed du 20

38.50 1gt / j val 1ml

4- Nutril sirup

30 -

مصدق منوف (الفوارجي سارقا) المطابق 5 الشقة 12 في المستشفيات - الدار البيضاء.

11, Rue Abou Hassan Askari (ex - Lavoisier) 5^{ème} Etage (avec ascenseur), appart. 12, quartier des hôpitaux Casablanca.

🕒 Urgence 06 77 20 20 24 ☎ 05 22 860 444 ✉ drgaddar@gmail.com Appt 12
Tel: 0522 860 444

ICE: 00202322000065

5- Animal ep

48,5G ACP x

4/j Vak

~~S.K. GADDI R Wasil
SQUINNISCOPE
11, RUE SOYOLIER, Apt 12
510 500 SQUINNISCOPE
Tel: 0536 860 444~~

479.90



Apixol®

Comprimés à sucer



• Calme l'irritation • Soulage la
Dispositif méd

LOT : 210/00
PER : 09/2024
PPC : 49,50 DH

Apixol®
Comprimés à sucer

COMPOSITION :

Extrait sec de Propolis. Extrait sec de fleurs de Sureau (Sambucus nigra). Huile essentielle de Eucalyptus (Eucalyptus globulus, maltodextrine). Extrait sec de feuilles de Sauge (Salvia officinalis, maltodextrine). Extrait sec de feuilles de Tilleul (Tilia platyphyllos ou Tilia cordata, maltodextrine) gamma-cyclodextrine. Extrait sec de résine de Myrrhe (Commiphora myrrha, gomme arabique). Extrait sec de gel d'Aloès (Aloe Barbadensis, maltodextrine) concentré 200 : 1. Extrait sec de fruits d'Acérola (Malpighia glabra, maltodextrine) titré à 25% en vitamine C naturelle. Isomalt E953. Arôme d'orange. Arôme de citron. Stéarate de magnésium E470B. Dioxyde de silicium E551. Edulcorant : sucralose E955. Contient un édulcorant. Sans gluten.

PROPRIÉTÉS :

Apixol® comprimés est un dispositif médical à base d'actifs naturels tels que la propolis, le tilleul, le myrrhe et l'aloès. Les composants de Apixol® comprimés forment un film protecteur à « effet barrière » et soulagent l'irritation de la gorge ce qui permet d'apaiser la toux sèche. Apixol® comprimés hydrate et fluidifie le mucus en cas de toux grasse et apporte ainsi un soulagement immédiat. Apixol® comprimés est formulé en comprimés à dissoudre lentement dans la bouche. Grâce à sa composition particulière à base d'ingrédients riches en polysaccharides, mucilage, résines et gommes, il est capable de créer un film adhésif muqueux aux multiples activités :

- Limite le contact avec des agents externes irritants en réduisant la stimulation des récepteurs de la toux ;
- Favorise l'hydratation du mucus et favorise son élimination ;

8 051128 6332820

Neutral®

- Hydroxyde d'aluminium + Hydroxyde de magnésium

FORMES PHARMACEUTIQUES ET PRESENTATIONS :

- Suspension buvable : flacon de 250 ml

- Comprimés à croquer ou

COMPOSITION :

Suspension buvable :

Hydroxyde d'aluminium g

Hydroxyde de magnésium

Excipient : mannitol, sorbitol

méthyle, parahydroxybenzoate

saccharine, silice colloïda

Comprimés :

Hydroxyde d'aluminium g

Hydroxyde de magnésium

Excipient : amidon de riz, stéarate de

talc, mannitol, quinuclate de sodium

CLASSE PHARMACOTHERAPIQUE :

Antiacide.

DANS QUELS CAS UTILISER :

- Hyperacidité gastrique

- Reflux oesophagien dans les cas de reflux

- Pyrosis

- Ulcères gastriques et duodénaux

- Troubles dyspeptiques

CONTRE-INDICATIONS :

- Hypersensibilité à l'un des composants

- Insuffisance rénale sévère

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE

Prendre un avis médical en cas de :

- Perte de poids

- Gêne abdominale persistante ou difficulté à avaler.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Prévenez votre médecin en cas de :

- Insuffisance rénale

- Dialyse chronique

- Prise d'antihistaminique H₂, furosémide, glucocorticoïdes, fluoroquinolones.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS :

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, ET NOTAMMENT Tétracycline, Chlorpromazine, Isoniazide, Fluoroquinolones, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

- L'utilisation de ce médicament ne doit être envisagée au cours de la grossesse que si nécessaire.

- Eviter les prises prolongées et à fortes doses de ce médicament

- L'allaitement peut être poursuivi lors de ce traitement.

PPV 38DH50

EXP 03/2024

LOT 13025 5

Neutral®

Hydroxyde d'aluminium - Hydroxyde de magnésium

Anti-Acid
Suspension buvable 250 ml

220 g
200 g
ate de
110V),

00 mg
00 mg
sium

OEDES® 20 mg

Microgranules gastrorésistants en gélule (Oméprazole)

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Elle contient des informations importantes sur votre traitement et votre maladie.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

1. Identification du médicament:

Forme pharmaceutique et présentation:

OEDES® 20 mg, Microgranules gastro-résistants en gélules, boîtes de 7, 14, 28 et 56

2. Composition du médicament :

Principe actives:

Oméprazole 20 mg

EXCIPIENTS : q.s.p une gélule.

Excipient à effet notable : Saccharose.

3. Classe pharmaco-thérapeutique :

OEDES® 20 mg contient la substance active Oméprazole. Il appartient à la classe des médicaments appelée inhibiteurs de la pompe à protons. Il diminue la quantité d'acide produite par votre estomac.

4. Indications thérapeutiques

OEDES® 20 mg est utilisé pour traiter les affections suivantes :

Chez les adultes :

• le reflux gastro-œsophagien (RGO). L'acide de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) entraînant douleur, inflammation et brûlures.

• les ulcères de la partie haute de votre intestin (ulcère duodénal) ou de votre estomac (ulcère gastrique).

• les ulcères infectés par une bactérie appelée Helicobacter pylori.

Dans ce cas, votre médecin peut également vous prescrire des antibiotiques qui permettent de traiter l'infection et de guérir l'ulcère.

• les ulcères de l'estomac associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). OEDES® 20 mg peut aussi être utilisé pour la prévention de ceux-ci si vous prenez des AINS.

• un excès d'acide dans l'estomac dû à une grosseur au niveau du pancréas (syndrome de Zollinger-Ellison)

Chez les enfants :

Enfants âgés de plus d'un an et avec un poids corporel ≥ 10 kg :

• le reflux gastro-œsophagien (RGO). L'acide de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) entraînant douleur, inflammation et brûlures.

• Les symptômes chez l'enfant peuvent comprendre des remontées dans la bouche du contenu de l'estomac (régurgitation), des vomissements et une prise de poids limitée.

Enfants âgés de plus de 4 ans et adolescents :

• les ulcères infectés par une bactérie appelée Helicobacter pylori.

gazeuse, un jus de fruit légèrement acide (jus d'orange, pomme ou ananas) ou dans de la compote de pomme.

• Toujours renuer juste avant de boire le mélange (le mélange ne sera pas homogène). Puis boire les 30 minutes.

• Pour s'assurer que vous avez le verre avec un demi-verre d'eau contiennent le médicament, ne

6. Contre-indications :

Ne prenez jamais OEDES® 20

- si vous êtes allergique à composants contenus dans OEDES® 20 mg
- si vous êtes allergique à un (par exemple pantoprazole esoméprazole).

• Si vous prenez un médicament pour traiter l'infection par le VIH

• Si vous êtes dans une des situations ci-dessous, ne prenez pas OEDES® 20 mg, gélule ou poudre. Si vous avez des doutes, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre OEDES® 20 mg.

7. Effets indésirables :

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Si vous remarquez un des effets indésirables suivants, ceux-ci étant rares mais sérieux, arrêtez de prendre OEDES® 20 mg et contactez immédiatement un médecin :

• Apparition soudaine d'une respiration sifflante, gonflement des lèvres, de la langue et de la gorge ou du corps, éruptions cutanées, perte de connaissance ou difficultés à avaler (réactions allergiques graves).

• Rougeurs de la peau avec des bulles ou une desquamation. Parfois, les bulles peuvent être importantes et s'accompagner d'un saignement au niveau des lèvres, des yeux, de la bouche, du nez et des parties génitales. Ceci peut correspondre à un syndrome de Stevens-Johnson ou à une nécrolyse épidermique toxique.

• Jaunisse, urines foncées et fatigue peuvent être des symptômes d'une maladie du foie.

Les autres effets indésirables sont :

Effets indésirables fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 10)

- Maux de tête.
- Effets sur l'estomac ou l'intestin : diarrhée, douleurs à l'estomac, constipation, flatulence.
- Nausées ou vomissements.
- Polypes bénins dans l'estomac.

Effets indésirables peu fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 100)

- Gonflement des pieds et des chevilles.
- Troubles du sommeil (insomnie).
- Étourdissements, fourmillements, somnolence.
- Vertiges.
- Modifications des résultats des tests sanguins contrôlant le fonctionnement de certains organes.

• Vous avez des selles noires (teintées de sang).

• Vous souffrez de diarrhée sévère ou persistante, car l'omeprazole a été associé à une faible augmentation de diarrhées infectieuses.

• Si vous avez des problèmes hépatiques sévères.

LOT 210585

EXP 12/2023

PPV 99.00 DH

Si vous avez une éruption sur la peau, en particulier dans les zones exposées au soleil, prévenez votre médecin dès que possible, car vous devrez peut-être arrêter votre traitement avec OEDES® 20 mg. N'oubliez pas de mentionner également tout autre effet indésirable tel que des douleurs dans vos articulations.

Enfants :

Certains enfants atteints d'une maladie chronique peuvent nécessiter un traitement à long terme bien que celui-ci ne soit pas recommandé. Ne donner pas ce médicament aux enfants de moins de 1 an ou < 10 kg.

Mentions relatives aux excipients à effet notable :

En raison de la présence de Saccharose, ce médicament est déconseillé chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase-isomaltase (maladies héréditaires rares).

9. Interactions avec d'autres médicaments:

Prise d'autres médicaments :

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou pharmacien. OEDES® 20 mg peut interagir sur le fonctionnement d'autres médicaments et certains médicaments peuvent avoir un effet sur OEDES® 20 mg.

Vous ne devez pas prendre OEDES® 20 mg si vous prenez un médicament contenant du neflifavir (utilisé pour traiter l'infection par le VIH).

Vous devez informer votre médecin ou pharmacien si vous prenez l'un des médicaments suivants :

- Kétoconazole, itraconazole, posaconazole ou voriconazole (utilisés dans le traitement des infections fongiques);
- Digoxine (utilisé dans le traitement de problèmes cardiaques);
- Diazépam (utilisé dans le traitement de l'anxiété, de l'épilepsie ou comme relaxant musculaire);
- Phénytoïne (utilisé dans le traitement de la convulsions, de la névralgie, une surveillance stricte).

TOUDEX® sirop

Forme et présentation :

Sirop. Flacon de 125 ml, Flacon de 200 ml.

Composition :

Cassis feuille, mauve bleu fleur (eau, glycérine, acide citrique), extrait fluide sorbate, sodium benzoate, gommes citrique monohydrate, aspartame, arômes.

Propriétés :

TOUDEX® est une association synergique de mauve et de cassis (i fluid*) bénéfiques pour les irritations de la gorge, les encombrements et inflammations des voies respiratoires.

La mauve possède une action pectorale, calmante, adoucissante et émolliente.

Le cassis (i fluid) possède une action anti-inflammatoire naturelle.

*I fluid est un procédé unique breveté grâce auquel l'ensemble des composants de la plante est précieusement préservé, pour être restitué dans son intégrité.

Conseils d'utilisation :

Agiter avant utilisation.

Nourrisson (à partir d'un an) : 1 cuillerée à café 2 fois/jour.

Enfant : 1 à 2 cuillerées à café 3 fois/jour.

Adulte : 1 cuillerée à soupe 3 fois/jour.

Durée d'utilisation :

Une fois le flacon entamé, il doit être utilisé dans le mois suivant son ouverture.

Fabriqué Phytéo Laboratoires

Distribué par Ramo-Pharm

Complément alimentaire n'est pas un médicament



Sans alcool

Dr. GADDAR Wassil

PNEUMOLOGUE

Asthme - Allergies
Pathologie du Sommeil
Arrêt du Tabac
Spirométrie - Bronchoscopie
Tests Cutanés
Maladies professionnelles



الدكتور گزار واصل
اختصاصي في أمراض الجهاز التنفسى

- الحقيقة - الحساسية
- أمراض النوم - الإقلاع عن التدخين
- الفحص بالمنظار - فحص وظائف الرئة
- اختبار الحساسية
- الأمراض المهنية

Casablanca le : ٢٣.٠٢.٢٢

Compte rendu

Fouad Rassi Lahla

Patient :

Examen : RADIOGRAPHIE THORACIQUE

Interprétation :

- Aspect de gros hile bilatéral
- Pas de foyer alvéolaire
- Pas de syndrome interstitiel
- Pas d'opacité pleurale
- Cadre osseux sans anomalie
- Silhouette cardiaque normale

Dr. GADDAR Wassil
Pneumologue
Appt 12
11, Rue Abou Hassan Askari (ex - Lavoisier) 5^{ème} Etage (avec ascenseur), appart. 12, quartier des hôpitaux - Casablanca.
Tél: 052 860 444

رقم 11، زققة أبو الحسن العaskري (الفاوازير سابقا) الطابق 5 (مصعد متوفّر)، الشقة 12 في المستشفيات - الدار البيضاء.

11, Rue Abou Hassan Askari (ex - Lavoisier) 5^{ème} Etage (avec ascenseur), appart. 12, quartier des hôpitaux - Casablanca.

Urgence 06 77 20 20 24 05 22 860 444 drgaddar@gmail.com

ICE: 002023220000065

Dr. GADDAR Wassil

PNEUMOLOGUE

Asthme - Allergies
Pathologie du Sommeil
Arrêt du Tabac
Spirométrie - Bronchoscopie
Tests Cutanés
Maladies professionnelles



الدكتور گزار واصل
اختصاصي في امراض الجهاز التنفسى

- الضيق - الحساسية
- أمراض النوم - الإقلاع عن التدخين
- الفحص بالمنظار - فحص وظائف الرئة
- اختبار الحساسية
- الأمراض المهنية

Casablanca le : 03 - 02 - 22

Lahcen Rassi Fouad

Patient :

Examen : radiothorax

Payé : 100 DH

Dr. GADDAR Wassil
11, Rue Abou Hassan Askari (ex - Lavoisier) 5^{ème} Etage (avec ascenseur), appart. 12, quartier des hôpitaux - Casablanca.
Tél: 05 22 860 444 - 06 77 20 20 24 - E-mail: drgaddar@gmail.com

رقم 11، زقة أبو الحسن العسكري (الفاوازير سابقا) الطابق 5 (مصد متوفر) الشقة 12 في المستشفيات - الدار البيضاء.

11, Rue Abou Hassan Askari (ex - Lavoisier) 5^{ème} Etage (avec ascenseur), appart. 12, quartier des hôpitaux - Casablanca.

Urgence 06 77 20 20 24 05 22 860 444 drgaddar@gmail.com

ICE: 00202322000065