

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR OBTENIR LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

tions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

rmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

tique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

entaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- 0 Réclamation : contact@mupras.com
- 0 Prise en charge : pec@mupras.com
- 0 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule: 4780

Société :

102573

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : KRODARI FATHUA

Date de naissance :


Adresse :

Tél. 06.45.71.19.05 Total des frais engagés :

Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation :

Nom et prénom du malade :

Age :

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

H.T.A

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Signature de l'adhérent(e) :

Le :



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
ARMERIA IBRAHIM Mehdi BELAYACHI 355, Av. Reda Guedira, Cité Djamaa Casablanca - Tel: 0522 37 07 06		1276,90

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important:

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan d'explorations.

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
00000000	00000000
35533411	11433553

[Création, remont, adjonction]

VISÉ ET SACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE REVISE

VISÉ ET SACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXÉCUTION

Dr. Mohamed Ali BENNANI

Cardiologue

Spécialiste des maladies
du cœur, des vaisseaux
et de l'hypertension artérielle
Echocardiographie doppler - Holter
tensionnel - Holter rythmique
Epreuve d'effort
Traitement des varices
Sur Rendez-vous



مركز فحوصات القلب والشرايين
CENTRE D'EXPLORATIONS
CARDIOVASCULAIRES

الدكتور محمد علي بناني

اختصاصي في أمراض القلب والشرايين



وارتفاع الضغط الدموي

التشخيص بالأمواج فوق الصوتية والدوببلر

تسجيل ممثمر لضغط الدم لمدة 24 ساعة

تسجيل ممثمر لخطيط القلب لمدة 24 ساعة

تخطيط القلب عند المجهود

علاج الدوالي (العروق المتفخة بالساقي)

بالموعود

تسجيل ممثمر لضغط الدم لمدة 24 ساعة

تخطيط القلب لمدة 24 ساعة

علاج الدوالي (العروق المتفخة بالساقي)

LOT 211753

EXP 06 2024

PPV 175.20 DH

الدار البيضاء، في :

04/11/2021

Casablanca, le :

Nom :

M. KHOUDARI FATNA

Régime peu salé

1200 x 2 DETENSIEL 10 mg, Comprimé pelliculé : 1/2 comprimé le matin pendant 3 mois

1520 x 3 INEXIUM 40 mg Comprimé GR 4 : 1 comprimé le matin pendant 3 mois

1520 x 3 IPERTEN 20 mg : 1 comprimé le matin pendant 3 mois

2700 CARDIOASPIRINE 100mg , Comprimé : 1 comprimé à midi pendant 3 mois

1250 x 3 VARTEX 160 mg : 1 comprimé le matin pendant 3 mois

LOT 212412

EXP 09 2024

PPV 175.20 DH

Docteur Mohamed Ali BENNANI

LOT 212412

EXP 09 2024

PPV 175.20 DH

PHARMACIE IBN ROUCHD
Mehdi BELAYACHI
355, Av. Rieda Guedira, Cité Djamaa
Casablanca - Tél: 0522 37 07 06

Dr. Mohamed Ali BENNANI
Spécialiste des Maladies du Coeur et des
Vaisseaux et de l'hypertension artérielle
1, Rue 4, Ahd El Jadid, 27 Rieda Guedira
1er Etage - Tél: 0522 37 09 00 - Casablanca

Traitement à ne pas arrêter jusqu'au prochain rendez-vous le : عدم توقيف الوصفة حتى الموعد المقرب منه :
Jeudi 03 Février 2022

1، زقة 4 العهد الجديد وشارع رضي اكديرة (النيل سابقا) - الطابق الأول (قرب حمام الفن) - ابن امسيك - الدار البيضاء
1, Rue 4 Ahd El Jadid et Bd. Reda Guedira (Ex. Ni) - 1 Etage - (à Côté de Hammam El Fane) - Ben M'sik - Casablanca
E-mail : bennanimedali@yahoo.fr - البريد الإلكتروني : Tél./Fax : 05 22 59 59 00

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez en à votre médecin ou à votre pharmacien.



CARDIOASPIRINE® -

100 mg, comprimés gastro-résistants

Cardioaspirine 100 mg/30cps

Acide acétylsalicylique

P.P.V. : 27,70 DH

Bayer S.A.



Dans cette n° 6 118001 090280

1. Qu'est ce que CardioAspirine 100 mg et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations nécessaires à connaître avant de prendre CardioAspirine 100 mg ?
3. Comment prendre CardioAspirine 100 mg ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CardioAspirine 100 mg ?
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST CE QUE CARDIOASPIRINE 100 MG ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

CardioAspirine contient comme principe actif l'acide acétylsalicylique. Ce dernier inhibe, à doses réduites, l'agrégation des plaquettes sanguines. Grâce à un enrobage résistant à l'acidité gastrique,

Iperten® 20 mg, comprimé

Chlorhydrate de manidipine

P.P.V. 152DH00

Distribué par PROMOPHARM S.A.

20 mg

; hydroxypropylcellulose faiblement substituée (L-HPC); hydroxypropylmagnésium; riboflavine (E 101).

LISTE DES EXCIPIENTS À EFFET NOTOIRE

Informations importantes concernant certains composants d'IPERTEN 20 mg, comprimé
Liste des excipients à effet notoire: lactose monohydraté

FORME PHARMACEUTIQUE ET CONTENU

Ce médicament se présente sous forme de comprimé.

Boîte de 28 comprimés.

CLASSE PHARMACOTHÉRAPEUTIQUE

IPERTEN contient une substance active appelée chlorhydrate de manidipine appartenant à la classe des inhibiteurs calciques qui bloquent l'entrée du calcium au niveau des cellules musculaires lisses des vaisseaux sanguins, provoquant une vasodilatation et ainsi une réduction de la pression sanguine.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

IPERTEN 20 mg, comprimé est destiné à traiter l'hypertension artérielle légère à modérée de l'adulte.

LISTE DES INFORMATIONS NÉCESSAIRES AVANT LA PRISE DU MÉDICAMENT

Si vous souffrez d'intolérance à certains types de sucres, contactez votre médecin avant de prendre IPERTEN.

CONTRE-INDICATIONS

Ne prenez jamais IPERTEN 20 mg, comprimé dans les cas suivants:

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la manidipine ou à tout autre produit de la famille des dihydropyridines ou à l'un des excipients du produit;
- Si vous souffrez de problèmes cardiaques, par exemple si vous avez eu un infarctus du myocarde il y a moins de 4 semaines ou si vous souffrez d'angine de poitrine (angor) instable (douleur à la poitrine due à un manque d'oxygénation du cœur), ou d'insuffisance cardiaque non traitée;
- Si vous souffrez de problèmes hépatiques modérés à sévères;
- Si vous souffrez de problèmes rénaux sévères;

IPERTEN ne doit pas être administré chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ; MISES EN GARDE SPÉCIALES

Faites attention avec IPERTEN 20 mg, comprimé:

- Si vous souffrez de certains problèmes cardiaques (tels qu'une dysfonction ventriculaire gauche, un obstacle

Iperten® 20 mg, comprimé

Chlorhydrate de manidipine

P.P.V. 152DH00

Distribué par PROMOPHARM S.A.

20 mg

; hydroxypropylcellulose faiblement substituée (L-HPC); hydroxypropylmagnésium; riboflavine (E 101).

LISTE DES EXCIPIENTS À EFFET NOTOIRE

Informations importantes concernant certains composants d'IPERTEN 20 mg, comprimé
Liste des excipients à effet notoire: lactose monohydraté

FORME PHARMACEUTIQUE ET CONTENU

Ce médicament se présente sous forme de comprimé.

Boîte de 28 comprimés.

CLASSE PHARMACOTHÉRAPEUTIQUE

IPERTEN contient une substance active appelée chlorhydrate de manidipine appartenant à la classe des inhibiteurs calciques qui bloquent l'entrée du calcium au niveau des cellules musculaires lisses des vaisseaux sanguins, provoquant une vasodilatation et ainsi une réduction de la pression sanguine.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

IPERTEN 20 mg, comprimé est destiné à traiter l'hypertension artérielle légère à modérée de l'adulte.

LISTE DES INFORMATIONS NÉCESSAIRES AVANT LA PRISE DU MÉDICAMENT

Si vous souffrez d'intolérance à certains types de sucres, contactez votre médecin avant de prendre IPERTEN.

CONTRE-INDICATIONS

Ne prenez jamais IPERTEN 20 mg, comprimé dans les cas suivants:

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la manidipine ou à tout autre produit de la famille des dihydropyridines ou à l'un des excipients du produit;
- Si vous souffrez de problèmes cardiaques, par exemple si vous avez eu un infarctus du myocarde il y a moins de 4 semaines ou si vous souffrez d'angine de poitrine (angor) instable (douleur à la poitrine due à un manque d'oxygénation du cœur), ou d'insuffisance cardiaque non traitée;
- Si vous souffrez de problèmes hépatiques modérés à sévères;
- Si vous souffrez de problèmes rénaux sévères;

IPERTEN ne doit pas être administré chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ; MISES EN GARDE SPÉCIALES

Faites attention avec IPERTEN 20 mg, comprimé:

- Si vous souffrez de certains problèmes cardiaques (tels qu'une dysfonction ventriculaire gauche, un obstacle

Iperten® 20 mg, comprimé

Chlorhydrate de manidipine

P.P.V. 152DH00

Distribué par PROMOPHARM S.A.

20 mg

; hydroxypropylcellulose faiblement substituée (L-HPC); hydroxypropylmagnésium; riboflavine (E 101).

LISTE DES EXCIPIENTS À EFFET NOTOIRE

Informations importantes concernant certains composants d'IPERTEN 20 mg, comprimé
Liste des excipients à effet notoire: lactose monohydraté

FORME PHARMACEUTIQUE ET CONTENU

Ce médicament se présente sous forme de comprimé.

Boîte de 28 comprimés.

CLASSE PHARMACOTHÉRAPEUTIQUE

IPERTEN contient une substance active appelée chlorhydrate de manidipine appartenant à la classe des inhibiteurs calciques qui bloquent l'entrée du calcium au niveau des cellules musculaires lisses des vaisseaux sanguins, provoquant une vasodilatation et ainsi une réduction de la pression sanguine.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

IPERTEN 20 mg, comprimé est destiné à traiter l'hypertension artérielle légère à modérée de l'adulte.

LISTE DES INFORMATIONS NÉCESSAIRES AVANT LA PRISE DU MÉDICAMENT

Si vous souffrez d'intolérance à certains types de sucres, contactez votre médecin avant de prendre IPERTEN.

CONTRE-INDICATIONS

Ne prenez jamais IPERTEN 20 mg, comprimé dans les cas suivants:

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la manidipine ou à tout autre produit de la famille des dihydropyridines ou à l'un des excipients du produit;
- Si vous souffrez de problèmes cardiaques, par exemple si vous avez eu un infarctus du myocarde il y a moins de 4 semaines ou si vous souffrez d'angine de poitrine (angor) instable (douleur à la poitrine due à un manque d'oxygénation du cœur), ou d'insuffisance cardiaque non traitée;
- Si vous souffrez de problèmes hépatiques modérés à sévères;
- Si vous souffrez de problèmes rénaux sévères;

IPERTEN ne doit pas être administré chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ; MISES EN GARDE SPÉCIALES

Faites attention avec IPERTEN 20 mg, comprimé:

- Si vous souffrez de certains problèmes cardiaques (tels qu'une dysfonction ventriculaire gauche, un obstacle

إينكسيوم® 40 ملغ، قرص صامد لحموضة المعدة

SYNTHEMEDIC
22 rue Zouhour brou à laouam roches
noires casablanca
INEXIUM

40 mg Cpr GR
Boite 14
84115DMP/21NRQ P.P.V:123,60 DH
6 118Q01 020607

ازومبرازول

يرجى قراءة كل النشرة بعناية قبل استعمال هذا الدواء.

- احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج إلى قرائتها من جديد.
- إذا كانت لديك أستنة أخرى أو شكوك، استشر الطبيب أو الصيدلاني.
- وصف هذا الدواء لك شخصياً، لا تصفه لشخص آخر حتى إذا ظهر ذلك أن ينفع به.
- إذا تفاقم أي أثر جانبي أو إذا لاحظت ظهور أي أثر جانبي غير مذكور في الطبيب أو الصيدلي.

في هذه النشرة:

- ما هو إينكسيوم 40 ملغ، قرص صامد لحموضة المعدة، وما هي دواعي استعماله؟
- ما هي المعلومات التي يجب معرفتها قبل استعمال إينكسيوم 40 ملغ، قرص صامد لحموضة المعدة؟
- كيف تستعمل إينكسيوم 40 ملغ، قرص صامد لحموضة المعدة؟
- ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟
- كيف يحفظ إينكسيوم 40 ملغ، قرص صامد لحموضة المعدة؟
- معلومات إضافية

1. ما هو إينكسيوم 40 ملغ، قرص صامد لحموضة المعدة، وما هي دواعي استعماله؟

يحتوي إينكسيوم على مادة تسمى ازومبرازول. هو دواء من فصيلة مثبطات مضخة البروتون. يقلل من إفراز الحمض في المعدة.

يسْتَعْمَلُ إِنْكَسِيُومُ 40 ملْغ، قِرْصٌ صَامِدٌ لِحَمْوَضَةِ الْمَعْدَةِ فِي عَلاَجِ الْأَمْرَاضِ التَّالِيَّةِ:

- الارتداد المعددي المريئي لما يعود حمض المعدة في المريء، و يتسبب في ألم، التهاب وحرقان.
- وجود حمض زائد في المعدة بسبب متلازمة زولينجر إيلسون.
- مواصلة العلاج بعد تلقي إينكسيوم عن طريق الوريد للوقاية من نكاس نزيفي بسبب قرحة هضمية.

2. ما هي المعلومات التي يجب معرفتها قبل استعمال إينكسيوم 40 ملغ، قرص صامد لحموضة المعدة؟

لا تتناول أبداً إينكسيوم 40 ملغ، قرص صامد لحموضة المعدة في الحالات التالية:

- إذا كنت تعاني من حساسية (فرط المحساسية) لازومبرازول أو أي من المكونات الأخرى من إينكسيوم 40 ملغ، قرص صامد لحموضة المعدة.
- إذا كنت تعاني من حساسية لأي كانت آخر ضد مضخة البروتون (مثل بانتوبرازول، لانسبرازول، الراببرازول، أو مبرازول)
- إذا كنت تتناول دواء يحتوي تلفيتافير و اتازنفير (التي تستخدم لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية).

إذا كانت لديك أي شكوك، إذا كانت أحد الحالات المذكورة أعلاه تنطبق عليك، تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي قبل تناول إينكسيوم 40 ملغ، قرص صامد لحموضة المعدة.

يرجى توخي الحذر لدى استعمال إينكسيوم 40 ملغ، قرص صامد لحموضة المعدة:

- إذا كان لديك مشاكل حادة في الكبد.
- إذا كان لديك مشاكل حادة في الكلى.

تحذث إلى طبيبك أو الصيدلي قبل بدء تناول إينكسيوم 40 ملغ، قرص صامد لحموضة المعدة. قد يخفى إينكسيوم 40 ملغ، قرص صامد لحموضة المعدة أعراض لأمراض أخرى. إذا كنت تتناول إينكسيوم 40 ملغ، قرص

صامد لحموضة المعدة، يجب عليك إعلام الطبيب على الفور إذا:

DÉTENSIEL 10 mg
30 comprimés pelliculés sécables



6 118001 101788

PPV : 72,00 DH

Distribué par Cooper Pharma

7862160236

DE L'UTILISATEUR

DÉTENSIEL® 10 mg, comprimé pelliculé sécable

Bisoprolol fumarate

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que Détensiel 10 mg, comprimé pelliculé sécable et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Détensiel 10 mg, comprimé pelliculé sécable ?
3. Comment prendre Détensiel 10 mg, comprimé pelliculé sécable ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Détensiel 10 mg, comprimé pelliculé sécable ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE DETENSIEL 10 mg, comprimé pelliculé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

DÉTENSIEL 10 mg
30 comprimés pelliculés sécables



6 118001 101788

PPV : 72,00 DH

Distribué par Cooper Pharma

DE L'UTILISATEUR

7862160236

DÉTENSIEL® 10 mg, comprimé pelliculé sécable

Bisoprolol fumarate

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que Détensiel 10 mg, comprimé pelliculé sécable et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Détensiel 10 mg, comprimé pelliculé sécable ?
3. Comment prendre Détensiel 10 mg, comprimé pelliculé sécable ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Détensiel 10 mg, comprimé pelliculé sécable ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE DETENSIEL 10 mg, comprimé pelliculé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?