

## RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

### Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

### Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

### Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

### Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

### Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

### Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

### Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

### Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

## Déclaration de Maladie

N° W19-572515



Mutuelle de Prévoyance  
& d'Actions Sociales  
de Royal Air Maroc

### Maladie

### Dentaire

### Optique

### Autres

0258

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule :

Actif

Pensionné(e)

Nom & Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

Tél. :

0693581411  
0522 363584

Société :


ROYAL AIR MAROC

Autre :

MERNISSI DRISS.

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation :

Nom et prénom du malade :

Lien de parenté :

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Signature de l'adhérent(e) :

Le : 09/12/2021

### VOLET ADHÉRENT

Déclaration de maladie

N° W19-572515

Remplissez ce volet, découpez le et conservez le.  
Il sera nécessaire de le présenter pour toute réclamation ultérieure.

Coupon à conserver par l'adhérent(e).

Matricule : 0258

Nom de l'adhérent(e) : DRISS M

Total des frais engagés : 5566,10 dh

Date de dépôt :

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
29/12/2011	Consultation ECG	1	400,00 Dhs	INP : Dr. BENNAI, Cardiologue, Rythmologue, Clinique Mers Soltan, Bd. Omar Elidrissi Casablanca, Tél: 0522 27 72 72

## EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien qui du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Melle LAMBOURG, C.I.Y Docteur en Pharmacie, C.I.Y 1 Rue Ain Assel, Casablanca - Tel: 03 22 35 24 55	09/12/21	4204.16
PHARMACIE LA SOURCE TEL MOUNA MINI MOUNA Pharmacie C.I.Y	24/12/21	765,00

## **ANALYSES - RADIOGRAPHIES**

Cache et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
	10.12.21	B170	197,80

## AUXILIAIRES MEDICAUX

## VOLET ADHERENT

\* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP : <input type="text"/>						
				Coefficient des travaux <input type="text"/>						
				Montants des soins <input type="text"/>						
				Début d'exécution <input type="text"/>						
				Fin d'exécution <input type="text"/>						
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE									
	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">H</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: center;">G</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">B</td> <td></td> </tr> </table>			H		D	G	B		Coefficient des travaux <input type="text"/>
H										
D	G									
B										
	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">H</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: center;">G</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">B</td> <td></td> </tr> </table>			H		D	G	B		Montants des soins <input type="text"/>
H										
D	G									
B										
	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">H</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: center;">G</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">B</td> <td></td> </tr> </table>			H		D	G	B		Date du devis <input type="text"/>
H										
D	G									
B										
	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">H</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: center;">G</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">B</td> <td></td> </tr> </table>			H		D	G	B		Date de l'exécution <input type="text"/>
H										
D	G									
B										
	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">H</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: center;">G</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">B</td> <td></td> </tr> </table>			H		D	G	B		
H										
D	G									
B										

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION



9/12/2021 Or el Chemin Driss

$$302.0 + 226.8 = 34.6 \times 8$$

1/ Lecitin 400mg AS

2 - 2 - 0.

230.8 57.2 x 4  
2 1 Aldactone 50mg AS

PHARMACIE LA SOURCE  
Melle EL MOUMNI MOUNA  
Docteur en Pharmacie  
7, Rue Ain Asserdoune, C.I.L  
Casablanca - Tél: 05 22 36 24 85

3/ Kalif

180g

4/ Arkandil 1600mg  
1p/5

69.0 57 Glucovor AS  
1-72-2 475 mg x 5

2375.0 6/ Coralan 75 AS

URGENCES 24H/24H

64، شارع عمر الادريسي (قرب حديقة مرسوخ) - الدار البيضاء - الفاكس 42 05 22 26 79 42

64, Bd Omar El Idrissi ( en face du jardin Murdoch ) - Casablanca - Fax : 05 22 26 79 42

هاتف : 05 22 27 72 72 (L.G) - 05 22 46 72 00/01/02/03 - 05 22 46 72 09 - 05 22 46 72 05

E-mail : cliniquemersultan@gmail.com / www.cliniquemersultan.com / ICE : 001728360000010

Dr. BENNANI Mohamed  
Cardiologue Interventionnel  
Rhumatologue  
Clinique Mers Sultan  
Bd. Omar El Idrissi Casablanca  
Tél: 0522 77 72 72

4 Parcelfour 82 kg AS  
202.50 Up to 40.5 kg

8 No Dose 50 mg  
PHARMACIE LA SOURCE  
Melle EL MOUINI MOUNA  
Docteur en Pharmacie  
7, Rue Ain Asserdoune, C.I.L  
Casablanca - Tel: 05 22 36 24 85

248. 9/ Trajetra 50 mg AS  
374. 30 x 2

4204. 10/ 18/5  
w/ on call plus AS

265.00  
PHARMACIE LA SOURCE  
Melle EL MOUINI MOUNA  
Docteur en Pharmacie  
7, Rue Ain Asserdoune, C.I.L  
Casablanca - Tel: 05 22 36 24 85

255. 30 x 3  
Dr. BENNANI Mohamed  
Cardiologue Interventionnel  
Rythmologue  
Chidie Mers Sultan  
64 Bd. Omal El Idrissi Casablanca  
Tél: 0522 27 7272

Up de 03 up

# Trajenta®

## 5 mg comprimés pelliculés

Linagliptine

Veuillez lire attentivement cette notice d'informations importantes pour votre santé.

- Gardez cette notice. Vous pourrez la lire à tout moment.
- Si vous avez d'autres questions, il vous suffit de contacter votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin. Il pourrait leur être nocif, même si les deux médicaments sont identiques.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable. Ceci s'applique à votre infirmier/ère. Ceci s'applique à votre infirmier/ère.



Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que Trajenta et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Trajenta
3. Comment prendre Trajenta
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Trajenta
6. Contenu de l'emballage et autres informations

### Qu'est-ce que Trajenta et dans quel cas est-il utilisé

Trajenta contient une substance active appelée linagliptine, qui appartient à une classe de médicaments dénommés « antidiabétiques oraux ». Ces antidiabétiques oraux sont utilisés pour traiter les taux élevés de sucre dans le sang. Ils agissent en aidant votre organisme à réduire le taux de sucre dans votre sang.

Trajenta est utilisé chez les patients adultes atteints de diabète de type 2, si la maladie ne peut pas être correctement contrôlée avec un médicament antidiabétique oral (metformine sulfamide hypoglycémiant) ou un régime alimentaire et la pratique d'un exercice physique régulier.

Si vous ressentez des symptômes d'urgence aigüe, comme une douleur abdominale persistante et importante, il est recommandé de consulter votre médecin.

Si votre peau présente des symptômes d'urgence, comme une éruption cutanée bulleuse. Votre médecin peut vous recommander d'arrêter de prendre Trajenta.

Si vous ressentez des symptômes d'urgence aigüe, comme une douleur abdominale persistante et importante, il est recommandé de consulter votre médecin.

Si votre peau présente des symptômes d'urgence, comme une éruption cutanée bulleuse. Votre médecin peut vous recommander d'arrêter de prendre Trajenta.

Les lésions cutanées diabétiques sont des complications fréquentes du diabète. Il est recommandé de suivre les recommandations de votre médecin ou de votre infirmier/ère pour les soins de la peau et des pieds.

**Enfants et les adolescents**  
Trajenta n'est pas recommandé pour les adolescents âgés de moins de 18 ans.

### Sujets âgés

L'expérience chez les patients âgés de 65 ans et plus est limitée.

**Autres médicaments et Trajenta**  
Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou allez prendre d'autres médicaments.

# Tardyferon® 80 mg

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours scrupuleusement les votre médecin ou votre:

- Gardez cette notice
- Adressez-vous à votre médecin ou votre infirmier qui ne rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre infirmier si vous ne ressentez aucun amélioration.

319334



6 118001 103041

## Tardyferon® 80 mg 30 comprimés pelliculés

Distribué par COOPER PHARMA  
41, Rue Mohamed Diouri - Casablanca  
Pharmacien Responsable : Amina DAOUDI

Si vous prenez moins bien



6 118001 103041

## Tardyferon® 80 mg 30 comprimés pelliculés

Distribué par COOPER PHARMA  
41, Rue Mohamed Diouri - Casablanca  
Pharmacien Responsable : Amina DAOUDI

Si vous prenez moins bien

319334

### Que contient cette notice?

1. Qu'est-ce que TARDYFERON 80 mg et à quelles cas est-il utilisé?
2. Quelles sont les informations sur TARDYFERON 80 mg?
3. Comment prendre TARDYFERON 80 mg?
4. Quels sont les effets secondaires de TARDYFERON 80 mg?
5. Comment conserver TARDYFERON 80 mg?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

### 1. QU'EST-CE QUE TARDYFERON 80 mg pelliculé ET DANS QUelles PRÉPARATIONS ANTI

Ce médicament est utilisé pour traiter une carence en fer pendant la grossesse lorsqu'il y a une carence en fer.

### 2. QUELLES SONT AVANT DE PRENDRE TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?

#### Ne prenez jamais TARDYFERON 80 mg si vous êtes allergique

- à certains des ingrédients qui composent ce médicament (voir la rubrique 6).
- si vous avez une anémie dans le sang) non liée à la grossesse.

319334



6 118001 103041

## Tardyferon® 80 mg 30 comprimés pelliculés

Distribué par COOPER PHARMA  
41, Rue Mohamed Diouri - Casablanca  
Pharmacien Responsable : Amina DAOUDI

Si vous prenez moins bien

319334

#### Avertissements et précautions

Adresssez-vous à votre médecin ou pharmacien si vous prenez TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé.

Si vous prenez TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé pour un manque de fer, il faudra également rechercher la cause de ce manque afin de la traiter.

Si votre manque de fer est associé à une maladie inflammatoire, le traitement par TARDYFERON 80 mg ne sera pas efficace.

En raison du risque d'ulcérations buccales et d'altération de la couleur dentaire, les comprimés ne doivent pas être sucrés, mâchés ou gardés dans la bouche mais avalés entiers avec de l'eau.

Si vous ne pouvez pas suivre cette instruction ou si vous rencontrez des difficultés de déglutition, veuillez contacter votre médecin.

D'après des données publiées dans la littérature, il a été observé des colorations de la paroi du tube gastro-intestinal chez des patients

âgés souffrant d'une insuffisance rénale, de diabète et/ou d'augmentation de la tension qui recevaient des médicaments contre ces maladies et une supplémentation en fer pour traiter leur

### Précautions d'emploi

La consommation importante de thé inhibe l'absorption du fer. Il est conseillé de ne pas prendre ce médicament en même temps qu'une tasse de thé.

**Autres médicaments et TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé**  
Si vous utilisez déjà les médicaments suivants, vous devrez utiliser TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé sans néanmoins le décliner. En effet, certains médicaments peuvent être utilisés en même temps, alors que d'autres nécessitent des changements spécifiques (de dose, de manière par exemple).

- Si vous prenez des médicaments injectables contenant du fer.
  - Si vous prenez des médicaments contenant de l'acétylhydroxyamique.
  - Si vous prenez certains antibiotiques (les cyclines, les fluoroquinolones).
  - Si vous prenez des médicaments pour traiter une fragilité osseuse (les bisphosphonates, le strontium).
  - Si vous prenez un médicament pour traiter une maladie articulaire (la penicillamine).
  - Si vous prenez un médicament pour traiter une maladie de la thyroïde (la thyroxine).
  - Si vous prenez des médicaments pour traiter la maladie de l'entacapone, la méthyldopa, la levodopa, la carbidopa).
  - Si vous prenez du zinc ou du calcium.
  - Si vous prenez un médicament pour traiter une acidité de votre estomac : topiques gastro-intestinaux, charbon actif, antiacides (sels d'aluminium, de calcium et de magnésium).
  - Si vous prenez un médicament pour traiter l'hypercholestérolémie (cholestyramine).
- Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez également pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

### TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé avec des aliments ou des boissons

La consommation concomitante de laitage, de thé, de café, de jus de fruits, de légumineuses, d'oeufs ou de céréales empêche l'absorption du fer par l'organisme.

### Précautions d'emploi pendant la grossesse, allaitement

Il est recommandé de prendre ce médicament dans les conditions normales d'utilisation, pendant la grossesse.

Il est recommandé de prendre ce médicament pendant la grossesse, si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez à une grossesse ou que vous planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

### Conduite de véhicules et utilisation de machines

Aucune donnée disponible sur les effets de la capacité à conduire et utiliser des machines.

### 3. COMMENT PRENDRE TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

### Posologie

Ce médicament est réservé aux enfants de plus de 6 ans et aux adultes.

# Tardyferon® 80 mg

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous. Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice.
- Adressez-vous à votre pharmacien.
- Si vous ressez, consultez votre médecin, ou une personne indésirable (rubrique 4).
- Veuillez déposer cette notice dans une boîte à pharmacie.



6 118001 103041



PPV / 40.50 DH

## Tardyferon® 80mg

30 comprimés pelliculés

Distribué par COOPER PHARMA  
41, Rue Mohamed Diouri - Casablanca  
Pharmacien Responsable : Amina DAOUDI

### Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

## 1. QU'EST-CE QUE TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

### PRÉPARATIONS ANTIANÉMIQUES

Ce médicament est un apport en fer. Il est recommandé dans l'anémie par carence en fer et pour prévenir cette carence pendant la grossesse lorsqu'un apport alimentaire en fer est insuffisant.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?

### Ne prenez jamais TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé :

- si vous êtes allergique (hypersensible) au fer ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- si vous avez une anémie (quantité insuffisante de globules rouges dans le sang) non liée à une carence en fer.

### Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé.

Si vous prenez TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé pour un manque de fer, il faudra également rechercher la cause de ce manque afin de la traiter.

Si votre manque de fer est associé à une maladie inflammatoire, le traitement par TARDYFERON 80 mg ne sera pas efficace.

En raison du risque d'ulcérations buccales et d'altération de la couleur dentaire, les comprimés ne doivent pas être sués, mâchés ou gardés dans la bouche mais avalés entiers avec de l'eau.

Si vous ne pouvez pas suivre cette instruction ou si vous rencontrez des difficultés de déglutition, veuillez contacter votre médecin.

D'après des données publiées dans la littérature, il a été observé des colorations de la paroi du tube gastro-intestinal chez des patients

âgés souffrant d'une insuffisance rénale, de diabète et/ou d'une augmentation de la tension qui recevaient des médicaments pour ces maladies et une supplémentation en fer pour traiter leur anémie.

### Précautions d'emploi

La consommation importante de thé inhibe l'absorption du fer. Il est conseillé de ne pas prendre ce médicament en même temps qu'une tasse de thé.

### Autres médicaments et TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé

Si vous utilisez déjà les médicaments suivants, vous ne devez pas utiliser TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé sauf si votre médecin le décide. En effet, certains médicaments ne peuvent pas être utilisés en même temps, alors que d'autres médicaments requièrent des changements spécifiques (de dose, de mode d'administration par exemple).

- Si vous prenez des médicaments injectables contenant du fer.
- Si vous prenez des médicaments contenant de l'acétoxydronamique.
- Si vous prenez certains antibiotiques (les cyclines ou les fluoroquinolones).
- Si vous prenez des médicaments pour traiter une fragilité osseuse (les bisphosphonates, le strontium).
- Si vous prenez un médicament pour traiter une maladie des articulations (la penicillamine).
- Si vous prenez un médicament pour traiter une maladie de la thyroïde (la thyroxine).
- Si vous prenez des médicaments pour traiter la maladie de Parkinson (l'entacapone, la méthyldopa, la levodopa, la carbidopa).
- Si vous prenez du zinc ou du calcium.
- Si vous prenez un médicament pour traiter une acidité excessive de votre estomac : topiques gastro-intestinaux, charbons actiniques (sels d'aluminium, de calcium et de magnésium).
- Si vous prenez un médicament pour traiter l'hypercholestérolémie (cholestyramine).

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, ou avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

### TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé avec des aliments ou des boissons

La consommation concomitante de laitage, de thé, de café, de vin rouge, de légumineuses, d'œufs ou de céréales empêche l'absorption du fer par l'organisme.

### Grossesse, allaitement

Ce médicament, dans les conditions normales d'utilisation, peut être pris pendant la grossesse.

L'utilisation de ce médicament est possible chez la femme qui allait. Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez à l'avenir d'une grossesse ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

### Conduite de véhicules et utilisation de machines

Aucune donnée disponible sur les effets de la capacité à conduire et utiliser des machines.

## 3. COMMENT PRENDRE TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

### Posologie

Ce médicament est réservé aux enfants de plus de 6 ans et aux adultes.



# GLURENOR comprimés 30 mg

## Gliquidone

### CATEGORIE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

Sulfamide Hypoglycémiant. Antidiabétique Oral

### INDICATIONS THERAPEUTIQUES

Traitement du diabète sucré (type II) lorsque l'alimentation et l'exercice physique ne suffisent pas à eux seuls pour un contrôle adéquat de la glycémie.

### CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité au principe actif, aux sulfonylurées et aux excipients.

Les sulfonylurées sont contre-indiquées dans le diabète de type I (insulino-dépendant), acido-cétosique,, le coma et le pré-coma diabétique, les états prédiabétiques, la grossesse et l'allaitement, en cas de fonction rénale ou hépatique gravement compromise ou en cas d'insuffisance surrénalienne.

### PRECAUTIONS D'USAGE

L'usage des hypoglycémiants oraux du groupe des sulfonylurées doit être limité aux patients adultes atteints de diabète sucré de type II symptomatique et non cétogénique, qui ne peut être contrôlé par un régime et à qui l'administration d'insuline n'est pas indiquée.

En cas de manifestations hypoglycémiques (voir effets indésirables) administrer des hydrates de carbone; dans les cas les plus graves, qui rarement peuvent déboucher sur la perte de conscience, il faut effectuer une perfusion lente i.v. de solution glucosée.

En cas de traumatismes, d'interventions chirurgicales, de maladies infectieuses et de fièvre, il peut s'avérer nécessaire d'instaurer temporairement la thérapie insulinaire pour maintenir un contrôle métabolique approprié.

Les patients doivent apprendre à reconnaître les premiers symptômes de l'hypoglycémie (qui sont, en général, le mal de tête, l'irritabilité et la dépression, les troubles du sommeil, les tremblements, la forte transpiration) afin de pouvoir avertir en temps utile leur médecin, qui doit être aussi informé en cas de fièvre ou de troubles digestifs intercurrents.

### INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

L'activité hypoglycémante des sulfonylurées peut être augmentée par le dicumarol et ses dérivés, par les inhibiteurs des mono amino oxydases, par les bêta-bloquants, par les sulfamidiques, par le phénylbutazone et ses dérivés, par le chloramphénicol, par les tetracyclines, par la cyclophosphamide, par le probénécide, le phényramidol, les tuberculostatiques et par les salicylates ; elle peut être au contraire diminuée par les sympathicomimétiques, la chlorpromazine, les corticostéroïdes, les contraceptifs oraux et les hormones thyroïdiennes, les diurétiques thiazidiques et les préparations d'acide nicotinique.

Il faut également agir avec prudence lors de l'administration simultanée de bêta-bloquants.

Chez les patients traités avec des sulfonylurées, il faut tenir compte de la possibilité d'un effet antabuse après ingestion de boissons alcoolisées.

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez ou si vous avez pris récemment tout autre type de médicament, même ceux sans prescription médicale.

### MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

Le traitement aux sulfonylurées de patients ayant un déficit en G6PD peut entraîner une anémie hémolytique.

Le Gliquidone doit donc être utilisé avec précaution chez ces patients et doit être considéré une alternative thérapeutique.

### \* VIGNETTE

**GLURENOR®**  
60 comprimés O  
PPV 69DH

excipients.

# Lasilix® 40 mg

# Lasilix® 20 mg/2 ml

## Furosemide

Lisez attentivement cette notice. Elle contient des informations importantes pour votre santé et celle d'autre.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la renseigner à nouveau.

LOT : 21E001  
PER. : 01/2025

LASILIX 40MG  
20CP SEC

P.P.V : 34DH60



6 118000 060468

Notice à votre disposition, car

il pres

LOT : 21E005  
PER. : 05/2025

LASILIX 40MG  
20CP SEC

P.P.V : 34DH60



6 118000 060468

is à l'un

## IDENTIFIANT

### Composition

LASILIX 4

Furosemide

Excipient : LASILIX 2

Furosemide

Excipients : chlorure de sodium, hydroxyde de sodium, eau

## Formes physiques

LASILIX 40

LASILIX 20

ampoule

## Dans quelles voies

Voie orale

Ce médicament est indiqué dans le traitement :

- des œdème
- des œdème
- potassium,
- de l'hypertension

## Voie injectable

Cette forme est :

- urgences cardiaques
- poussées hypertensives
- rétentions sodées sévères d'origine cardiaque, rénale, cirrhotique (rétention ac. scii),
- radiologique du bas appareil urinaire et test de lavage « wash out » au LASILIX,
- peut être utilisé en réanimation pédiatrique.




## ATTENTION !

### Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :







clinique  
mers  
sultan



مصحة  
مرس  
السلطان

09/12/21

Dr El Amini Driss  
meilleur résultat  
kt  
AFS. M  
L.M.

Laboratoire Assalam Medigenes

101221-004



MERNISSI

Driss

Dr. BENNANI Mohamed  
Cardiologue Interventionnel  
Rythmologue  
Clinique Mers Sultan  
64, Bd. Omar El Idrissi Casablanca  
Tél: 0522 27 72 72

LABORATOIRE ASSALAM-MEDIGENES  
D'ANALYSES MEDICALIS  
Y. IDRISSI - BIOLOGISTE  
Résidence AÏAKHA - Imm. A5 - 1er ét - N° 3  
Bd Akid El Aïlam - Quartier Bournazel  
CASABLANCA  
Tel. : 05.22.56.31.02 - Fax : 05.22.58.51.03


## URGENCES 24H/24H

شارع عمر الادريسي (قرب حدائق مرس) - الدار البيضاء - الفاكس 64 05 22 26 79 42

64, Bd Omar El Idrissi ( en face du jardin Murdoch ) - Casablanca - Fax : 05 22 26 79 42

هاتف : 05 22 27 72 72 (L.G) - 05 22 46 72 00/01/02/03 - 05 22 46 72 09 - 05 22 46 72 05

E-mail : cliniquemersultan@gmail.com / www.cliniquemersultan.com / ICE : 001728360000010



## Facture

N° Facture : 2021-04305

Patient : Mr MERNISSI Driss

Prélèvement du : 10/12/2021

Analyses	Valeur en B	Montant
HEMOGRAMME : NFS + PLQ	80	88,00
UREE	30	33,00
CREATININE	30	33,00
POTASSIUM	30	33,00
<b>Total B</b>	<b>170</b>	<b>187,00</b>
<b>APB</b>	<b>1,0</b>	<b>10,00</b>
<b>Total</b>		<b>197,00</b>

Arrêtée la présente facture à la somme de : Cent quatre-vingt-dix-sept dirhams\*\*\*

*[Handwritten signature over the stamp]*  
LABORATOIRE ASSALAM-MEDIGENES  
D'ANALYSES MEDICALES  
Y. IDRISI E. - BIOLOGISTE  
Résidence ANNAKHLA - Imm. A5 - 1er ét - N° 3  
Bd Akid EL Allam - Quartier Bournazel  
CASABLANCA  
Tél. : 05 22 56 51 02 - Fax : 05 22 56 51 03



يوسف إدريسي قيطوني

Youssef IDRISI KAÏTOUNI  
Pharmacien Biologiste  
Diplômé de l'Université de Lille



INP 093001386

Casablanca, le 10/12/2021

## Compte rendu d'analyses

\*\*\*  
Dossier N° : 101221-004 Pvt du: 10/12/2021 8:58

Nom : Mr MERNISSI Driss

Demandé par Dr : BENNANI MOHAMED



Page : 1/2

### ANALYSES D'HEMATOLOGIE

Valeurs Usuelles

Antériorité

#### HEMOGRAMME : NFS + PLQ

(Technique : Cytométrie en flux/Sysmex XN-550)

Globules rouges	:	5,08 $10^6/\text{mm}^3$	( 4,2 - 5,7 )	5,22 (31/05/21)
Hémoglobine	:	15,30 g/dl	( 14 - 17 )	15,40 (31/05/21)
Hématocrite	:	45 %	( 40 - 52 )	46 (31/05/21)
VGM	:	88 fL	( 80 - 95 )	87 (31/05/21)
TGMH	:	30 pg	( 27 - 33 )	29 (31/05/21)
CCMH	:	34 g/dl	( 32 - 36 )	34 (31/05/21)
Globules blancs	:	7 040 / $\text{mm}^3$	( 4000 - 10000 )	9690 (31/05/21)
<b>Formule sanguine</b>	:			
Neutrophiles	:	63 % 4435,20 / $\text{mm}^3$	( 2000 - 7500 )	5717,10 (31/05/21)
Eosinophiles	:	4 % 281,60 / $\text{mm}^3$	( Inférieur à 400 )	290,70 (31/05/21)
Basophiles	:	0 % 0,00 / $\text{mm}^3$	( Inférieur à 150 )	0,00 (31/05/21)
Lymphocytes	:	25 % 1760,00 / $\text{mm}^3$	( 1500 - 4000 )	
Monocytes	:	8 % 563,20 / $\text{mm}^3$	( 40 - 800 )	581,40 (31/05/21)
Plaquettes	:	<b>134 000 /<math>\text{mm}^3</math></b>	( 150000 - 400000 )	159 000 (31/05/21)

LABORATOIRE ASSALAM-MEDIGENES  
D'ANALYSES MEDICALES  
Y. IDRISI KAÏTOUNI-BILOGISTE  
Résidence ANNAKHLA Imm. A5 - 1er ét - N° 3  
Bd Akid El Allam - Quartier Bournazel  
Tél. : 05 22 56 51 02 - Fax : 05 22 56 51 03  
CASABLANCA - Maroc



يوسف إدريسي قبطوني

Youssef IDRISI KAÏOUNI

Pharmacien Biologiste

Diplômé de l'Université de Lille

Mr MERNISSI Driss



INP 093001386

Dossier N° : 101221-004

Page : 2/2

**ANALYSES DE BIOCHIMIE (SANG)**

UREE


(Technique : Cinétique-UREASE/Hitachi 911)

**0,90** g/l  
15,00 mmol/l

**Valeurs Usuelles**

( 0,18 - 0,55 )  
( 3 - 9,2 )

Antériorité




CREATININE

(Technique : Jaffé compensée/Hitachi 911)

**15,20** mg/l  
134,52 µmol/l

( 6 - 13 )  
( 53,1 - 115,05 )



POTASSIUM

(Technique : Electrode spécifique/Hitachi-911)

**4,78** mmol/l

( 3,5 - 5 )

4,50 (24/11/21)  
4,31 (02/04/21)  
4,97 (19/01/21)  
4,51 (09/12/20)

*Nous vous remercions de votre confiance et vous souhaitons bon rétablissement*

**Le Biologiste**

LABORATOIRE ASSALAM-MEDIGENES  
D'ANALYSES MEDICALES  
Y. IDRISI K. - BILOGISTE  
Résidence ANNAKHLA - Imm. A5 - 1er ét - N° 3  
Bd Akid El Allam - Quartier Bournazel  
CASABLANCA  
Tél. : 05.22.56.51.02 - Fax : 05.22.56.51.03

شارع العقيد العلام. إقامة النخلة 5، الطابق الأول رقم 3. حي البورنازيل. الدار البيضاء

Bd Akid El Allam - Résidence Annakhla Imm. A5, 1er Etage N°3 - Quartier Bournazel - Casablanca

Tél : 05 22 56 51 02 / 05 22 37 02 03 - Fax : 05 22 56 51 03 - 06 89 10 33 48 - E-mail : labomedigenes@gmail.com

IF : 42138380 - PAT 32759422 - ICE : 001685010000058 - CNSS : 6405618



Le ...../...../.....

M<sup>le</sup> 0258

## DECLARATION DE MALADIE CHRONIQUE (✓)

(A adresser au médecin conseil de la MUPRAS sous pli confidentiel)

<p>A remplir par le praticien</p> <p>Dr. BENNANI Mohamed Cardiologue Interventionnel Rythmologue Clinique Mers Sultan 64, Bd. Omar El Idrissi Casablanca Tél: 0522 27 72 72</p>	
<p>Je soussigné:</p> <p>Certifie que Mlle, Mme, M : <i>El Aouia Driss</i></p>	
<p>Présente <i>DAC</i></p>	
<p>Nécessitant un traitement d'une durée de:</p> <p>.....</p>	
<p>Dont ci-joint l'ordonnance:</p> <p>.....</p>	
<p>(A défaut noter le traitement prescrit):</p> <p>.....</p>	

(✓) : Valable 3 mois

Contact: 05-22-22-78-14 Fax 05-22-22-78-18

**CLINIQUE MERS SULTAN****CENTRE DES EXPLORATIONS CARDIOLOGIQUES**

64,Bd Omar El Idrissi (en face du jardin Murdoch) - Casablanca

Tél: 05 22 27 02 79 / 05 22 27 72 72

**Mernissi Driss**

N° patient

Date de naissance 01.07.1940 (81 Y.)

Sexe Unknown

ECG de repos Évaluation du 09.12.2021 15:05

**Données examen**

QRS (ms)	141
P (ms)	147
PQ (ms)	174
QT (ms)	398
QTc B. (ms)	460 (117%)
QTc disp. (ms)	24
Axe QRS	83°
FC	80
RR moy (ms)	750

**Rapport non confirmé**

rythme sinusal-cardiaque normal  
cœur vertical  
onde P élargie  
bloc de branche gauche

ECG analysé FC: 80

(25 mm/s 10 mm/mV 0.05Hz - 45Hz / 50Hz true wave®)

