

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR OBTENIR LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

ditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

rmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

que :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

ducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

taire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

adie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation

: contact@mupras.com

Prise en charge

: pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut

: adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
22/05/22		G 300,00		ALIAH Souda ENREGISTREMENT DU PAYER DES ACTES MEDICALS DU 22/05/22 A LA DATE DU 22/05/22

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	21/12	904,00

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICALS

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient													
				COEFFICIENT DES TRAVAUX												
				MONTANTS DES SOINS												
				DEBUT D'EXECUTION												
				FIN D'EXECUTION												
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE															
	<table> <tr> <td>H</td> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		H	25533412	21433552	D	00000000	00000000		35533411	11433553	B				Coefficient DES TRAVAUX
H	25533412	21433552														
D	00000000	00000000														
	35533411	11433553														
B																
	<p>[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession</p>			MONTANTS DES SOINS												
				DATE DU DEVIS												
				DATE DE L'EXECUTION												

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr. Souad BENABDALLAH ép.LAZRAK

Gastro-entérologue

Spécialiste

des Maladies de l'Appareil Digestif
(Foie, Vésicule, Pancréas, Estomac, Intestins,
Hémorroïdes)

Endoscopie digestive

Echographie abdominale

Ex. Gastro Entérologue au CHU Avicenne Rabat
et à l'Hôpital Ben Msik Sidi Othmane - Casablanca



الدكتورة سعاد بنعبد الله الازرق

اختصاصية في:

أمراض الجهاز الهضمي

(الكبد، المراة، المعدة، الأمعاء، البواسير)

الكشف الداخلي للجهاز الهضمي

الفحص بالصدى

طبيبة سابقا بقسم امراض الجهاز الهضمي
بمستشفى بن مسيك سيدي عثمان - الدار البيضاء
ويمستشفى السوسيي بالرباط

Casablanca, le : 22/05/22 الدار البيضاء في

W 62 ^م et ouardighi Soumaya

1) Metformin mg 800 x 30
dose x 21 ^م x 30
9/00 puis 500 x 21 ^م x 30
2) Simvastatin 60 N^o 30
29/00 x 2 dose x 30
3) Azithromycine N^o 60
dose x 15 ^م x 60
4) Méglumine 160 mg dose x 30
63/20 x 2 dose x 30
5) Zyntec N^o 15 dose x 15

Dr. BENABDALLAH Souad
Gastro-entérologue
Spécialiste
Casablanca, Maroc
Tél. 0522.25.88.62 / 0522.98.90.12
Fax : 05.22 28.90.12

Résidence Bensaid - 30, Rue du Marché, 2ème étage - Maarif - Casablanca - (en Face Galerie Benomar)

إقامة بين سعيد، 30 زنقة المارشمي - الطابق الثاني - المعاريف - الدار البيضاء (امام مركب بن عمر)

Tel : 05 22 25.88.62 / 0522.98.90.12 - Fax : 05.22 28.90.12

g) Demeter part Ns 3.11

$\left(2\right)^{ho}$ D pah x 21¹
66.80 x 3

g) Florimontaine Ns 3.11

70,30 d3 D Ap x 21¹

g) Meru-Lil Ap Ns 3.11

D Ap x 21¹

g) Seeds Ns (56₈) 3.11

160^{ho}
30 4.0

Dr BEN ABDALLAH Sonad
Enterologue, Maroc
49, Rue de la Marche, 1000
Bruxelles, Belgique
Téléphone: 02 22 98.90.12
Fax: 02 22 98.90.12
Dr BEN ABDALLAH Sonad
Enterologue, Maroc
49, Rue de la Marche, 1000
Bruxelles, Belgique
Téléphone: 02 22 98.90.12
Fax: 02 22 98.90.12
Tel: 05.22.26.88.62

MORIDIL®

FORMES ET PRÉSENTATIONS :

- Suppositoires : Boîte de 12 suppositoires.
- Crème : Tube de 20 g.

COMPOSITION :

• Suppositoires :	Par suppositoire	Par boîte
- Carraghénates	0,3 g	3,6 g
- Dioxyde de titane	0,2 g	2,4 g
- Oxyde de zinc	0,4 g	4,8 g
- Talc	0,2 g	2,4 g
- Excipients q.s.p	1 suppositoire	12 suppositoires.
• Crème :	Par tube	Par 100 g
- Carraghénates	0,5 g	2,5 g
- Dioxyde de titane	0,4 g	2,0 g
- Oxyde de zinc	0,4 g	2,0 g
- Lidocaïne	0,4 g	2,0 g
- Excipients q.s.p	20 g	100 g
- Excipients à effet notoire : Acide sorbique - Parahydroxybenzoate de méthyle.		

PROPRIÉTÉS :

- Crème : Anesthésique local - Topique en proctologie.
- Suppositoire : protecteur et cicatrisant (système cardiovasculaire).

MORIDIL® est un mucoprotecteur et lubrifiant de la muqueuse anorectale. Il protège la muqueuse des agressions mécaniques ou chimiques.

INDICATIONS :

Traitements symptomatiques des douleurs, prurits et sensations congestives au cours des poussées diarréiques et autres affections anales.

CONTRE-INDICATIONS :

- Manifestations ou antécédents allergiques à l'un des composants de MORIDIL®, notamment la parahydroxybenzoate de méthyle contenue dans la crème.

EFFETS INDESIRABLES :

Crème : réactions au site de l'application : brûlures, érythème, irritation, douleur ...

POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI :

- Suppositoires : 1 à 2 suppositoires par jour.

- Crème : 1 à 4 applications par jour. La durée de traitement ne doit pas excéder 7 jours.

MISES EN GARDE/PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

L'administration de MORIDIL® ne dispense pas du traitement spécifique de la maladie.

Le traitement doit être de courte durée.

Si les symptômes ne disparaissent pas rapidement, le traitement doit être prolongé et indispensable.

La crème : contient du parahydroxybenzoate de méthyle et des huiles essentielles (éventuellement retardées).

En cas de doute, demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

MORIDIL® est un médicament : ne pas laisser à la portée des enfants.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES :

Il n'existe aucune interaction médicamenteuse significative à ce jour.

GROSSESSE/ALLAITEMENT :



MORIDIL®

FORMES ET PRÉSENTATIONS :

- Suppositoires : Boîte de 12 suppositoires.
- Crème : Tube de 20 g.

COMPOSITION :

• Suppositoires :	Par suppositoire	Par boîte
- Carraghénates	0,3 g	3,6 g
- Dioxyde de titane	0,2 g	2,4 g
- Oxyde de zinc	0,4 g	4,8 g
- Talc	0,2 g	2,4 g
- Excipients q.s.p	1 suppositoire	12 suppositoires.
• Crème :	Par tube	Par 100 g
- Carraghénates	0,5 g	2,5 g
- Dioxyde de titane	0,4 g	2,0 g
- Oxyde de zinc	0,4 g	2,0 g
- Lidocaïne	0,4 g	2,0 g
- Excipients q.s.p	20 g	100 g
- Excipients à effet notoire : Acide sorbique - Parahydroxybenzoate de méthyle.		

PROPRIÉTÉS :

- Crème : Anesthésique local - Topique en proctologie.
- Suppositoire : protecteur et cicatrisant (système cardiovasculaire).

MORIDIL® est un mucoprotecteur et lubrifiant de la muqueuse anorectale. Il protège la muqueuse contre les agressions mécaniques ou chimiques.

INDICATIONS :

Traitements symptomatiques des douleurs, prurits et sensations congestives au cours des poussées diarrhéiques et autres affections anales.

CONTRE-INDICATIONS :

- Manifestations ou antécédents allergiques à l'un des composants de MORIDIL®, notamment la parahydroxybenzoate de méthyle contenue dans la crème.

EFFETS INDESIRABLES :

Crème : réactions au site de l'application : brûlures, érythème, irritation, douleur ...

POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI :

- Suppositoires : 1 à 2 suppositoires par jour.

- Crème : 1 à 4 applications par jour. La durée de traitement ne doit pas excéder 7 jours.

MISES EN GARDE/PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

L'administration de MORIDIL® ne dispense pas du traitement spécifique de la maladie.

Le traitement doit être de courte durée.

Si les symptômes ne disparaissent pas rapidement, le traitement doit être prolongé et indispensable.

La crème : contient du parahydroxybenzoate de méthyle et des huiles essentielles (éventuellement retardées).

En cas de doute, demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

MORIDIL® est un médicament : ne pas laisser à la portée des enfants.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES :

Il n'existe aucune interaction médicamenteuse significative à ce jour.

GROSSESSE/ALLAITEMENT :



MORIDIL®

FORMES ET PRÉSENTATIONS :

- Suppositoires : Boîte de 12 suppositoires.
- Crème : Tube de 20 g.

COMPOSITION :

• Suppositoires :	Par suppositoire	Par boîte
- Carraghénates	0,3 g	3,6 g
- Dioxyde de titane	0,2 g	2,4 g
- Oxyde de zinc	0,4 g	4,8 g
- Talc	0,2 g	2,4 g
- Excipients q.s.p	1 suppositoire	12 suppositoires.
• Crème :	Par tube	Par 100 g
- Carraghénates	0,5 g	2,5 g
- Dioxyde de titane	0,4 g	2,0 g
- Oxyde de zinc	0,4 g	2,0 g
- Lidocaïne	0,4 g	2,0 g
- Excipients q.s.p	20 g	100 g
- Excipients à effet notoire : Acide sorbique - Parahydroxybenzoate de méthyle.		

PROPRIÉTÉS :

- Crème : Anesthésique local - Topique en proctologie.
- Suppositoire : protecteur et cicatrisant (système cardiovasculaire).

MORIDIL® est un mucoprotecteur et lubrifiant de la muqueuse anorectale. Il protège la muqueuse contre les agressions mécaniques ou chimiques.

INDICATIONS :

Traitements symptomatiques des douleurs, prurits et sensations congestives au cours des poussées diarrhéiques et autres affections anales.

CONTRE-INDICATIONS :

- Manifestations ou antécédents allergiques à l'un des composants de MORIDIL®, notamment la parahydroxybenzoate de méthyle contenue dans la crème.

EFFETS INDESIRABLES :

Crème : réactions au site de l'application : brûlures, érythème, irritation, douleur ...

POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI :

- Suppositoires : 1 à 2 suppositoires par jour.

- Crème : 1 à 4 applications par jour. La durée de traitement ne doit pas excéder 7 jours.

MISES EN GARDE/PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

L'administration de MORIDIL® ne dispense pas du traitement spécifique de la maladie.

Le traitement doit être de courte durée.

Si les symptômes ne disparaissent pas rapidement, le traitement doit être prolongé et indispensable.

La crème : contient du parahydroxybenzoate de méthyle et des huiles essentielles (éventuellement retardées).

En cas de doute, demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

MORIDIL® est un médicament : ne pas laisser à la portée des enfants.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES :

Il n'existe aucune interaction médicamenteuse significative à ce jour.

GROSSESSE/ALLAITEMENT :



- **ZYRTEC® 10 mg, comprimé pelliculé sécable**
- **ZYRTEC® 10 mg/ml, solution buvable en gouttes**
- **ZYRTEC® 1 mg/ml, solution buvable en flacon**
 - Dichlorhydrate de cétirizine

de cette notice avant de prendre ce médicament.

ir besoin de la relire.

ous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

ement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

rave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre

QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

NS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ZYRTEC ?

RABLES EVENTUELS ?

?

ES

QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

stance active de ZYRTEC.

nique utilisé dans le traitement de l'allergie.

Zyrtec solution buvable en flacon sont indiqués chez l'adulte et l'enfant à ulte et l'enfant à partir de 6 ans :

aux et oculaires de la rhinite allergique saisonnière ou perannuelle.
urticaria.

NS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ZYRTEC ?



6 118000 020158

63,20

- **ZYRTEC® 10 mg, comprimé pelliculé sécable**
- **ZYRTEC® 10 mg/ml, solution buvable en gouttes**
- **ZYRTEC® 1 mg/ml, solution buvable en flacon**
 - Dichlorhydrate de cétirizine

de cette notice avant de prendre ce médicament.

ir besoin de la relire.

ous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

ement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

rave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre

QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

NS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ZYRTEC ?

RABLES EVENTUELS ?

?

ES

QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

stance active de ZYRTEC.

nique utilisé dans le traitement de l'allergie.

Zyrtec solution buvable en flacon sont indiqués chez l'adulte et l'enfant à ulte et l'enfant à partir de 6 ans :

aux et oculaires de la rhinite allergique saisonnière ou perannuelle.
urticaria.

NS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ZYRTEC ?



6 118000 020158

63,20

AZIX®

Azithromycine

COMPOSITION ET PRÉSENTATION :

Comprimé 500 mg sécable, boîte de 3

INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

Traitements des infections dues aux germes sensibles telles que :

- infections respiratoires hautes : otite moyenne, sinusite, angine et pharyngite;
- infections respiratoires basses (y compris bronchite et pneumonie);
- infections odontostomatologiques;
- infections cutanées;
- infections des tissus mous;
- urétrites et cervicites non gonococciques (chlamydia trachomatis).

CONTRE-INDICATIONS :

- Antécédents d'allergie à l'azithromycine et aux macrolides.
- Insuffisance hépatique sévère.

MISES EN GARDE :

- Toute manifestation allergique (éruption cutanée, démangeaison ...) en cours de traitement doit être signalée immédiatement à votre médecin.
- Signaler au médecin traitant toute allergie ou manifestation allergique survenue lors de traitements par les antibiotiques de la famille des macrolides.
- Ce médicament ne doit pas être utilisé chez les patients présentant une maladie hépatique.
- En l'absence de données, l'association aux dérivés de l'ergot de seigle n'est pas recommandée.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Prévenir le médecin traitant en cas de :

Insuffisance hépatique, antécédents allergiques, manifestations cutanées d'origine allergique, prise concomitante d'autres médicaments, grossesse, allaitement.

EFFETS INDESIRABLES :

- Troubles digestifs : nausées, vomissements, diarrhées et douleurs abdominales.
- Manifestations allergiques; prurit, rash cutané, oedème de Quincke.

POSOLOGIE :


Se conformer à la prescription médicale.

Adulte et enfant de plus de 45 kg : 500 mg par jour, 1 comprimé de 500 mg en une prise par jour pendant 3 jours.

MODE D'ADMINISTRATION :

Azix peut être pris pendant ou en d

TABLEAU A (LISTE I).



AZIX®

Azithromycine

COMPOSITION ET PRÉSENTATION :

Comprimé 500 mg sécable, boîte de 3

INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

Traitements des infections dues aux germes sensibles telles que :

- infections respiratoires hautes : otite moyenne, sinusite, angine et pharyngite;
- infections respiratoires basses (y compris bronchite et pneumonie);
- infections odontostomatologiques;
- infections cutanées;
- infections des tissus mous;
- urétrites et cervicites non gonococciques (chlamydia trachomatis).

CONTRE-INDICATIONS :

- Antécédents d'allergie à l'azithromycine et aux macrolides.
- Insuffisance hépatique sévère.

MISES EN GARDE :

- Toute manifestation allergique (éruption cutanée, démangeaison ...) en cours de traitement doit être signalée immédiatement à votre médecin.
- Signaler au médecin traitant toute allergie ou manifestation allergique survenue lors de traitements par les antibiotiques de la famille des macrolides.
- Ce médicament ne doit pas être utilisé chez les patients présentant une maladie hépatique.
- En l'absence de données, l'association aux dérivés de l'ergot de seigle n'est pas recommandée.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Prévenir le médecin traitant en cas de :

Insuffisance hépatique, antécédents allergiques, manifestations cutanées d'origine allergique, prise concomitante d'autres médicaments, grossesse, allaitement.

EFFETS INDESIRABLES :

- Troubles digestifs : nausées, vomissements, diarrhées et douleurs abdominales.
- Manifestations allergiques; prurit, rash cutané, oedème de Quincke.

POSOLOGIE :


Se conformer à la prescription médicale.

Adulte et enfant de plus de 45 kg : 500 mg par jour, 1 comprimé de 500 mg en une prise par jour pendant 3 jours.

MODE D'ADMINISTRATION :

Azix peut être pris pendant ou en d

TABLEAU A (LISTE I).



EUCARBON®

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

EUCARBON®

Boîtes de 30 et 100 comprimés

Charbon végétal pulvérisé, Extrait sec de rhubarbe, Feuilles de séné et Soufre purifié

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice.
- Vous devez-vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après utilisation.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que EUCARBON® et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre EUCARBON® ?
3. Comment prendre EUCARBON® ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver EUCARBON® ?
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE EUCARBON® ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmaco-thérapeutique

Laxatif de contact, sennosides ; code ATC : A06AB06

EUCARBON® contient exclusivement des agents actifs végétaux et minéraux. EUCARBON® a un double effet : régulateur de la fonction intestinale et légèrement laxatif. Le charbon végétal adsorbe les toxines bactériennes et celles du métabolisme, les feuilles de séné et les racines de rhubarbe évacuent rapidement les toxines adsorbées par le charbon et ont un effet légèrement désinfectant dans l'intestin, a

Indications thérapeutiques

EUCARBON® est indiqué dans les cas suivants

- Dyspepsie, digestion pénible.
- Flatulence, ballonnement, météorisme, é
- putréfaction intestinale.
- Auto-intoxication intestinale.
- Paresse intestinale.
- Toutes les formes de constipation

Sportifs

Sans obje

Effets su

machines

Sans obje

Mention

Ce médic

est déco

fructose.

ou un dé

3. COMM

Instructions

Sans obje

Posologi

d'admini

Posologi

Adultes

jour pen

les ballon

augment

Examen

des gaz

comprim

Traiteme

prises/jo

en 1 à 2

La dose

individue

Mode et

Voie oral

Prendre l

les repas

Durée du

Lot:

3914 A

EXP:

10.2025

PPV:

91,00

91,00 HTS

être soi

Conduite

EUCARBON®

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

EUCARBON®

Boîtes de 30 et 100 comprimés

Charbon végétal pulvérisé, Extrait sec de rhubarbe, Feuilles de séné et Soufre purifié

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice.
- Vous devez-vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après utilisation.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que EUCARBON® et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre EUCARBON® ?
3. Comment prendre EUCARBON® ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver EUCARBON® ?
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE EUCARBON® ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmaco-thérapeutique

Laxatif de contact, sennosides ; code ATC : A06AB06

EUCARBON® contient exclusivement des agents actifs végétaux et minéraux. EUCARBON® a un double effet : régulateur de la fonction intestinale et légèrement laxatif. Le charbon végétal adsorbe les toxines bactériennes et celles du métabolisme, les feuilles de séné et les racines de rhubarbe évacuent rapidement les toxines adsorbées par le charbon et ont un effet légèrement désinfectant dans l'intestin, a

Indications thérapeutiques

EUCARBON® est indiqué dans les cas suivants

- Dyspepsie, digestion pénible.
- Flatulence, ballonnement, météorisme, é
- putréfaction intestinale.
- Auto-intoxication intestinale.
- Paresse intestinale.
- Toutes les formes de constipation

Sportifs

Sans obje

Effets su

machines

Sans obje

Mention

Ce médic

est déco

fructose.

ou un dé

3. COMM

Instructions

Sans obje

Posologi

d'admini

Posologi

Adultes

jour pen

les ballon

augment

Examen

des gaz

comprim

Traiteme

prises/jo

en 1 à 2

La dose

individue

Mode et

Voie oral

Prendre l

les repas

Durée d

Lot:

3914 A

EXP:

10.2025

PPV:

91,00

91,00 HTS

être soi

Conduite

EUCARBON®

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

EUCARBON®

Boîtes de 30 et 100 comprimés

Charbon végétal pulvérisé, Extrait sec de rhubarbe, Feuilles de séné et Soufre purifié

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice.
- Vous devez-vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après utilisation.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que EUCARBON® et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre EUCARBON® ?
3. Comment prendre EUCARBON® ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver EUCARBON® ?
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE EUCARBON® ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmaco-thérapeutique

Laxatif de contact, sennosides ; code ATC : A06AB06

EUCARBON® contient exclusivement des agents actifs végétaux et minéraux. EUCARBON® a un double effet : régulateur de la fonction intestinale et légèrement laxatif. Le charbon végétal adsorbe les toxines bactériennes et celles du métabolisme, les feuilles de séné et les racines de rhubarbe évacuent rapidement les toxines adsorbées par le charbon et ont un effet légèrement désinfectant dans l'intestin, a

Indications thérapeutiques

EUCARBON® est indiqué dans les cas suivants

- Dyspepsie, digestion pénible.
- Flatulence, ballonnement, météorisme, é
- putréfaction intestinale.
- Auto-intoxication intestinale.
- Paresse intestinale.
- Toutes les formes de constipation

Sportifs

Sans obje

Effets su

machines

Sans obje

Mention

Ce médic

est déco

fructose.

ou un dé

3. COMM

Instructions

Sans obje

Posologi

d'admini

Posologi

Adultes

jour pen

les ballon

augment

Examen

des gaz

comprim

Traiteme

prises/jo

en 1 à 2

La dose

individue

Mode et

Voie oral

Prendre l

les repas

Durée d

Lot:

3914 A

EXP:

10.2025

PPV:

91,00

91,00 HTS

être soi

Conduite

FLAMMAZINE® 1%

Crème

Tube de 50 g

Sulfadiazine Argentique

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

Composition qualitative et quantitative

Sulfadiazine Argentique (DCI)	1 g
Excipients Q.S.P.	100 g

EXCIPIENTS A EFFET NOTOIRE

Alcool cétylique et propylène glycol.

Forme pharmaceutique

Crème.

Tube de 50 g.

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament est indiqué dans le traitement local et la prévention des infections dans les brûlures, et le traitement adjuvant aux mesures générales et locales habituelles, des infections de la peau et des plaies.

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT ?

POSOLOGIE :

Veuillez suivre rigoureusement ces instructions, à moins que votre médecin vous en ait donné d'autres. En cas d'incertitude, veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien.

Si aucune amélioration n'apparaît, veuillez consulter à nouveau votre médecin.

Après avoir nettoyé et désinfecté la plaie, appliquer la Flammazine de deux façons :

1. Vous appliquez la Flammazine directement.

Mettez une couche de 2 à 3 mm d'épaisseur.

Couvrez ensuite avec une gaze stérile.

2. Vous mettez d'abord de la Flammazine dans les deux cas vous pouvez mettre un



LOT / BATCH: 16591
FAB / MFR: 07-2020
EXP: 06-2023

RE ME

LAITE

emploi

nt insu

es n'or

Ifonam

azine r

emploi

insu

s n'ont

l'ancienne

Il CONVIENT AU COURS

de la

FLAMMAZINE® 1%

Crème

Tube de 50 g

Sulfadiazine Argentique

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

Composition qualitative et quantitative

Sulfadiazine Argentique (DCI)	1 g
Excipients Q.S.P.	100 g

EXCIPIENTS A EFFET NOTOIRE

Alcool cétylique et propylène glycol.

Forme pharmaceutique

Crème.

Tube de 50 g.

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament est indiqué dans le traitement local et la prévention des infections dans les brûlures, et le traitement adjuvant aux mesures générales et locales habituelles, des infections de la peau et des plaies.

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT ?

POSOLOGIE :

Veuillez suivre rigoureusement ces instructions, à moins que votre médecin vous en ait donné d'autres. En cas d'incertitude, veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien.

Si aucune amélioration n'apparaît, veuillez consulter à nouveau votre médecin.

Après avoir nettoyé et désinfecté la plaie, appliquer la Flammazine de deux façons :

1. Vous appliquez la Flammazine directement.

Mettez une couche de 2 à 3 mm d'épaisseur.

Couvrez ensuite avec une gaze stérile.

2. Vous mettez d'abord de la Flammazine dans les deux cas vous pouvez mettre un



LOT / BATCH: 16591
FAB / MFR: 07-2020
EXP: 06-2023

RE ME

LAITE

emploi

nt insu

es n'o

lfonam

azine r

emploi

insu

s n'o

l

l

l

l

l

l

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Usage Topique.

La Flammazine doit être appliquée une fois par jour. Pour appliquer une nouvelle couche vous devez enlever l'ancienne.

50 g e

PPV: 66,80 DH

IL CONVIENT AU COURS

FLAMMAZINE® 1%

Crème

Tube de 50 g

Sulfadiazine Argentique

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
 - Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations.
 - Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, cela pourrait lui être nocif.
 - Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

Composition qualitative et quantitative

Sulfadiazine Argentique(DCI) 1 g
Excipients Q.S.P. 100 g

EXCIPIENTS A EFFET NOTOIRE

Alcool cétylique et propylène glycol

Forme pharmaceutique

Crème

Tube de 50 g.

DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

DANS QUELLES CAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?
Ce médicament est indiqué dans le traitement local et la prévention des infections dans les brûlures, et le traitement adjuvant aux mesures générales et locales habituelles, des infections de la peau et des plaies.

COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT ?

POSOLOGIE :

Veuillez suivre rigoureusement ces instructions, à moins que votre médecin vous en ait donné d'autres. En cas d'incertitude, veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien.

Si aucune amélioration n'apparaît, veuillez nouveau votre médecin.

Après avoir nettoyé et désinfecté la plaie, appliquer la Flammazine de deux façons :

1. Vous appliquez la Flammazine directement. Mettez une couche de 2 à 3 mm d'épaisseur. Couvrez ensuite avec une gaze stérile.
 2. Vous mettez d'abord de la Flammazine puis ensuite vous la mettez sur la plaie.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

MODE ET VOL

La Flammazine doit être appliquée une fois par jour. Il faut d'appliquer une nouvelle couche vous devez enlever la précédente.



LOT / BATCH:16591
FAB / MFR: 07-2020
EXP: 06-2023

1

PPV: 66.80 DH

IL CONVIENT AU COURS

OEDES® 20 mg

Microgranules gastrorésistants en gélule (Oméprazole)

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Elle contient des informations importantes sur votre traitement et votre maladie.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

1. Identification du médicament:

Forme pharmaceutique et présentation:

OEDES® 20 mg, Microgranules gastro-résistants en gélules, boîtes de 7, 14, 28 et 56

2. Composition du médicament:

Principaux actifs:

Oméprazole 20 mg

EXCIPIENTS : q.s.p une gélule.

Excipient à effet notoire : Saccharose.

3. Classe pharmaco-thérapeutique :

OEDES® 20 mg contient la substance active Oméprazole. Il appartient à la classe des médicaments appelée inhibiteurs de la pompe à protons. Il diminue la quantité d'acide produite par votre estomac.

4. Indications thérapeutiques

OEDES® 20 mg est utilisé pour traiter les affections suivantes :

Chez les adultes :

- le reflux gastro-cesophagien (RGO). L'acide de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) entraînant douleur, inflammation et brûlures.
- les ulcères de la partie haute de votre intestin (ulcère duodénal) ou de votre estomac (ulcère gastrique).
- les ulcères infectés par une bactérie appelée Helicobacter pylori.

Dans ce cas, votre médecin peut également vous prescrire des antibiotiques qui permettent de traiter l'infection et de guérir l'ulcère.

- les ulcères de l'estomac associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). OEDES® 20 mg peut aussi être utilisé pour la prévention de ceux-ci si vous prenez des AINS.
- un excès d'acide dans l'estomac dû à une grosseur au niveau du pancréas (syndrome de Zollinger-Ellison)

Chez les enfants :

Enfants âgés de plus d'un an et avec un poids corporel ≥ 10 kg :

- le reflux gastro-cesophagien (RGO). L'acide de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) entraînant douleur, inflammation et brûlures.
- Les symptômes chez l'enfant peuvent comprendre des remontées dans la bouche ou du contenu de l'estomac (régurgitation), des vomissements et une prise de poids limitée.

Enfants âgés de plus de 4 ans et adolescents :

- les ulcères infectés par une bactérie appelée Helicobacter pylori.

Dans ce cas, le médecin peut également prescrire à votre enfant des antibiotiques qui permettent de traiter l'infection et de guérir l'ulcère.

5. Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement :

Veillez toujours à prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien.

Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute. Votre médecin vous dira combien de gélules vous devez prendre et pendant combien de temps vous devez les prendre. Cela dépendra de votre état de santé et de votre âge.

Posologie :

Les doses recommandées sont mentionnées ci-dessous:

Utilisation chez les adultes :

Traitement des symptômes du reflux gastro-cesophagien tels que brûlures et régurgitation acide.

Si votre médecin constate que votre œsophage a été lénigera-

tement, un jus de fruit légèrement acide (jus d'orange, pomme ou ananas) ou dans la compote de pomme.

• Toujours renuer juste avant de boire le mélange (le mélange ne sera pas homogène). Puis boire le mélange immédiatement ou dans les 30 minutes.

• Pour s'assurer que vous avez bu tout le médicament, bien rincer le verre avec un demi-verre d'eau et le boire. Les morceaux solides contiennent le médicament, ne pas les mâcher ni les croquer.

6. Contre-indications :

Ne prenez jamais OEDES® 20 mg, gélule :

- si vous êtes allergique à l'oméprazole ou à l'un des autres composants contenus dans OEDES® 20 mg.
- si vous êtes allergique à un autre inhibiteur de la pompe à protons (par exemple pantoprazole, lansoprazole, rabéprazole, esoméprazole).

- Si vous prenez un médicament contenant du nelfinavir (utilisé pour traiter l'infection par le VIH).
- Si vous êtes dans une des situations décrites ci-dessus, ne prenez pas OEDES® 20 mg, gélule gastro-résistante. Si vous avez des doutes, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre OEDES® 20 mg.

7. Effets indésirables :

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Si vous remarquez un des effets indésirables suivants, ceux-ci étant rares mais sérieux, arrêtez de prendre OEDES® 20 mg et contactez immédiatement un médecin :

- Apparition soudaine d'une respiration sifflante, gonflement des lèvres, de la langue et de la gorge ou du corps, éruptions cutanées, perte de connaissance ou difficultés à avaler (réactions allergiques graves).
- Rougeurs de la peau avec des bulles ou une desquamation. Parfois, les bulles peuvent être importantes et s'accompagner d'un saignement au niveau des lèvres, des yeux, de la bouche, du nez et des parties génitales. Ceci peut correspondre à un syndrome de Stevens-Johnson ou à une nécrolyse épidermique toxique.

- Jaunisse, urines foncées et fatigue peuvent être des symptômes d'une maladie du foie.

Les autres effets indésirables sont :

Effets indésirables fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 10)

- Maux de tête.
- Effets sur l'estomac ou l'intestin : diarrhée, douleurs à l'estomac, constipation, flatulence.
- Nausées ou vomissements.
- Polypes bénins dans l'estomac.

Effets indésirables peu fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 100)

- Gonflement des pieds et des chevilles.
- Troubles du sommeil (insomnie).
- Étourdissements, fourmillements, somnolence.
- Vertiges.
- Modificat... fonctionnement
- Eruptions c...
- Malaise gér...

Effets indésirables sur 1000

- Troubles san... blancs ou de faiblesses, des écl...
- Réactions aléatoires, parfois très graves incluant le gonflement des lèvres, de la langue et de la gorge, de la fièvre, une respiration sifflante.

- Diminution du taux de sodium dans le sang. Celle-ci peut provoquer une faiblesse, des vomissements et des crampes.
- Agitation, confusion ou dépression.
- Troubles du goût.

• Vous a...
• Vous s...
• a été ass...
• Si vous...
• S'il voi...
• un traite...
• Vous a...
• Vous s...
• Si vous...
• réguli...
• événem...
• médic...
La prise d...
mg, gél...
supérieu...
de la han...
si vous so...
peuvent a...
Si vous a...
zones exp...
car vous...
mg. N'ou...
indésirab...
Enfants :
Certains...
nécessité...
recommen...
de 1 an ou...
Mentions :
En raison...
déconseill...
un syndrom...
déficit en ...
9. Interact...
Prise d'a...
Si vous p...
compris u...
médecin...
fonctionne...
peuvent a...
Vous ne p...
médicame...
le VIH).
Vous dev...
l'un des m...
• Keto...
(utilisés d...
• Digoxin...
• Diazép...
commun...
• Phén...
phényto...
début et ...
• Médic...
warfarin...
médecin a...
OEDES®
• Rifaxim...
• Alatzan...
• Tacrolim...
• Milape...
la dépres...
• Clio...
intermitt...
• Saquin...
• Clopid...
• Erlotin...
• Clio...
• Saquin...
• Clopid...
• Erlotin...

LOT : 210831
PER : 01~2024
PPV : 140,00DH

Attention à l'avenue d'infections.