

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET ÉVITER LES REJETS

conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Education :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Prothèse :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire, en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.



Déclaration de Maladie

N° M21- 0057570

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 8378 Société : RAN 105721
 Actif Pensionné(e) Autre :
 Nom & Prénom : ATBIB Fouza
 Date de naissance : 01/01/1966
 Adresse : 7 Rue NASHI ADDINE RES AL JAMOUIKA
IN A APP 17 Marrakech
 Tél. : 0668466040 Total des frais engagés : 359,80 Dhs

Autorisation CNDP N° : A-A-215 / 2019

Cadre réservé au Médecin


 DR ZEMAMIAO LAFI
 45 Bd Sidi Ben Azzarine
 C : 06 22 25 03 73
 GSM : 06 61 14 99 85
 Fax : 0522 251300
 Email : zelaf@live.fr
 DE : 0034634177895

Cachet du médecin :

Date de consultation : 22 FEV 2022

Nom et prénom du malade : Dr ATBIB Fouza Age : 56

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : Br resp

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : _____

Le : / /

Signature de l'adhérent(e) : 

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
22 FEV. 2022	V		150,00D	DR ZEMMAMA O LOTFI 45 Bd Bir Anzarane 05 22 25 03 73 GSM : 06 61 14 99 86 Fax : 0522251300 Email : zol2@live.fr 34534177805

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien et du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
 EL OTHMAN AL BAHRI PHARMACEUTIQUE DANTO ORAN 20, rue El Othman Al Bahri El Oued - Algérie Tel 0522 25 09 78	22/02/22	209,87

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Cœfficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ORL.

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
00000000	00000000
00000000	00000000

(Création, remont, adjonction)
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

The diagram shows a branched polymer chain with substituents labeled with numbers 1 through 8. The main chain consists of a series of circles connected by lines. Substituents are represented by circles attached to the main chain at various points. Substituent 1 is at the top, 2 is on the left branch, 3 is on the right branch, 4 is on the rightmost branch, 5 is on the leftmost branch, 6 is on the bottom left, 7 is on the bottom middle, and 8 is on the bottom right. Some substituents have additional labels like 'P' or arrows pointing to specific atoms.

COEFFICIENT
DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DATE DU
DEVIS

Dr Zemmama Omar Lotfi
LAUREAT DE LA FACULTE
DE MEDECINE DE CASABLANCA



الدكتور زمامه عمر لطفي
خريج كلية الطب
بالدار البيضاء

Casablanca, Le 22 FEV. 2022 الدار البيضاء في

Brux ATBIB Fouzga
1) Biotic 10
375 mg salut 2x3 ap repas
2) Neopred 20
180 mg 3x ap dejeus Cematin au 1 piz 3241
3) Prolimogestale
240 mg 1 cce 3x
4) Coquelinol Peau
— 1 suppo 2x1

20g 80

Tél : 05 22 25 03 73
47 Boulevard Bir Anzarane
+212 522 25 03 73
05 22 25 03 73
05 22 25 03 73
05 22 25 03 73
Casablanca

Mme Amal EL QABBAJ BAHRI
Docteur en Pharmacie
PHARMACIE DANTON
47 Boulevard Bir Anzarane
+212 522 25 03 73

DR ZEMMAMA O LOTFI
45 Bd Bir Anzarane
C 05 22 25 03 73
GSM : 06 61 14 99 86
Fax : 0522251300
Email : zol2@live.fr
CE : 06 61 14 99 86

45, Bd. Bir Anzarane - Casablanca
TEL : 05 22 25 03 73
Fax : 05 22 25 13 00
GSM: 06 61 14 99 86
E-mail: zol2@live.fr

RAPPORTER L'ORDONNANCE

45، شارع بير أنزاران الدار البيضاء
الهاتف : 05 22 25 03 73
الفاكس : 05 22 25 13 00
المحمول : 06 61 14 99 86
البريد الإلكتروني: zol2@live.fr



C PLUS®

Acide clavulanique

Intégralité de cette notice avant de lire : elle contient des informations

*- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
 - Si vous avez une autre question, si vous avez un doute, demandez à votre pharmacien.
 Ce médicament a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela peut lui être nocif.
 Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre pharmacien.*

ou à son pharmacien.

- QUELS SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE BIOTIC PLUS® ?**
1. QU'EST-CE QUE BIOTIC PLUS®, ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE BIOTIC PLUS® ?
 3. COMMENT PRENDRE BIOTIC PLUS® ?
 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
 5. COMMENT CONSERVER BIOTIC PLUS® ?
 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES.

- 1. QU'EST-CE QUE BIOTIC PLUS®, ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?**

Classe pharmacothérapeutique

- Amoxicilline : Antibiotique bactéricide à large spectre de la famille des bêta-lactamines du groupe des aménopénicillines.

- Acide clavulanique : puissant inhibiteur de bêta-lactamases.

Indications thérapeutiques

Elles sont limitées aux infections causées par les germes sensibles, notamment dans certaines situations où les espèces bactériennes responsables de l'infection peuvent être multiples et/ou résistantes aux antibiotiques actuellement disponibles, en particulier les germes producteurs de bêta-lactamases.

BIOTIC PLUS® est particulièrement conseillé dans les infections suivantes :

- sinusite bactérienne aiguë (diagnostiquée de façon appropriée), angines récidivantes, exacerbation de bronchite chronique, pneumonie aiguë, cystite, pyélonéphrite, infections de la peau et des tissus mous, en particulier cellulite, abcès dentaire sévère avec propagation de cellulites, infections des os et des articulations, en particulier ostéomyélite. Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l'utilisation appropriée des antibactériens.

INFORMATIONS A CONNAITRE

Prise ou utilisation d'autres médicaments :

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Associations déconseillées : - Méthotrexate : augmentation des effets et de la toxicité hématologique du méthotrexate par inhibition de la sécrétion tubulaire rénale par les pénicillines.

Associations à prendre en compte :

- Allopurinol : risque accru de réactions cutanées.
 - Anticoagulants oraux : surveiller avec attention le temps de Quick ou l'INR.

- Probénécide : L'utilisation concomitante de probénécide peut conduire à une augmentation prolongée de la concentration sanguine d'amoxicilline, mais pas de l'acide clavulanique.

Interactions avec les aliments et les boissons : sans objet
Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives : sans objet

Grossesse et allaitement :

Grossesse : l'association amoxicilline-acide clavulanique peut être prescrite pendant la grossesse si besoin.

Prendre conseil auprès de son médecin ou bien de son pharmacien avant de prendre tout médicament.

Allaitement : Le passage de l'association amoxicilline-acide clavulanique dans le lait maternel est faible et les quantités ingérées très inférieures aux doses thérapeutiques. En conséquence, l'allaitement est possible en cas de prise de cet antibiotique. Toutefois, interrompre l'allaitement (ou le médicament) en cas de survenue de diarrhée, de candidose, ou d'éruption cutanée chez le nourrisson.

Sportifs : sans objet

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines :

BIOTIC PLUS® peut provoquer des effets indésirables (par ex., réactions allergiques, vertiges, convulsions) susceptibles de réduire la capacité à conduire.

- Tenir compte de la teneur en potassium chez les personnes suivant un régime hypokaliémiant.

- BIOTIC PLUS® enfant et nourrisson contient de l'aspartam, qui est une source de phénylalanine. Ce médicament doit être utilisé avec prudence chez les patients atteints de phénylcétoneurie.

- Tenir compte de la teneur en sodium dans la poudre en suspension et sachets, chez les personnes suivant un régime hiposodé strict.

- En raison de la présence de lactose, la forme poudre pour sachets est contre-indiquée en cas de galactosémie congénitale, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en lactase.

3. COMMENT PRENDRE BIOTIC PLUS® ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

POSOLOGIE (Exprimée en Amoxicilline)

Dans tous les cas, se conformer strictement à la prescription de votre médecin traitant. En général :

prés chaque prise.

NEOPRED®
Prednisolone
20 mg

PPV : 37,40 DH

OPRED®

mg et 5 mg
imé effervescent
ednisolone

100 191919

Signalez de cette notice avant de prendre ce

iz avoir besoin de la relire.

• Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

• Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

• Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE NEOPRED®, comprimé effervescent ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE NEOPRED®, comprimé effervescent ?
3. COMMENT PRENDRE NEOPRED®, comprimé effervescent ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER NEOPRED®, comprimé effervescent ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE NEOPRED®, comprimé effervescent ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : GLUCOCORTICOIDES - USAGE SYSTEMIQUE.

(H: Hormones systémiques non sexuelles).

Indications thérapeutiques :

Ce médicament est un corticoïde. Il est utilisé dans certaines maladies où il est utilisé pour son effet anti-inflammatoire. Il est indiqué dans certaines maladies où il est utilisé pour son effet anti-inflammatoire.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE NEOPRED®, comprimé effervescent ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Contre-indications :

N'utilisez jamais NEOPRED®, comprimé effervescent dans les cas suivants :

- la plupart des infections,
- certaines maladies virales en évolution (hépatites virales, herpès, varicelle, zona),
- certains troubles mentaux non traités,
- vaccination par des vaccins vivants,
- si vous êtes allergique à la prednisolone ou à l'un des autres composants.

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Précautions d'emploi : mises en garde spéciales :

• faites attention avec NEOPRED®, comprimé effervescent : mises en garde spéciales

• médicament doit être pris sous stricte surveillance médicale

NT LE TRAITEMENT :

Instructions pour un bon usage ; Sans objet.

Poseologie, Mode et/ou voie(s) d'administration du traitement :

Posologie

NEOPRED® 20 mg est adapté aux traitements courte durée nécessitant des doses moyennes ou plus de 10 kg.

NEOPRED® 5mg est indiqué pour les traitements d'entretien. La dose à utiliser est déterminée par votre médecin, en fonction de la maladie traitée.

Elle est strictement individuelle.

Il est très important de suivre régulièrement le traitement et d'en arrêter brutalement sans l'avis de votre médecin.

Mode et voie d'administration :

Vole orale.

En général, dissoudre les comprimés dans un verre d'eau en cours du repas. Respecter la prescription de votre médecin.

Durée du traitement :

Elle est déterminée par votre médecin.

En cas de traitement prolongé, ne pas arrêter brutalement le traitement sans l'avis de votre médecin pour la diminution des doses.

Symptômes et instructions en cas de surdosage : Sans objet.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses :

Si vous oubliez de prendre NEOPRED®, comprimé effervescent. Pour être efficace, ce médicament doit être utilisé régulièrement. Cependant, si vous avez omis une dose, continuez le traitement normalement. Risque de syndrome de sevrage. Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Description des effets indésirables :

Comme tous les médicaments, NEOPRED® comprimé effervescent est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet. Ce médicament, indispensable à votre santé, est le plus souvent bien toléré lorsque l'on suit les recommandations et notamment le régime pauvre en sel, en sucre et riche en protéines.

Il peut néanmoins entraîner, selon la dose et la durée du traitement, des effets indésirables plus graves.

Les plus fréquemment rencontrés sont :

- Modification de certains paramètres biologiques (sel, sucre, potassium) pouvant nécessiter un régime ou un traitement complémentaire.
- Apparition de bleus.
- Elevation de la tension artérielle, rétention d'eau et de sel pouvant entraîner une insuffisance cardiaque.
- Troubles de l'humeur: excitation, euphorie, troubles du sommeil.
- Syndrome de Cushing: une prise de corticoïdes peut se manifester par une prise de poids, un gonflement et une rougeur du visage, une poussée excessive des poils.
- Fragilité osseuse: ostéoporose, fractures.
- Atteintes dououreuses des os au niveau de l'articulation de la hanche (ostéonécrose).

D'autres effets beaucoup plus rares, ont été observés :

- Risque d'insuffisance de sécrétion de la glande surrénale.
- Retard de croissance chez l'enfant.
- Troubles des règles,
- Faiblesse musculaire, rupture des tendons surtout en association avec les fluoroquinolones (antibiotiques).
- Troubles digestifs : ulcère digestif, hémorragies et perforations digestives, pancréatites surtout chez l'enfant.
- Fragilisation de la peau, retard de cicatrisation, acné.
- Confusion, convulsions, état dépressif à l'arrêt du traitement.

LOT 210100
EXP 01/24
PPV 24.40 DH

Ins

opaux

ELUSEDAL PARACETAMOL 100 mg, suppositoire
ELUSEDAL PARACETAMOL 250 mg, suppositoire
ELUSEDAL PARACETAMOL 500 mg, suppositoire

ment cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des
nutes pour votre traitement.

questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre
armacien.

- Ce médicament peut être utilisé en automédication c'est-à-dire sans consultation ni prescription d'un médecin.
- Si les symptômes persistent, s'ils s'aggravent ou si de nouveaux symptômes apparaissent, demandez l'avis de votre pharmacien ou de votre médecin.
- Cette notice est faite pour vous aider à bien utiliser ce médicament. Gardez-la, vous pourriez avoir besoin de la relire.

NE LAISSEZ PAS CE MEDICAMENT A LA PORTEE DES ENFANTS.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE COQUELUSEDAL PARACETAMOL, suppositoire ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER COQUELUSEDAL PARACETAMOL, suppositoire ?
3. COMMENT UTILISER COQUELUSEDAL PARACETAMOL, suppositoire ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER COQUELUSEDAL PARACETAMOL, suppositoire ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE COQUELUSEDAL PARACETAMOL, suppositoire ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Ce médicament est un antipyrrétique, antalgique et antitussif.

Il est indiqué dans :

- le traitement de la douleur et/ou fièvre telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures,
- le traitement de la fièvre au cours des affections bronchiques aiguës bénignes telles que la toux.

en cas
si vous
Ce traite
destiné
Ne pas p
Cette sp
chez le n
Ce médic
Précauti
Ce médic
sodium.
Ce médic
Ce médic
En cas d'
En cas de
En cas de
Enfants :

PPV (DH) :

LOT N° :

18,00

UT. AV. :

jours.

t l'expectoration ; la prise simultanée d'un médicament de traitement par ce médicament. Des accidents neurologiques à type de convulsions préconisées. provoquer des réactions allergiques.

prendre en compte chez les patients contrôlant leur apport alimentaire en

sucre saccharose par dose. Ceci doit être pris en compte chez les patients diabétiques.

En cas d'hyperglycémie ancienne ou récente, DEMANDER CONSEIL A VOTRE MEDECIN.

En cas de doute, ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Enfants :

Sans objet.

8. Interactions

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS notamment avec les médicaments (disulfirame, certains antibactériens, certains antifongiques) entraînant une réaction antabuse avec l'alcool (chaleur, rougeur, vomissement, palpitations), les dépresseurs du système nerveux central (antidépresseurs, antihistaminiques, anxiolytiques, neuroleptiques, morphiniques, certains antihypertenseurs), les médicaments destinés au traitement du diabète (chlorpropamide, glibenclamide, glipizide, insulin, metformine, sulfamides hypoglycémiants), IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

9. Utilisation en cas de grossesse et d'allaitement ;

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Il est préférable de ne pas administrer ce médicament pendant la grossesse. Cependant, aucun effet indésirable n'a été rapporté au cours de la grossesse.

Par prudence, éviter l'administration de ce médicament pendant l'allaitement. En cas d'allaitement, il est préférable de ne pas utiliser ce médicament.

10. Les effets possibles du traitement sur la capacité à conduire un véhicule ou à utiliser certaines machines :

L'altération de la vigilance liée à la présence d'alcool peut rendre dangereuse la conduite de véhicules ou l'utilisation de machines.

11. Symptômes et conduite à tenir en cas de surdosage :

Arrêtez le traitement et consultez rapidement votre médecin.

12. Conduite à tenir en cas d'omission d'une ou plusieurs doses :

Sans objet.

13. Mention, si nécessaire, d'un risque de syndrome de sevrage :

Sans objet.

- Conditions de prescription et de délivrance :

Médicament non soumis à prescription médicale.

- Précaution particulières de conservation

Sans objet.

Après la première ouverture du flacon : 15 jours

- Tenir hors de la portée des enfants

- Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte

- La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le : 07/2018

CECI EST UN MEDICAMENT.

UN MEDICAMENT N'EST PAS UN PRODUIT COMME LES AUTRES.

Il vous concerne, vous et votre santé.

Le médicament est un produit actif.

Une longue recherche a permis de découvrir son activité, mais son absorption n'est pas toujours sans danger.

Il ne faut jamais abuser des médicaments.

Il ne faut utiliser les médicaments qu'à bon escient.

Utiliser les médicaments prescrits comme vous le conseille votre médecin.

Il sait quels sont les médicaments dont vous avez besoin.

Exécutez exactement les prescriptions de son ordonnance : suivez le traitement prescrit, ne l'interrompez pas, ne le reprenez pas de votre propre initiative.

VOTRE PHARMACIEN CONNAIT LES MEDICAMENTS : suivez ses conseils.

Il ne s'agit pas pour vous de prendre des médicaments en quantité importante.

Il s'agit pour vous de prendre les médicaments dont vous avez besoin.

Fabriqué par :



COOPER
PHARMA

774.045.11.20