

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR TIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## ditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## rmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## iologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## ique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## ducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## ntaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

## maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

**MUPRAS** : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge  
Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - [www.mupras.com](http://www.mupras.com)



## Déclaration de Maladie

N° M21- 0055611

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

### Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 7020 Société : RAM

Actif  Pensionné(e)  Autre : 106206

Nom & Prénom : Salah Batassa

Date de naissance : 07/01/1960

Adresse : HAY AL Qods Res. ELF AGR 1MM 01 NR 05 SB

cas

Tél. : 06 84 33 35 70 Total des frais engagés : ..... Dhs

### Cadre réservé au Médecin



Cachet du médecin :

Date de consultation : / /

Nom et prénom du malade : ZELATI MINA Age :

Lien de parenté :  Lui-même  Conjoint  Enfant

Nature de la maladie : off renal

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature de l'adhérent(e) : .....

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficie	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
1 JAN. 2012	C		130 A	 Dr. BELKOUK Hassane ECHOGRAPHIE OMNIPRATICIEN 10, Chem. Bd (H) Sidi Bernou 2738 - Casablanca

## EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE CHAILLAIS	12/10/2022	127,00

## ANALYSES - RADIOGRAPHIES

## AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan d'explorations complémentaires.

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECU

Docteur Hassan BELKOUK

Lauréat de la Faculté,  
de Médecine de Casablanca

Diplômé D'echographie  
Générale de la F. M. C

Diplôme d'Expertise  
Médicale de la F. M. C

**MEDECINE GENERALE**

Tél: 05 22 75 07 38

الدكتور حسن بلوك

خريج كلية الطب بالمركز الجامعي  
ابن رشد بالبيضاء

دبلوم الفحص بالصدى كلية  
الطب بالبيضاء

دبلوم الخبرة الطبية  
كلية الطب بالبيضاء

الطب العام

الهاتف: 05 22 75 07 38

Casablanca, le : 14 JAN. 2022

البيضاء في

Zerjati  
mina

RPV :

LOT :

EXP :

38,20

**ARMACIE GHOUFRANE**  
Dr. HRIOUA LAÏLA  
Rue 2 N° 116 Bloc (C)  
ter Al Qods Sidi Bernoussi  
Casablanca

BELKOUK Hassan  
ECHOGRAPHIE  
OMNIPRATICIEN  
4, Hay El Qods Bd.(H) Sidi Bernoussi

شارع نابولس الرقم 144 - حي القدس - سيدى البرنوصي - الدار البيضاء

Boulevard NABOULS N°144, Hay EL QODS - Sidi Bernoussi - CASABLANCA

Dénomination du médicament :

**Voltarène® 25 mg, Voltarène® 50 mg**  
Comprimés enrobés. Boîtes de 30  
Diclofénac sodique  
**Voltarène® 100 mg**

Suppositoires. Boîte de 5 & 10  
Diclofénac sodique

 NOVARTIS



Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourrez avoir besoin de la relire.  
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'information à votre médecin ou votre pharmacien.

- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que VOLTAREN® et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser VOLTAREN® ?
3. Comment utiliser VOLTAREN® ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver VOLTAREN® ?
6. Informations supplémentaires

**1. Qu'est-ce que VOLTAREN® et dans quel cas est-il utilisé ?**

Voltarène est un antiinflammatoire non stéroïden ayant des propriétés anti-inflammatoires et analgésiques.

L'utilisation de Voltarène soulage les symptômes de l'inflammation, comme la douleur et l'enflure, en bloquant la synthèse des molécules (prostaglandines) qui sont responsables de l'inflammation, de la douleur et de la fièvre. Mais il ne peut éliminer les causes.

Voltarène est utilisé sur prescription médicale dans les affections rhumatismales, par exemple dans les affections articulaires, les crises de crises de goutte, les états douloureux du dos et de la colonne cervicale, les rhumatismes des tissus mous, les inflammations et douleurs après une blessure (p.ex. entorse, élongation), les inflammations et douleurs après une intervention chirurgicale orthopédique ou dentaire, les douleurs et inflammations en gynécologie, les crises de migraine (suppositoires seulement), traitement complémentaire lors de diverses infections aiguës douloureuses, en particulier au niveau des oreilles, du nez et de la gorge.

Si l'on dépasse d'une maladie cardiaque ou avec des risques importants de maladie cardiaque, votre médecin réévaluera à intervalles réguliers la poursuite du traitement par Voltarène, en particulier si votre traitement dure plus de 4 semaines.

**2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser VOLTAREN® ?**

**• Ne prenez jamais Voltarène**

Voltarène ne doit pas être utilisé si vous êtes allergique à l'un de ses composants ou si vous avez déjà développé une défense respiratoire ou des réactions de la peau du type urticaire (éruption de vésicules) ou de la goutte (éruption de vésicules du cou et/ou des extrémités (signes d'un angioédème)) après la prise d'acide acétylsalicylique ou d'autres médicaments antiinflammatoires ou antiinflamatoires, qu'on appelle anti-inflammatoires non stéroïdiens; durant le dernier trimestre de la grossesse; en cas d'ulcères actifs de l'estomac ou de l'estinat grêle (ulcères duodénal), de saignements ou de perforations de l'estomac ou de l'intestin grêle ou encore de symptômes tels que sang dans les selles ou selles noires; en cas de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (maladie de Crohn, colite ulcéreuse); en cas de défaillance de la fonction hépatique ou rénale; en cas de maladie cardiaque ou de maladie pulmonaire; lors du traitement des douleurs suivant une opération de by-pass cardiaque (utilisation du circuit extracorporelle). Les suppositoires ne doivent pas être utilisés en cas de rectite (inflammation de l'extrémité

(inflammation de l'intestin) avec saignements et

goutte, le signaler à votre

électricien si ce médicament

comprimés à 50 mg et les

enfants de moins de 14

mandez conseil à votre

docteur si l'apparition des

ulcères de l'estomac ou de l'intestin

ou de l'estinat grêle, ou si

importe quand durant le

travail, le signaler à votre

électricien si ce médicament

comprimés à 50 mg et les

enfants de moins de 14

mandez conseil à votre

docteur si l'apparition des

ulcères de l'estomac ou de l'intestin

ou de l'estinat grêle, ou si

importe quand durant le

travail, le signaler à votre

électricien si ce médicament

comprimés à 50 mg et les

enfants de moins de 14

mandez conseil à votre

docteur si l'apparition des

ulcères de l'estomac ou de l'intestin

ou de l'estinat grêle, ou si

importe quand durant le

travail, le signaler à votre

électricien si ce médicament

comprimés à 50 mg et les

enfants de moins de 14

mandez conseil à votre

docteur si l'apparition des

ulcères de l'estomac ou de l'intestin

ou de l'estinat grêle, ou si

importe quand durant le

travail, le signaler à votre

électricien si ce médicament

comprimés à 50 mg et les

enfants de moins de 14

mandez conseil à votre

docteur si l'apparition des

ulcères de l'estomac ou de l'intestin

ou de l'estinat grêle, ou si

importe quand durant le

travail, le signaler à votre

électricien si ce médicament

comprimés à 50 mg et les

enfants de moins de 14

mandez conseil à votre

docteur si l'apparition des

ulcères de l'estomac ou de l'intestin

ou de l'estinat grêle, ou si

importe quand durant le

travail, le signaler à votre

électricien si ce médicament

comprimés à 50 mg et les

enfants de moins de 14

mandez conseil à votre

docteur si l'apparition des

ulcères de l'estomac ou de l'intestin

ou de l'estinat grêle, ou si

importe quand durant le

travail, le signaler à votre

électricien si ce médicament

comprimés à 50 mg et les

enfants de moins de 14

mandez conseil à votre

docteur si l'apparition des

ulcères de l'estomac ou de l'intestin

ou de l'estinat grêle, ou si

importe quand durant le

travail, le signaler à votre

électricien si ce médicament

comprimés à 50 mg et les

enfants de moins de 14

mandez conseil à votre

docteur si l'apparition des

ulcères de l'estomac ou de l'intestin

ou de l'estinat grêle, ou si

importe quand durant le

travail, le signaler à votre

électricien si ce médicament

comprimés à 50 mg et les

enfants de moins de 14

mandez conseil à votre

docteur si l'apparition des

ulcères de l'estomac ou de l'intestin

ou de l'estinat grêle, ou si

importe quand durant le

travail, le signaler à votre

électricien si ce médicament

comprimés à 50 mg et les

enfants de moins de 14

mandez conseil à votre

docteur si l'apparition des

ulcères de l'estomac ou de l'intestin

ou de l'estinat grêle, ou si

importe quand durant le

travail, le signaler à votre

électricien si ce médicament

comprimés à 50 mg et les

enfants de moins de 14

mandez conseil à votre

docteur si l'apparition des

ulcères de l'estomac ou de l'intestin

ou de l'estinat grêle, ou si

importe quand durant le

travail, le signaler à votre

électricien si ce médicament

comprimés à 50 mg et les

enfants de moins de 14

mandez conseil à votre

docteur si l'apparition des

ulcères de l'estomac ou de l'intestin

ou de l'estinat grêle, ou si

importe quand durant le

travail, le signaler à votre

électricien si ce médicament

comprimés à 50 mg et les

enfants de moins de 14

mandez conseil à votre

docteur si l'apparition des

ulcères de l'estomac ou de l'intestin

ou de l'estinat grêle, ou si

importe quand durant le

travail, le signaler à votre

électricien si ce médicament

comprimés à 50 mg et les

enfants de moins de 14

mandez conseil à votre

docteur si l'apparition des

ulcères de l'estomac ou de l'intestin

ou de l'estinat grêle, ou si

importe quand durant le

travail, le signaler à votre

électricien si ce médicament

comprimés à 50 mg et les

enfants de moins de 14

mandez conseil à votre

docteur si l'apparition des

ulcères de l'estomac ou de l'intestin

ou de l'estinat grêle, ou si

importe quand durant le

travail, le signaler à votre

électricien si ce médicament

comprimés à 50 mg et les

enfants de moins de 14

mandez conseil à votre

docteur si l'apparition des

ulcères de l'estomac ou de l'intestin

ou de l'estinat grêle, ou si

importe quand durant le

travail, le signaler à votre

électricien si ce médicament

comprimés à 50 mg et les

enfants de moins de 14

mandez conseil à votre

docteur si l'apparition des

ulcères de l'estomac ou de l'intestin

ou de l'estinat grêle, ou si

importe quand durant le

travail, le signaler à votre

électricien si ce médicament

comprimés à 50 mg et les

enfants de moins de 14

mandez conseil à votre

docteur si l'apparition des

ulcères de l'estomac ou de l'intestin

ou de l'estinat grêle, ou si

importe quand durant le

travail, le signaler à votre

électricien si ce médicament

comprimés à 50 mg et les

enfants de moins de 14

mandez conseil à votre

docteur si l'apparition des

ulcères de l'estomac ou de l'intestin

ou de l'estinat grêle, ou si

importe quand durant le

travail, le signaler à votre

électricien si ce médicament

comprimés à 50 mg et les

enfants de moins de 14

mandez conseil à votre

docteur si l'apparition des

ulcères de l'estomac ou de l'intestin

ou de l'estinat grêle, ou si

importe quand durant le

travail, le signaler à votre

électricien si ce médicament

comprimés à 50 mg et les

enfants de moins de 14

mandez conseil à votre

docteur si l'apparition des

ulcères de l'estomac ou de l'intestin

ou de l'estinat grêle, ou si

importe quand durant le

travail, le signaler à votre

électricien si ce médicament

comprimés à 50 mg et les

enfants de moins de 14

mandez conseil à votre

docteur si l'apparition des

ulcères de l'estomac ou de l'intestin

ou de l'estinat grêle, ou si

importe quand durant le

travail, le signaler à votre

électricien si ce médicament

comprimés à 50 mg et les

enfants de moins de 14

mandez conseil à votre

docteur si l'apparition des

ulcères de l'estomac ou de l'intestin

ou de l'estinat grêle, ou si

importe quand durant le

travail, le signaler à votre

électricien si ce médicament

comprimés à 50 mg et les

enfants de moins de 14

mandez conseil à votre

docteur si l'apparition des

ulcères de l'estomac ou de l'intestin

ou de l'estinat grêle, ou si

importe quand durant le

travail, le signaler à votre

électricien si ce médicament

comprimés à 50 mg et les

enfants de moins de 14

mandez conseil à votre

docteur si l'apparition des

ulcères de l'estomac ou de l'intestin

ou de l'estinat grêle, ou si

importe quand durant le

travail, le signaler à votre

électricien si ce médicament

comprimés à 50 mg et les

enfants de moins de 14

mandez conseil à votre

docteur si l'apparition des

ulcères de l'estomac ou de l'intestin

# Codoliprane®

## PARACETAMOL ET CODEINE

comprimé sécable

## IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

## COMPOSITION

Paracétamol .....	*	400,00 mg
Phosphate de codeïne hémihydraté .....		20,00 mg
(Quantité correspondant à codeïne base) .....		15,62 mg
Excipients : gélatine, acide stéarique, amidon de pomme de terre, povidone, pour un comprimé.		

## FORME PHARMACEUTIQUE

#### Comprimé sécable - boîte de 16.

## **CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE**

#### **ANTALGIQUE CENTRAL ET PERIPHERIQUE (N. Système nerveux central)**

## DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Traitement chez l'adulte des douleurs d'intensité modérée à intense, qui ne sont pas soulagées par l'aspirine ou le paracétamol utilisé seul.

## **DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT**

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- allergie connue au paracétamol ou à la codeine,
  - maladie grave du foie,
  - chez l'asthmatique,
  - en cas d'insuffisance respiratoire,
  - allaitement.

CE MEDICAMENT NE DOIT GENERALEMENT PAS ETRE UTILISE, sauf avis contraire de votre medecin avec des medicaments contenant de la buprenorphine, de la nalbuphine ou de la pentazocine. EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

## MISES EN GARDE SPECIALES

En cas de maladie chronique (au long cours) des bronches ou des poumons s'accompagnant d'expectoration, en cas de maladie du foie ou d'insuffisance rénale ainsi que chez les sujets âgés, un avis médical est indispensable. Ne pas utiliser ce médicament de façon prolongée en raison du risque de dépendance.

## PRÉCAUTION D'EMPLOI

La prise de boissons alcoolisées durant le traitement est déconseillée.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

## INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, NE PAS PRENDRE EN MATEMMENT AVEC LA BUPRÉNORPHINE, LA NALBUPHINE OU LA PENTAZOCINE. IL FAUT SIGNALER SYMPTÔMES TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MÉDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

PPV:22DH20  
PER:11/23  
LOT:K3399

...dine. D'autres médicaments en contiennent. Les doses maximales conseillées (cf. posologie).