

# **RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS**

## **Conditions générales :**

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## **Pharmacie :**

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## **Biologie et Biologie :**

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## **Optique :**

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## **Education :**

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## **Prothèse :**

En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

## **Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :**

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## **Adresses Mails utiles**

Reclamation : contact@mupras.com

Mise en charge : pec@mupras.com

adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données personnelles.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

## Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 11445 Société :

Actif  Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : SAMANI HICHAM

Date de naissance :

Adresse :

Tél. : 066.00168.03 Total des frais engagés : ..... Dhs

## Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : ..... / ..... / .....

Nom et prénom du malade : ..... Age : .....

Lien de parenté :  Lui-même  Conjoint  Enfant

Nature de la maladie : .....



En cas d'accident préciser les causes et circonstances .....

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature de l'adhérent(e) :





**SAHAM**  
Assurance

member of Sanlam group

## DECOMPTE DE REMBOURSEMENT DESTINE A L'ASSURE

<b>Police N°</b>	: 0600996886	<b>Contractante</b>	: Centrale Automobile Cherifienn
<b>Assuré</b>	: Safaa Errach	<b>Date de réception de la déclaration</b>	: 03/01/2022
<b>N° Adhésion</b>	: 309	<b>Date de validation</b>	: 04/01/2022
<b>Personne soignée</b>	: Safaa Errach	<b>Date de survenance</b>	: 21/12/2021
<b>Sinistre N°</b>	: 5204164	<b>Déclaration N°</b>	: 13766768A
<b>Bordereau N°</b>	: 827598	<b>Médecin Traitant</b>	: FICHTALI KARIMA

Nature de soins	Frais engagés	Coefficient	Valeur	Base de remboursement (a)	Frais remboursés par le premier assureur	Taux de remboursement (b)	Frais remboursés (c)=(a)*(b)
CONSULTATION / SPECIALISTE	300.00	NA	NA	300.00	NA	85.00 %	255.00
MEDICAMENTS	913.40	NA	NA	816.40	NA	85.00 %	693.94
RADIOGRAPHIE	300.00	NA	NA	300.00	NA	85.00 %	255.00
<b>Totaux</b>	<b>1 513.40</b>			<b>1 416.40</b>			<b>1 203.94</b>

### Détail explicatif des soins non remboursés

Nature du soin non remboursé	Montant du soin non remboursé	Motif du non remboursement
AINARA	97.00	Produits non remboursables
<b>Totaux</b>	<b>97.00</b>	

**Nom du gestionnaire : ANDELGHANI MOUNIR**

**Date de l'édition : 04/01/2022**

- a) Si la nature du soin correspond à une prestation avec une valeur clé (dentaire, analyses, etc.), la base de remboursement est le produit du coefficient de remboursement par la valeur clé.  
 Si la nature du soin ne correspond pas à une prestation avec valeur clé, la base de remboursement est issue de la Nomenclature générale des actes professionnels marocaine.
- b) Le taux de remboursement est le taux de couverture garanti défini pour chaque prestation dans le contrat.  
 c) Les frais remboursés ne peuvent pas dépasser le solde restant du plafond général ou le solde restant du plafond de la prestation.

**s importantes****par personne et par maladie**

doit comporter les cachets du médecin traitant, les noms et les soignée (bénéficiaire) inscrits de manière distincte.

doit être accompagnée de la prescription des médicaments, et de laboratoire, ainsi que toutes

de la personne malade doivent être signées par les praticiens eux-mêmes, siége.

cernant une maladie doivent être dans les trois mois au plus tard à l'entrée médicale.

éclarer les causes, circonstances,

nettes et PPM concernant les deux joints aux ordonnances.

en médicale ou chirurgicale, la doit être accompagnée d'une quitté sur laquelle devront être inscrits les actes, la ventilation des frais ours d'hospitalisation et le détail des étiologies.

s d'honoraires et ordonnances remis sont conservés par la Compagnie.

ne d'assurances et de réassurance au capital social de 411.687.400 de DH. Entreprise régie par la loi n°17-99 portant code des assurances \* siège social Casablanca Maroc \* RC Casablanca :22.341.CNSS :167.8541\*Taxe professionnelle:355.11.249-IF:01084025-ICE:000230054000034\*Tél:0522.43.56.00 \*Fax:0522.20.60.81

N°13766768

Police n°:

Adhésion n°:

- Tout dossier retourné pour complément d'informations doit être retransmis à la Compagnie dans un délai d'un mois.
- Pli confidentiel : dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, en préciser la nature sous pli cacheté à l'attention du médecin-conseil de la Compagnie.
- L'indemnité forfaitaire couvrant les frais de grossesse et de maternité est payable sur présentation d'un extrait d'acte de naissance du nouveau né.
- Lorsque la personne bénéficiaire d'un premier remboursement auprès d'un régime de prévoyance, l'assuré(e) doit remettre à la Compagnie les photocopies des pièces justificatives et l'original du décompte de règlement délivré par cet organisme.
- Afin de proroger la garantie des enfants âgés de plus de 21 ans, l'assuré doit produire annuellement un certificat de scolarité correspondant à l'année d'assurance considérée.
- Dans le cas où le conjoint de l'assuré ne bénéficierait d'aucun régime de prévoyance, demander le questionnaire relatif à la prise en charge du conjoint et/ou des enfants. Ce document doit nous être retourné dûment rempli et accompagné des pièces justificatives nécessaires.
- Réclamations : toute réclamation doit être formulée au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la date de dépôt du dossier maladie.
- Toute fausse déclaration est passible des sanctions prévues par la Loi.

Maladie Maternité Optique Traitements spéciaux **Société contractante**

Société contractante :

Cachet de la société contractante

N° de police :

N° d'adhésion :

N° d'adhésion du conjoint :

**Renseignements concernant l'assuré(e)**Nom : *ERRACI*

Prénom(s) :

*SAFIA  
11/02/1988*

N° de C.I.N. :

Date de naissance :

Adresse :

Ville :

*0655301678  
Casablanca*Montant des frais engagés : *1513,40*

DH N° GSM

**J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration.****Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.**

Fait à :

*Casablanca , le 21/12/2021***Signature de l'assuré(e)****Clause « Protection des données personnelles »**

Les données personnelles demandées par l'assureur ont un caractère obligatoire pour obtenir la souscription du présent contrat et l'exécution de l'ensemble des services qui y sont rattachés. Elles sont utilisées exclusivement à cette fin par les services de l'assureur et les tiers autorisés. La durée de conservation de ces données est limitée à la durée du contrat d'assurance et à la période postérieure pendant laquelle leur conservation est nécessaire pour permettre à l'assureur de respecter ses obligations en fonction des délais de prescription ou en application d'autres dispositions légales. Par ailleurs, la communication des informations de l'assuré/souscripteur est limitée aux communications obligatoires en fonction des obligations légales et réglementaires qui s'imposent à l'assureur et aux tiers légalement autorisés à obtenir les dites informations. L'assureur garantit notamment le respect de la loi n°09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Les données sont protégées aussi bien sur support physique qu'électronique, de telle sorte que leur accès soit impossible à des tiers non autorisés. L'assureur s'assure que les personnes habilitées à traiter les données personnelles connaissent leurs obligations légales en matière de protection de ces données et s'y tiennent. Les données à caractère personnel peuvent à tout moment faire l'objet d'un droit d'accès, de modification, de rectification et d'opposition auprès du siège social de SAHAM Assurances, sis au 216, Boulevard Zerkouni - 20000 CASABLANCA -Tél : 0522.43.56.00 - MAROC. De manière expresse, l'assuré/souscripteur autorise l'assureur à utiliser ses coordonnées à des fins de prospections commerciales en vue de proposer d'autres services d'assurance. Il peut s'opposer par courrier à la réception de sollicitations commerciales.

SAHAM Assurance, Société anonyme d'assurances et de réassurance au capital social de 411.687.400 de DH. Entreprise régie par la loi n°17-99 portant code des assurances \* siège social 216, Boulevard Zerkouni-20000 Casablanca Maroc \* RC Casablanca :22.341.CNSS :167.8541\*Taxe professionnelle:355.11.249-IF:01084025-ICE:000230054000034\*Tél:0522.43.56.00 \*Fax:0522.20.60.81

**VOLET DÉTACHABLE**

Déclaration de maladie

N°13 766768

Police n°:

Adhésion n°:

ecin

nts concernant le patient

Prénom(s) du patient : *Saïd*  
 Lien de parenté avec l'assuré(e) :  
 Indiquer la cause :  
 , le *10/06/2021*

mplir par le Médecin)

Nature et coefficient	Montant détaillé des honoraires	Signature et cachet du médecin attestant le paiement des actes
	<i>600 DH</i>	<i>Dr. SAÏD KHALIL Gynécologue - Obstétricien Casablanca</i>

ances (à remplir par le Pharmacien)

Montant de la facture	Cachet du pharmacien attestant le paiement de la facture
<i>913.40</i>	<i>PHARMACIE MAZOLA Mme BEN ABBAS Ibtissam Casablanca</i>

Analyses - Radiographies

Date de l'ordonnance	Désignation des coefficients	Montant des honoraires	Signature et cachet du laboratoire ou du radiologue

Actes médicaux ou paramédicaux - Auxiliaires médicaux

Devis  Nombre de séances : ..... Établi le : .....  
 Facture  Nombre de séances : ..... Établi le : .....

Date des soins	Nombre				Montant détaillé des honoraires	Signature et cachet du praticien - N° d'autorisation d'exercer au Maroc
	AM	PC	IM	IV		

Cadre réservé à SAHAM Assurance

Médecin conseil	Fiche dossier



# HOPITAL CHEIKH KHALIFA IBN ZAID

## FACTURE

N° **152 793 / 2021** du **21/12/2021**

Nom patient : **ERRAGH SAFAA**

Entrée **21/12/2021**

Prise en charge : **PAYANTS**

Sortie **21/12/2021**


	Nombre	Lettre Clé	Prix Unitaire	Montant
<i>PRESTATIONS INTERNES</i>				
CONSULT SPECIALITE GYNECO+ECHO	<b>1,00</b>	CS	<b>600,00</b> Sous-Total	<b>600,00</b> 600,00
<b>Total Frais Clinique</b>				<b>600,00</b>

*Arrêtée la présente facture à la somme de :*

SIX CENTS DIRHAMS

**Total 600,00**

Encaissements						<b>Total encaissé</b>	<b>Solde</b>
							<b>600,00</b>





Date : 21/04/2021

Quittance - Paiement espèces 0630707

IPP : .....

N° D'admission : ..... Montant : 600,00 DA

Patient : Bnraou Sajaa .....

Cachet



4) Atenarca

60.000 x 9

application (j)



5) Forflex

1 cp/jours



pendant 3 mois.

91345

PHARMACIE MAZOLA  
Mme BENAZIZ SUZ Ibtissam  
N° 517 route de Mazola  
H.27 - 44350 - Casablanca  
T.0524 75 18 18

Le : 21/12/21

وصفة طبية

## Ordonnance

Casablanca, le :

Ave Léonard Safaa

57.00

1) Digynone 500   
1cp x 3/j pendant 5j


49.60

2) D cure forte   
1 aponie (Mois)

84.90 x 2

pendant 4 mois   
3) Dufaston pendant  
du j15 au j25 3ans

N° 51 Rue 4 Mazoula  
Hay Hassani - Casablanca  
Tél. 02 33 33 89

  
Dr. Kamal NACIRI  
Professeur d'Angiologie  
et de Radiologie  
Spécialiste en Angiologie et Radiologie



## I. QU'EST CE QUE AINARA ?

**Ainara** est un gel hydratant mucoadhésif utilisé pour soulager des symptômes d'atrophie vulvo-vaginale, sécheresse vaginale et l'inconfort associés, qui peuvent survenir pendant la grossesse, l'accouchement, la ménopause ou résultant de l'irritation physique, chimique ou altération de la flore vaginale normale ou associés à l'utilisation des contraceptifs oraux ou autres médicaments.

La sécheresse vulvo-vaginale est provoquée par une diminution de l'hydratation naturelle du vagin suite d'une réduction du taux d'oestrogène et résultante de l'irritation physique ou chimique ou par altération de la microflore vaginale normale. Les troubles vaginaux les plus fréquents sont des démangeaisons, irritation, brûlure et dyspareunie (douleur pendant les rapports sexuels).

**Ainara**, grâce à la présence de molécules bio-adhésives dans sa composition, crée une couche mince hydratante sur la paroi vaginale de la muqueuse, sans laisser des résidus ni des tâches après l'application.

**Ainara** est un gel à base d'eau, inodore, transparent et avec une texture agréable. Il présente une bonne tolérance vaginale. Il est compatible avec l'utilisation des préservatifs.


## II. COMMENT UTILISER AINARA ?

Laver les mains avant et après l'utilisation de Ainara.

**Ainara** est appliquée à l'intérieur du vagin à l'aide d'un applicateur, préalablement rempli avec 1 g de gel.

Il est recommandé d'utiliser **Ainara** deux fois par semaine ou il peut être utilisé quotidiennement en cas de besoin jusqu'à 12 semaines. Si les symptômes persistent, consultez votre médecin.

L'image ci-dessous montre les composants de la boîte.



Lot : 107  
Date : 2024-03  
PPC : 97,00 Dhs

## Dydrogestéron

### Dydrogestéron

# Duphaston®

10 mg, comprimé pelliculé

Dydrogestéron

- Qu'est-ce que Duphaston 10 mg comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?**
- Duphaston contient l'ingrédient actif dydrogénostéron. La dydrogénostéron est une hormone progestagénique féminine. Les hormones progestagéniques ont le même effet que la progesterone naturelle. Elle régule avec les hormones oestrogéniques le cycle menstruel.
- Duphaston 10 mg comprimé pelliculé est utilisé :**
- Pour les problèmes de progestation : pour corriger le cycle menstruel irrégulier ;
  - pour traiter des anomalies de la muqueuse de l'utérus en dehors de l'utérus (endométriose) : infertilité due à un faible niveau de progestérone ;
  - pour traiter la phase lutéale dans le cadre des cycles induits pendant les traitements de fertilité ;
  - limiter le risque d'une menace de fausse couche ou si vous avez eu des fausses couches à répétition.
- Thérapie hormonale de substitution (THS)**
- Duphaston 10 mg comprimé pelliculé est également utilisé en combinaison avec des oestrogènes : afin d'éviter des symptômes de la ménopause.
- Votre corps équilibre normalement la quantité d'hormones naturelles de progestérone et d'oestrogène (l'autre hormone féminine).

- Le nombre de comprimés que vous prenez et les périodes dépendront de ce que vous traitez. Si vous n'avez pas de périodes naturelles, le jour 1 de votre cycle c'est quand commencer le jour 1 du Cycle et quand commencer à prendre vos comprimés que vous prenez et les périodes.
- Prenez 1 comprimé par jour. Faites cela, à partir de la deuxième jour de votre prochain cycle.

- Si vous avez cessé d'avoir des périodes exceptionnellement abondantes et/ou irrégulières, pour éviter des symptômes de la ménopause.
- Votre corps équilibre normalement la quantité d'hormones naturelles de

**Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

Gardez cette notice. Vous pourrez avoir besoin de la relire.

- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

#### Que contient cette notice

1. Qu'est-ce que Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ce médicament ?
3. Comment prendre ce médicament ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ce médicament ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

#### Qu'est-ce que Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?

Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé contient une substance active appelée dydrogénostéron.

La dydrogénostéron est une hormone progestagénique féminine. Les hormones progestagéniques ont le même effet que la progesterone naturelle. Elle régule avec les hormones oestrogéniques le cycle menstruel.

#### Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé est utilisé :

##### Pour les problèmes que vous pourriez avoir lorsque votre corps ne produit pas suffisamment de progestérone :

- contrôler le cycle menstruel irrégulier ;
- croissance de la muqueuse utérine en dehors de l'utérus (endométriose) ;
- menstruations douloureuses ;
- infertilité due à un faible niveau de progestérone ;
- soutien de la phase lutéale dans le cadre des cycles induits lors d'un traitement de fécondation assistée.
- limiter le risque d'une menace de fausse couche ou si vous avez eu des fausses couches à répétition.

#### Thérapie hormonale de substitution (THS)

Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé est également utilisé en combinaison avec des oestrogènes :

- afin d'éviter des anomalies de la muqueuse de l'utérus lors du traitement des symptômes de la ménopause ;
- si vous avez cessé d'avoir vos menstruations avant la ménopause ;
- pour des menstruations exceptionnellement abondantes et/ou irrégulières.

Votre corps équilibre normalement la quantité d'hormones naturelles de progestérone et d'oestrogène (autre hormone féminine). Si votre corps ne produit pas suffisamment de progestérone, Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé, compense et rétablit l'équilibre.

Votre médecin peut également vous demander d'utiliser des oestrogènes en plus de Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé. Cela dépend de la raison pour laquelle vous utilisez Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé.

Pour certaines femmes utilisant un traitement hormonal substitutif (THS), prendre seulement un oestrogène peut provoquer un épaissement anormal de la muqueuse utérine. Cela peut aussi être le cas si vous avez subi une ablation de l'utérus et/ou avez des antécédents d'endométriose (présence de muqueuse utérine en dehors de l'utérus). Prendre Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé pendant une partie de votre cycle mensuel permet d'éviter un épaissement de votre muqueuse utérine.

Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé peut être pris avec ou sans nourriture.

#### Fertilité, grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

**Grossesse :** Il peut y avoir un risque accru d'une anomalie congénitale du pénis impliquant l'ouverture urinaire (hypospadias) chez les enfants dont les mères ont pris certaines progestatifs. Cependant, ce risque accru n'a pas été clairement confirmé. Plus de 9 millions de femmes ont pris Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé. A ce jour, il n'y avait aucune indication que l'utilisation de Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé pendant la grossesse a un effet nocif. Allaitement : On ne sait pas si Duphaston passe dans le lait maternel et affecte l'enfant. On étudie d'autres progestatifs montrent que de petites quantités passent dans le lait maternel.

Il n'y a aucune indication que Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé diminue la fertilité, s'il est pris comme recommandé par votre médecin.

#### Conduite de véhicules et utilisation de machines

Vous pouvez vous sentir un peu somnolent ou avoir des sensations vertigineuses après la prise de Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé. En particulier dans les premières heures après la prise. Si cela arrive, ne conduisez pas ou n'utilisez pas de machines. Attendez de voir comment vous réagissez, avant de conduire ou d'utiliser des machines.

#### Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé contient du lactose

Si vous avez une intolérance à certains sucres, parlez-en à votre médecin avant de prendre ce médicament. Cela inclut les problèmes transmis dans les familles qui affectent la façon dont le corps utilise le lactose, comme un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose-galactose.

#### Comment prendre ce médicament ?

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

- Prendre ce médicament**
- Avalez le comprimé avec de l'eau. - Vous pouvez prendre les comprimés avec ou sans nourriture. - Si vous devez prendre plus d'un comprimé, les répartir sur la journée. Par exemple, prendre un comprimé le matin et un le soir.
  - Essayez de prendre les comprimés au même moment chaque jour afin d'être sûr d'avoir une quantité de produit constante dans votre corps.
  - La ligne de sécabilité du comprimé n'est là que pour faciliter la prise du comprimé en facilitant la division, elle ne le divise pas en deux demi-doses égales.

**Posologie :** Le nombre de comprimés que vous prenez et les jours où vous les prenez dépendront de ce que vous prenez et les jours où vous les prenez.

- Pour réguler votre cycle menstruel**
- Prenez 1 comprimé par cycle jusqu'au premier. La journée de début de cycle commence à la prise du comprimé.
  - Pour traiter l'endométriose (présence de muqueuse utérine en dehors de l'utérus) :
    - Prenez 1 à 3 comprimés par jour.
    - Il vous sera demandé soit de prendre vos comprimés tous les jours de votre cycle ou uniquement du 5<sup>ème</sup> au 25<sup>ème</sup> jour du cycle.

Pour les douleurs menstruelles :



6 118000 010517

115912  
maphar  
Km 10, route côtière 111, Quartier industriel  
Zenata, Ain Saba Casablanca - Maroc  
DUPHASTON 10MG CP PEL B20 PPV: 84DH90

boissons  
Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé peut être pris avec ou sans nourriture.

#### Fertilité, grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

**Grossesse :** Il peut y avoir un risque accru d'une anomalie congénitale du pénis impliquant l'ouverture urinaire (hypospadias) chez les enfants dont les mères ont pris certaines progestatifs. Cependant, ce risque n'a pas été clairement confirmé. Plus de 9 millions de femmes enceintes ont pris Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé. A ce jour, aucune preuve n'indique que l'utilisation de Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé pendant la grossesse a un effet nocif.

**Allaitement :** Ne prenez pas Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé si vous allaitez. On ne sait pas si Duphaston passe dans le lait maternel et affecte l'enfant. Les études d'autres progestatifs montrent que de petites quantités passent dans le lait maternel.

**Fertilité :** aucune preuve n'indique que Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé diminue la fertilité, s'il est pris comme recommandé par votre médecin.

#### Conduite de véhicules et utilisation de machines

Vous pouvez vous sentir un peu somnolente ou avoir des sensations vertigineuses après la prise de Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé. En particulier dans les premières heures après la prise. Si cela arrive, ne conduisez pas ou n'utilisez pas de machines. Attendez de voir comment vous affecte Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé, avant de conduire ou d'utiliser des machines.

#### Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé contient du lactose

Si vous avez une intolérance à certains sucre, parlez-en à votre médecin avant de prendre ce médicament. Cela inclut les problèmes rares transmis dans les familles qui affectent la façon dont le corps utilise le lactose, comme un déficit -galactose.

#### 3. Comment prendre ce médicament ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

**Prendre ce médicament**

Avez le comprimé avec de l'eau. Vous pouvez prendre les comprimés avec ou sans nourriture. Si vous devez prendre plus d'un comprimé, les répartir sur la journée.

Par exemple, prendre un comprimé le matin et un le soir.

Essayez de prendre les comprimés au même moment chaque jour afin d'être sûr d'avoir une quantité de produit constante dans votre corps.

Cela vous aidera aussi à ne pas oublier de prendre vos comprimés.

**Mode d'administration :**

Avez le comprimé avec de l'eau.

Vous pouvez prendre les comprimés avec ou sans nourriture.

Si vous devez prendre plus d'un comprimé, les répartir sur la journée.

Par exemple, prendre un comprimé le matin et un le soir.

Essayez de prendre les comprimés au même moment chaque jour afin d'être sûr d'avoir une quantité de produit constante dans votre corps.

Cela vous aidera aussi à ne pas oublier de prendre vos comprimés.

**La ligne de sécabilité du comprimé n'est là que pour faciliter la prise du comprimé en facilitant la division, elle ne le divise pas en deux demi-doses égales.**

**Posologie :**

Le nombre de comprimés que vous prenez et les jours où vous les prenez dépendront de ce que vous prenez et les cycles que vous prenez.

Le comprimé peut également vous demander d'utiliser des œstrogènes en plus de Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé. Cela dépend de la raison pour laquelle vous utilisez Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé.

Pour certaines femmes utilisant un traitement hormonal substitutif (THS), prendre seulement un œstrogène peut provoquer un épaissement anormal de la muqueuse utérine. Cela peut aussi être le cas si vous avez subi une ablation de l'utérus et/ou avez des antécédents d'endométriose (présence de muqueuse utérine en dehors de l'utérus). Prendre Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé pendant une partie de votre cycle mensuel permet d'éviter un épaissement de votre muqueuse utérine.

**Pour réguler votre cycle**

Prenez 1 comprimé par cycle jusqu'au premier.

La journée de début de votre cycle ou uniquement du 5<sup>me</sup> au 25<sup>me</sup> jour du cycle.

**Pour traiter l'endométriose (présence de muqueuse utérine en dehors de l'utérus) :**

- Prenez 1 à 3 comprimés par jour.

- Il vous sera demandé soit de prendre vos comprimés tous les jours de votre cycle ou uniquement du 5<sup>me</sup> au 25<sup>me</sup> jour du cycle.

**Pour les douleurs menstruelles :**



112512  
maphar  
Km 10, route cotière 111, Quartier industriel  
Zerata, Ain Sebaa Casablanca - Maroc  
DUPHASTON 10MG CP PEL B20 PPV: 84DH90

# Duphaston®

10 mg, comprimé pelliculé  
Dydrogéstérone

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

#### Que contient cette notice

- Qu'est-ce que Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ce médicament ?
- Comment prendre ce médicament ?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver ce médicament ?
- Contenu de l'emballage et autres informations.

#### 1. Qu'est-ce que Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?

Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé contient une substance active appelée hydrogéstérone.

La hydrogéstérone est une hormone progestagénique féminine. Les hormones progestagéniques ont le même effet que la progestérone naturelle. Elle régule avec les hormones œstrogènes le cycle menstruel.

#### Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé est utilisé :

Pour les problèmes que vous pourriez avoir lorsque votre corps ne produit pas suffisamment de progestérone :

contrôler le cycle menstruel irrégulier ;

croissance de la muqueuse utérine en dehors de l'utérus (endométriose) ;

menstruations douloureuses ;

infertilité due à un faible niveau de progesterone ;

soutien de la phase lutéale dans le cadre des cycles induits lors d'un traitement de fécondation assistée.

On étudie d'autres progestatifs montrant que de petites quantités passent dans le lait maternel.

Il n'y a aucune indication que Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé diminue votre fertilité, si elle est prise comme recommandé par votre médecin.

Veillez à toujours prendre un peu somnolente ou avoir des sensations

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

machines. Attendez de faire partie de celles dans les premières

Dicynone® 250 mg, Comprimé Boîte de 20  
Dicynone® 500 mg, Comprimé Boîte de 20  
Etamsylate

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous sentez moins bien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que Dicynone®, comprimé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Dicynone®, comprimé ?
3. Comment prendre Dicynone®, comprimé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Dicynone®, comprimé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

#### 1. QU'EST-CE QUE DICYNONE® ET DANS QUOI CAS EST-IL UTILISÉ ?

CLASSE PHARMACOTHÉRAPEUTIQUE

AUTRE HEMOSTATIQUE SYSTEMIQUE - code ATC : B02BX01

Dicynone® 250 mg :

Ce médicament est un antihémorragique et un vasculoprotecteur.  
Il est proposé :

- dans le traitement des saignements de fragilité des petits vaisseaux sanguins et dans les saignements gynécologiques.
- en cas d'intervention chirurgicale pour diminuer les pertes sanguines.

Dicynone® 500 mg :

- Utilisé dans les manifestations fonctionnelles de l'insuffisance veinolymphatique (jambes lourdes, douleurs, impatiences du primaordinaire).
- Utilisé dans le traitement symptomatique des troubles fonctionnels de la fragilité capillaire.
- Traitement d'appoint des ménorrhagies après bilan étiologique.
- Utilisé dans les baisses d'acuité et troubles du champ visuel présumés d'origine vasculaire.

#### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE Dicynone®, comprimé ?

Ne prenez jamais Dicynone®, comprimé :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active (Etamsylate) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.
- Si vous êtes allergique (hypersensible) au blé en raison de la présence d'amidon de blé.

Avertissements et précautions

Dicynone® comprimé avec des aliments et boissons

Sans objet.

Grossesse et allaitement

Les données sur l'utilisation de Dicynone® chez les femmes enceintes sont limitées. Par mesure de précaution, il est préférable d'éviter l'utilisation de Dicynone® pendant la grossesse.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

L'allaitement est déconseillé pendant la durée du traitement.

Sportifs

Sans objet.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet.

Excipients à effet notable

Dicynone® comprimé contient : Amidon de blé et sulfite de sodium.

#### 3. COMMENT PRENDRE Dicynone®, comprimé ?

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Posologie

Dicynone® 250 mg

Adultes : moyenne 2 comprimés 3 fois par jour.

Utilisation chez les enfants

Enfants : moyenne 1 comprimé 3 fois par jour.

Dicynone® 500 mg

En moyenne 3 comprimés

Mode d'administration

Voie orale.

Si vous avez pr.

• Sans objet.

Si vous oubliez

Si vous arrêtez



#### 4. QUELS SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE SUR LE COMPROMIS ?

Comm

indési

mondi

• nau

• éru

• fièv

• ma

• dim

• dimi

• réact

sur le p

avec malai

respiratoire (bronchospasme)

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

Notice :  
Information de l'utilisateur  
D-CURE FORTE 100.000 U.I.,  
solution buvable en ampoule, boîtes de 3.

Cholécalciférol (Vitamine D 3).

PPV: 49,60 DH

LOT: 21116

EXP: 09/2024

en vitamine D

les dérivés de la

Remboursable

Fabriqué par : SMB

SMB TECHNOLOGY S.A.

39 rue du Parc Industriel,

B-6900 MARCHE-EN-FAMENNE, Belgique.



6 118001 320103

1

2

3

CURE

## UTILISATEURS

rale

### égralité de cette notice

voir besoin de la relire.  
si, vous avez un doute,  
votre médecin ou à votre

nnellement prescrit. Ne le  
même en cas de symptômes  
cif.  
rables non mentionnés dans  
er votre médecin ou votre

ition orale et dans quelles cas  
connaître avant de prendre

solution orale.  
entuels.  
g solution orale.

### SOLUTION ORALE ET DANS

anémique/fer.  
médicament qui apporte du  
ing, pour le traitement des  
de l'anémie (diminution des  
mbre et de la dimension des  
en fer).

**NS A CONNAITRE AVANT DE  
ON ORALE :**  
solution orale dans les cas

ble) au Fer protéinsuccinate  
tenus dans ce médicament.  
es lactées.  
l provoque une accumulation  
ose et Hémochromatose).  
(inflammation du pancréas)  
adie chronique du foie qui se  
sions de fibrose ou de  
e et qui altère sa structure et  
s à une accumulation de fer.  
carence en fer.  
mg :

- En cas de carence en fer ou d'anémie, consultez votre médecin avant de prendre ce médicament.

#### Prise ou utilisation d'autres médicaments :

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Antibiotiques de la classe des quinolones et des tétracyclines.

- Si vous prenez d'autres médicaments visant à traiter les problèmes osseux (ostéoporose), comme des biphosphonates. La pénicillamine utilisée pour l'arthrite (inflammation des articulations).

Alfa méthyldopa, utilisée pour le traitement de l'hypertension artérielle.

- Thyroxine, utilisée pour le traitement de l'hypothyroïdie (glande thyroïde trop peu active).

Lévodopa et carbidopa utilisés pour le traitement de la maladie de Parkinson.

Mycophénolate mofétil, utilisé en prévention de rejet de greffe. L'absorption intestinale du fer et ainsi l'efficacité du FERPLEX 40 mg solution orale peut être réduite si l'administration est accompagnée par les médicaments mentionnés ci-dessous. Il est nécessaire d'espacer d'au moins deux heures la prise du FERPLEX et celle des médicaments suivants :

- Antiacides, habituellement utilisés chez les patients qui souffrent d'acidité gastrique.

Chloramphénicol (antibiotique).

- Cholestyramine, utilisé chez les patients ayant une hypercholestérolémie.

Médicaments pour le traitement de l'ulcère gastrique ou le reflux gastro-oesophagique comme l'oméprazole, le lanzoprazole et le pantoprazole.

Risque d'interférences avec les tests diagnostiques :  
Ce médicament peut interférer avec les analyses en laboratoire pour la recherche de sang occulte dans les selles.

**Prise de FERPLEX 40 mg solution orale avec les aliments et les boissons :**

Certains aliments végétaux, le lait, le café et le thé diminuent l'absorption du fer. Il est donc nécessaire d'espacer d'au moins deux heures l'administration de FERPLEX 40 mg et la prise de ces aliments.

La prise de fer peut être augmentée suite à une prise d'aliments végétaux, de lait, café, thé, citron, etc.) fraîchement pressé.

**2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE FERPLEX 40 MG SOLUTION ORALE :**

**Ne prenez jamais FERPLEX 40 mg solution orale dans les cas suivants :**

- Si vous êtes allergique (hypersensible) au Fer protéinsuccinate ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.
- Si vous êtes allergique aux protéines lactées.
- Si vous souffrez d'une maladie qui provoque une accumulation de fer dans l'organisme (Hemosidérose et Hémochromatose).
- Si vous souffrez d'une pancréatite (inflammation du pancréas) ou d'une cirrhose hépatique (maladie chronique du foie qui se caractérise par la formation de lésions de fibrose ou de « cicatrices » dans le tissu hépatique et qui altère sa structure et son fonctionnement normal) dues à une accumulation de fer.
- Si vous souffrez d'une anémie sans carence en fer.

## NOTICE D'INFORMATION POUR LES UTILISATEURS

### FERPLEX 40 mg, Solution Orale

#### Fer protéinsuccinate

Boîte de 10 flacons de 15 ml

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

#### Contenu de la notice :

Qu'est-ce que FERPLEX 40 mg solution orale et dans quelles cas est-il utilisé.

Quelles sont les informations à connaître avant de prendre FERPLEX 40 mg solution orale.

Comment prendre FERPLEX 40 mg solution orale.

Quels sont les effets indésirables éventuels.

Comment conserver FERPLEX 40 mg solution orale.

Informations supplémentaires.

### 1. QU'EST-CE QUE FERPLEX 40 MG SOLUTION ORALE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE :

Classe pharmacothérapeutique : Antianémique/fer.

FERPLEX 40 mg solution orale est un médicament qui apporte du fer aux globules rouges dans le sang, pour le traitement des carences de fer ainsi que le traitement de l'anémie (diminution du taux d'hémoglobine ainsi que du nombre et de la dimension des globules rouges), due à cette carence en fer.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE FERPLEX 40 MG SOLUTION ORALE :

**Ne prenez jamais FERPLEX 40 mg solution orale dans les cas suivants :**

- Si vous êtes allergique (hypersensible) au Fer protéinsuccinate ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.
- Si vous êtes allergique aux protéines lactées.
- Si vous souffrez d'une maladie qui provoque une accumulation de fer dans l'organisme (Hemosidérose et Hémochromatose).
- Si vous souffrez d'une pancréatite (inflammation du pancréas) ou d'une cirrhose hépatique (maladie chronique du foie qui se caractérise par la formation de lésions de fibrose ou de « cicatrices » dans le tissu hépatique et qui altère sa structure et son fonctionnement normal) dues à une accumulation de fer.
- Si vous souffrez d'une anémie sans carence en fer.

Faites attention avec FERPLEX 40 mg :

- En cas de carence en fer ou d'anémie, consultez votre médecin avant de prendre ce médicament.

#### Prise ou utilisation d'autres médicaments :

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien :

Antibiotiques de la classe des quinolones et des tétracyclines.

- Si vous prenez d'autres médicaments visant à traiter les problèmes osseux (ostéoporose), comme des biphosphonates. La pénicillamine utilisée pour l'arthrite (inflammation des articulations).

Alfa méthyldopa, utilisée pour le traitement de l'hypertension artérielle.

- Thyroxine, utilisée pour le traitement de l'hypothyroïdie (glande thyroïde trop peu active).

Lévodopa et carbidopa utilisés pour le traitement de la maladie de Parkinson.

Mycophénolate mofétil, utilisé en prévention de rejet de greffe.

L'absorption intestinale du fer et ainsi l'efficacité du FERPLEX 40 mg solution orale peut être réduite si l'administration est accompagnée par les médicaments mentionnés ci-dessous. Il est nécessaire d'espacer d'au moins deux heures la prise du FERPLEX et celle des médicaments suivants :

- Antiacides, habituellement utilisés chez les patients qui souffrent d'acidité gastrique.

Chloramphénicol (antibiotique).

- Cholestyramine, utilisé chez les patients ayant une hypercholestérolémie.

Médicaments pour le traitement de l'ulcère gastrique ou le reflux gastro-oesophagique comme l'oméprazole, le lanzoprazole et le pantoprazole.

Risque d'interférences avec les tests diagnostiques :

- Ce médicament peut interférer avec les analyses en laboratoire pour la recherche de sang occulte dans les selles.

#### Prise de FERPLEX 40 mg solution orale avec les aliments et les boissons :

Certains aliments végétaux, le lait, le café et le thé diminuent l'absorption du fer. Il est donc nécessaire d'espacer d'au moins deux heures l'administration de FERPLEX 40 mg et la prise de ces aliments.

L'absorption des dérivés de fer peut être augmentée suite à une prise d'aliments végétaux, de lait, café, thé, citron, etc.) fraîchement pressé.



## NOTICE D'INFORMATION POUR LES UTILISATEURS

### FERPLEX 40 mg, Solution Orale

#### Fer protéinsuccinate

Boîte de 10 flacons de 15 ml

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

#### Contenu de la notice :

Qu'est-ce que FERPLEX 40 mg solution orale et dans quelles cas est-il utilisé.

Quelles sont les informations à connaître avant de prendre FERPLEX 40 mg solution orale.

Comment prendre FERPLEX 40 mg solution orale.

Quels sont les effets indésirables éventuels.

Comment conserver FERPLEX 40 mg solution orale.

Informations supplémentaires.

### 1. QU'EST-CE QUE FERPLEX 40 MG SOLUTION ORALE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE :

Classe pharmacothérapeutique : Antianémique/fer.

FERPLEX 40 mg solution orale est un médicament qui apporte du fer aux globules rouges dans le sang, pour le traitement des carences de fer ainsi que le traitement de l'anémie (diminution du taux d'hémoglobine ainsi que du nombre et de la dimension des globules rouges), due à cette carence en fer.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE FERPLEX 40 MG SOLUTION ORALE :

**Ne prenez jamais FERPLEX 40 mg solution orale dans les cas suivants :**

- Si vous êtes allergique (hypersensible) au Fer protéinsuccinate ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.

Si vous êtes allergique aux protéines lactées.

- Si vous souffrez d'une maladie qui provoque une accumulation de fer dans l'organisme (Hemosidérose et Hémochromatose).

Si vous souffrez d'une pancréatite (inflammation du pancréas) ou d'une cirrhose hépatique (maladie chronique du foie qui se caractérise par la formation de lésions de fibrose ou de « cicatrices » dans le tissu hépatique et qui altère sa structure et son fonctionnement normal) dues à une accumulation de fer.

Si vous souffrez d'une anémie sans carence en fer.

Faites attention avec FERPLEX 40 mg :

- En cas de carence en fer ou d'anémie, consultez votre médecin avant de prendre ce médicament.

#### Prise ou utilisation d'autres médicaments :

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien :

Antibiotiques de la classe des quinolones et des tétracyclines.

- Si vous prenez d'autres médicaments visant à traiter les problèmes osseux (ostéoporose), comme des biphosphonates. La pénicillamine utilisée pour l'arthrite (inflammation des articulations).

Alfa méthyldopa, utilisée pour le traitement de l'hypertension artérielle.

- Thyroxine, utilisée pour le traitement de l'hypothyroïdie (glande thyroïde trop peu active).

Lévodopa et carbidopa utilisés pour le traitement de la maladie de Parkinson.

Mycophénolate mofétil, utilisé en prévention de rejet de greffe.

L'absorption intestinale du fer et ainsi l'efficacité du FERPLEX 40 n solution orale peut être réduite si l'administration est accompagnée par les médicaments mentionnés ci-dessous. Il est nécessaire d'espacer d'au moins deux heures la prise du FERPLEX et celle des médicaments suivants :

- Antiacides, habituellement utilisés chez les patients qui souffrent d'acidité gastrique.

Chloramphénicol (antibiotique).

- Cholestyramine, utilisée chez les patients ayant une hypercholestérolémie.

Médicaments pour le traitement de l'ulcère gastrique ou le reflux gastro-oesophagique comme l'oméprazole, le lanzoprazole et pantoprazole.


Risque d'interférences avec les tests diagnostiques :

- Ce médicament peut interférer avec les analyses en laboratoire pour la recherche de sang occulte dans les selles.

**Prise de FERPLEX 40 mg solution orale avec les aliments :**

Certains aliments végétaux, le lait, le café et le thé diminuent l'absorption du fer. Il est donc nécessaire d'espacer d'au moins deux heures l'administration de FERPLEX 40 mg et la prise de ces aliments.

L'absorption des dérivés de fer peut être augmentée suite à une prise d'aliments végétaux, de lait, café, thé, citron, etc.) fraîchement pressé.



de FERPLEX 40 mg solution orale :

## LISATEURS

- En cas de carence en fer ou d'anémie, consultez votre médecin avant de prendre ce médicament.

### Prise ou utilisation d'autres médicaments :

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien :

Antibiotiques de la classe des quinolones et des tétracyclines.

- Si vous prenez d'autres médicaments visant à traiter les problèmes osseux (ostéoporose), comme des bisphosphonates.

La pénicillamine utilisée pour l'arthrite (inflammation des articulations).

Alfa méthyldopa, utilisée pour le traitement de l'hypertension artérielle.

Thyroxine, utilisée pour le traitement de l'hypothyroïdie (glande thyroïde trop peu active).

Lévodopa et carbidopa utilisés pour le traitement de la maladie de Parkinson.

Mycophénolate mofétil, utilisé en prévention de rejet de greffe. L'absorption intestinale du fer et ainsi l'efficacité du FERPLEX 40 mg solution orale peut être réduite si l'administration est accompagnée par les médicaments mentionnés ci-dessous. Il est nécessaire d'espacer d'au moins deux heures la prise du FERPLEX et celle des médicaments suivants :

Antiacides, habituellement utilisés chez les patients qui souffrent d'acidité gastrique.

Chloramphénicol (antibiotique).


Cholestyramine, utilisé chez les patients ayant une hypercholestérolémie.

Médicaments pour le traitement de l'ulcère gastrique ou le reflux gastro-oesophagique comme l'oméprazole, le lanzoprazole et le pantoprazole.

Risque d'interférences avec les tests diagnostiques :  
• Ce médicament peut interférer avec les analyses en laboratoire pour la recherche de sang occulte dans les selles.

### Prise de FERPLEX 40 mg solution orale avec les aliments et boissons :

Certains aliments végétaux, le lait, le café et le thé diminuent l'absorption du fer. Il est donc nécessaire d'espacer d'au moins deux heures l'aliment et la prise de FERPLEX 40 mg.



## alité de cette notice

besoin de la relire.  
si vous avez un doute,  
re médecin ou à votre

lement prescrit. Ne le  
ne en cas de symptômes

es non mentionnés dans  
tre médecin ou votre

ionale et dans quelles cas  
l'autre avant de prendre

ion orale.  
tels.  
ution orale.

## UTION ORALE ET DANS

nique/fer.  
dicament qui apporte du  
pour le traitement des  
l'anémie (diminution du  
e et de la dimension des  
er.

## CONNAITRE AVANT DE RALE : tion orale dans les cas

au Fer protéinsuccinylate  
us dans ce médicament.  
tées.  
voque une accumulation  
et Hémochromatose).  
lammation du pancréas  
chronique du foie qui se  
ions de fibrose ou de  
qui altère sa structure et  
ne accumulation de fer  
nce en fer.  
:

Faites attention avec FERPLEX 40 mg solution orale :

## NOTICE D'INFORMATION POUR LES UTILISATEURS

### FERPLEX 40 mg, Solution Orale

#### Fer protéinsuccinate

Boîte de 10 flacons de 15 ml

#### Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Alfa méthyldopa, utilisée pour le traitement de l'hypertension artérielle.

Thyroxine, utilisée pour le traitement de l'hypothyroïdie (glande thyroïde trop peu active).

Lévodopa et carbidopa utilisés pour le traitement de la maladie de Parkinson.

Mycophénolate mofétil, utilisé en prévention de rejet de greffe.

L'absorption intestinale du fer et ainsi l'efficacité du FERPLEX 40 mg solution orale peut être réduite si l'administration est accompagnée par les médicaments mentionnés ci-dessous. Il est nécessaire d'espacer d'au moins deux heures la prise du FERPLEX et celle des médicaments suivants :

Antiacides, habituellement utilisés chez les patients qui souffrent d'acidité gastrique.

Chloramphénicol (antibiotique).

Cholestyramine, utilisé chez les patients ayant une hypercholestérolémie.

Médicaments pour le traitement de l'ulcère gastrique ou le reflux gastro-oesophagique comme l'oméprazole, le lanzoprazole et le pantoprazole.

Risque d'interférences avec les tests diagnostiques :  
• Ce médicament peut interférer avec les analyses en laboratoire pour la recherche de sang occulte dans les selles.

#### Prise de FERPLEX 40 mg solution orale avec les aliments et boissons :

Certains aliments végétaux, le lait, le café et le thé diminuent l'absorption du fer. Il est donc nécessaire d'espacer d'au moins deux heures l'aliment et la prise de FERPLEX 40 mg.

#### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE FERPLEX 40 MG SOLUTION ORALE :

#### Ne prenez jamais FERPLEX 40 mg solution orale dans les cas suivants :

Si vous êtes allergique (hypersensible) au Fer protéinsuccinate ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.

Si vous êtes allergique aux protéines lactées.

Si vous souffrez d'une maladie qui provoque une accumulation de fer dans l'organisme (Hemosidérose et Hémochromatose).

Si vous souffrez d'une pancréatite (inflammation du pancréas) ou d'une cirrhose hépatique (maladie chronique du foie qui se caractérise par la formation de lésions de fibrose ou de « cicatrices » dans le tissu hépatique et qui altère sa structure et son fonctionnement normal) dues à une accumulation de fer.

Si vous souffrez d'une anémie sans carence en fer.

#### Faites attention avec FERPLEX 40 mg :

• En cas de carence en fer ou d'anémie, consultez votre médecin avant de prendre ce médicament.

#### Prise ou utilisation d'autres médicaments :

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien :

Antibiotiques de la classe des quinolones et des tétracyclines.

- Si vous prenez d'autres médicaments visant à traiter les problèmes osseux (ostéoporose), comme des bisphosphonates.

La pénicillamine utilisée pour l'arthrite (inflammation des articulations).

Alfa méthyldopa, utilisée pour le traitement de l'hypertension artérielle.

Thyroxine, utilisée pour le traitement de l'hypothyroïdie (glande thyroïde trop peu active).

Lévodopa et carbidopa utilisés pour le traitement de la maladie de Parkinson.

Mycophénolate mofétil, utilisé en prévention de rejet de greffe.

L'absorption intestinale du fer et ainsi l'efficacité du FERPLEX 40 mg solution orale peut être réduite si l'administration est accompagnée par les médicaments mentionnés ci-dessous. Il est nécessaire d'espacer d'au moins deux heures la prise du FERPLEX et celle des médicaments suivants :

Antiacides, habituellement utilisés chez les patients qui souffrent d'acidité gastrique.

Chloramphénicol (antibiotique).

Cholestyramine, utilisé chez les patients ayant une hypercholestérolémie.

Médicaments pour le traitement de l'ulcère gastrique ou le reflux gastro-oesophagique comme l'oméprazole, le lanzoprazole et le pantoprazole.

Risque d'interférences avec les tests diagnostiques :  
• Ce médicament peut interférer avec les analyses en laboratoire pour la recherche de sang occulte dans les selles.

#### Contenu de la notice :

1. Qu'est-ce que FERPLEX 40 mg solution orale et dans quels cas est-il utilisé.

Quelles sont les informations à connaître avant de prendre FERPLEX 40 mg solution orale.

Comment prendre FERPLEX 40 mg solution orale.

Quels sont les effets indésirables éventuels.

Comment conserver FERPLEX 40 mg solution orale.

Informations supplémentaires.

#### 2. QU'EST-CE QUE FERPLEX 40 MG SOLUTION ORALE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ :

Classe pharmacothérapeutique : Antianémique/fer.

FERPLEX 40 mg solution orale est un médicament qui apporte du fer aux globules rouges dans le sang, pour le traitement des carences de fer ainsi que le traitement de l'anémie (diminution du taux d'hémoglobine ainsi que du nombre et de la dimension des globules rouges), due à cette carence en fer.

#### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE FERPLEX 40 MG SOLUTION ORALE :

#### Ne prenez jamais FERPLEX 40 mg solution orale dans les cas suivants :

Si vous êtes allergique (hypersensible) au Fer protéinsuccinate ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.

Si vous êtes allergique aux protéines lactées.

Si vous souffrez d'une maladie qui provoque une accumulation de fer dans l'organisme (Hemosidérose et Hémochromatose).

Si vous souffrez d'une pancréatite (inflammation du pancréas) ou d'une cirrhose hépatique (maladie chronique du foie qui se caractérise par la formation de lésions de fibrose ou de « cicatrices » dans le tissu hépatique et qui altère sa structure et son fonctionnement normal) dues à une accumulation de fer.

Si vous souffrez d'une anémie sans carence en fer.

#### Faites attention avec FERPLEX 40 mg :

Particularités de sécurité :  
Conduite de véhicules et utilisation de machines :

Aucun effet sur l'aptitude à la conduite et l'utilisation de machines n'a été observé.

#### Informations importantes concernant certains composants de FERPLEX 40 mg solution orale :

#### Faites attention avec FERPLEX 40 mg :

## NOTICE D'INFORMATION POUR LES UTILISATEURS

### FERPLEX 40 mg, Solution Orale

#### Fer protéinsuccinate

Boîte de 10 flacons de 15 ml

#### Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Alfa méthyldopa, utilisée pour le traitement de l'hypertension artérielle.

Thyroxine, utilisée pour le traitement de l'hypothyroïdie (glande thyroïde trop peu active).

Lévodopa et carbidopa utilisés pour le traitement de la maladie de Parkinson.

Mycophénolate mofétil, utilisé en prévention de rejet de greffe.

L'absorption intestinale du fer et ainsi l'efficacité du FERPLEX 40 mg solution orale peut être réduite si l'administration est accompagnée par les médicaments mentionnés ci-dessous. Il est nécessaire d'espacer d'au moins deux heures la prise du FERPLEX et celle des médicaments suivants :

Antiacides, habituellement utilisés chez les patients qui souffrent d'acidité gastrique.

Chloramphénicol (antibiotique).

Cholestyramine, utilisé chez les patients ayant une hypercholestérolémie.

Médicaments pour le traitement de l'ulcère gastrique ou le reflux gastro-oesophagique comme l'oméprazole, le lanzoprazole et le pantoprazole.

Risque d'interférences avec les tests diagnostiques :  
• Ce médicament peut interférer avec les analyses en laboratoire pour la recherche de sang occulte dans les selles.

#### Contenu de la notice :

1. Qu'est-ce que FERPLEX 40 mg solution orale et dans quels cas est-il utilisé.

Quelles sont les informations à connaître avant de prendre FERPLEX 40 mg solution orale.

Comment prendre FERPLEX 40 mg solution orale.

Quels sont les effets indésirables éventuels.

Comment conserver FERPLEX 40 mg solution orale.

Informations supplémentaires.

#### 2. QU'EST-CE QUE FERPLEX 40 MG SOLUTION ORALE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ :

Classe pharmacothérapeutique : Antianémique/fer.

FERPLEX 40 mg solution orale est un médicament qui apporte du fer aux globules rouges dans le sang, pour le traitement des carences de fer ainsi que le traitement de l'anémie (diminution du taux d'hémoglobine ainsi que du nombre et de la dimension des globules rouges), due à cette carence en fer.

#### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE FERPLEX 40 MG SOLUTION ORALE :

#### Ne prenez jamais FERPLEX 40 mg solution orale dans les cas suivants :

Si vous êtes allergique (hypersensible) au Fer protéinsuccinate ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.

Si vous êtes allergique aux protéines lactées.

Si vous souffrez d'une maladie qui provoque une accumulation de fer dans l'organisme (Hemosidérose et Hémochromatose).

Si vous souffrez d'une pancréatite (inflammation du pancréas) ou d'une cirrhose hépatique (maladie chronique du foie qui se caractérise par la formation de lésions de fibrose ou de « cicatrices » dans le tissu hépatique et qui altère sa structure et son fonctionnement normal) dues à une accumulation de fer.

Si vous souffrez d'une anémie sans carence en fer.

#### Faites attention avec FERPLEX 40 mg :

Particularités de sécurité :  
Conduite de véhicules et utilisation de machines :

Aucun effet sur l'aptitude à la conduite et l'utilisation de machine n'a été observé.

#### Informations importantes concernant certains composants de FERPLEX 40 mg solution orale :

#### Faites attention avec FERPLEX 40 mg :

En cas de carence en fer ou d'anémie, consultez votre médecin avant de prendre ce médicament.

### Prise ou utilisation d'autres médicaments :

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien :

Antibiotiques de la classe des quinolones et des tétracyclines.

- Si vous prenez d'autres médicaments visant à traiter les problèmes osseux (ostéoporose), comme des bisphosphonates.

La pénicillamine utilisée pour l'arthrite (inflammation des articulations).

Alfa méthyldopa, utilisée pour le traitement de l'hypertension artérielle.

Thyroxine, utilisée pour le traitement de l'hypothyroïdie (glande thyroïde trop peu active).

Lévodopa et carbidopa utilisés pour le traitement de la maladie de Parkinson.

Mycophénolate mofétil, utilisé en prévention de rejet de greffe.

L'absorption intestinale du fer et ainsi l'efficacité du FERPLEX 40 mg solution orale peut être réduite si l'administration est accompagnée par les médicaments mentionnés ci-dessous. Il est nécessaire d'espacer d'au moins deux heures la prise du FERPLEX et celle des médicaments suivants :

Antiacides, habituellement utilisés chez les patients qui souffrent d'acidité gastrique.

Chloramphénicol (antibiotique).

Cholestyramine, utilisé chez les patients ayant une hypercholestérolémie.

Médicaments pour le traitement de l'ulcère gastrique ou le reflux gastro-oesophagique comme l'oméprazole, le lanzoprazole et le pantoprazole.

Risque d'interférences avec les tests diagnostiques :  
• Ce médicament peut interférer avec les analyses en laboratoire pour la recherche de sang occulte dans les selles.

#### Contenu de la notice :

1. Qu'est-ce que FERPLEX 40 mg solution orale et dans quels cas est-il utilisé.

Quelles sont les informations à connaître avant de prendre FERPLEX 40 mg solution orale.

Comment prendre FERPLEX 40 mg solution orale.

Quels sont les effets indésirables éventuels.

Comment conserver FERPLEX 40 mg solution orale.

Informations supplémentaires.

#### 2. QU'EST-CE QUE FERPLEX 40 MG SOLUTION ORALE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ :

Classe pharmacothérapeutique : Antianémique/fer.

FERPLEX 40 mg solution orale est un médicament qui apporte du fer aux globules rouges dans le sang, pour le traitement des carences de fer ainsi que le traitement de l'anémie (diminution du taux d'hémoglobine ainsi que du nombre et de la dimension des globules rouges), due à cette carence en fer.

#### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE FERPLEX 40 MG SOLUTION ORALE :

#### Ne prenez jamais FERPLEX 40 mg solution orale dans les cas suivants :

Si vous êtes allergique (hypersensible) au Fer protéinsuccinate ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.

Si vous êtes allergique aux protéines lactées.

Si vous souffrez d'une maladie qui provoque une accumulation de fer dans l'organisme (Hemosidérose et Hémochromatose).

Si vous souffrez d'une pancréatite (inflammation du pancréas) ou d'une cirrhose hépatique (maladie chronique du foie qui se caractérise par la formation de lésions de fibrose ou de « cicatrices » dans le tissu hépatique et qui altère sa structure et son fonctionnement normal) dues à une accumulation de fer.

Si vous souffrez d'une anémie sans carence en fer.

#### Faites attention avec FERPLEX 40 mg :

Particularités de sécurité :  
Conduite de véhicules et utilisation de machines :

Aucun effet sur l'aptitude à la conduite et l'utilisation de machine n'a été observé.

#### Informations importantes concernant certains composants de FERPLEX 40 mg solution orale :

#### Faites attention avec FERPLEX 40 mg :

## ES UTILISATEURS

### 1 Orale

#### Intégralité de cette notice

z avoir besoin de la relire.  
tion, si vous avez un doute,  
à votre médecin ou à votre

rsonnellement prescrit. Ne le  
re, même en cas de symptômes  
nocif.

ésirables non mentionnés dans  
mer votre médecin ou votre

solution orale et dans quels cas

à connaître avant de prendre

g solution orale.  
éventuels.  
ng solution orale.

#### G SOLUTION ORALE ET DANS

tianémique/fer.  
in médicament qui apporte du  
sang, pour le traitement des  
ent de l'anémie (diminution du  
ombre et de la dimension des  
ce en fer).

IONS A CONNAITRE AVANT DE  
ION ORALE :  
g solution orale dans les cas

sible) au Fer protéinsuccinylate  
contenus dans ce médicament.  
nes lactées.  
ui provoque une accumulation  
lérose et Hémochromatose).  
te (inflammation du pancréas)  
aladie chronique du foie qui se  
le lésions de fibrose ou de  
ue et qui altère sa structure et  
es à une accumulation de fer.  
is carence en fer.  
0 mg :

- En cas de carence en fer ou d'anémie, consultez votre médecin avant de prendre ce médicament.

#### Prise ou utilisation d'autres médicaments :

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien :

Antibiotiques de la classe des quinolones et des tétracyclines.

- Si vous prenez d'autres médicaments visant à traiter les problèmes osseux (ostéoporose), comme des biphosphonates.

La pénicillamine utilisée pour l'arthrite (inflammation des articulations).

Alfa méthyldopa, utilisée pour le traitement de l'hypertension artérielle.

Thyroxine, utilisée pour le traitement de l'hypothyroïdie (glande thyroïde trop peu active).

Lévodopa et carbidopa utilisés pour le traitement de la maladie de Parkinson.

Mycophénolate mofétil, utilisé en prévention de rejet de greffe.

L'absorption intestinale du fer et ainsi l'efficacité du FERPLEX 40 mg solution orale peut être réduite si l'administration est accompagnée par les médicaments mentionnés ci-dessous. Il est nécessaire d'espacer d'au moins deux heures la prise du FERPLEX et celle des médicaments suivants :

- Antiacides, habituellement utilisés chez les patients qui souffrent d'acidité gastrique.

Chloramphénicol (antibiotique).


- Cholestyramine, utilisé chez les patients ayant une hypercholestérolémie.

Médicaments pour le traitement de l'ulcère gastrique ou le reflux gastro-cesophagique comme l'oméprazole, le lanzoprazole et le pantoprazole.

Risque d'interférences avec les tests diagnostiques :

- Ce médicament peut interférer avec les analyses en laboratoire pour la recherche de sang occulte dans les selles.
- Prise de FERPLEX 40 mg solution orale avec les aliments et boissons :

Certains aliments végétaux, le lait, le café et le thé diminuent l'absorption du fer. Il est donc nécessaire d'espacer d'au moins deux heures l'administration de FERPLEX 40 mg et la prise de ces



## NOTICE D'INFORMATION POUR LES UTILISATEURS

### FERPLEX 40 mg, Solution Orale

#### Fer protéinsuccinate

Boîte de 10 flacons de 15 ml

#### Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

#### Contenu de la notice :

1. Qu'est-ce que FERPLEX 40 mg solution orale et dans quels cas est-il utilisé.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre FERPLEX 40 mg solution orale.

3. Comment prendre FERPLEX 40 mg solution orale.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels.

5. Comment conserver FERPLEX 40 mg solution orale.

6. Informations supplémentaires.

#### 1. QU'EST-CE QUE FERPLEX 40 MG SOLUTION ORALE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ :

Classe pharmacothérapeutique : Antianémique/fer.

FERPLEX 40 mg solution orale est un médicament qui apporte du fer aux globules rouges dans le sang, pour le traitement des carences de fer ainsi que le traitement de l'anémie (diminution du taux d'hémoglobine ainsi que du nombre et de la dimension des globules rouges), due à cette carence en fer.

#### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE FERPLEX 40 MG SOLUTION ORALE :

Ne prenez jamais FERPLEX 40 mg solution orale dans les cas suivants :

• Si vous êtes allergique (hypersensible) au Fer protéinsuccinate ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.

• Si vous êtes allergique aux protéines lactées.

• Si vous souffrez d'une maladie qui provoque une accumulation de fer dans l'organisme (Hemosidérose et Hémochromatose).

• Si vous souffrez d'une pancréatite (inflammation du pancréas) ou d'une cirrhose hépatique (maladie chronique du foie qui se caractérise par la formation de lésions de fibrose ou de « cicatrices » dans le tissu hépatique et qui altère sa structure et son fonctionnement normal) dues à une accumulation de fer. Si vous souffrez d'une anémie sans carence en fer.

Faites attention avec FERPLEX 40 mg :



- En cas de carence en fer ou d'anémie, consultez votre médecin avant de prendre ce médicament.

#### Prise ou utilisation d'autres médicaments :

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien :

Antibiotiques de la classe des quinolones et des tétracyclines.

- Si vous prenez d'autres médicaments visant à traiter les problèmes osseux (ostéoporose), comme des biphosphonates.

La pénicillamine utilisée pour l'arthrite (inflammation des articulations).

Alfa méthyldopa, utilisée pour le traitement de l'hypertension artérielle.

Thyroxine, utilisée pour le traitement de l'hypothyroïdie (glande thyroïde trop peu active).

Lévodopa et carbidopa utilisés pour le traitement de la maladie de Parkinson.

Mycophénolate mofétil, utilisé en prévention de rejet de greffe.

L'absorption intestinale du fer et ainsi l'efficacité du FERPLEX 40 mg solution orale peut être réduite si l'administration est accompagnée par les médicaments mentionnés ci-dessous. Il est nécessaire d'espacer d'au moins deux heures la prise du FERPLEX et celle des médicaments suivants :

Antiacides, habituellement utilisés chez les patients qui souffrent d'acidité gastrique.

Chloramphénicol (antibiotique).

Cholestyramine, utilisé chez les patients ayant une hypercholestérolémie.

Médicaments pour le traitement de l'ulcère gastrique ou le reflux gastro-cesophagique comme l'oméprazole, le lanzoprazole et le pantoprazole.

Risque d'interférences avec les tests diagnostiques :

- Ce médicament peut interférer avec les analyses en laboratoire pour la recherche de sang occulte dans les selles.

#### Prise de FERPLEX 40 mg solution orale avec les aliments et boissons :

Certains aliments végétaux, le lait, le café et le thé diminuent l'absorption du fer. Il est donc nécessaire d'espacer d'au moins deux heures l'administration de FERPLEX 40 mg et la prise de ces

aliments.

Suite à l'absorption du fer, il est donc nécessaire d'espacer d'au moins deux heures l'administration de ces aliments.

Si vous prenez FERPLEX 40 mg solution orale avec ces aliments, il est recommandé de faire une pause entre la prise de FERPLEX 40 mg et la prise de ces aliments.

Si vous prenez FERPLEX 40 mg solution orale avec ces aliments, il est recommandé de faire une pause entre la prise de FERPLEX 40 mg et la prise de ces aliments.

Si vous prenez FERPLEX 40 mg solution orale avec ces aliments, il est recommandé de faire une pause entre la prise de FERPLEX 40 mg et la prise de ces aliments.

Si vous prenez FERPLEX 40 mg solution orale avec ces aliments, il est recommandé de faire une pause entre la prise de FERPLEX 40 mg et la prise de ces aliments.

Si vous prenez FERPLEX 40 mg solution orale avec ces aliments, il est recommandé de faire une pause entre la prise de FERPLEX 40 mg et la prise de ces aliments.

Si vous prenez FERPLEX 40 mg solution orale avec ces aliments, il est recommandé de faire une pause entre la prise de FERPLEX 40 mg et la prise de ces aliments.

#### Informations importantes concernant certains composants de FERPLEX 40 mg solution orale :



## NOTICE D'INFORMATION POUR LES UTILISATEURS

### FERPLEX 40 mg, Solution Orale

#### Fer protéinsuccinate

Boîte de 10 flacons de 15 ml

#### Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

#### Contenu de la notice :

1. Qu'est-ce que FERPLEX 40 mg solution orale et dans quels cas est-il utilisé.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre FERPLEX 40 mg solution orale.

3. Comment prendre FERPLEX 40 mg solution orale.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels.

5. Comment conserver FERPLEX 40 mg solution orale.

6. Informations supplémentaires.

#### 1. QU'EST-CE QUE FERPLEX 40 MG SOLUTION ORALE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ :

Classe pharmacothérapeutique : Antianémique/fer.

FERPLEX 40 mg solution orale est un médicament qui apporte du fer aux globules rouges dans le sang, pour le traitement des carences de fer ainsi que le traitement de l'anémie (diminution du taux d'hémoglobine ainsi que du nombre et de la dimension des globules rouges), due à cette carence en fer.

#### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE FERPLEX 40 MG SOLUTION ORALE :

Ne prenez jamais FERPLEX 40 mg solution orale dans les cas suivants :

• Si vous êtes allergique (hypersensible) au Fer protéinsuccinate ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.


• Si vous êtes allergique aux protéines lactées.

• Si vous souffrez d'une maladie qui provoque une accumulation de fer dans l'organisme (Hemosidérone et Hémochromatose).

• Si vous souffrez d'une pancréatite (inflammation du pancréas) ou d'une cirrhose hépatique (maladie chronique du foie qui se caractérise par la formation de lésions de fibrose ou de « cicatrices » dans le tissu hépatique et qui altère sa structure et son fonctionnement normal) dues à une accumulation de fer.

Si vous souffrez d'une anémie sans carence en fer.

Faites attention avec FERPLEX 40 mg :



- En cas de carence en fer ou d'anémie, consultez votre médecin avant de prendre ce médicament.

#### Prise ou utilisation d'autres médicaments :

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, par votre médecin ou à votre pharmacien :

Antibiotiques de la classe des quinolones et des tétracyclines.

- Si vous prenez d'autres médicaments visant à traiter les problèmes osseux (ostéoporose), comme des biphosphonates.

La pénicillamine utilisée pour l'arthrite (inflammation des articulations).

Alfa méthyldopa, utilisée pour le traitement de l'hypertension artérielle.

Thyroxine, utilisée pour le traitement de l'hypothyroïdie (glande thyroïde trop peu active).

Lévodopa et carbidopa utilisés pour le traitement de la maladie de Parkinson.

Mycophénolate mofétil, utilisé en prévention de rejet de greffe.

L'absorption intestinale du fer et ainsi l'efficacité du FERPLEX 40 mg solution orale peuvent être réduites si l'administration est accompagnée par les médicaments mentionnés ci-dessous. Il est nécessaire d'espacer d'au moins deux heures la prise du FERPLEX et celle des médicaments suivants :

Antiacides, habituellement utilisés chez les patients qui souffrent d'acidité gastrique.

Chloramphénicol (antibiotique).

Cholestyramine, utilisé chez les patients ayant une hypercholestérolémie.

Médicaments pour le traitement de l'ulcère gastrique ou le reflux gastro-cesophagique comme l'oméprazole, le lanzoprazole et le pantoprazole.

Risque d'interférences avec les tests diagnostiques :

- Ce médicament peut interférer avec les analyses en laboratoire pour la recherche de sang occulte dans les selles.

#### Prise de FERPLEX 40 mg solution orale avec les aliments et boissons :

Certains aliments végétaux, le lait, le café et le thé diminuent l'absorption du fer. Il est donc nécessaire d'espacer d'au moins deux heures l'administration de FERPLEX 40 mg et la prise de ces aliments.

Suite à l'absorption du fer, il est donc nécessaire d'espacer d'au moins deux heures l'administration de ces aliments.

Si vous prenez FERPLEX 40 mg solution orale avec ces aliments, il est recommandé de faire une pause entre la prise de FERPLEX 40 mg et la prise de ces aliments.

Si vous prenez FERPLEX 40 mg solution orale avec ces aliments, il est recommandé de faire une pause entre la prise de FERPLEX 40 mg et la prise de ces aliments.

Si vous prenez FERPLEX 40 mg solution orale avec ces aliments, il est recommandé de faire une pause entre la prise de FERPLEX 40 mg et la prise de ces aliments.

Si vous prenez FERPLEX 40 mg solution orale avec ces aliments, il est recommandé de faire une pause entre la prise de FERPLEX 40 mg et la prise de ces aliments.

Si vous prenez FERPLEX 40 mg solution orale avec ces aliments, il est recommandé de faire une pause entre la prise de FERPLEX 40 mg et la prise de ces aliments.

Si vous prenez FERPLEX 40 mg solution orale avec ces aliments, il est recommandé de faire une pause entre la prise de FERPLEX 40 mg et la prise de ces aliments.

Si vous prenez FERPLEX 40 mg solution orale avec ces aliments, il est recommandé de faire une pause entre la prise de FERPLEX 40 mg et la prise de ces aliments.

Si vous prenez FERPLEX 40 mg solution orale avec ces aliments, il est recommandé de faire une pause entre la prise de FERPLEX 40 mg et la prise de ces aliments.

Si vous prenez FERPLEX 40 mg solution orale avec ces aliments, il est recommandé de faire une pause entre la prise de FERPLEX 40 mg et la prise de ces aliments.

Si vous prenez FERPLEX 40 mg solution orale avec ces aliments, il est recommandé de faire une pause entre la prise de FERPLEX 40 mg et la prise de ces aliments.

Si vous prenez FERPLEX 40 mg solution orale avec ces aliments, il est recommandé de faire une pause entre la prise de FERPLEX 40 mg et la prise de ces aliments.

Si vous prenez FERPLEX 40 mg solution orale avec ces aliments, il est recommandé de faire une pause entre la prise de FERPLEX 40 mg et la prise de ces aliments.

Si vous prenez FERPLEX 40 mg solution orale avec ces aliments, il est recommandé de faire une pause entre la prise de FERPLEX 40 mg et la prise de ces aliments.

Si vous prenez FERPLEX 40 mg solution orale avec ces aliments, il est recommandé de faire une pause entre la prise de FERPLEX 40 mg et la prise de ces aliments.

Si vous prenez FERPLEX 40 mg solution orale avec ces aliments, il est recommandé de faire une pause entre la prise de FERPLEX 40 mg et la prise de ces aliments.

Si vous prenez FERPLEX 40 mg solution orale avec ces aliments, il est recommandé de faire une pause entre la prise de FERPLEX 40 mg et la prise de ces aliments.

Si vous prenez FERPLEX 40 mg solution orale avec ces aliments, il est recommandé de faire une pause entre la prise de FERPLEX 40 mg et la prise de ces aliments.

Si vous prenez FERPLEX 40 mg solution orale avec ces aliments, il est recommandé de faire une pause entre la prise de FERPLEX 40 mg et la prise de ces aliments.

Si vous prenez FERPLEX 40 mg solution orale avec ces aliments, il est recommandé de faire une pause entre la prise de FERPLEX 40 mg et la prise de ces aliments.

Si vous prenez FERPLEX 40 mg solution orale avec ces aliments, il est recommandé de faire une pause entre la prise de FERPLEX 40 mg et la prise de ces aliments.

Si vous prenez FERPLEX 40 mg solution orale avec ces aliments, il est recommandé de faire une pause entre la prise de FERPLEX 40 mg et la prise de ces aliments.

Si vous prenez FERPLEX 40 mg solution orale avec ces aliments, il est recommandé de faire une pause entre la prise de FERPLEX 40 mg et la prise de ces aliments.

Si vous prenez FERPLEX 40 mg solution orale avec ces aliments, il est recommandé de faire une pause entre la prise de FERPLEX 40 mg et la prise de ces aliments.

Si vous prenez FERPLEX 40 mg solution orale avec ces aliments, il est recommandé de faire une pause entre la prise de FERPLEX 40 mg et la prise de ces aliments.

Si vous prenez FERPLEX 40 mg solution orale avec ces aliments, il est recommandé de faire une pause entre la prise de FERPLEX 40 mg et la prise de ces aliments.

Si vous prenez FERPLEX 40 mg solution orale avec ces aliments, il est recommandé de faire une pause entre la prise de FERPLEX 40 mg et la prise de ces aliments.

Si vous prenez FERPLEX 40 mg solution orale avec ces aliments, il est recommandé de faire une pause entre la prise de FERPLEX 40 mg et la prise de ces aliments.

Si vous prenez FERPLEX 40 mg solution orale avec ces aliments, il est recommandé de faire une pause entre la prise de FERPLEX 40 mg et la prise de ces aliments.

Si vous prenez FERPLEX 40 mg solution orale avec ces aliments, il est recommandé de faire une pause entre la prise de FERPLEX 40 mg et la prise de ces aliments.

Si vous prenez FERPLEX 40 mg solution orale avec ces aliments, il est recommandé de faire une pause entre la prise de FERPLEX 40 mg et la prise de ces aliments.

Si vous prenez FERPLEX 40 mg solution orale avec ces aliments, il est recommandé de faire une pause entre la prise de FERPLEX 40 mg et la prise de ces aliments.

Si vous prenez FERPLEX 40 mg solution orale avec ces aliments, il est recommandé de faire une pause entre la prise de FERPLEX 40 mg et la prise de ces aliments.

Si vous prenez FERPLEX 40 mg solution orale avec ces aliments, il est recommandé de faire une pause entre la prise de FERPLEX 40 mg et la prise de ces aliments.

Si vous prenez FERPLEX 40 mg solution orale avec ces aliments, il est recommandé de faire une pause entre la prise de FERPLEX 40 mg et la prise de ces aliments.

Si vous prenez FERPLEX 40 mg solution orale avec ces aliments, il est recommandé de faire une pause entre la prise de FERPLEX 40 mg et la prise de ces aliments.

Si vous prenez FERPLEX 40 mg solution orale avec ces aliments, il est recommandé de faire une pause entre la prise de FERPLEX 40 mg et la prise de ces aliments.