

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

N° W19-425113

A08070

☐ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1307 Société : MOHAMMED

☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre : MOHAMMED

Nom & Prénom : ELARFAOU MOHAMMED

Date de naissance : 02/08/1957

Adresse : 6 Rue ATARAYAR ABTAJ

NAY RAHA CASABLANCA

Tél. : 06 77 77 522 Total des frais engagés : 548 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin : [Stamp]

Date de consultation : 03/03/2022

Nom et prénom du malade : ZARRI NAGAT Age : 49.7

Lien de parenté : ☐ Lui-même ☒ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : Diabète sucré - 2ème type

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : / /

Signature de l'adhérent(e) : /

VOLET ADHÉRENT

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
09/03/22			300 dh	INP : 09101619

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE AD-DOHA Avenue Stendhal Cité Plateau Casablanca - Tél: 05 22 25 36 69	09/03/22	244,80

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP :
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F. PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE H 25533412 00000000 D 00000000 35533411 21433552 00000000 G 00000000 11433553 B			COEFFICIENT DES TRAVAUX
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

*CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION


Cabinet Médical Spécialisé

Dr. ARBAOUI BATTAL FATIHA

Spécialiste

Endocrinologie • diabétologie

Maladies Métaboliques • Nutrition • Obésité



عيادة طبية متخصصة

الدركتور عرباوي باتال فاتيحة

أخصائية

الغدد - السكري

الأمراض الأيضية - التغذية - السممة

Casablanca, le 09/03/22

N ZARBA NAJAT

23.90 x 8

+ Glucose 850.

2 v 4 5 10.



13.40 x 4

+ Levofloxacin 500.

2 v 4 5 10.

2 v 5 2 hours (S.V.)

Traité de 4 jours.

244.80

PHARMACIE AD-DOHA

Avenue Stendhal Cité Plateau

Casablanca - Tél: 05 22 25 96 69

Dr. ARBAOUI FATIHA
ENDOCRINOLOGIE - NUTRITION
DIABÉTOLOGIE
Résidence Jawhara, 150 Route de l'Oasis
En face Gare de l'Oasis 1 - Casablanca
Tél: 0522 25 61 65 - Fax: 0522 23 25 06
En cas d'urgence: 0663 43 95 48

إقامة جوهرة، 150 طريق الوازيس (مقابل محطة القطار الوازيس) - الدار البيضاء

Résidence Jawhara, 150 Route de l'Oasis (En face Gare Oasis) - Casablanca

Tél : 0522 25 61 65 / 0522 23 25 06 / Fax : 0522 23 25 06

En cas d'urgence : 0663 43 95 48

Patente : 091046169 - IF : 401444221 - ICE : 001714969000048

سارع نظم القلب، الاضطرابات البصرية، صعوبة التركيز الذهني . لا تقد سيارة ولا تستخدم آلة إذا بدأت لإحساس بهذه الأعراض.

ما هي طريقة تناول ثلوكوجاف 850 قرص مغلف؟
 يجب التقيد دائما بالجرعة التي وصفها لك الطبيب. في حال الشك، عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي.
 لثوكوجاف لا يحل محل حسنات النظام المعيشي الجيد. عليك الاستمرار في اتباع نصائح الطبيب الخاصة
 بنظام الغذائي والقيام بتمارين بدنية بصورة منتظمة.

جربة اليومية القصوى هي 2000 مغ موزعة على دفعتين او ثلاث دفعات
ان استعمال هذا الدواء لعلاج الأطفال الذين تتراوح اعمارهم بين 10 و 12 سنة يوصى به فقط بناء على

تدبر المرضي الذين يعانون من الفشل الكلوي مع DFG ما بين 45 و 60 مل/الدقيقة، الجرعة الأولية هي 800 مل أو 850 مل من غلوكوفاج مرة واحدة في اليوم. الجرعة القصوى هي 1000 مل/اليوم في جرعتين مختلفتين (كل 3-6 أشهر).

يعا لمعدل سكر في الدم، عليك استشارة الطبيب بصورة منتظمة. إن ذلك مهم بنوع خاص لدى الأطفال ولدى

طريقة تناول كُلو كوجاج أثناء وجبة الطعام أو بعدها. هذا سيسمح بتجنب التأثيرات غير المرغوبة على هضمك

إذا كنت تتناول جرعتين في اليوم، تناول جرعة في الصباح (مع وجبة الفطور) وجرعة ظهراً (مع وجبة العشاء)
إذا كنت تتناول ثلاث جرعات في اليوم، تناول جرعة في الصباح (مع وجبة الفطور) وجرعة ظهراً (مع وجبة

الجرعة المفرطة:
1. تناولت غلوكوفاج أكثر مما كان يلزم:

من بين الأعراض الأخرى، هناك انخفاض درجة حرارة الجسم ونض القلب. فإذا أحسست بأحد هذه الأعراض يجب عليك استشارة الطبيب فوراً لأن الحمض اللبني قد يؤدي إلى الغيبوبة توقف فوراً عن تناول

4- ماهي التأثيرات غير المرغوبة المحتملة؟

تظهر التأثيرات غير المرغوبة التالية:

اضطراب المذاق، (سجلت لدى اقل من شخص من اصل 10 اشخاص)

2 ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول كُلو كُفاج 850 مغ، فرص مغلف؟

- ما هو غلوكوفاج 850 مغ، قرص مغلف وما في حالات استعماله؟

لإنسولين هرمون ينتجه البنكرياس يسمح للجسم باستعادة كمية الجلوكوز (السكر) المتواجد في الدم.

دا كنت بالغا وتعاني وزن زائد، يسمح كذلك تناول غلوكوفاج على المدى الطويل بالمساعدة على الحد من

يسمح انظام الغدائي والتمرين البدني وحدهما بالتحكم معدل الغلوكوز في الدم، يستعمل خاصة عند المرضى ذوي الوزن الزائد.

ما هي للعلوم الواجب معرفتها قبل تناول خلوكوفاج 850 قرص مغلف؟

٩٥ ٩٣

30 Comprimés pelliculés

عانيت من وقت قريب من نوبة قلبية، أو إذا كنت تعاني من

إذا كنت تستهلك بكثرة المشروبات الكحولية،

Glucophage® 850mg ○

30 Comprimés pelliculés

6 118000 080633

0 110300

تستهلك بكثرة المشروبات الكحولية.

سارع نظم القلب، الاضطرابات البصرية، صعوبة التركيز الذهني . لا تقد سيارة ولا تستخدم آلة إذا بدأت لإحساس بهذه الأعراض.

ما هي طريقة تناول ثلوكوجاف 850 قرص مغلف؟
 يجب التقيد دائما بالجرعة التي وصفها لك الطبيب، في حال الشك، عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي.
 لثوكوجاف لايحل محل حسنات النظام المعيشي الجيد. عليك الاستمرار في اتباع نصائح الطبيب الخاصة
 بنظام الغذائي والقيام بتمارين بدنية بصورة منتظمة.

جربة اليومية القصوى هي 2000 مغ موزعة على دفعتين او ثلاث دفعات
ان استعمال هذا الدواء لعلاج الأطفال الذين تتراوح اعمارهم بين 10 و 12 سنة يوصى به فقط بناء على

تدبر المرضي الذين يعانون من الفشل الكلوي مع DFG ما بين 45 و 60 مل/الدقيقة، الجرعة الأولية هي 800 مل أو 850 مل من غلوكوفاج مرة واحدة في اليوم. الجرعة القصوى هي 1000 مل/اليوم في جرعتين مختلفتين (كل 3-6 أشهر).

يعا لمعدل سكر في الدم، عليك استشارة الطبيب بصورة منتظمة. إن ذلك مهم بنوع خاص لدى الأطفال ولدى

طريقة تناول كوكوفاج أثناء وجبة الطعام او بعدها. هذا سيسمح بتجنب التأثيرات غير المرغوبة على هضمك

إذا كنت تتناول جرعتين في اليوم، تناول جرعة في الصباح (مع وجبة الفطور) وجرعة ظهراً (مع وجبة العشاء).
إذا كنت تتناول ثلاث جرعات في اليوم، تناول جرعة في الصباح (مع وجبة الفطور) وجرعة ظهراً (مع وجبة العشاء).

الجرعة المفرطة:
1. تناولت غلوكوفاج أكثر مما كان يلزم:

من بين الأعراض الأخرى، هناك انخفاض درجة حرارة الجسم ونض القلب. فإذا أحسست بأحد هذه الأعراض يجب عليك استشارة الطبيب فوراً لأن الحمض اللبني قد يؤدي إلى الغيبوبة توقف فوراً عن تناول

4- ماهي التأثيرات غير المرغوبة المحتملة؟

تظهر التأثيرات غير المرغوبة التالية:

اضطراب المذاق، (سجلت لدى اقل من شخص من اصل 10 اشخاص)

2 ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول كُلو كُفاج 850 مغ، فرص مغلف؟

- ما هو غلوكوفاج 850 مغ، قرص مغلف وما في حالات استعماله؟

لإنسولين هرمون ينتجه البنكرياس يسمح للجسم باستعادة كمية الجلوكوز (السكر) المتواجد في الدم.

دا كنت بالغا وتعاني وزن زائد، يسمح كذلك تناول غلوكوفاج على المدى الطويل بالمساعدة على الحد من

يسمح انظام الغدائي والتمرين البدني وحدهما بالتحكم معدل الغلوكوز في الدم، يستعمل خاصة عند المرضى ذوي الوزن الزائد.

ما هي للعلوم الواجب معرفتها قبل تناول خلوكوفاج 850 قرص مغلف؟

٩٥ ٩٣

30 Comprimés pelliculés

عانيت من وقت قريب من نوبة قلبية، أو إذا كنت تعاني من

إذا كنت تستهلك بكثرة المشروبات الكحولية،

Glucophage® 850mg ○

30 Comprimés pelliculés

6 118000 080633

0 110300

تستهلك بكثرة المشروبات الكحولية.

سارع نظم القلب، الاضطرابات البصرية، صعوبة التركيز الذهني . لا تقد سيارة ولا تستخدم آلة إذا بدأت لإحساس بهذه الأعراض.

ما هي طريقة تناول ثلوكوجاف 850 قرص مغلف؟
 يجب التقيد دائما بالجرعة التي وصفها لك الطبيب، في حال الشك، عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي.
 لثوكوجاف لا يحل محل حسنات النظام المعيشي الجيد. عليك الاستمرار في اتباع نصائح الطبيب الخاصة
 بنظام الغذائي والقيام بتمارين بدنية بصورة منتظمة.

جربة اليومية القصوى هي 2000 مغ موزعة على دفعتين او ثلاث دفعات
ان استعمال هذا الدواء لعلاج الأطفال الذين تتراوح اعمارهم بين 10 و 12 سنة يوصى به فقط بناء على

تدبر المرضي الذين يعانون من الفشل الكلوي مع DFG ما بين 45 و 60 مل/الدقيقة، الجرعة الأولية هي 800 مل أو 850 مل من غلوكوفاج مرة واحدة في اليوم. الجرعة القصوى هي 1000 مل/اليوم في جرعتين مختلفتين (كل 3-6 أشهر).

يعا لمعدل سكر في الدم، عليك استشارة الطبيب بصورة منتظمة. إن ذلك مهم بنوع خاص لدى الأطفال ولدى

طريقة تناول كُلو كوجاج أثناء وجبة الطعام أو بعدها. هذا سيسمح بتجنب التأثيرات غير المرغوبة على هضمك

إذا كنت تتناول جرعتين في اليوم، تناول جرعة في الصباح (مع وجبة الفطور) وجرعة ظهراً (مع وجبة العشاء)
إذا كنت تتناول ثلاث جرعات في اليوم، تناول جرعة في الصباح (مع وجبة الفطور) وجرعة ظهراً (مع وجبة

الجرعة المفرطة:
1. تناولت غلوكوفاج أكثر مما كان يلزم:

من بين الأعراض الأخرى، هناك انخفاض درجة حرارة الجسم ونض القلب. فإذا أحسست بأحد هذه الأعراض يجب عليك استشارة الطبيب فوراً لأن الحمض اللبني قد يؤدي إلى الغيبوبة توقف فوراً عن تناول

4- ماهي التأثيرات غير المرغوبة المحتملة؟

تظهر التأثيرات غير المرغوبة التالية:

اضطراب المذاق، (سجلت لدى اقل من شخص من اصل 10 اشخاص)

2 ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول كُلو كُفاج 850 مغ، فرص مغلف؟

- ما هو غلوكوفاج 850 مغ، قرص مغلف وما في حالات استعماله؟

لإنسولين هرمون ينتجه البنكرياس يسمح للجسم باستعادة كمية الجلوكوز (السكر) المتواجد في الدم.

دا كنت بالغا وتعاني وزن زائد، يسمح كذلك تناول غلوكوفاج على المدى الطويل بالمساعدة على الحد من

يسمح انظام الغدائي والتمرين البدني وحدهما بالتحكم معدل الغلوكوز في الدم، يستعمل خاصة عند المرضى ذوي الوزن الزائد.

ما هي للعلوم الواجب معرفتها قبل تناول خلوكوفاج 850 قرص مغلف؟

٩٣ ٩٥

30 Comprimés pelliculés

عانيت من وقت قريب من نوبة قلبية، أو إذا كنت تعاني من

إذا كنت تستهلك بكثرة المشروبات الكحولية،

Glucophage® 850mg ○

30 Comprimés pelliculés

6 118000 080633

0 110300

تستهلك بكثرة المشروبات الكحولية.

سارع نظم القلب، الاضطرابات البصرية، صعوبة التركيز الذهني . لا تعد سيارة ولا تستخدم آلة إذا بدأت لإحساس بهذه الأعراض.

-ما هي طريقة تناول ثلوكوفاج 850 قرص مغلف؟
 يجب التقيد دائما بالجرعة التي وصفها لك الطبيب. في حال الشك، عليك استشارة الطبيب او الصيدلي.
 لملوكوفاج لا يحل محل تحسينات النظام المعيشي الجيد. عليك الاستمرار في اتباع نصائح الطبيب الخاصة
 بنظام الغذائي والقيام بتمارين بدنية بصورة منتظمة.

جرعة اليومية القصوى هي 2000 مغ موزعة على دفتين او ثلاث دفعات
ان استعمال هذا الدواء لعلاج الأطفال الذين تتراوح اعمارهم بين 10 و 12 سنة يوصى به فقط بناء على

بصالح خاصة من طرف الطبيب، علما بأن الخبرة في ما يخص هذه الفئة من الأعمار محدودة.

يتمتع المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي مع DFG ما بين 45 و 60 مل/الدقيقة، الجرعة الأولية هي 800 ملغ أو 850 ملغ من غلوكون فاج مرة واحدة في اليوم. الجرعة القصوى هي 1000 ملغ/اليوم في جرعتين مختلفتين (بصفة الكلى يجب أن تأخذ عن كتاب كل 3-6 أشهر).

راقبة

يعا لمعدل سكر في الدم. عليك استشارة الطبيب بصورة منتظمة. إن ذلك مهم بنوع خاص لدى الأطفال ولدى

• ميسراقب الطبيب ايضا مرة في السنة على الأقل حالة عمل كليتيك قد يكون من الضروري اجراء عدة

لرقيقة تناول كلوكوفاج أثناء وجبة الطعام أو بعدها. هذا سيسمح بتجنب التأثيرات غير المرغوبة على هضمك.

تسحق الأقراص ولا تمضغها. يبلع كل قرص مع كأس ماء.
إذا كنت تتناول جرعة واحدة في اليوم، تناولها في الصباح (من وجبة الفطور).

إذا كنت تتناول جرعتين في اليوم، تناول جرعة في الصباح (مع وجبة الفطور) وجرعة ظهرا (مع وجبة العشاء)
إذا كنت تتناول ثلاث جرعات في اليوم، تناول جرعة في الصباح (مع وجبة الفطور) وجرعة ظهرا (مع وجبة

١. شعرت بعد بضع الوقت، بأن مفعول كَلَوْتُ كَفَاج قَوِي جداً أو ضعيف جداً عليك إعلام الطبيب أو الصيدلي.

جرجة المفرطة:
أ. تناولت حُلوك فاج أكثر مما كان يلزم:

تناولت جلوكوكوجاز أكثر مما كان يلزم، قد يسبب ذلك حماضا لبنيا. اعراض الحماض اللبني غير محددة مثل التقيؤ، اوجاع في البطن مع تشنجات عضلية، إحساس عام بالانزعاج مع تعب شديد وصعوبات التنفس.

من بين الأعراض الأخرى، هناك انخفاض درجة حرارة الجسم ونبض القلب. فإذا أحسست بأحد هذه الأعراض يجب عليك استشارة الطبيب فوراً لأن الحمض اللبني قد يؤدي إلى الغيبوبة توقف فوراً عن تناول

إذا نسيت تناول خلوكوفاج

4- ماهي التأثيرات غير المرغوبة المحتملة؟

تتل كل الأوبئة، قد ينجم عن تناول كوكوفاج 850 مغ قرص مغلف التأثيرات غير المرغوبة حتى ولو أن كل الأشخاص غير معرضين لها.

تظهر التأثيرات غير المرغوبة التالية:

تأثيرات غير مرغوبة متواترة جدا (سجلت لدى أكثر من شخص من أصل 10 أشخاص)

أصطربت هضمية، مثل الغيبان النقيض الأسهال أوجاع في البطن، فقدان الشهية بظهر تأثيرات غير مرغوبة قلب الاحيان في بداية العلاج بـكلوكوفاج . قد يساعدك توزيع الجرعات خلال النهار تناول كلوكوفاج أثناء وجبة الطعام إذا استميت الأمراض عليك التوقف عن تناول كلوكوفاج . استشارة الطبيب

اضطراب المذاق (سجلت لدى اقل من شخص من اصل 10 اشخاص)

في هذه القضية

2 ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول گلوکوفاج 850 مغ، فرص مغلف؟

4 - ما هي التأثيرات غير المرغوبة المحتملة؟

- ما هو غلوكوفاج 850 مغ، قرص، معلق وما في حالات استعماله؟

لصنف الدوائى العلاجى
 يحتوي جلوكوفاج على متفورمين. إنه دواء مستعمل لعلاج السكري. ينتمى الى فئة الادوية مسماة ببيغوانيد.

لإنسولين هرمون ينتجه البنكرياس يسمح للجسم باستعادة كمية الغلوكوز (السكر) المتواجد في الدم.

عندما تكون مريضاً بالسكري، لا ينتج البنكرياس لديك الإنسولين بكمية كافية وأجسامك ليس قادر على استخدام الإنسولين الذي ينتجه بنكرياسك. لذلك، تحتاج مريضاً بالسكري إلى استخدام حقن الإنسولين أو أجهزة ضخ الإنسولين لإنتاج الطاقة أو تخزينه لاستخدامه لاحقاً.

دا كنت بالغا وتعاين وزن زائد، يسمح كذلك تناول جلوكوفاج على المدى الطويل بالمساعدة على الحد من

خطار المضاعفات المصاحبة للسكري. يشارك كلوكوفاج بالاستقرار في الوزن أو بفقدان قليل من الوزن. ستعمل كلوكوفاج لعلاج السكري من النوع 2 (المسمى كذلك "السكري غير المتوقف على الإنسولين") عندما

يسمح انظام الغذائي والتمرين البدني وحدهما بالتحكم معدل الغلوكوز في الدم. يستعمل خاصة عند المرضى ذوي الوزن الزائد.

يستطيع المرضى تناول كلوكوفاج وحده أو مع الأدوية أخرى ضد السكري (الدوية قابلة للبلع أو للإنسولين).

ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول خلوكوفاج 850 قرص مغلف؟

...المركبات الأخرى لهذا الدواء (انظر على

٩٢ ٩٥

أخصاص حيوي، الخصائص الحيوي أصابة بحسن في
 به التسبب بسبب سكري اولي، الأعراض هي بنوع
 و، نفس نه، انحة فأكية غير معتادة.

Glucophage® 850mg
30 Comprimés pelliculés

ين أو القصبات. التهاب الكليتين. قد تؤدي الاصابات الحادة

عانيت من وقت قريب من نوبة قلبية، أو إذا كنت تعاني من

6 118000 080633

إذا كنت تستهلك بكثرة المشروبات الحلوية،

سارع نظم القلب، الاضطرابات البصرية، صعوبة التركيز الذهني . لا تقد سيارة ولا تستخدم آلة إذا بدأت لإحساس بهذه الأعراض.

ما هي طريقة تناول ثلوكوجاف 850 قرص مغلف؟
 يجب التقيد دائما بالجرعة التي وصفها لك الطبيب. في حال الشك، عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي.
 لثوكوجاف لا يحل محل حسنات النظام المعيشي الجيد. عليك الاستمرار في اتباع نصائح الطبيب الخاصة
 بنظام الغذائي والقيام بتمارين بدنية بصورة منتظمة.

جربة اليومية القصوى هي 2000 مغ موزعة على دفعتين او ثلاث دفعات
ان استعمال هذا الدواء لعلاج الأطفال الذين تتراوح اعمارهم بين 10 و 12 سنة يوصى به فقط بناء على

تدبر المرضي الذين يعانون من الفشل الكلوي مع DFG ما بين 45 و 60 مل/الدقيقة، الجرعة الأولية هي 800 مل أو 850 مل من غلوكوفاج مرة واحدة في اليوم. الجرعة القصوى هي 1000 مل/اليوم في جرعتين مختلفتين (كل 3-6 أشهر).

يعا لمعدل سكر في الدم، عليك استشارة الطبيب بصورة منتظمة. إن ذلك مهم بنوع خاص لدى الأطفال ولدى

طريقة تناول كُلو كوجاج أثناء وجبة الطعام أو بعدها. هذا سيسمح بتجنب التأثيرات غير المرغوبة على هضمك

إذا كنت تتناول جرعتين في اليوم، تناول جرعة في الصباح (مع وجبة الفطور) وجرعة ظهراً (مع وجبة العشاء)
إذا كنت تتناول ثلاث جرعات في اليوم، تناول جرعة في الصباح (مع وجبة الفطور) وجرعة ظهراً (مع وجبة

الجرعة المفرطة:
1. تناولت غلوكوفاج أكثر مما كان يلزم:

من بين الأعراض الأخرى، هناك انخفاض درجة حرارة الجسم ونض القلب. فإذا أحسست بأحد هذه الأعراض يجب عليك استشارة الطبيب فوراً لأن الحمض اللبني قد يؤدي إلى الغيبوبة توقف فوراً عن تناول

4- ماهي التأثيرات غير المرغوبة المحتملة؟

تظهر التأثيرات غير المرغوبة التالية:

اضطراب المذاق، (سجلت لدى اقل من شخص من اصل 10 اشخاص)

2 ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول كُلو كُفاج 850 مغ، فرص مغلف؟

- ما هو غلوكوفاج 850 مغ، قرص مغلف وما في حالات استعماله؟

لإنسولين هرمون ينتجه البنكرياس يسمح للجسم باستعادة كمية الجلوكوز (السكر) المتواجد في الدم.

دا كنت بالغا وتعاني وزن زائد، يسمح كذلك تناول جلوكوفاج على المدى الطويل بالمساعدة على الحد من

يسمح انظام الغدائي والتمرين البدني وحدهما بالتحكم معدل الغلوكوز في الدم، يستعمل خاصة عند المرضى ذوي الوزن الزائد.

ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول خلوكوفاج 850 قرص مغلف؟
تتناول ادا خلوكوفاج في الحالات التالية:

٩٥ ٩٣

30 Comprimés pelliculés

عانيت من وقت قريب من نوبة قلبية، أو إذا كنت تعاني من

إذا كنت تستهلك بكثرة المشروبات الكحولية،

Glucophage® 850mg ○

30 Comprimés pelliculés

6 118000 080633

0 110300

تستهلك بكثرة المشروبات الكحولية.

سارع نظم القلب، الاضطرابات البصرية، صعوبة التركيز الذهني . لا تقد سيارة ولا تستخدم آلة إذا بدأت لإحساس بهذه الأعراض.

ما هي طريقة تناول ثلوكوجاف 850 قرص مغلف؟
 يجب التقيد دائما بالجرعة التي وصفها لك الطبيب، في حال الشك، عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي.
 لثوكوجاف لايحل محل حسنات النظام المعيشي الجيد. عليك الاستمرار في اتباع نصائح الطبيب الخاصة
 بنظام الغذائي والقيام بتمارين بدنية بصورة منتظمة.

جربة اليومية القصوى هي 2000 مغ موزعة على دفعتين او ثلاث دفعات
ان استعمال هذا الدواء لعلاج الأطفال الذين تتراوح اعمارهم بين 10 و 12 سنة يوصى به فقط بناء على

تُقدّم المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي مع DFG ما بين 45 و 60 مل/الدقيقة، الجرعة الأولية هي 1000 مل أو 850 مل من كلوكوفاج مرة واحدة في اليوم. الجرعة القصوى هي 1000 مل/اليوم في جرعتين مختلفتين.

معيار معدل سكر في الدم لديك و سيعضبط الجرعة التي ستتأولها من جلوكوفاج معاً لمعدل سكر في الدم عليك استشارة الطبيب بصورة منتظمة. إن ذلك مهم بصفة خاصة لدى الأطفال ولدى

حوصات اذا كنت مسنا او في حالة خال وظيفة كليتك.

إذا كنت تتناول جرعتين في اليوم، تناول جرعة في الصباح (مع وجبة الفطور) وجرعة ظهرا (مع وجبة العشاء).

جرعة المقرطة:

من بين الأعراض الأخرى، هناك انخفاض درجة حرارة الجسم ونبض القلب. فإذا أحسست بأحد هذه الأعراض يجب عليك استشارة الطبيب فوراً لأن الحمض اللبني قد يؤدي إلى الغيبوبة توقف فورا عن تناول

تناول جرعة مضاعفة للتعويض عن الجرعة المنسية تناول الجرعة التالية في موعدھا المعتاد.
إذا كان لديك أسئلة أخرى حول استعمال هذا الدواء، اطلب المزيد من المطومات من الطبيب أو الصيدلي.

تظهر التأثيرات غير المرغوبة التالية:

تأثيرات غير مرغوبة متواترة جدا (سجلت لدى أكثر من شخص من أصل 10 أشخاص)

اطعمام او حالا بعدها. إذا استمرت الأعراض، عليك التوقف عن تناول كلوكوفاج و استشارة الطبيب.

2 ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول كُلو كُفاج 850 مغ، فرص مغلف؟

- ما هو غلوكوفاج 850 مغ، قرص مغلف وما في حالات استعماله؟

لإنسولين هرمون ينتجه البنكرياس يسمح للجسم باستعادة كمية الجلوكوز (السكر) المتواجد في الدم.

دا كنت بالغا وتعاني وزن زائد، يسمح كذلك تناول جلوكوفاج على المدى الطويل بالمساعدة على الحد من

يسمح انظام الغدائي والتمرين البدني وحدهما بالتحكم معدل الغلوكوز في الدم، يستعمل خاصة عند المرضى ذوي الوزن الزائد.

ما هي للعلوم الواجب معرفتها قبل تناول خلوكوفاج 850 قرص مغلف؟

٩٣ ٩٥

30 Comprimés pelliculés

عانيت من وقت قريب من نوبة قلبية، أو إذا كنت تعاني من

إذا كنت تستهلك بكثرة المشروبات الكحولية،

Glucophage® 850mg ○

30 Comprimés pelliculés

6 118000 080633

0 110000

تستهلك بحره المشروبات الكحوليه.

MERCK

نشرة: معلومات الاستعمال

ليفوتيروكس® قرص قابل للقطع

ليفوتيروكسين صودي، عن طريق الفم

يجب قراءة هذه النشرة بأكملها بانتباه قبل استعمال هذا الدواء. لأنها تحتوي على معلومات هامة بالنسبة لك

- احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج لقراءتها من جديد
 - إذا كانت لديك أسئلة أخرى، اسأل طبيبك أو صيدليك
 - وصف لك هذا الدواء شخصياً. لا تعطيه لأحد سواك، حتى ولو كانت لديه نفس الأعراض التي لديك، لأن ذلك قد يسبب له الضرر
 - إذا كنت تواجه أي آثار جانبية، تحدث مع طبيبك أو صيدليك. وهذا ينطبق أيضاً على أي من الآثار الجانبية المحتملة غير المذكورة في هذه النشرة
- انظر الفقرة 4

تحتوي هذه النشرة:

فترة الحمل.

الاشتراك بين ليفوتيروكس مع مضادات الغدة الدرقية في علاج فرط التدرق لا يشار إليه خلال فترة الحمل. في الواقع، ليفوتيروكس يجتاز قليلاً جداً حاجز المشيمة، في حين مضادات الغدة الدرقية تجتازها بسهولة. لهذا قد يؤدي إلى خطورة حدوث قصور الغدة الدرقية عند الجنين.

الرضاعة الطبيعية هي ممكنة خلال فترة العلاج.

قصور الغدة الدرقية أو فرط التدرق قد يضعف الخصوبة. وينبغي تكثيف علاج قصور الغدة الدرقية بواسطة ليفوتيروكس على أساس المراقبة البيولوجية لأن أخذ تحت الجرعة قد لا يحسن قصور الغدة الدرقية و أخذ فوق جرعة يمكن أن يسبب فرط التدرق.

- 1 - ما هو ليفوتيروكس قرص قابل للقطع و ما هي حالات استعماله؟
 - 2 - ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل استعمال ليفوتيروكس قرص قابل للقطع؟
 - 3 - ما هي طريقة استعمال ليفوتيروكس قرص قابل للقطع؟
 - 4 - ما هي التأثيرات غير المرغوبة المحتملة؟
 - 5 - ما هي طريقة حفظ ليفوتيروكس قرص قابل للقطع؟
- معلومات أخرى

قابل للقطع و ما هي حالات استعماله؟

6 118001 102013
Levothyrox® 50µg,
Comprimés sécables B/30
PPV: 13,40 DH

آثار على القدرة على قيادة المركبات و استخدام الآلات

MERCK

نشرة: معلومات الاستعمال

ليفوتيروكس® قرص قابل للقطع

ليفوتيروكسين صودي، عن طريق الفم

يجب قراءة هذه النشرة بأكملها بانتباه قبل استعمال هذا الدواء. لأنها تحتوي على معلومات هامة بالنسبة لك

- احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج لقراءتها من جديد
 - إذا كانت لديك أسئلة أخرى، اسأل طبيبك أو صيدليك
 - وصف لك هذا الدواء شخصياً. لا تعطيه لأحد سواك، حتى ولو كانت لديه نفس الأعراض التي لديك، لأن ذلك قد يسبب له الضرر
 - إذا كنت تواجه أي آثار جانبية، تحدث مع طبيبك أو صيدليك. وهذا ينطبق أيضاً على أي من الآثار الجانبية المحتملة غير المذكورة في هذه النشرة
- انظر الفقرة 4

تحتوي هذه النشرة:

فترة الحمل.

الاشتراك بين ليفوتيروكس مع مضادات الغدة الدرقية في علاج فرط التدرق لا يشار إليه خلال فترة الحمل. في الواقع، ليفوتيروكس يجتاز قليلاً جداً حاجز المشيمة، في حين مضادات الغدة الدرقية تجتازها بسهولة. لهذا قد يؤدي إلى خطورة حدوث قصور الغدة الدرقية عند الجنين.

الرضاعة الطبيعية هي ممكنة خلال فترة العلاج.

قصور الغدة الدرقية أو فرط التدرق قد يضعف الخصوبة. وينبغي تكثيف علاج قصور الغدة الدرقية بواسطة ليفوتيروكس على أساس المراقبة البيولوجية لأن أخذ تحت الجرعة قد لا يحسن قصور الغدة الدرقية و أخذ فوق جرعة يمكن أن يسبب فرط التدرق.

- 1 - ما هو ليفوتيروكس قرص قابل للقطع و ما هي حالات استعماله؟
 - 2 - ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل استعمال ليفوتيروكس قرص قابل للقطع؟
 - 3 - ما هي طريقة استعمال ليفوتيروكس قرص قابل للقطع؟
 - 4 - ما هي التأثيرات غير المرغوبة المحتملة؟
 - 5 - ما هي طريقة حفظ ليفوتيروكس قرص قابل للقطع؟
- معلومات أخرى

قابل للقطع و ما هي حالات استعماله؟

6 118001 102013
Levothyrox® 50µg,
Comprimés sécables B/30
PPV: 13,40 DH

آثار على القدرة على قيادة المركبات و استخدام الآلات

MERCK

نشرة: معلومات الاستعمال

ليفوتيروكس® قرص قابل للقطع

ليفوتيروكسين صودي، عن طريق الفم

يجب قراءة هذه النشرة بكاملها بانتباه قبل استعمال هذا الدواء. لأنها تحتوي على معلومات هامة بالنسبة لك

- احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج لقراءتها من جديد
 - إذا كانت لديك أسئلة أخرى، اسأل طبيبك أو صيدليك
 - وصف لك هذا الدواء شخصياً. لا تعطيه لأحد سواك، حتى ولو كانت لديه نفس الأعراض التي لديك، لأن ذلك قد يسبب له الضرر
 - إذا كنت تواجه أي آثار جانبية، تحدث مع طبيبك أو صيدليك. وهذا ينطبق أيضاً على أي من الآثار الجانبية المحتملة غير المذكورة في هذه النشرة
- انظر الفقرة 4

تحتوي هذه النشرة:

فترة الحمل.

الاشتراك بين ليفوتيروكس مع مضادات الغدة الدرقية في علاج فرط التدرق لا يشار إليه خلال فترة الحمل. في الواقع، ليفوتيروكس يجتاز قليلاً جداً حاجز المشيمة، في حين مضادات الغدة الدرقية تجتازها بسهولة. لهذا قد يؤدي إلى خطورة حدوث قصور الغدة الدرقية عند الجنين.

الرضاعة الطبيعية هي ممكنة خلال فترة العلاج.

قصور الغدة الدرقية أو فرط التدرق قد يضعف الخصوبة. وينبغي تكثيف علاج قصور الغدة الدرقية بواسطة ليفوتيروكس على أساس المراقبة البيولوجية لأن أخذ تحت الجرعة قد لا يحسن قصور الغدة الدرقية و أخذ فوق جرعة يمكن أن يسبب فرط التدرق.

- 1 - ما هو ليفوتيروكس قرص قابل للقطع و ما هي حالات استعماله؟
 - 2 - ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل استعمال ليفوتيروكس قرص قابل للقطع؟
 - 3 - ما هي طريقة استعمال ليفوتيروكس قرص قابل للقطع؟
 - 4 - ما هي التأثيرات غير المرغوبة المحتملة؟
 - 5 - ما هي طريقة حفظ ليفوتيروكس قرص قابل للقطع؟
- معلومات أخرى

قابل للقطع و ما هي حالات استعماله؟



7862160336

آثار على القدرة على قيادة المركبات و استخدام الآلات

MERCK

نشرة: معلومات الاستعمال

ليفوتيروكس® قرص قابل للقطع

ليفوتيروكسين صودي، عن طريق الفم

يجب قراءة هذه النشرة بكاملها بانتباه قبل استعمال هذا الدواء. لأنها تحتوي على معلومات هامة بالنسبة لك

- احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج لقراءتها من جديد
 - إذا كانت لديك أسئلة أخرى، اسأل طبيبك أو صيدليك
 - وصف لك هذا الدواء شخصياً. لا تعطيه لأحد سواك، حتى ولو كانت لديه نفس الأعراض التي لديك، لأن ذلك قد يسبب له الضرر
 - إذا كنت تواجه أي آثار جانبية، تحدث مع طبيبك أو صيدليك. وهذا ينطبق أيضاً على أي من الآثار الجانبية المحتملة غير المذكورة في هذه النشرة
- انظر الفقرة 4

تحتوي هذه النشرة:

فترة الحمل.

الاشتراك بين ليفوتيروكس مع مضادات الغدة الدرقية في علاج فرط التدرق لا يشار إليه خلال فترة الحمل. في الواقع، ليفوتيروكس يجتاز قليلاً جداً حاجز المشيمة، في حين مضادات الغدة الدرقية تجتازها بسهولة. لهذا قد يؤدي إلى خطورة حدوث قصور الغدة الدرقية عند الجنين.

الرضاعة الطبيعية هي ممكنة خلال فترة العلاج.

قصور الغدة الدرقية أو فرط التدرق قد يضعف الخصوبة. وينبغي تكثيف علاج قصور الغدة الدرقية بواسطة ليفوتيروكس على أساس المراقبة البيولوجية لأن أخذ تحت الجرعة قد لا يحسن قصور الغدة الدرقية و أخذ فوق جرعة يمكن أن يسبب فرط التدرق.

- 1 - ما هو ليفوتيروكس قرص قابل للقطع و ما هي حالات استعماله؟
 - 2 - ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل استعمال ليفوتيروكس قرص قابل للقطع؟
 - 3 - ما هي طريقة استعمال ليفوتيروكس قرص قابل للقطع؟
 - 4 - ما هي التأثيرات غير المرغوبة المحتملة؟
 - 5 - ما هي طريقة حفظ ليفوتيروكس قرص قابل للقطع؟
- معلومات أخرى

قابل للقطع و ما هي حالات استعماله؟



7862160336

آثار على القدرة على قيادة المركبات و استخدام الآلات