

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
 Prise en charge : pec@mupras.com
 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

N° W19-421629

(108069)

Maladie Dentaire Optique Autres

Matricule : 7207 Société :

Actif Pensionné(e) Autre :

Nom & Prénom : EL RIFAI MOHAMMED

Date de naissance : 01-01-1957

Adresse : 6 RUE ATAYAK ABYAD HAYRAH

Tél. : 062 447 587 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation :

Nom et prénom du malade : DR. RACHID ABOUTAIEB

Lien de parenté : Fils - Fille - Conjoint - Enfant

Nature de la maladie : Urologue

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Signature de l'adhérent(e) : EL RIFAI

Le : 16 MAR. 2022

Dr. Rachid ABOUTAIEB

Chirurgien Urologue

Professeur Agrégé

Hôpital Al Akhdar

clinique Al Akhdar

VOLET ADHERENT

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRE				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
21/01/22		5	350,-	INP : 111111111111 Hayati Amane Rachid ABOUT Trol
12/02/22		5	250,-	



Casablanca le

21/1/22

M² Zahrir Najar

224.00 x 2

Meiack

- 14 x 2 | j

x 15 j -

22.20

Co d'abonnement

14 x 2 | j

x 15 j

*Clinique Al Amane
39 Rue Mohamed AL HAYANI (ex Lamenais), Franceville, Casablanca
Tél : 05 22 25 38 72, 05 22 25 10 62 - Fax : 05 22 98 88 94
Web : www.cliniquealamane.com - Mail : contact@cliniquealamane.com*

*Pharmacie des Clubs
Tél. : 05 22 25 38 72
Fax : 05 22 25 38 72
Souscription : 05 22 25 38 72*

*Dr. Rachid ABOUTAIEB
Chirurgien Urologue
Professeur Agrégé
Clinique Al Amane*

Meiact®

Cefditoren pivoxil

Composition:

Meiact 200 mg: Chaque comprimé pelliculé contient: Du cefditoren pivoxil équivalent à 200 mg de cefditoren.

Meiact 400 mg: Chaque comprimé pelliculé contient: Du cefditoren pivoxil équivalent à 400 mg de cefditoren.

Excipients: Caseinate de sodium, croscarmellose sodique, mannitol, tripolyphosphate sodique, stearate de magnésium, opadry, cire de carnauba, émulsion de silicium.

Propriétés:

Le cefditoren pivoxil est un antibiotique semi-synthétique de la classe des céphalosporines destiné à une administration orale. Au cours de l'absorption, il est métabolisé en cefditoren, qui est doté d'une activité antibactérienne contre diverses bactéries, qui est due à une activité antibactérienne contre de β -lactamase.

Méthode de la paroi cellulaire des bactéries et possède les protéines de liaison des penicillines dans diverses effets bactéricides. Cefditoren est principalement éliminé par excretion dans l'urine environ 4 à 5 lh, clairance réduite chez l'insuffisance rénale.

Utilités:

es infections suivantes:

Spéciales:

le, abcès périamygallien), pharyngolaryngite (abcès

ne, sinusite, bronchite aiguë, exacerbation aiguë de

une bactérienne, dilatation des bronches avec infection,

Infections de la peau et des tissus mous:

Folliculite, furoncule, impétigo vulgaire, érysipèle, phlegmon, lymphangite (adenite), paronchie suppurative (panaris superficiel périungueal), panaris, abcès sous-cutané, hidradénite, athérome infectieux, pyodermité chronique.

Infections chirurgicales:

Mastite, abcès périanal, infection secondaire superficielle dans un traumatisme, lésion chirurgicale.

Infections de l'appareil urinaire:

Interactions médicamenteuses:

L'administration concomitante du cefditoren pivoxil avec des antiacides et des antagonistes des récepteurs H₂ diminue l'absorption du cefditoren.

L'administration concomitante du cefditoren pivoxil avec du probénécide augmente la concentration plasmatique du cefditoren.

Le cefditoren pivoxil n'a aucun effet sur la pharmacocinétique de l'émphysothérapie (le composant œstrogénique de la plupart des contraceptifs).

Posologie et mode d'administration:

Le cefditoren pivoxil est administré par voie orale au milieu des repas (afin d'augmenter l'absorption gastro-intestinale). La posologie habituelle du cefditoren pivoxil chez les adultes et les adolescents de 12 ans et plus est de 200 mg deux fois par jour pendant 10 jours, en fonction de la gravité des symptômes.

Surdosage:

Aucune information de surdosage n'a été rapportée à propos du cefditoren pivoxil.

Effets indésirables:

Choc ou réaction anaphylactoïde: Sensation de malaise, gêne de la cavité buccale, stridor, vertige, besoin de défécation, acouphènes, diaphorèse.

Colite grave avec présence de sang dans les selles, telle qu'une entérocolite muco-Syndrome de Stevens-Johnson (syndrome oculo-cutané-muqueux) ou Syndrome de Lyell (syndrome épidermique toxique).

Pneumonie interstitielle, syndrome de Löffler accompagné de fièvre, toux, dyspnée, radiographie thoracique normale et éosinophilie.

Trouble de la fonction hépatique associé à un ictere, augmentation marquée des ASAT (GOT), ALAT (GPT) et A1-P. Dysfonction rénale grave telle qu'une insuffisance rénale aiguë, agranulocytose ou anémie hémolytique.

Hypersensibilité: Éruption cutanée, urticaria, crise sérique, protéinurie et hématurie.

Effets hématologiques: Granulopénie, éosinophilie et thrombopénie.

Effets rénaux: Augmentation de l'azoture uréique du sang, augmentation de la créatinine sérique, protéinurie et hématurie.

Effets Gastro-Intestinaux: Diarrhée, selles trop liquides, nausées, gêne à l'estomac, douleurs abdominales, sensation d'abdomen étiré et vomissement.

Substitution microbienne: Stomatite, candidose.

Antiphospholipase: Symptômes de déficit en vitamine K (hypoprothrombinémie, tendance aux saignements), symptômes de déficit en vitamines du groupe B (glossite, stomatite, anorexie et névrite).

Autres: Maux de tête, état vertigineux, ordre et engourdissements.

P.P.V. 224.0 MAD

Meiact®

Cefditoren pivoxil

Composition:

Meiact 200 mg: Chaque comprimé pelliculé contient: Du cefditoren pivoxil équivalent à 200 mg de cefditoren.

Meiact 400 mg: Chaque comprimé pelliculé contient: Du cefditoren pivoxil équivalent à 400 mg de cefditoren.

Excipients: Caseinate de sodium, croscarmellose sodique, mannitol, tripolyphosphate sodique, stearate de magnésium, opadry, cire de carnauba, émulsion de silicium.

Propriétés:

Le cefditoren pivoxil est un antibiotique semi-synthétique de la classe des céphalosporines destiné à une administration orale. Au cours de l'absorption, il est métabolisé en cefditoren, qui est doté d'une activité antibactérienne contre diverses bactéries, qui est due à une activité antibactérienne contre de β -lactamase.

Méthode de la paroi cellulaire des bactéries et possède les protéines de liaison des penicillines dans diverses effets bactéricides. Cefditoren est principalement éliminé par excretion dans l'urine environ 4 à 5 lh, clairance réduite chez l'insuffisance rénale.

Utilités:

Les infections suivantes:

Spécifiques:

Ile, abcès périamygallien), pharyngolaryngite (abcès tonsillaire, sinusite, bronchite aiguë, exacerbation aiguë de l'abcès bronchique), pharyngolaryngite (abcès bronchique, dilatation des bronches avec infection,

Infections de la peau et des tissus mous:

Folliculite, furoncule, impétigo vulgaire, érysipèle, phlegmon, lymphangite (adénite), paronchie suppurative (panaris superficiel périungueal), panaris, abcès sous-cutané, hidradénite, athérome infectieux, pyodermité chronique.

Infections chirurgicales:

Mastite, abcès périanal, infection secondaire superficielle dans un traumatisme, lésion chirurgicale.

Infections de l'appareil urinaire:

Interactions médicamenteuses:

L'administration concomitante du cefditoren pivoxil avec des antiacides et des antagonistes des récepteurs H₂ diminue l'absorption du cefditoren.

L'administration concomitante du cefditoren pivoxil avec du probénécide augmente la concentration plasmatique du cefditoren.

Le cefditoren pivoxil n'a aucun effet sur la pharmacocinétique de l'émphysothérapie (le composant œstrogénique de la plupart des contraceptifs).

Posologie et mode d'administration:

Le cefditoren pivoxil est administré par voie orale au milieu des repas (afin d'augmenter l'absorption gastro-intestinale). La posologie habituelle du cefditoren pivoxil chez les adultes et les adolescents de 12 ans et plus est de 200 mg deux fois par jour pendant 10 jours, en fonction de la gravité des symptômes.

Surdosage:

Aucune information de surdosage n'a été rapportée à propos du cefditoren pivoxil.

Effets indésirables:

Choc ou réaction anaphylactoïde: Sensation de malaise, gêne de la cavité buccale, stridor, vertige, besoin de défécation, acouphènes, diaphorèse.

Colite grave avec présence de sang dans les selles, telle qu'une entérocolite muco-Syndrome de Stevens-Johnson (syndrome oculo-cutané-muqueux) ou Syndrome de Lyell (syndrome épidermique toxique).

Pneumonie interstitielle, syndrome de Löffler accompagné de fièvre, toux, dyspnée, radiographie thoracique normale et éosinophilie.

Trouble de la fonction hépatique associé à un ictere, augmentation marquée des ASAT (GOT), ALAT (GPT) et A1-P. Dysfonction rénale grave telle qu'une insuffisance rénale aiguë, agranulocytose ou anémie hémolytique.

Hypersensibilité: Éruption cutanée, urticaria, érythème, prurit, fièvre, gonflement des glandes lymphatiques et artérite.

Effets hématologiques: Granulopénie, éosinophilie et thrombopénie.

Effets rénaux: Éruption cutanée, urticaria, érythème, prurit, fièvre, crétinisme sérique, protéinurie et hématurie.

Effets Gastro-Intestinaux: Diarrhée, selles trop liquides, nausées, gêne à l'estomac, douleurs abdominales, sensation d'abdomen étiré et vomissement.

Substitution microbienne: Stomatite, candidose.

Antiphospholipase: Symptômes de déficit en vitamine K (hypoprothrombinémie, tendance aux saignements), symptômes de déficit en vitamines du groupe B (glossite, stomatite, anorexie et névrite).

Autres: Maux de tête, état vertigineux, ordre et engourdissements.

P.P.V. 224.0 MAD



Codoliprар

PARACETAMOL ET CODEINE

IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

COMPOSITION

Paracétamol
Phosphate de codeine hémihydraté
(Quantité correspondant à codeine base)
Excipients : gélatine, acide stéarique, amidon de pomme de terre, povidone

PPV : 22DH20

PER : 12/23

LOT : K3410

FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimé sécable - boîte de 16.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

ANTALGIQUE CENTRAL ET PERIPHERIQUE (N. Système nerveux)

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Traitements chez l'adulte des douleurs d'intensité modérée à intense, qui ne sont pas soulagées par l'aspirine ou le paracétamol utilisé seul.

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- allergie connue au paracétamol ou à la codeine,
- maladie grave du foie,
- chez l'asthmatique,
- en cas d'insuffisance respiratoire,
- allaitement.

Ce médicament NE DOIT GENERALEMENT PAS ETRE UTILISE, sauf avis contraire de votre médecin avec des médicaments contenant de la buprénorphine, de la nalbuphine ou de la pentazocine.
EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE SPECIALES

En cas de maladie chronique (au long cours) des bronches ou des poumons s'accompagnant d'expectoration, en cas de maladie du foie ou d'insuffisance rénale ainsi que chez les sujets âgés, un avis médical est indispensable. Ne pas utiliser ce médicament de façon prolongée en raison du risque de dépendance.

PRECAUTION D'EMPLOI

La prise de boissons alcoolisées durant le traitement est déconseillée.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS. Notamment avec la buprénorphine, la nalbuphine ou la pentazocine, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Ce médicament contient du paracétamol et de la codéine. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées (cf. posologie).





Casablanca le 12-2-2022

M = Zahrbi Nagat

22 M. 00

Mei akt



2/5

X5j



*Clinique Al Amane
39 Rue Mohamed El Hayat
France Ville Casablanca
Tél: 05 22 25 80 70 / 05 22 25 10*

~~Dr. Rachid ABOUTAIEB
Chirurgien Urologue
Professeur Agrégé
Clinique Al Amane~~

Meiact®

Cefditoren pivoxil

Composition:

Meiact 200 mg: Chaque comprimé pelliculé contient: Du cefditoren pivoxil équivalent à 200 mg de cefditoren.

Meiact 400 mg: Chaque comprimé pelliculé contient: Du cefditoren pivoxil équivalent à 400 mg de cefditoren.

Excipients: Caseinate de sodium, croscarmellose sodique, mannitol, tripolyphosphate sodique, stearate de magnésium, opadry, cire de carnauba, émulsion de silicium.

Propriétés:

Le cefditoren pivoxil est un antibiotique semi-synthétique de la classe des céphalosporines destiné à une administration orale. Au cours de l'absorption, il est métabolisé en cefditoren, qui est doté d'une activité antibactérienne contre diverses bactéries, qui est due à une activité antibactérienne contre de β -lactamase.

Méthode de la paroi cellulaire des bactéries et possède les protéines de liaison des penicillines dans diverses effets bactéricides. Cefditoren est principalement éliminé par excretion dans l'urine environ 4 à 5 lh, clairance réduite chez l'insuffisance rénale.

Utilités:

es infections suivantes:

Spéciales:

le, abcès périamygallien), pharyngolaryngite (abcès

ne, sinusite, bronchite aiguë, exacerbation aiguë de

une bactérienne, dilatation des bronches avec infection,

Infections de la peau et des tissus mous:

Folliculite, furoncule, impétigo vulgaire, érysipèle, phlegmon, lymphangite (adenite), paronchie suppurative (panaris superficiel périungueal), panaris, abcès sous-cutané, hidradénite, athérome infectieux, pyodermité chronique.

Infections chirurgicales:

Mastite, abcès périanal, infection secondaire superficielle dans un traumatisme, lésion chirurgicale.

Infections de l'appareil urinaire:

Interactions médicamenteuses:

L'administration concomitante du cefditoren pivoxil avec des antiacides et des antagonistes des récepteurs H₂ diminue l'absorption du cefditoren.

L'administration concomitante du cefditoren pivoxil avec du probénécide augmente la concentration plasmatique du cefditoren.

Le cefditoren pivoxil n'a aucun effet sur la pharmacocinétique de l'émphysothérapie (le composant œstrogénique de la plupart des contraceptifs).

Posologie et mode d'administration:

Le cefditoren pivoxil est administré par voie orale au milieu des repas (afin d'augmenter l'absorption gastro-intestinale). La posologie habituelle du cefditoren pivoxil chez les adultes et les adolescents de 12 ans et plus est de 200 mg deux fois par jour pendant 10 jours, en fonction de la gravité des symptômes.

Surdosage:

Aucune information de surdosage n'a été rapportée à propos du cefditoren pivoxil.

Effets indésirables:

Choc ou réaction anaphylactoïde: Sensation de malaise, gêne de la cavité buccale, stridor, vertige, besoin de défécation, acouphènes, diaphorèse.

Colite grave avec présence de sang dans les selles, telle qu'une entérocolite muco-Syndrome de Stevens-Johnson (syndrome oculo-cutané-muqueux) ou Syndrome de Lyell (syndrome épidermique toxique).

Pneumonie interstitielle, syndrome de Löffler accompagné de fièvre, toux, dyspnée, radiographie thoracique normale et éosinophilie.

Trouble de la fonction hépatique associé à un ictere, augmentation marquée des ASAT (GOT), ALAT (GPT) et A1-P. Dysfonction rénale grave telle qu'une insuffisance rénale aiguë, agranulocytose ou anémie hémolytique.

Hypersensibilité: Éruption cutanée, urticaria, crise sérique, protéinurie et hématurie.

Effets hématologiques: Granulopénie, éosinophilie et thrombopénie.

Effets rénaux: Augmentation de l'azoture uréique du sang, augmentation de la créatinine sérique, protéinurie et hématurie.

Effets Gastro-Intestinaux: Diarrhée, selles trop liquides, nausées, gêne à l'estomac, douleurs abdominales, sensation d'abdomen étiré et vomissement.

Substitution microbienne: Stomatite, candidose.

Antiphospholipase: Symptômes de déficit en vitamine K (hypoprothrombinémie, tendance aux saignements), symptômes de déficit en vitamines du groupe B (glossite, stomatite, anorexie et névrite).

Autres: Maux de tête, état vertigineux, ordre et engourdissements.

P.P.V. 224.0 MAD



Service Consultation

Reçu N° 0003590

Nom du patient : Zaubi Nayat

Age :

Tél :

Date : 21/11/2022

Heure :

Organisme : mtsel

Medecin : f. abotah

Nature de l'acte :

Acte Complémentaire :

Prix : 350

Avance :

Reste :

Reçu par :



Dr Rachid ABOUAIER
Chirurgien Urologue
Professeur Agrégé
Clinique Al Amane

Signature