

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

Nº M21- 0054401

108212

Optique

Autres

Maladie

Dentaire

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 2073 Société :

Actif Pensionné(e) Autre :

Nom & Prénom : BENBILY Tafjani

Date de naissance : 13/03/1946

Adresse : BP 213 1.000 EL HAJEB

Tél. : 06.64.34.62.61 Total des frais engagés : 120000 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Dr. Talbi Ahmed
MEDICIN GENERALISTE
36 شارع الحسن الثاني، الدار البيضاء
36, Av. Hassan II - BL HAJEB
05 38 64 30 28

Autorisation CNDP N° : AA-215 / 2019

Cachet du médecin :

Date de consultation : / /

Nom et prénom du malade : Bensbil Tafjani Age :

Lien de parenté : Lui-même Conjoint

Nature de la maladie : HTA

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : El Hajeb Le : 18/02/2022

Signature de l'adhérent(e) :



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
03-02-2022	C		110,20	 Dr. Tahbi Ahmed MEDICIN GENERALISTE 36 شارع الحبيب زهبي 95 Avenue Hussain El HAJEB التلفون: 30 88

EXECUTION DES ORDONNANCES

INPE 13204573

Pharmacie Nouvelle Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur Mme DOUNYA MOHATTANE 42, Avenue Hassan II El Hajeb Tél. : 05 35 54 30 38	Date 08/02/2022	Montant de la Facture Mme DOUNYA MOHATTANE 42, Avenue Hassan II El Hajeb Tel : 05 35 54 30 38
---	--------------------------------------	--

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Cœfficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de la

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES		DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE		
		H 25533412 21433552 00000000 00000000 D ----- G 00000000 00000000 35533411 11433553 B		COEFFICIENT DES TRAVAUX
		[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession		MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXÉCUTION

Docteur TALBI Ahmed

Médecine Générale
DIPLOME DE LA FACULTE
DE MEDECINE DE RABAT
DIPLOME D'UNIVERSITE
D'ASTHMOLOGIE

36, Av. Hassan II - EL-HAJEB

Tél. { C. 05.35.54.30.88
D. 05.35.54.34.26

الدكتور طالبي أحمد

الطب العام

**خريج كلية الطب بالرباط
وبليوم جامعي في الرباط**

36، شارع الحسن الثاني - الحاجب

05.35.54.30.88. ع
الهاتف { 05.35.54.34.26. م

EL Hajeb, le 08/02/2022 الحاجب في

m¹ Bonbonniere

3x 97.30

7 Clevastin 42mg (30)

PPV: 97DH60
PER: 11/23
LOT: K3127-2

7g 1/13m

3x 122.10

7 Triac 4 mg (30)

97,60

7g 1/13m

PPV: 97DH60
PER: 05/23
LOT: K1484-2

3x 31.30

246cc 4 200 (36f)

97,60

7g 5/13m

PPV: 97DH60
PER: 05/23
LOT: K1484-2

13.40 4 Colchicum 4

7g 5

SV

766.40

Pharmacie Nouvelle

Mme DOUNYA MOHATTANE

42, Avenue Hassan II

El Hajeb

Tél. : 05 35 54 30 38

الدكتور طالبي
الطب العام
36 شارع الحسن الثاني - الحاجب
36, AV. HASSAN II - EL-HAJEB
05 35 54 30 38

ZYLORIC

LOT
EXP
PPV

211335
05 2025
31.30

Veuillez lire attentivement ce médicament car

- Gardez cette notice pour la lire ou la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que ZYLORIC comprimés, et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ZYLORIC, comprimés ?
3. Comment prendre ZYLORIC comprimés ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ZYLORIC comprimés ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE ZYLORIC comprimés, ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Les comprimés de ZYLORIC contiennent un principe actif appelé l'allopurinol. Il agit en ralentissant la vitesse de certaines réactions chimiques dans votre organisme afin de diminuer le taux d'acide urique dans le sang et les urines. ZYLORIC, comprimé est utilisé pour réduire ou prévenir la formation de dépôts d'urate/d'acide urique lorsque votre organisme produit en trop grande quantité une substance appelée l'acide urique. Ces dépôts sont responsables de la goutte ou de certains types de calculs rénaux ou de certains autres types de problèmes rénaux.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ZYLORIC comprimés ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais ZYLORIC, comprimé :

- En cas d'allergie connue à l'allopurinol ou à l'un des constituants du produit mentionnés dans la rubrique 6.
- Chez l'enfant de moins de 6 ans (contre-indication liée à la forme pharmaceutique).

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Avertissements et précautions :

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère avant de prendre ZYLORIC mg, comprimé si vous :

- Avez des problèmes au niveau de votre foie ou de vos reins.
- Souffrez de problèmes cardiaques ou d'une hypertension artérielle et si vous prenez des diurétiques et/ou un médicament appelé un IEC (inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine).
- Souffrez actuellement d'une crise de goutte.
- Etes d'origine chinoise, ethnies Han, africaine ou indienne.
- Avez des problèmes de thyroïde.

Faites particulièrement attention avec ZYLORIC, comprimé :

- Des éruptions cutanées ont été signalées chez des patients prenant de l'allopurinol. Fréquemment, l'éruption cutanée peut entraîner des ulcères au niveau de la bouche, de la gorge, du nez, des organes génitaux et une conjonctivite (yeux rouges et gonflés). Ces éruptions cutanées graves sont souvent précédées par des symptômes pseudo-grippaux, fièvre, maux de tête, courbatures (symptômes ressemblant à la grippe). L'éruption peut évoluer vers une apparition de vésicules sur tout le corps et une desquamation de la peau. En cas d'éruption cutanée ou de symptômes cutanés, arrêtez de prendre

allopurinol et contactez votre pharmacien ou votre infirmier/ère dans les voies médicamenteuses. Ne prenez pas de médicaments sans ordonnance, tels que la phylline, utilisés comme stimulants.

- Vidarabine (anti-virus).
- Didanosine, utilisée contre le VIH.
- Antibiotiques (amoxicilline).
- Médicaments utilisés contre les pressions artérielles, par exemple.
- Médicaments utilisés contre les crises d'épilepsie.
- Médicaments pour les maladies cardiaques, comme des IEC (inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine).
- Médicaments utilisés contre l'hypertension.
- Tout autre médicament.

Veuillez avertir votre pharmacien si vous avez récemment pris tous ces médicaments sans ordonnance, en particulier si vous êtes enceinte ou si vous planifiez une grossesse. Si vous êtes enceinte, contactez votre pharmacien avant de prendre ce médicament. L'utilisation de ZYLORIC par une femme enceinte peut entraîner des anomalies congénitales. En raison du risque pour l'enfant, il est recommandé de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Conduite de voitures et autres activités dangereuses
Dans de rares cas, ZYLORIC peut provoquer des étourdissements, des vertiges et des hallucinations. Si vous êtes en état de conduire une automobile ou une autre machine, veillez à ne pas prendre ce médicament.

Liste des excipients

Si votre médecin vous a prescrit ZYLORIC, comprimé, contactez votre pharmacien pour obtenir la liste des ingrédients. L'utilisation de ce médicament peut entraîner une intolérance au glucose et à la glycémie. Les personnes qui ont une malabsorption du glucose doivent éviter de prendre ce médicament.

3. COMMENT PRENDRE ZYLORIC comprimés ?

Veuillez à toujours prendre ZYLORIC comprimé sous surveillance de votre médecin ou d'un pharmacien. Ne prenez pas ce médicament si vous n'avez pas de douleur. Les comprimés doivent être pris avec de l'eau ou avec un repas.

Posologie
La posologie recommandée est de 1 comprimé par jour. Vous commencerez par 1 comprimé par jour et augmenterez progressivement jusqu'à ce que les symptômes disparaissent. Si vous êtes âgé(e) de plus de 65 ans, votre médecin pourra vous prescrire une dose quotidienne de 1 comprimé par jour. Si vous êtes âgé(e) de plus de 75 ans, votre médecin pourra vous prescrire une dose quotidienne de 1 comprimé par jour. Si vous êtes âgé(e) de plus de 85 ans, votre médecin pourra vous prescrire une dose quotidienne de 1 comprimé par jour.

Utilisation chez les enfants
Les posologies recommandées pour les enfants sont basées sur la surface corporelle. Les comprimés doivent être pris avec de l'eau ou avec un repas.

Mode et voie d'action
ZYLORIC est un inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC). Il empêche l'enzyme de conversion de l'angiotensine de convertir l'angiotensinogenie en angiotensine II. L'angiotensine II est une hormone qui contribue à la contraction des vaisseaux sanguins et à la production d'acide urique dans le corps.

Voie orale
Les comprimés doivent être pris avec de l'eau ou avec un repas.

ZYLORIC

LOT
EXP
PPV

211335
05 2025
31.30

Veuillez lire attentivement ce médicament car

- Gardez cette notice pour la lire ou la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que ZYLORIC comprimés, et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ZYLORIC, comprimés ?
3. Comment prendre ZYLORIC comprimés ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ZYLORIC comprimés ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE ZYLORIC comprimés, ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Les comprimés de ZYLORIC contiennent un principe actif appelé l'allopurinol. Il agit en ralentissant la vitesse de certaines réactions chimiques dans votre organisme afin de diminuer le taux d'acide urique dans le sang et les urines. ZYLORIC, comprimé est utilisé pour réduire ou prévenir la formation de dépôts d'urate/d'acide urique lorsque votre organisme produit en trop grande quantité une substance appelée l'acide urique. Ces dépôts sont responsables de la goutte ou de certains types de calculs rénaux ou de certains autres types de problèmes rénaux.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ZYLORIC comprimés ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais ZYLORIC, comprimé :

- En cas d'allergie connue à l'allopurinol ou à l'un des constituants du produit mentionnés dans la rubrique 6.
- Chez l'enfant de moins de 6 ans (contre-indication liée à la forme pharmaceutique).

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Avertissements et précautions :

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère avant de prendre ZYLORIC mg, comprimé si vous :

- Avez des problèmes au niveau de votre foie ou de vos reins.
- Souffrez de problèmes cardiaques ou d'une hypertension artérielle et si vous prenez des diurétiques et/ou un médicament appelé un IEC (inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine).
- Souffrez actuellement d'une crise de goutte.
- Etes d'origine chinoise, ethnies Han, africaine ou indienne.
- Avez des problèmes de thyroïde.

Faites particulièrement attention avec ZYLORIC, comprimé :

- Des éruptions cutanées ont été signalées chez des patients prenant de l'allopurinol. Fréquemment, l'éruption cutanée peut entraîner des ulcères au niveau de la bouche, de la gorge, du nez, des organes génitaux et une conjonctivite (yeux rouges et gonflés). Ces éruptions cutanées graves sont souvent précédées par des symptômes pseudo-grippaux, fièvre, maux de tête, courbatures (symptômes ressemblant à la grippe). L'éruption peut évoluer vers une apparition de vésicules sur tout le corps et une desquamation de la peau. En cas d'éruption cutanée ou de symptômes cutanés, arrêtez de prendre

allopurinol et contactez votre pharmacien ou votre infirmier/ère dans les voies médicamenteuses. Ne prenez pas de médicaments sans ordonnance, tels que la phylline, utilisés autrement que prescrit.

- Vidarabine (anti-virus).
- Didanosine, utilisée contre le VIH.
- Antibiotiques (amoxicilline).
- Médicaments utilisés contre les pressions artérielles, par exemple.
- Médicaments utilisés contre les crises d'épilepsie.
- Médicaments pour les maladies cardiaques, comme des IEC (inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine).
- Médicaments utilisés contre l'hypertension.
- Tout autre médicament.

Veuillez avertir votre pharmacien si vous avez récemment pris tous ces médicaments sans ordonnance, en particulier si vous êtes enceinte ou si vous planifiez une grossesse. Si vous êtes enceinte, contactez votre pharmacien avant de prendre ce médicament. L'utilisation de ZYLORIC par une femme enceinte peut entraîner des anomalies congénitales. En raison du risque pour l'enfant, il est recommandé de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Conduite de votre médicament
Dans de rares cas, certains médicaments, des végétaux ou des aliments peuvent provoquer des réactions allergiques. Si vous êtes enceinte ou si vous planifiez une grossesse, contactez votre pharmacien.

Liste des excipients
Si votre pharmacien vous demande de lister les ingrédients de ce médicament, contactez votre pharmacien. L'utilisation de certains médicaments peut entraîner une intolérance au glucose ou à la fructose, qui peuvent entraîner une malabsorption du sucre.

3. COMMENT PRENDRE ZYLORIC
Veillez à toujours prendre ce médicament sous surveillance de votre pharmacien ou de votre infirmier/ère. Les comprimés doivent être pris avec un repas.

Posologie
La posologie recommandée est de 1 comprimé par jour. Vous commencerez par 1 comprimé par jour et augmenterez progressivement jusqu'à ce que les effets thérapeutiques soient atteints. Si vous êtes âgé(e) de plus de 65 ans, votre pharmacien pourra vous conseiller une dose quotidienne de 1 comprimé par jour. Si vous êtes âgé(e) de plus de 75 ans, votre pharmacien pourra vous conseiller une dose quotidienne de 1 comprimé par jour. Si vous êtes âgé(e) de plus de 85 ans, votre pharmacien pourra vous conseiller une dose quotidienne de 1 comprimé par jour.

Utilisation chez les enfants
Les posologies recommandées pour les enfants sont basées sur la surface corporelle. Les comprimés doivent être pris avec un repas.

Mode et voie d'action
ZYLORIC est un inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC). Il empêche l'enzyme de conversion de l'angiotensine de convertir l'angiotensinogenine en angiotensine II. L'angiotensine II est une hormone qui contribue à la contraction des vaisseaux sanguins et à la production d'acide urique. En empêchant l'enzyme de conversion de l'angiotensine de faire son travail, ZYLORIC réduit la quantité d'acide urique dans le sang et les urines.

TRIATEC®

,25 mg, 2,5 mg, 5 mg, 10 mg

Ramipril

Comprimé

sanofi aventis

Cette notice ét
attentivement ;
pas hésiter à co

remise à jour, il convient de la lire
nouvelle boîte. Pour toute question ne
m'in ou pharmacien.

COMPOSITION

TRIATEC® 1,25	1,25 mg/comprimé
TRIATEC® 2,5 m	2,5 mg/comprimé
TRIATEC® 5 mg	5 mg/comprimé
TRIATEC® Prote	10 mg/comprimé
Excipients (cor préglatinisé, ce	opylméthylcellulose, amidon de maïs ne, stéaryl fumarate de sodium, oxyde de yde de fer rouge (pour TRIATEC® 5 mg).

SENTATIONS

- 1,25 à 1,25 mg, boîte de 30.
, à 2,5 mg, boîte de 30.
15 mg, boîtes de 15 et 30.
5 dosés à 10 mg, boîtes de 15 et 30.

INDICATIONS

- Hypertension artérielle.
- Insuffisance cardiaque.
- Réduction de la mortalité en cas d'insuffisance cardiaque après la phase aiguë d'un infarctus du myocarde.
- Néphropathie glomérulaire manifeste avec ou sans diabète.
- Début de néphropathie diabétique chez les patients souffrant de diabète du type II et d'hypertension artérielle.
- Maladie vasculaire avec athérosclérose établie (avec ou sans diabète de type II) : prévention de l'infarctus du myocarde, de l'accident vasculaire cérébral ou des décès cardiovasculaires.

CONTRE-INDICATIONS

- Hypersensibilité au ramipril, à un autre inhibiteur de l'enzyme de

TRIATEC®

,25 mg, 2,5 mg, 5 mg, 10 mg

Ramipril

Comprimé

sanofi aventis

Cette notice ét
attentivement ;
pas hésiter à co

remise à jour, il convient de la lire
nouvelle boîte. Pour toute question ne
m'in ou pharmacien.

COMPOSITION

TRIATEC® 1,25	1,25 mg/comprimé
TRIATEC® 2,5 m	2,5 mg/comprimé
TRIATEC® 5 mg	5 mg/comprimé
TRIATEC® Prote	10 mg/comprimé
Excipients (cor préglatinisé, ce	opylméthylcellulose, amidon de maïs ne, stéaryl fumarate de sodium, oxyde de yde de fer rouge (pour TRIATEC® 5 mg).

SENTATIONS

- 1,25 à 1,25 mg, boîte de 30.
, à 2,5 mg, boîte de 30.
15 mg, boîtes de 15 et 30.
5 dosés à 10 mg, boîtes de 15 et 30.

INDICATIONS

- Hypertension artérielle.
- Insuffisance cardiaque.
- Réduction de la mortalité en cas d'insuffisance cardiaque après la phase aiguë d'un infarctus du myocarde.
- Néphropathie glomérulaire manifeste avec ou sans diabète.
- Début de néphropathie diabétique chez les patients souffrant de diabète du type II et d'hypertension artérielle.
- Maladie vasculaire avec athérosclérose établie (avec ou sans diabète de type II) : prévention de l'infarctus du myocarde, de l'accident vasculaire cérébral ou des décès cardiovasculaires.

CONTRE-INDICATIONS

- Hypersensibilité au ramipril, à un autre inhibiteur de l'enzyme de

TRIATEC®

,25 mg, 2,5 mg, 5 mg, 10 mg

Ramipril

Comprimé

sanofi aventis

Cette notice ét
attentivement ;
pas hésiter à co

remise à jour, il convient de la lire
nouvelle boîte. Pour toute question ne
m'in ou pharmacien.

COMPOSITION

TRIATEC® 1,25	1,25 mg/comprimé
TRIATEC® 2,5 m	2,5 mg/comprimé
TRIATEC® 5 mg	5 mg/comprimé
TRIATEC® Prote	10 mg/comprimé
Excipients (cor préglatinisé, ce	opylméthylcellulose, amidon de maïs ne, stéaryl fumarate de sodium, oxyde de yde de fer rouge (pour TRIATEC® 5 mg).

SENTATIONS

- 1,25 à 1,25 mg, boîte de 30.
, à 2,5 mg, boîte de 30.
15 mg, boîtes de 15 et 30.
5 dosés à 10 mg, boîtes de 15 et 30.

INDICATIONS

- Hypertension artérielle.
- Insuffisance cardiaque.
- Réduction de la mortalité en cas d'insuffisance cardiaque après la phase aiguë d'un infarctus du myocarde.
- Néphropathie glomérulaire manifeste avec ou sans diabète.
- Début de néphropathie diabétique chez les patients souffrant de diabète du type II et d'hypertension artérielle.
- Maladie vasculaire avec athérosclérose établie (avec ou sans diabète de type II) : prévention de l'infarctus du myocarde, de l'accident vasculaire cérébral ou des décès cardiovasculaires.

CONTRE-INDICATIONS

- Hypersensibilité au ramipril, à un autre inhibiteur de l'enzyme de