

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR TIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

ditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

macie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

ologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

que :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

ducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

taire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

adie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com
Prise en charge : pec@mupras.com
Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

JPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

RAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge
Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie
N° M21- 0021919

☐ Maladie ☐ Dentaire ☒ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 10578 Société : 108589
☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :
Nom & Prénom : MATHOUDI MAREK
Date de naissance : 10/03/1960
Adresse : AKID ELALLAM N° 8 MAY MOULAY RACHID II
BOURNAZIL
Tél. : 06-10-38-35-35 Total des frais engagés : 1025,00 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :
Date de consultation : 04 Mars 2022
Nom et prénom du malade : Soukaina Age :
Lien de parenté : ☐ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant
Nature de la maladie : Double + pharyngite
En cas d'accident préciser les causes et circonstances :
Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : C.A.S.A. Le : 21/03/2022
Signature de l'adhérent(e) :

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
04 Mars 2022		C	150.26	Dr. MEDENSAIR 73, Av. Colonne d'Alger - Casablanca (en dessus d'Alcazar) BORDJ Tél : 05 22 72 42 42

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	06.03.22	875.00

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan d

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient															
				COEFFICIENT DES TRAVAUX														
				MONTANTS DES SOINS														
				DEBUT D'EXECUTION														
				FIN D'EXECUTION														
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU CCEFFICIENT MASTICATOIRE																	
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">H</td> </tr> <tr> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>G</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> <tr> <td colspan="2">B</td> </tr> </table>			H		25533412	21433552	00000000	00000000	D	G	00000000	00000000	35533411	11433553	B		COEFFICIENT DES TRAVAUX
	H																	
	25533412	21433552																
	00000000	00000000																
	D	G																
	00000000	00000000																
	35533411	11433553																
	B																	
	(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			MONTANTS DES SOINS														
				DATE DU DEVIS														
			DATE DE L'EXECUTION															

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXE

DR . RACHID SAIR

MEDECIN

- Diplôme universitaire de Diabetologie
- université de Montpellier France
- Diplôme en soins avancés en cardiologie
- université de montréal-Canada
- Licencié du Conseil Médical du Canada (LCMC)
- Echographie -ECG



الدكتور رشيد سائر

طبيب

- دبلوم جامعي في أمراض السكري
- جامعة مونتبولي - فرنسا
- دبلوم رعاية صحية متقدمة لأمراض القلب
- جامعة مونتريال - كندا
- إرتفاع الضغط الدموي - أمراض القلب والشرابيين
- طبيب مجاز من طرف المجلس الطبي الكندي
- الفحص بالصدى - التخطيط الكهربائي للقلب

Casablanca le : 04 Mars 2022 الدار البيضاء في

سائر رشيد

98.00

دكتور

62.00

دكتور

75.00

دكتور

82.00 x 6

دكتور

28.00 x 6

دكتور

T = 875.00

Dr. Rachid SAIR
MEDECIN

73, Av. Colonel Akid Allam 1er étage
(en dessus BMCE) - Boumazel - Casablanca
Tél : 05 22 72 42 42

4200

Boîte de 20.

... cette notice avant de
... besoin de la relire.
vous avez un doute,
médecin ou à votre
... ment prescrit. Ne le
... même en cas de
symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous
remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette
notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. COMPOSITION DU MEDICAMENT

Principe actif:

Prednisolone 20,00 mg
(Sous forme de métsulfobenzate sodique de prednisolone : 31,44mg)

Excipients:

Bicarbonate de sodium, Acide tartrique, Citrate monosodique anhydre, Saccharine sodique, Lactose monohydraté, Benzoate de sodium, Arôme orange-pamplemousse*.....q.s.p. un comprimé effervescent sécable.

* Composition de l'arôme orange-pamplemousse : Huile essentielle d'orange, huile essentielle de pamplemousse, jus concentré d'orange, aldéhyde acétique, butyrate d'éthyle, citral, aldéhyde C6, linalol, terpinéol, acétate d'éthyle, maltodextrine, gomme arabique, sorbitol.

Excipients à effet notoire : Sodium, Sorbitol et Lactose.

2. CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE OU LE TYPE D'ACTIVITE

Classe pharmacothérapeutique - code ATC : H02AB06
GLUCOCORTICOIDES - USAGE SYSTEMIQUE.
(H. Hormones non sexuelles).

Ce médicament est un corticoïde (également appelé anti-inflammatoire stéroïdien).

3. INDICATIONS THERAPEUTIQUES

Ce médicament est réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 10 kg.

Ce médicament est utilisé dans certaines maladies, où il est utilisé pour son effet anti-inflammatoire.

Son action est utile dans le traitement de nombreuses affections inflammatoires ou allergiques.

A fortes doses, ce médicament diminue les réactions immunitaires et est donc également utilisé pour prévenir ou traiter le rejet des greffes d'organes.

4. POSOLOGIE

Posologie

Ce médicament est réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 10 kg.

La dose à utiliser est déterminée par votre médecin, en fonction de votre poids et de la maladie traitée. Elle est strictement individuelle.

Le dosage de PREDNI® 20 COOPER est adapté si vous débutez un traitement ou si vous devez prendre un traitement sur une courte durée nécessitant des doses moyennes ou fortes.

Si vous devez prendre ce traitement sur une durée prolongée et à des doses inférieures à 20 mg par jour, il existe des dosages plus appropriés.

Mode et voie d'administration

Ce médicament est utilisé par voie orale.
Vous devez dissoudre les comprimés dans un verre d'eau. Avaler le contenu du verre de préférence au cours du repas, en une prise le matin.

Durée du traitement

Elle est déterminée par votre médecin.
Il est très important de suivre régulièrement le traitement et de ne pas le modifier, ni l'arrêter brutalement sans l'avis de votre

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

7. MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS PARTICULIERES D'EMPLOI

Avertissements et précautions

Ce médicament doit être pris sous une stricte surveillance médicale.

Ce médicament ne doit pas être utilisé chez les enfants de moins de 10 kg et par conséquent chez les prématurés et les nouveau-nés à terme. Cependant, chez les nourrissons prématurés traités par d'autres médicaments de la même classe, une échographie cardiaque doit être effectuée pour surveiller la structure et la fonction du muscle cardiaque.

Avant le traitement, prévenez votre médecin :

- Si vous avez été vacciné récemment,
 - Si vous avez eu ou avez un ulcère digestif, une maladie du gros intestin, ou si vous avez été opéré récemment pour un problème d'intestin,
 - Si vous avez du diabète (taux de sucre trop élevé dans le sang), ou une tension artérielle élevée,
 - Si vous avez une infection (notamment si vous avez eu la tuberculose),
 - Si vos reins ou votre foie ne fonctionnent pas correctement,
 - Si vous souffrez d'ostéoporose (maladie des os avec une fragilité des os) et de myasthénie grave (maladie des muscles avec fatigue musculaire),
 - Si vous souffrez de sclérodémie (également connue sous le nom de sclérose systémique, un trouble auto-immun), car des doses journalières de 15 mg ou plus peuvent augmenter le risque de développer une complication grave appelée crise rénale sclérodermique. Les signes d'une crise rénale sclérodermique sont, entre autres, une augmentation de la pression sanguine et une diminution de la production d'urine. Votre médecin peut vous conseiller de faire contrôler régulièrement votre pression sanguine et votre urine,
 - Si vous avez séjourné dans les régions tropicale, subtropicale ou le sud de l'Europe, en raison du risque de maladie parasitaire.
 - Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.
 - L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose (maladie héréditaire rare).
 - L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).
 - Ce médicament contient du sodium. A prendre en compte chez les patients contrôlant leur apport alimentaire en sodium.
- Pendant et après le traitement :**
- Prévenez immédiatement votre médecin si vous ressentez des douleurs au niveau des tendons (reconnaissable par des douleurs lors de mouvements). En effet, ce médicament peut favoriser l'apparition d'une atteinte des tendons voire de manière exceptionnelle d'une rupture des tendons.
 - Ce médicament peut également entraîner la survenue de crises liées à la présence de phéochromocytome (tumeur des glandes surrénales) et pouvant mettre votre vie en danger.
 - Évitez le contact avec les personnes atteintes de la varicelle ou de la rougeole.
 - Prévenez le médecin que vous prenez ou que vous avez pris ce médicament (pendant une année après l'arrêt du traitement) si vous devez vous faire opérer ou si vous êtes dans une situation de stress (fièvre, maladie).
 - Votre médecin pourra vous conseiller de suivre un régime, en particulier pauvre en sel, en sucre et riche en protéines.
 - Si le traitement est prolongé, votre médecin vous prescrira également un apport en calcium et vitamine D.
 - Contactez votre médecin en cas de vision floue ou d'autres troubles visuels.
- 9. INTERACTIONS**

NOFLAT

LOT : 155238F

DLUO : 05/2024

PPC : 75.00 DH

PHARMA CONNECT

NOFLAT

Charbon végétal micro.....	151,3 mg
Fenouil racine.....	115,5 mg
Stéarate de Magnésium.....	8,3 mg
Gélule poisson taille o.....	95 mg

Ballonnements et flatulences :

Les ballonnements et flatulences sont dus à une accumulation de gaz dans les intestins. Ces gaz sont issus de la dégradation de certains nutriments par les bactéries qui composent la flore intestinale.

Propriétés :

Fenouil :

très riche en fibre, il active le fonctionnement du transit intestinal.

Charbon activé :

Il est obtenu par calcination du bois à l'abri de l'air puis une deuxième fois en présence de vapeur d'eau : c'est l'activation. Ce procédé permet de créer de très nombreux orifices microscopiques qui vont fortement accroître la surface de contact entre le charbon et le milieu où il se trouve.

Le charbon activé utilise cette grande surface pour fixer les gaz intestinaux, les toxines, les métaux lourds ainsi que les poisons.

Précaution d'emploi :

Le charbon activé est très absorbant et doit être administré à distance d'autres médicaments.

Pour l'absorption et donc l'efficacité de ces derniers, il est donc préférable de consulter son médecin ou pharmacien.

Son utilisation provoque une coloration noirâtre des selles

Conseils d'utilisations :

En cas de ballonnements ou flatulences : 1 à 2 gélules matin, midi et soir.

Exclusivité



PHARMA CONNECT

des maux de ventre (nausées, vomissements ou diarrhée)
des convulsions. Parlez-en à votre médecin le plus

Titulaire de l'AMM:
Laprophan
21 Rue des Oudaya,
Casablanca-Maroc

Glucovance 1000 mg/5mg
Comprimes pelliculés B/30
PPV: 82.00 DH

- إذا كنت مرضعا.

يجب استشارة الطبيب :

- إذا كنت ستخضع لفحص مثل التصوير الإشعاعي أو
في دورتك الدموية،
- إذا كنت ستخضع لعملية جراحية مع تخدير عام، أو

يجب عليك التوقف عن تناول غلوكوفانس لبعض الوقت قبل وبعد الفحص أو العملية. وسيقرر
طبيبك إذا ما كنت ستحتاج لعلاج آخر في أثناء هذه الفترة. يجب الحرص على اتباع جميع تعليمات
الطبيب.

احتياطات الاستعمال : تحذيرات خاصة

يجب استشارة الطبيب قبل الشروع في تناول غلوكوفانس.

احتمال الذأء اللاكتوزيدي

قد يسبب غلوكوفانس تأثيرا جانبيا نادرا، ولكنه خطير، يسمى " الذأء اللاكتوزيدي"، وخاصة إذا لم
تكن كليتك تعملان بشكل سليم. ويرتفع احتمال ظهور الذأء اللاكتوزيدي كذلك في حالة السكري
الخارج عن السيطرة، أو الإصابات الخطيرة، أو الصوم الطويل أو استهلاك الكحول أو الاجتهاف
(انظر فقرة معلومات إضافية أسفله)، أو مشاكل الكبد وجميع الاعتلالات الطبية الأخرى التي تجعل
الجسم يتلقى الأكسجين بشكل ناقص (أمراض القلب الحادة الخطيرة مثلا).
فإذا طببت عليك هذه الحالة، يجب الاتصال بالطبيب فورا كي يوجهك لما يجب فعله.

يجب التوقف عن تناول غلوكوفانس، لمدة قصيرة إذا كنت تعاني من اعتلال قد يكون مرتبطا بحالة
اجتهاف (فقدان السوائل البدنية) مثل التقيؤ الحاد، أو الإسهال، أو الحمى، أو التعرض لأشعة
الشمس، أو إذا كنت لا تشرب ما يكفي من السوائل. يجب الاتصال بالطبيب كي يوجهك لما يجب
فعله.

يجب التوقف عن تناول غلوكوفانس والاتصال فورا بالطبيب أو بأقرب مستشفى إذا ظهرت عليك
أعراض الذأء اللاكتوزيدي، لأن هذا الداء قد يؤدي إلى غيبوبة.

أعراض الذأء اللاكتوزيدي:

- التقيؤ،
- آلام المعدة (آلام في البطن)،
- تشنجات عضلية،
- إحساس عام بالإنزعاج مع الإعياء والتعب،
- صعوبات في التنفس،
- انخفاض حرارة الجسم ونبض القلب.

إن الذأء اللاكتوزيدي حالة طبية مستعجلة يجب معالجتها في المستشفى.

نرة : معلومات خاصة بالمستخدم

غلوكوفانس 500 ملغ/2,5 ملغ

غلوكوفانس 500 ملغ/5 ملغ

غلوكوفانس 1000 ملغ/5 ملغ

أعراض مغلفة

وريهيدرات المينفورمين / غليبينكلاميد
من طريق الفم

أول كل هذه النشرة بعناية قبل البدء في تناول هذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات مهمة
تنبه لك.

احتفظ بهذه النشرة لأنك قد تحتاج إلى قراءتها من جديد.
توجه لطبيبك أو الصيدلي من أجل أي نصيحة أو معلومة أخرى.
هذا الدواء موصوف لك شخصيا ولا يجوز لك أن تعطيه لغيرك لأنه قد يلحق بهم ضررا حتى
ولو كانت أعراضهم مماثلة لأعراضك.

إذا شعرت بأحد الأعراض الجانبية، أبلغ طبيبك أو الصيدلي بها. وينطبق هذا أيضا على أي تأثير
غير مرغوب فيه لم يرد ذكره في هذه النشرة. انظر القسم 4.

في هذه النشرة:

- ما هو غلوكوفانس؟ وما هي حالات استعماله ؟
- ما هي المعلومات التي يجب معرفتها قبل تناول غلوكوفانس؟
- كيف يستعمل هذا الدواء ؟
- ما هي الآثار الجانبية المحتملة ؟
- كيف يحفظ دواء غلوكوفانس ؟
- محتوى العلبة ومعلومات إضافية

- ما هو غلوكوفانس ؟ وما هي حالات استعماله ؟

كون غلوكوفانس من دوائين خافضين للسكر ينتميان لمجموعة أدوية البيغوانيدات (كلوريهيدرات
مينفورمين) ومجموعة السلفونيل يوريا (الغليبينكلاميد).

Titulaire de l'AMM:
Laprophan
21 Rue des Oudaya,
Casablanca-Maroc

Glucovance 1000 mg/5mg
Comprimes pelliculés B/30
PPV: 82.00 DH

- إذا كنت مرضعا.

يجب استشارة الطبيب :

- إذا كنت ستخضع لفحص مثل التصوير الإشعاعي أو
في دورتك الدموية،
- إذا كنت ستخضع لعملية جراحية مع تخدير عام، أو

يجب عليك التوقف عن تناول غلوكوفانس لبعض الوقت قبل وبعد الفحص أو العملية. وسيقرر
طبيبك إذا ما كنت ستحتاج لعلاج آخر في أثناء هذه الفترة. يجب الحرص على اتباع جميع تعليمات
الطبيب.

احتياطات الاستعمال : تحذيرات خاصة

يجب استشارة الطبيب قبل الشروع في تناول غلوكوفانس.

احتمال الذأء اللاكتوزيدي

قد يسبب غلوكوفانس تأثيرا جانبيا نادرا، ولكنه خطير، يسمى " الذأء اللاكتوزيدي"، وخاصة إذا لم
تكن كليتك تعملان بشكل سليم. ويرتفع احتمال ظهور الذأء اللاكتوزيدي كذلك في حالة السكري
الخارج عن السيطرة، أو الإصابات الخطيرة، أو الصوم الطويل أو استهلاك الكحول أو الاجتهاد
(انظر فقرة معلومات إضافية أسفله)، أو مشاكل الكبد وجميع الاعتلالات الطبية الأخرى التي تجعل
الجسم يتلقى الأكسجين بشكل ناقص (أمراض القلب الحادة الخطيرة مثلا).
فإذا طببت عليك هذه الحالة، يجب الاتصال بالطبيب فورا كي يوجهك لما يجب فعله.

يجب التوقف عن تناول غلوكوفانس، لمدة قصيرة إذا كنت تعاني من اعتلال قد يكون مرتبطا بحالة
اجتهاد (فقدان السوائل البدنية) مثل التقيؤ الحاد، أو الإسهال، أو الحمى، أو التعرض لأشعة
الشمس، أو إذا كنت لا تشرب ما يكفي من السوائل. يجب الاتصال بالطبيب كي يوجهك لما يجب
فعله.

يجب التوقف عن تناول غلوكوفانس والاتصال فورا بالطبيب أو بأقرب مستشفى إذا ظهرت عليك
أعراض الذأء اللاكتوزيدي، لأن هذا الداء قد يؤدي إلى غيبوبة.

أعراض الذأء اللاكتوزيدي:

- التقيؤ،
- آلام المعدة (آلام في البطن)،
- تشنجات عضلية،
- إحساس عام بالإنزعاج مع الإعياء والتعب،
- صعوبات في التنفس،
- انخفاض حرارة الجسم ونبض القلب.

إن الذأء اللاكتوزيدي حالة طبية مستعجلة يجب معالجتها في المستشفى.

نرة : معلومات خاصة بالمستخدم

غلوكوفانس 500 ملغ/2,5 ملغ

غلوكوفانس 500 ملغ/5 ملغ

غلوكوفانس 1000 ملغ/5 ملغ

ارص مغلقة

وريهيدرات الميفورمين / غليبينكلاميد
ن طريق الفم

أكل هذه النشرة بعناية قبل البدء في تناول هذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات مهمة
تنبه لك.

احتفظ بهذه النشرة لأنك قد تحتاج إلى قراءتها من جديد.
توجه لطبيبك أو الصيدلي من أجل أي نصيحة أو معلومة أخرى.
هذا الدواء موصوف لك شخصيا ولا يجوز لك أن تعطيه لغيرك لأنه قد يلحق بهم ضررا حتى
ولو كانت أعراضهم مماثلة لأعراضك.

إذا شعرت بأحد الأعراض الجانبية، أبلغ طبيبك أو الصيدلي بها. وينطبق هذا أيضا على أي تأثير
غير مرغوب فيه لم يرد ذكره في هذه النشرة. انظر القسم 4.

في هذه النشرة:

- ما هو غلوكوفانس؟ وما هي حالات استعماله ؟
- ما هي المعلومات التي يجب معرفتها قبل تناول غلوكوفانس؟
- كيف يستعمل هذا الدواء ؟
- ما هي الآثار الجانبية المحتملة ؟
- كيف يحفظ دواء غلوكوفانس ؟
- محتوى العلبة ومعلومات إضافية

- ما هو غلوكوفانس ؟ وما هي حالات استعماله ؟

كون غلوكوفانس من دوائين خافضين للسكر ينتميان لمجموعة أدوية البيغوانيدات (كلوريهيدرات
ميتفورمين) ومجموعة السلفونيل يوريا (الغليبينكلاميد).

Titulaire de l'AMM:
Laprophan
21 Rue des Oudaya,
Casablanca-Maroc

Glucovance 1000 mg/5mg
Comprimés pelliculés B/30
PPV: 82.00 DH

- إذا كنت مرضعا.

يجب استشارة الطبيب :

- إذا كنت ستخضع لفحص مثل التصوير الإشعاعي أو
في دورتك الدموية،
- إذا كنت ستخضع لعملية جراحية مع تخدير عام، أو

يجب عليك التوقف عن تناول غلوكوفانس لبعض الوقت قبل وبعد الفحص أو العملية. وسيقرر
طبيبك إذا ما كنت ستحتاج لعلاج آخر في أثناء هذه الفترة. يجب الحرص على اتباع جميع تعليمات
الطبيب.

احتياطات الاستعمال : تحذيرات خاصة

يجب استشارة الطبيب قبل الشروع في تناول غلوكوفانس.

احتمال الذأء اللاكتوزيدي

قد يسبب غلوكوفانس تأثيرا جانبيا نادرا، ولكنه خطير، يسمى " الذأء اللاكتوزيدي"، وخاصة إذا لم
تكن كليتيك تعملان بشكل سليم. ويرتفع احتمال ظهور الذأء اللاكتوزيدي كذلك في حالة السكري
الخارج عن السيطرة، أو الإصابات الخطيرة، أو الصوم الطويل أو استهلاك الكحول أو الاجتهاد
(انظر فقرة معلومات إضافية أسفله)، أو مشاكل الكبد وجميع الاعتلالات الطبية الأخرى التي تجعل
الجسم يتلقى الأكسجين بشكل ناقص (أمراض القلب الحادة الخطيرة مثلا).
فإذا طبخت عليك هذه الحالة، يجب الاتصال بالطبيب فورا كي يوجهك لما يجب فعله.

يجب التوقف عن تناول غلوكوفانس، لمدة قصيرة إذا كنت تعاني من اعتلال قد يكون مرتبطا بحالة
اجتهاد (فقدان السوائل البدنية) مثل التقيؤ الحاد، أو الإسهال، أو الحمى، أو التعرض لأشعة
الشمس، أو إذا كنت لا تشرب ما يكفي من السوائل. يجب الاتصال بالطبيب كي يوجهك لما يجب
فعله.

يجب التوقف عن تناول غلوكوفانس والاتصال فورا بالطبيب أو بأقرب مستشفى إذا ظهرت عليك
أعراض الذأء اللاكتوزيدي، لأن هذا الداء قد يؤدي إلى غيبوبة.

أعراض الذأء اللاكتوزيدي:

- التقيؤ،
- آلام المعدة (آلام في البطن)،
- تشنجات عضلية،
- إحساس عام بالإنزعاج مع الإعياء والتعب،
- صعوبات في التنفس،
- انخفاض حرارة الجسم ونبض القلب.

إن الذأء اللاكتوزيدي حالة طبية مستعجلة يجب معالجتها في المستشفى.

نرة : معلومات خاصة بالمستخدم

غلوكوفانس 500 ملغ/2,5 ملغ

غلوكوفانس 500 ملغ/5 ملغ

غلوكوفانس 1000 ملغ/5 ملغ

ارص مغلقة

وريهيدرات الميفورمين / غليبينكلاميد
ن طريق الفم

أكل هذه النشرة بعناية قبل البدء في تناول هذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات مهمة
تنبه لك.

احتفظ بهذه النشرة لأنك قد تحتاج إلى قراءتها من جديد.
توجه لطبيبك أو الصيدلي من أجل أي نصيحة أو معلومة أخرى.
هذا الدواء موصوف لك شخصيا ولا يجوز لك أن تعطيه لغيرك لأنه قد يلحق بهم ضررا حتى
ولو كانت أعراضهم مماثلة لأعراضك.

إذا شعرت بأحد الأعراض الجانبية، أبلغ طبيبك أو الصيدلي بها. وينطبق هذا أيضا على أي تأثير
غير مرغوب فيه لم يرد ذكره في هذه النشرة. انظر القسم 4.

في هذه النشرة:

- ما هو غلوكوفانس؟ وما هي حالات استعماله ؟
- ما هي المعلومات التي يجب معرفتها قبل تناول غلوكوفانس؟
- كيف يستعمل هذا الدواء ؟
- ما هي الآثار الجانبية المحتملة ؟
- كيف يحفظ دواء غلوكوفانس ؟
- محتوى العلبة ومعلومات إضافية

- ما هو غلوكوفانس ؟ وما هي حالات استعماله ؟

كون غلوكوفانس من دوائين خافضين للسكر ينتميان لمجموعة أدوية البيغوانيدات (كلوريهيدرات
ميتفورمين) ومجموعة السلفونيل يوريا (الغليبينكلاميد).

Titulaire de l'AMM:
Laprophan
21 Rue des Oudaya,
Casablanca-Maroc

Glucovance 1000 mg/5mg
Comprimes pelliculés B/30
PPV: 82.00 DH

- إذا كنت مرضعا.

يجب استشارة الطبيب :

- إذا كنت ستخضع لفحص مثل التصوير الإشعاعي أو
في دورتك الدموية،
- إذا كنت ستخضع لعملية جراحية مع تخدير عام، أو

يجب عليك التوقف عن تناول غلوكوفانس لبعض الوقت قبل وبعد الفحص أو العملية. وسيقرر
طبيبك إذا ما كنت ستحتاج لعلاج آخر في أثناء هذه الفترة. يجب الحرص على اتباع جميع تعليمات
الطبيب.

احتياطات الاستعمال : تحذيرات خاصة

يجب استشارة الطبيب قبل الشروع في تناول غلوكوفانس.

احتمال الذأء اللاكتوزيدي

قد يسبب غلوكوفانس تأثيرا جانبيا نادرا، ولكنه خطير، يسمى " الذأء اللاكتوزيدي"، وخاصة إذا لم
تكن كليتيك تعملان بشكل سليم. ويرتفع احتمال ظهور الذأء اللاكتوزيدي كذلك في حالة السكري
الخارج عن السيطرة، أو الإصابات الخطيرة، أو الصوم الطويل أو استهلاك الكحول أو الاجتهاد
(انظر فقرة معلومات إضافية أسفله)، أو مشاكل الكبد وجميع الاعتلالات الطبية الأخرى التي تجعل
الجسم يتلقى الأكسجين بشكل ناقص (أمراض القلب الحادة الخطيرة مثلا).
فإذا طببت عليك هذه الحالة، يجب الاتصال بالطبيب فوراً كي يوجهك لما يجب فعله.

يجب التوقف عن تناول غلوكوفانس، لمدة قصيرة إذا كنت تعاني من اعتلال قد يكون مرتبطاً بحالة
اجتهاد (فقدان السوائل البدنية) مثل التقيؤ الحاد، أو الإسهال، أو الحمى، أو التعرض لأشعة
الشمس، أو إذا كنت لا تشرب ما يكفي من السوائل. يجب الاتصال بالطبيب كي يوجهك لما يجب
فعله.

يجب التوقف عن تناول غلوكوفانس والاتصال فوراً بالطبيب أو بأقرب مستشفى إذا ظهرت عليك
أعراض الذأء اللاكتوزيدي، لأن هذا الداء قد يؤدي إلى غيبوبة.

أعراض الذأء اللاكتوزيدي:

- التقيؤ،
- آلام المعدة (آلام في البطن)،
- تشنجات عضلية،
- إحساس عام بالإنزعاج مع الإعياء والتعب،
- صعوبات في التنفس،
- انخفاض حرارة الجسم ونبض القلب.

إن الذأء اللاكتوزيدي حالة طبية مستعجلة يجب معالجتها في المستشفى.

نرة : معلومات خاصة بالمستخدم

غلوكوفانس 500 ملغ/2,5 ملغ

غلوكوفانس 500 ملغ/5 ملغ

غلوكوفانس 1000 ملغ/5 ملغ

أعراض مغلفة

وريهيدرات المينفورمين / غليبينكلاميد
من طريق الفم

أولاً كل هذه النشرة بعناية قبل البدء في تناول هذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات مهمة
تنبه لك.

احتفظ بهذه النشرة لأنك قد تحتاج إلى قراءتها من جديد.
توجه لطبيبك أو الصيدلي من أجل أي نصيحة أو معلومة أخرى.
هذا الدواء موصوف لك شخصياً ولا يجوز لك أن تعطيه لغيرك لأنه قد يلحق بهم ضرراً حتى
ولو كانت أعراضهم مماثلة لأعراضك.

إذا شعرت بأحد الأعراض الجانبية، أبلغ طبيبك أو الصيدلي بها. وينطبق هذا أيضاً على أي تأثير
غير مرغوب فيه لم يرد ذكره في هذه النشرة. انظر القسم 4.

في هذه النشرة:

- ما هو غلوكوفانس؟ وما هي حالات استعماله ؟
- ما هي المعلومات التي يجب معرفتها قبل تناول غلوكوفانس؟
- كيف يستعمل هذا الدواء ؟
- ما هي الآثار الجانبية المحتملة ؟
- كيف يحفظ دواء غلوكوفانس ؟
- محتوى العلبة ومعلومات إضافية

- ما هو غلوكوفانس ؟ وما هي حالات استعماله ؟

كون غلوكوفانس من دوائين خافضين للسكر ينتميان لمجموعة أدوية البيغوانيدات (كلوريهيدرات
مينفورمين) ومجموعة السلفونيل يوريا (الغليبينكلاميد).

Titulaire de l'AMM:
Laprophan
21 Rue des Oudaya,
Casablanca-Maroc

Glucovance 1000 mg/5mg
Comprimés pelliculés B/30
PPV: 82.00 DH

- إذا كنت مرضعا.

يجب استشارة الطبيب :

- إذا كنت ستخضع لفحص مثل التصوير الإشعاعي أو
في دورتك الدموية،
- إذا كنت ستخضع لعملية جراحية مع تخدير عام، أو

يجب عليك التوقف عن تناول غلوكوفانس لبعض الوقت قبل وبعد الفحص أو العملية. وسيقرر
طبيبك إذا ما كنت ستحتاج لعلاج آخر في أثناء هذه الفترة. يجب الحرص على اتباع جميع تعليمات
الطبيب.

احتياطات الاستعمال : تحذيرات خاصة

يجب استشارة الطبيب قبل الشروع في تناول غلوكوفانس.

احتمال الذأء اللاكتوزيدي

قد يسبب غلوكوفانس تأثيرا جانبيا نادرا، ولكنه خطير، يسمى " الذأء اللاكتوزيدي"، وخاصة إذا لم
تكن كليتك تعملان بشكل سليم. ويرتفع احتمال ظهور الذأء اللاكتوزيدي كذلك في حالة السكري
الخارج عن السيطرة، أو الإصابات الخطيرة، أو الصوم الطويل أو استهلاك الكحول أو الاجتهاف
(انظر فقرة معلومات إضافية أسفله)، أو مشاكل الكبد وجميع الاعتلالات الطبية الأخرى التي تجعل
الجسم يتلقى الأكسجين بشكل ناقص (أمراض القلب الحادة الخطيرة مثلا).
فإذا طبخت عليك هذه الحالة، يجب الاتصال بالطبيب فوراً كي يوجهك لما يجب فعله.

يجب التوقف عن تناول غلوكوفانس، لمدة قصيرة إذا كنت تعاني من اعتلال قد يكون مرتبطاً بحالة
اجتهاف (فقدان السوائل البدنية) مثل التقيؤ الحاد، أو الإسهال، أو الحمى، أو التعرض لأشعة
الشمس، أو إذا كنت لا تشرب ما يكفي من السوائل. يجب الاتصال بالطبيب كي يوجهك لما يجب
فعله.

يجب التوقف عن تناول غلوكوفانس والاتصال فوراً بالطبيب أو بأقرب مستشفى إذا ظهرت عليك
أعراض الذأء اللاكتوزيدي، لأن هذا الداء قد يؤدي إلى غيبوبة.

أعراض الذأء اللاكتوزيدي:

- التقيؤ،
- آلام المعدة (آلام في البطن)،
- تشنجات عضلية،
- إحساس عام بالإنزعاج مع الإعياء والتعب،
- صعوبات في التنفس،
- انخفاض حرارة الجسم ونبض القلب.

إن الذأء اللاكتوزيدي حالة طبية مستعجلة يجب معالجتها في المستشفى.

نرة : معلومات خاصة بالمستخدم

غلوكوفانس 500 ملغ/2,5 ملغ

غلوكوفانس 500 ملغ/5 ملغ

غلوكوفانس 1000 ملغ/5 ملغ

ارص مغلقة

وريهيدرات المينفورمين / غليبينكلاميد
ن طريق الفم

أول كل هذه النشرة بعناية قبل البدء في تناول هذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات مهمة
تنبه لك.

احتفظ بهذه النشرة لأنك قد تحتاج إلى قراءتها من جديد.
توجه لطبيبك أو الصيدلي من أجل أي نصيحة أو معلومة أخرى.
هذا الدواء موصوف لك شخصيا ولا يجوز لك أن تعطيه لغيرك لأنه قد يلحق بهم ضررا حتى
ولو كانت أعراضهم مماثلة لأعراضك.

إذا شعرت بأحد الأعراض الجانبية، أبلغ طبيبك أو الصيدلي بها. وينطبق هذا أيضا على أي تأثير
غير مرغوب فيه لم يرد ذكره في هذه النشرة. انظر القسم 4.

في هذه النشرة:

- ما هو غلوكوفانس؟ وما هي حالات استعماله ؟
- ما هي المعلومات التي يجب معرفتها قبل تناول غلوكوفانس؟
- كيف يستعمل هذا الدواء ؟
- ما هي الآثار الجانبية المحتملة ؟
- كيف يحفظ دواء غلوكوفانس ؟
- محتوى العلبة ومعلومات إضافية

- ما هو غلوكوفانس ؟ وما هي حالات استعماله ؟

كون غلوكوفانس من دوائين خافضين للسكر ينتميان لمجموعة أدوية البيغوانيدات (كلوريهيدرات
مينفورمين) ومجموعة السلفونيل يوريا (الغليبينكلاميد).

Titulaire de l'AMM:
Laprophan
21 Rue des Oudaya,
Casablanca-Maroc

Glucovance 1000 mg/5mg
Comprimés pelliculés B/30
PPV: 82.00 DH

- إذا كنت مرضعا.

يجب استشارة الطبيب :

- إذا كنت ستخضع لفحص مثل التصوير الإشعاعي أو
في دورتك الدموية،
- إذا كنت ستخضع لعملية جراحية مع تخدير عام، أو

يجب عليك التوقف عن تناول غلوكوفانس لبعض الوقت قبل وبعد الفحص أو العملية. وسيقرر
طبيبك إذا ما كنت ستحتاج لعلاج آخر في أثناء هذه الفترة. يجب الحرص على اتباع جميع تعليمات
الطبيب.

احتياطات الاستعمال : تحذيرات خاصة

يجب استشارة الطبيب قبل الشروع في تناول غلوكوفانس.

احتمال الذأء اللاكتوزيدي

قد يسبب غلوكوفانس تأثيرا جانبيا نادرا، ولكنه خطير، يسمى " الذأء اللاكتوزيدي"، وخاصة إذا لم
تكن كليتيك تعملان بشكل سليم. ويرتفع احتمال ظهور الذأء اللاكتوزيدي كذلك في حالة السكري
الخارج عن السيطرة، أو الإصابات الخطيرة، أو الصوم الطويل أو استهلاك الكحول أو الاجتهاد
(انظر فقرة معلومات إضافية أسفله)، أو مشاكل الكبد وجميع الاعتلالات الطبية الأخرى التي تجعل
الجسم يتلقى الأكسجين بشكل ناقص (أمراض القلب الحادة الخطيرة مثلا).
فإذا طبخت عليك هذه الحالة، يجب الاتصال بالطبيب فورا كي يوجهك لما يجب فعله.

يجب التوقف عن تناول غلوكوفانس، لمدة قصيرة إذا كنت تعاني من اعتلال قد يكون مرتبطا بحالة
اجتهاد (فقدان السوائل البدنية) مثل التقيؤ الحاد، أو الإسهال، أو الحمى، أو التعرض لأشعة
الشمس، أو إذا كنت لا تشرب ما يكفي من السوائل. يجب الاتصال بالطبيب كي يوجهك لما يجب
فعله.

يجب التوقف عن تناول غلوكوفانس والاتصال فورا بالطبيب أو بأقرب مستشفى إذا ظهرت عليك
أعراض الذأء اللاكتوزيدي، لأن هذا الداء قد يؤدي إلى غيبوبة.

أعراض الذأء اللاكتوزيدي:

- التقيؤ،
- آلام المعدة (آلام في البطن)،
- تشنجات عضلية،
- إحساس عام بالإنزعاج مع الإعياء والتعب،
- صعوبات في التنفس،
- انخفاض حرارة الجسم ونبض القلب.

إن الذأء اللاكتوزيدي حالة طبية مستعجلة يجب معالجتها في المستشفى.

نرة : معلومات خاصة بالمستخدم

غلوكوفانس 500 ملغ/2,5 ملغ

غلوكوفانس 500 ملغ/5 ملغ

غلوكوفانس 1000 ملغ/5 ملغ

ارص مغلقة

وريهيدرات الميفورمين / غليبينكلاميد
ن طريق الفم

أكل هذه النشرة بعناية قبل البدء في تناول هذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات مهمة
تنبه لك.

احتفظ بهذه النشرة لأنك قد تحتاج إلى قراءتها من جديد.
توجه لطبيبك أو الصيدلي من أجل أي نصيحة أو معلومة أخرى.
هذا الدواء موصوف لك شخصيا ولا يجوز لك أن تعطيه لغيرك لأنه قد يلحق بهم ضررا حتى
ولو كانت أعراضهم مماثلة لأعراضك.

إذا شعرت بأحد الأعراض الجانبية، أبلغ طبيبك أو الصيدلي بها. وينطبق هذا أيضا على أي تأثير
غير مرغوب فيه لم يرد ذكره في هذه النشرة. انظر القسم 4.

في هذه النشرة:

- ما هو غلوكوفانس؟ وما هي حالات استعماله ؟
- ما هي المعلومات التي يجب معرفتها قبل تناول غلوكوفانس؟
- كيف يستعمل هذا الدواء ؟
- ما هي الآثار الجانبية المحتملة ؟
- كيف يحفظ دواء غلوكوفانس ؟
- محتوى العلبة ومعلومات إضافية

- ما هو غلوكوفانس ؟ وما هي حالات استعماله ؟

كون غلوكوفانس من دوائين خافضين للسكر ينتميان لمجموعة أدوية البيغوانيدات (كلوريهيدرات
ميفورمين) ومجموعة السلفونيل يوريا (الغليبينكلاميد).

28,00