

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° W21-672499

108787

☒ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1905 Société : R.A.M.

☐ Actif ☒ Pensionné(e) ☐ Autre :

Nom & Prénom : HABAB EL HASAN

Date de naissance : 01.01.1956

Adresse : 53 Avenue "C" Hay BADAIZ

Tél. : 0661197367 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : 27/04/2022

Nom et prénom du malade : TOSSI TOUNG Age : 60 ans

Lien de parenté : ☐ Lui-même ☒ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : Lombosciatalgies

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : M. HABAB EL HASAN Le : 08 / 02 / 2022

Signature de l'adhérent(e) : [Signature]



Autorisation CNDP N° : A-A-215/2019

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
20/10/22	C.N.P.S.		250 D.H.S.	INP : 0711847373 Dr. Leila BELATABI Neurologie - Neurophysiologie E.E.G. - E.M.G. INPE : 071247373 Bloc B n° 25 Res. Rokaya Av. Abdelkrim 30000 - El Khattabi Marrakech - Tel : 05 24 43 76 08

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
 DANP : 072013721	20/11/22	191,40

ANALYSES - RADIOGRAPHIES			
Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
Dr. Ahmed OUSEF Clinique Spécialisée de Radiologie Médicale, Radiothérapie Alker 19, Quartier de L'Alker Tél : 05 24 45 75 NPE : 070061379 - ICE : 00	20/11/22	IRM LOMBALRE	3.000,00

AUXILIAIRES MEDICAUX						
Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES																				
Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins. Important : Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.																				
SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP : <input type="text"/>																
				COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>																
					MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>															
					DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/>															
				FIN D'EXECUTION <input type="text"/>																
O.D.F. PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/> MONTANTS DES SOINS <input type="text"/> DATE DU DEVIS <input type="text"/> DATE DE L'EXECUTION <input type="text"/>																
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">H</td> </tr> <tr> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">D</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> <tr> <td colspan="2">B</td> </tr> <tr> <td colspan="2">G</td> </tr> </table>				H		25533412	21433552	00000000	00000000	D		00000000	00000000	35533411	11433553	B		G	
	H																			
	25533412	21433552																		
	00000000	00000000																		
	D																			
	00000000	00000000																		
	35533411	11433553																		
	B																			
	G																			
(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession																				

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION



CABINET DE
NEUROLOGIE

Dr Laila BELARABI
الدكتورة ليلى بلعربي

Marrakech le 20/05/2022

CABINET DE NEUROLOGIE

Epilepsie - AVC - Pathologies des nerfs et des muscles (neuropathies, myopathies, JNM) - Céphalées - Parkinson - Alzheimer et démences - Vertiges - SEP - Neuropédiatrie
EEG (ElectroEncéphalogramme)
ENMG (Electroneuromyogramme)

مرض الصرع - السكتة الدماغية - أمراض الأعصاب والعضلات - الصداع - الرأسي - باركنسون - الزهايمر والخرف - الدوار - التصلب العصبي المتعدد - التخطيط الكهربائي للدماغ - التخطيط الكهربائي للأعصاب و العضلات

Dr. TOSSI TOUNG

INP : 072010721

1/ Lycaplin 50
1 cp/j le soir pdt 15 jrs

2/ Dolipen 400
1 cp x 2/j pdt 05 jrs

3/ Coltramyl 4mg
1 cp x 2/j

SV 13,00

SV 29,00

49,40

Tot 191,40



Dr. Laila BELARABI
Neurologie - Neurophysiologie
ENMG
06 24 43 76 08



N°26, Bloc B, Residence Rokaya, Avenue Abdelkrim Al Khattabi - Marrakech



0524437608 / Portable : 0661494144



dr.lailabelarabineuro@gmail.com



INPE : 071247373

Coltramyl® 4 mg

Thiocolchicoside

Comprimé

SANOFI

Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire qui permettra l'identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. Vous pouvez y contribuer en signalant tout effet indésirable que vous observez. Voir en fin de rubrique 4 comment déclarer les effets indésirables.

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. QU'EST-CE QUE Coltramyl ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament est un relaxant musculaire. Il est utilisé chez les adultes et les adolescents de plus de 16 ans en tant que traitement d'appoint des contractures musculaires douloureuses. Il doit être utilisé pour des affections aiguës liées à la colonne vertébrale.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE Coltramyl ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais COLTRAMYL dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique au thiocolchicoside ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6),
- Si vous êtes enceinte, pourriez tomber enceinte ou pensez que vous pourriez être enceinte
- Si vous êtes une femme en âge d'avoir des enfants n'utilisant pas de contraception
- Si vous allaitez

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites att

Mises en

Utiliser av

*convulsio

impose l'

Précautio

En cas de

pourra éven

En cas de dob

vomissements, prévenez votre médecin.

Respectez rigoureusement les doses et la durée du traitement décrites à la rubrique 3. Vous ne devez pas utiliser ce médicament à une dose plus élevée ou pour une durée dépassant 7 jours. Ceci est dû au fait que les produits formés dans votre organisme lorsque vous prenez thiocolchicoside à des doses élevées peuvent provoquer des lésions sur certaines cellules (nombre anormal de chromosomes). Cela a été mis en évidence lors d'études chez l'animal et d'études en laboratoire. Chez l'homme, ce type de lésions cellulaires est un facteur de risque de cancer, d'altération de la fertilité masculine et peut-être dangereux pour un enfant à naître. Parlez-en avec votre médecin si vous avez plus de questions.

Votre médecin vous renseignera sur toutes les mesures relatives à une contraception efficace et sur les risques potentiels d'une grossesse.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose ou au fructose, un déficit en lactase de Lapp, un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).

Enfants et adolescents

N'administrez pas ce médicament à des enfants ou des adolescents âgés de moins de 16 ans pour des raisons de sécurité.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement et fertilité

Ne prenez pas ce médicament :

- si vous êtes enceinte, pourriez tomber enceinte ou pensez que

49.40



N
traite
Ce mé
terme
Utilisa
N'admi
adoles
sécurité
Si vo
Si vo
n'a
Si
N

nt, notamment crise d'asthme ou
LE TRAITEMENT ET CONTACTEZ
MEDICAL D'URGENCE.

e maux de tête sévères, nausées,
la conscience. Les patients atteints
lupus érythémateux disséminé ou
pper une méningite aseptique ;
DIATEMENT UN MÉDECIN.

os que ce médicament d'autres
non stéroïdiens et/ou de l'aspirine,
urra être envisagé chez certains
insi que chez ceux nécessitant de
ment susceptible d'augmenter le
puprofène en association avec
compris les inhibiteurs sélectifs de
en raison du risque d'ulcération ou
aires chez les patients prenant en
menter le risque d'ulcération ou de
agulants, certains antidépresseurs
rine.

Préimprimé pelliculé :
prenez, avez récemment pris ou

matatoires non stéroïdiens tels que
menter le risque d'ulcération ou de
ticoagulants comme la warfarine,
mètres de la coagulation est

ec DOLIFEN® 400 mg, comprimé
de saignement.

comprimé pelliculé avec le lithium
ces médicaments dans le sang.
mg, comprimé pelliculé avec le
r les risques d'atteinte rénale.
ceptible de réduire les effets des
tension artérielle et d'augmenter

ceptible de réduire les effets des
en cas de prise concomitante, le

comprimé pelliculé et de diurétiques
ix de potassium dans le sang.
s, peuvent augmenter le risque

mé pelliculé dans les 24h avant ou
as concentrations de méthotrexate
ses effets indésirables.
eptibles de provoquer une atteinte

pourra être nécessaire en cas
role.

eut augmenter le risque d'atteinte
at susceptible de majorer le risque

s aliments et boissons :
a un plus fort risque d'effets
cérébraux.

lait, si vous pensez être enceinte
à votre médecin ou pharmacien

essesse, votre médecin peut être
ment.

ous ne devez EN AUCUN CAS
effets sur votre enfant peuvent

ers, que votre gynécologue vous
STRICTEMENT l'ordonnance de

ndée pendant l'accouchement.
assent dans le lait maternel. Par

er pendant l'allaitement.
pelliculé appartient à une classe

fécondité chez la femme. Son
qui planifie d'être enceinte,
procrée ou chez lesquelles

it en cours, veuillez en parler à
ndre DOLIFEN®. Cet effet est

ut entraîner des vertiges et des

tre altérés pendant la conduite
urriez ne plus être capable de
v un événement soudain et

mmation de prise concomitante

o pelliculé ?
ent en suivant exactement les
votre médecin ou pharmacien.
cas de doute.

pas dépasser 3 prises par jour.
pas dépasser 3 à 4 prises par jour.

Règles douloureuses

comprimés par jour
Autres douleurs e

prises par jour.
Mode d'administr

Les comprimés d
mâchés, cassés, é
de la gorge. Les c

Fréquence d'adm
Les prises réguli

doivent être espa
Se conformer str

En dehors des af
la fièvre plus de

trouble, en infon
Si vous avez pris

dû, ou si des an
un médecin ou

conseils sur les mes
Si vous oubliez de

prendre DOLIFEN® 400 mg, comprimé pelliculé
Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée de

prendre.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

• Réactions allergiques :

- Cutanées : éruption sur la peau, démangeaisons, œdème, aggravation d'urticaire chronique, bleus ou petites taches rouges sur la peau (purpura), réactions cutanées graves : syndrome de Stevens-Johnson et Lyell, érythème polymorphe.

- Respiratoires, de type crise d'asthme, aggravation de l'asthme, gêne respiratoire, difficulté respiratoire.

- Générales, brusque gonflement du visage et du cou (œdème de Quincke). Une réaction cutanée sévère appelée syndrome d'hypersensibilité peut survenir. Les symptômes d'hypersensibilité sont : éruption cutanée, fièvre, gonflement des ganglions lymphatiques et augmentation des éosinophiles.

Dans certains cas rares, il est possible que survienne une hémorragie gastro-intestinale. Celle-ci est d'autant plus fréquente que la posologie utilisée est élevée.

Il peut exceptionnellement être observé des maux de tête accompagnés de nausées, de vomissements et de raideur de la nuque.

Dans des cas exceptionnels, des infections graves de la peau et des complications des tissus mous peuvent survenir pendant la varicelle.

Dans tous ces cas, il faut immédiatement arrêter le traitement et avertir votre médecin.

• Au cours du traitement, il est possible que surviennent :

- Des troubles digestifs : maux d'estomac, vomissements, nausées, diarrhée, constipation,

- exceptionnels : vertiges ou maux de tête, rares : troubles de la vision, diminution importante des urines, insuffisance rénale.

Dans tous ces cas, il faut en avertir votre médecin.

• Exceptionnellement, ont été observées des modifications du bilan hépatique ou de la formule sanguine pouvant être graves.

Les effets indésirables suivants peuvent survenir avec ce médicament :

Fréquents (susceptibles de survenir chez 1 à 10 patients sur 100) :

• Maux de tête, sensations vertigineuses, dyspepsie, diarrhée, nausées, vomissements, douleurs abdominales, flatulences, constipation, sang dans les selles ou selles noires, vomissement de sang, éruption cutanée (rash), fatigue.

Peu fréquents (susceptibles de survenir chez 1 à 10 patients sur 1000) :

• Gonflement des muqueuses du nez, insomnie, anxiété, sensations de picotement et fourmillement, somnolence, troubles de la vue, troubles de l'ouïe, bourdonnements d'oreilles, vertiges.

• Asthme, gêne respiratoire, difficulté respiratoire, inflammation de l'estomac ulcère de l'estomac et de la bouche, perforation gastro-intestinale, hépatite, jaunissement de la peau et du blanc des yeux, anomalie de la fonction hépatique, urticaire, démangeaisons, « bleus » ou petites taches rouges sur la peau, gonflement du visage et du cou d'origine allergique (angio-œdème), réaction cutanée lors d'une exposition au soleil ou aux UV.

• Toxicité rénale : syndrome néphrotique, atteintes inflammatoires des reins, insuffisance rénale, réactions allergiques.

Rares (susceptibles de survenir chez moins de 1 patient sur 1000) :

• Méningite aseptique, troubles de la formation des cellules du sang, réaction d'origine allergique, dépression, confusion, inflammation du nerf optique, atteinte des nerfs optiques, insuffisance hépatique, œdème.

Très rares (susceptibles de survenir chez moins de 1 patient sur 10 000) :

• Pancréatite, insuffisance hépatique,

• Réactions cutanées graves comprenant des éruptions cutanées avec rougeurs et formation de cloques (syndrome de Stevens-Johnson et de Lyell), manifestations bulleuses de la peau ou des muqueuses,

• Insuffisance cardiaque, crise cardiaque (infarctus du myocarde), hypertension artérielle.

Les effets indésirables ont été rapportés avec une fréquence inconnue :

• Aggravation de l'inflammation de l'intestin (rectocolite) et maladie de Crohn.

5. Comment conserver DOLIFEN® 400 mg, comprimé pelliculé ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. Informations supplémentaires : Ce que contient DOLIFEN® 400 mg, comprimé pelliculé :

La substance active est : Ibuprofène 400 mg pour un cpp

Les autres composants sont : microcristalline cellulose, tricalcium phosphate, croscarmellose sodium, povidone, hypromellose, acide stéarique, talc, hypromellose, titanium dioxide (E-171), talc, macrogol 6000.

Tableau C (liste II).

PPV:29DH00

PER:08/23

LOT:K2095



bottu.s.a

82, Allée des Casuarinas - Ain Seba - Casablanca

S. Bachouchi - Pharmacien Responsable

AJDIR 08/20
101160

إذا قُتِعت عن تناول ليرابرين[®]

لا تتخفوا عن تناول ليرابرين[®] ما لم يخبركم الطبيب بذلك. إذا كنتم محبزين على التوقف عن العلاج، يجب أن يكون ذلك ترجيحاً لمدة أسبوع واحد على الأقل. ستقولون من بعض الآثار الجانبية بعد التوقف عن العلاج، سواء كان التوقف طويلاً أو قصيراً المدى. وتشمل هذه الآثار الجانبية اضطراب النوم، صداع، غثيان، قلق، إسهال، أعراض تشبه أعراض مرض الألغونوز، ونوبات عصبية، إكتئاب، ألم، تعرق ودوار. قد تحدث هذه الأعراض بشكل متكرر أكثر أو تكون أكثر حدة عندما يتم إعطاء بريكالين لفترة طويلة. لا كان لديكم أي أسئلة أخرى حول استخدام هذا الدواء، اسألوا طبيبك أو الصيدلي مزيد من المعلومات.

4. ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟

مثل جميع الأدوية، قد يسبب هذا الدواء آثاراً جانبية، إلا أنها قد لا تحدث عند جميع الناس.

- شائعة جداً: قد تؤثر على أكثر من شخص 1 من كل 10 أشخاص
- دوار، غثيان وصداع الرأس

شائعة: قد تؤثر على ما يصل إلى شخص واحد من كل 10 أشخاص

- زيادة الشهية للطعام
- شعور بنفخة، حالة إرتباك، توهان، انخفاض الرغبة الجنسية، تهيج
- تشوش الانتباه، الخرق (القيام بتصرفات غير مألوفة)، ضعف الذاكرة، فقدان الذاكرة،
- رعاش، صعوبة التركيز، وخز، فقدان الحس، تغيير، غثيان، أرق، تعب، أحاسيس غير طبيعية.
- عدم وضوح الرؤية، إزدواجية الرؤية
- دوار، اختلالات في التوازن، سقوط
- جفاف الفم، إمساك، تقوى، إبتقاع البطن، إسهال، غثيان، إبتقاع
- صعوبة الانتصاب
- تورم الجسم بما في ذلك الأطراف
- الشعور بالتألم، اضطرابات في المشي
- زيادة الوزن
- تشنج العضلات، الألم المفاصل، الألم الظهر وألم الأطراف
- ألم في الحلق

غير شائعة: قد تؤثر على ما يصل إلى شخص واحد من بين كل 100 شخص

- فقدان الشهية، فقدان الوزن، إبتخفاض نسبة السكر في الدم، إرتفاع نسبة السكر في الدم
- تغيرات في الشخصية، عصبية، إكتئاب، هياج، تقلب المزاج، صعوبة إيجاد الكلمات، هوس، أحلام غير طبيعية، نوبات الهلع، الألام، عدوانية، الشعور بالوقوع
- اضطراب في الوظيفة العقلية، صعوبة التركيز، زيادة الرغبة الجنسية، مشاكل في الوظيفة الجنسية بما في ذلك فشل في وصول الشدة الجنسية، تأخر الكف
- اضطراب الرؤية، حركات غير عادية للعين، اضطراب في الرؤية بما في ذلك صعوبة تحديد مجال الرؤية، ومشاكل من الضوء، حركات متقطعة، إبتخفاض ردود الفعل، فرط النشاط دوار عند الوقوف، حساسية الجلد، فقدان حاسة التذوق، شعور بالحرق، رعاش أثناء الحركة، إبتخفاض البقطة، فقدان الوعي، إصغاء، زيادة الحساسية للضوء، إصغاء شعور بتورم
- جفاف العين، تورم العين، الألم العين، ضعف العين، عيون دامعة، تهيج العين
- اضطراب ضربات القلب، زيادة معدل ضربات القلب، إبتخفاض ضغط الدم، زيادة ضغط الدم، تغيرات ضربات القلب، قصور القلب
- إحصار الوجه، إبيات ساخنة
- صعوبة التنفس، جفاف الأنف، إحتقان الأنف
- زيادة إفراز اللعاب، حرقة، خدر حول الفم
- تعرق، طفح جلدي، قشعريرة وحس

30، 60، 90 و 180 كبسولة
30، 60، 90 و 180 كبسولة
30، 60، 90 و 180 كبسولة
30، 60، 90 و 180 كبسولة

هذا الدواء لا أنها تتضمن معلومات

جديد.
ل المعلومات من طبيبك أو من
لمرجو عدم إعطائه لأي شخص
من مرضه بأعراض مرض
لم أي أثر آخر لم يتم ذكره في هذه

Lot N°: PTC3267B

EXP.: 05/2023

PPV: I13 DH 40

2. ما هو دواء ليرابرين[®]؟ وما هي دواعي استعماله؟
3. ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل استعمال ليرابرين[®]؟
4. كيف يجب استعمال ليرابرين[®]؟
5. ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟
6. ما هي الاحتياطات الواجب إتخاذها عند تخزين ليرابرين[®]؟
7. معلومات إضافية.

1. ما هو دواء ليرابرين[®]؟ وما هي دواعي استعماله؟

صنف الدواء الصيدلاني العلاجي: ينتمي ليرابرين[®] إلى عائلة أدوية تعالج نوبات الصرع، والأم الإعتلال العصبي و اضطرابات التقلع العام عند البالغين رمز N03AX16: ATC

إرشادات علاجية:

ألام الأعصاب المحيطية والمركزية: يستخدم ليرابرين[®] لعلاج الآلام الطويلة الأمد الناتجة عن تلف الأعصاب. أمراض مختلفة قد تحفز آلام الأعصاب المحيطية، مثل مرض السكري أو التهابات العنق (زونا). قد تكون الأعراض على شكل إحساس بالحرق، وجع، ألم، وادمان للبعض، ألم مفاجئ وحاد، إحساس بشبه طعنة السكين، ألم حارق، تشنجات، أو تصاعدي، وخز، فقدان الحس، إحساس بوخز وشبه وخز الدبابيس والإبر. قد تكون الآلام العصبية المحيطية والمركزية مصحوبة أيضاً بتغيرات في المزاج، اضطرابات في النوم، تعب، وقد يكون لها تأثير على النشاط البدني والاحتشامي، وعلى نمط الحياة بشكل عام.

الصرع: يستخدم دواء ليرابرين[®] لعلاج أنواع الصرع (نوبات صرع جزئية مع أو بدون تعميم ثانوي) عند البالغين. سيصف لكم طبيبك ليرابرين[®] لمساعدتكم على علاج الصرع في حالة كان علاجتكم الحالي لا يمكن من التحكم التام في النوبات. يجب أخذ دواء ليرابرين[®] بالاشتراك مع علاجتكم الحالي. لا ينبغي استخدام دواء ليرابرين[®] استخداماً بديلاً مع دواء آخر مضاد للصرع.

دواء ليرابرين[®] لعلاج اضطراب التقلع العام: تشمل معلومات بلق مفرط وقلق يصعب التحكم فيه. يجب من الشعور بالانفعال أو صعوبة التركيز أو مشاكل في الذاكرة، أو يختلف هذا عن الإجهاد وضعف طاقات



CABINET DE
NEUROLOGIE

Dr Laila BELARABI
الدكتورة ليلي بلعربي

CABINET DE NEUROLOGIE

Epilepsie - AVC - Pathologies des nerfs et des muscles (neuropathies, myopathies, JNM) - Céphalées - Parkinson - Alzheimer et démences - Vertiges - SEP - Neuropédiatrie
EEG (ElectroEncéphalogramme)
ENMG (Electroneuromyogramme)

مرض الصرع - السكتة الدماغية - أمراض الأعصاب والعضلات - الصداع - الراسي - باركنسون - الزهايمر والخرف - الدوار - التصلب العصبي المتعدد - التخطيط الكهربائي للدماغ - التخطيط الكهربائي للأعصاب و العضلات

Marrakech le 20/04/2022

Mme TOSSI Touria

Faire sup
IRIL lombaire

RC
ds droites

Dr. Ahmed OUSEHAL
Professeur de Radiologie
Clinique Spécialisée Ménara
19, Albek O. de L'Hôpital Guéliz
Marrakech - Tél : 05 24 45 75 83

Clinique Spécialisée Ménara
Oncologie Médicale, Radiothérapie
Albek 19, Quartier de L'Hôpital Guéliz
Tél : 05 24 45 75 83
IF : 40434684 - TP
NPE : 070061379 - ICF

Dr. Laila BELARABI
Neurologie - Tél : 05 24 43 76 68
EEG - ENMG
INPE : 071247373

N°26, Bloc B, Residence Rokaya, Avenue Abdelkrim EL Khattabi - Guéliz - Marrakech

0524437608 / Portable : 0661494144 dr.laibelarabineuro@gmail.com

INPE : 071247373

CLINIQUE SPÉCIALISÉE MENARA

Oncologie Médicale - Hematologie - Radiothérapie
Curiethérapie - Dépistage des Cancers - Traitement de la Douleur
Centre de Médecine Nucléaire Pet et Scanner - Gamma Caméra
Irathérapie - Centre de Radiologie Diagnostique et Interventionnelle

INPE : 070061379

المصحة المختصة المنارة

الأنكولوجيا الطبية - وحدة فحص أمراض الدم
وحدة علاج الألم - العلاج بالأشعة - علاج بالأشعة الداخلية
مركز الطب النووي التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني
مركز الأشعة



070061379

FACTURE

N° de l'admission : 22002072 N° Facture : 22001194 Date facturation : 21/01/2022
Nom et prénom du patient : **TOURIA TOSSI**
Convention : **PAYANT**
Traitement : **Examen radiologie** Entrée: 21/01/2022 Sortie: 21/01/2022

PRESTATIONS	nombre	prix unitaire	montant
IRM LOMBAIRE	1.00	3 000.00	3 000.00
		sous-total	3 000.00

arrêtée la présente facture à la somme de :

Trois mille dirhams

total : 3 000.00

Immatriculation :

N° prise en charge :

Notre compte bancaire : 145450212112955069000955

Clinique Spécialisée Ménara
Oncologie Médicale, Radiothérapie, Radiologie
Albek 19, Quartier de l'Hôpital
Tél : 05 24 44 75 83
IF : 40434684 - TP : 45326432
INPE : 070061379 - ICE : 001548437000074

CENTRE DE RADIOLOGIE MÉNARA

RADIOLOGIE NUMÉRISÉE • ECHO DOPPLER • ECHOGRAPHIE OBSTÉTRICALE
MAMMOGRAPHIE NUMÉRISÉE • OSTÉODENSITOMÉTRIE
SCANNER MULTIBARETTES • IRM HAUT CHAMP 1,5T
RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE

مركز التشخيص بالأشعة المنارة

التشخيص الرقمي بالأشعة السينية • التشخيص فوق الصوتي و الدوبلر
تتبع الحمل بالدبدبات فوق الصوتية • فحص الثدي الرقمي
قياس كثافة العظام • الفحص بالسكانير
الفحص بالرنين المغناطيسي • التدخل الموجه بالأشعة
21 Janvier 2022

Marrakech, le :

Nom et prénom: Mme TOSSI TOURIA
Médecin Traitant: Dr BELARABI

IRM LOMBAIRE

Technique :

Séquence sagittale T1, T2 et STIR ;
Séquence axiale T2.

Résultats :

Canal lombaire de dimensions normales.
Arthrose lombaire intersomatique étagée avec lésion de type Modic 2 à l'étage L1-L2 et L5-S1.
Arthrose des articulaires postérieures surtout à l'étage L4-L5 et L5-S1 avec hypertrophie des articulaires sans retentissement sur les foramens.
Hernie discale postérolatérale droite à l'étage L5-S1 migrée vers le bas comblant le récessus latéral et comprimant la racine S1 droite.
Discrète protrusion discale à l'étage L4-L5 sans conflit radiculaire.
Absence d'image de hernie discale ou de conflit discoradiculaire aux autres étages explorés.
Absence d'anomalie des parties molles.

Au total :

Arthrose lombaire intersomatique étagée et des articulaires postérieures à l'étage L4-L5 et L5-S1 avec hernie discale L5-S1 droite conflictuelle.

الدكتور عمر الصديقي
اختصاصي في التشخيص بالأشعة
خريج كليتي الطب بالدار البيضاء و نانسي
أستاذ سابق بكليتي الطب بالدار البيضاء و مراكش

الدكتور أحمد أسحل
اختصاصي في التشخيص بالأشعة
خريج كليتي الطب بالدار البيضاء و نانسي
أستاذ سابق بكليتي الطب بالدار البيضاء و مراكش

الدكتور محمد شكيب بنفضيل
اختصاصي في التشخيص بالأشعة
اختصاصي في الأشعة
خريج كلية الطب بباريس
طبيب سابق بمستشفى محمد السادس

Professeur Omar ESSADKI
Spécialiste en Radiologie
Lauréat des Facultés de Médecine de Casablanca et Nancy
Ex-enseignant de Radiologie aux Facultés de Médecine de Casablanca et de Marrakech

Professeur Ahmed OUSEHAL
Spécialiste en Radiologie
Lauréat des Facultés de Médecine de Casablanca et Nancy
Ex-enseignant de Radiologie aux Facultés de Médecine de Casablanca et de Marrakech

Docteur Mohamed Chakib BENFDIL
Spécialiste en Radiologie
Lauréat de la Faculté de Médecine de Paris
Ancien Radiologue du CHU Med VI

Dr. Ahmed OUSEHAL
Professeur de Radiologie
Clinique Spécialisée Ménara
19, Albek Q. de l'Hôpital Guéliz
Marrakech - Tél : 05 24 45 75 83

Ci-joint un CD comprenant la totalité de l'examen et les coupes réalisées.

19 البك حي المستشفى جليز (قرب مندوبية الصحة) - مراكش
19, Albek Quartier de l'hôpital (à côté de la délégation du Ministère de la Santé) - Guéliz Marrakech
Tél : 05 24 45 75 83 : الهاتف - Fax : 05 24 44 70 21 : الفاكس