

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| 0 Réclamation | contact@mupras.com |
| 0 Prise en charge | pec@mupras.com |
| 0 Adhésion et changement de statut | adhession@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tel : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° W19-409078

109335

Par courrier

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)
Matricole : 2538

Société : RAM

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

KACHANI MUSTAPHA

Date de naissance :

01/01/1951

Adresse :

JAMILA 5 Rue 187 N° 28 C/D Casab 04

Tél. : 0667028896

Total des frais engagés : 386,60

Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation :

3/3/2021

Nom et prénom du malade :

Kachani Kachyp

Age :

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

HTA

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Signature de l'adhérent(e) :

Le : / /

VOLET ADHÉRENT

Déclaration de maladie

N° W19-409078

Remplissez ce volet, découpez-le et conservez-le.
Il sera nécessaire de le présenter pour toute réclamation ultérieure.

Coupon à conserver par l'adhérent(e).

2538

Matricole :

KACHANI MUST

Nom de l'adhérent(e) :

386,60

Total des frais engagés :

Date de dépôt :

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

| | | | |
|--|---|----------------------------------|--|
| Dates des Actes 31/3/21 | Nom et Prénom du Médecin DR. CHAIBI Faical | Nombre et Coefficient 100 | Montant détaillé des Honoraires INP : 091042721 |
| Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes | | | |
| Dr. CHAIBI Faical Medecin Echographie Generale Cte Diemaa | | | |

| EXECUTION DES ORDONNANCES | | |
|---|----------------------|--|
| Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur INPE: 092025592 | Date 08/08/21 | Montant de la Facture 236,60 Dhs. |

| ANALYSES - RADIographies | | | |
|---|------|------------------------------|------------------------|
| Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue | Date | Designation des Coefficients | Montant des Honoraires |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| AUXILIAIRES MEDICAUX | | | | | | |
|------------------------------------|----------------|--------|-----|-----|-----|---------------------------------|
| Cachet et signature du Particulier | Date des Soins | Nombre | | | | Montant détaillé des Honoraires |
| | | A M | P C | I M | I V | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

VOLET ADHERENT

* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'O.D.F

| SOINS DENTAIRES | Dents Traitées | Nature des Soins | Coefficient | INP : <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|------------------|-------------|--|----------|----------|---|----------|----------|---|----------|----------|---|----------|----------|--|
| | | | | COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | |
| | | | | MONTANTS DES SOINS <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | |
| | | | | FIN D'EXECUTION <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | |
| <p>O.D.F. PROTHESES DENTAIRES</p> <p>DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE</p> <table border="1"> <tr> <td>H</td> <td>25523412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> </table> <p>[Création, remont, adjonction] Fonctionnel Therapeutique nécessaire à la profession</p> | | | | H | 25523412 | 21433552 | D | 00000000 | 00000000 | B | 00000000 | 00000000 | G | 35533411 | 11433553 | COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/> |
| H | 25523412 | 21433552 | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 00000000 | 00000000 | | | | | | | | | | | | | | |
| B | 00000000 | 00000000 | | | | | | | | | | | | | | |
| G | 35533411 | 11433553 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | MONTANTS DES SOINS <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DATE DU DEVIS <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DATE DE L'EXECUTION <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | |

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur CHRAÏBI Faïcel

الدكتور الشرابي فيصل

- Médecine Générale
 - Médecin du travail
 - Echographie (Echodoppler Couleur)
 - ECG



- الطِّبِّ العام

- طب الشغل

- الفحص بالصدى

- التخطيط الكهربائي للقلب

الدار البيضاء في Casablanca, le 03/03/2022

Madame KACHANI Khadija

1/ ANCINE PLUS 50/12,5 mg

1 cp le matin pdt 03 mois

2/ RHUMIX x 2

1 sachet avant les repas matin, midi et soir.

22

23616

A circular blue ink stamp. The text "Dr. CHAPAIN Faïcel" is at the top, followed by "Médecin du Travail". Below that is "Janvier 1998". At the bottom, it says "Casablanca - Maroc" and "05-11-98".

DR. REINHOLD VON HANAU

AS

45

05 22 29 16 31 . الهاتف - البريد الإلكتروني - المجموعة العامة .

Jamila 7, Rue 14 N°82 , Cité Djamâa - Casablanca -Tél.: 05 22 29 16 31

ANCINE PLUS®

Losartan - Hydrochlorothiazide

FORME, PRÉSENTATIONS ET COMPOSITION :

Comprimés pelliculés à 100mg/25mg, boîtes de 15 et de 30 sous plaquettes thermoformées.

Losartan (exprimé en losartan potassique)

Hydrochlorothiazide

Excipient q.s.p.

Comprimés pelliculés à 50mg/12,5mg, boîtes de 15 et de 30 sous plaquettes thermoformées.

Losartan (exprimé en losartan potassique)

Hydrochlorothiazide

Excipient q.s.p.

Excipients : microcristalline cellulose, lactose monohydraté, amidon prégalatiné, magnésium stearate, opadry OY jaune

Excipient à effet rotatoire : Lactose

CLASSE PHARMACO-THERAPIQUE :

Antihypertenseur, association d'un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II et d'un diurétique.

INDICATIONS :

- Traitement de l'hypertension artérielle essentielle chez les patients dont la pression artérielle n'est pas suffisamment contrôlée par le losartan ou l'hydrochlorothiazide en monothérapie.

CONTRE - INDICATIONS :

- Hypersensibilité à l'un des constituants du médicament. Au cours du 2ème et 3ème trimestres de la grossesse. En cas d'allaitement. Insuffisance rénale et hépatique sévère, hypotonie réfractaire. Hypokaliémie. Hypercalcémie.

Goutte. Anémie.

MODE, VOIE D'ADMINISTRATION ET POSOLOGIE :

Voir orale.

Dose initiale : 50mg/12,5mg une fois par jour chez certains patients ne répondant pas de façon adéquate, la posologie peut être augmentée à 2 comprimés de ANCINE PLUS (50mg/12,5mg) en une ou 2 prises quotidiennes ou à 1 comprimé de ANCINE PLUS (100mg/25mg). Une posologie supérieure à 1 comprimé / jour de ANCINE PLUS (100mg/25mg) n'est pas recommandée. ANCINE PLUS peut être pris pendant ou à distance des repas. La posologie initiale (losartan 50mg/Hydrochlorothiazide 12,5mg) chez les patients âgés de 65 ans ou plus est inchangée. Le Losartan/Hydrochlorothiazide ne doit pas être utilisé chez l'enfant et l'adolescent (en dessous de 18 ans). Pour que ANCINE PLUS, comprimés pelliculés soit pleinement efficace, suivez attentivement l'ordonnance de votre médecin et respectez la dose prescrite sans l'augmenter ni la diminuer.

Si vous oubliez de prendre ANCINE PLUS, comprimé pelliculé ne prenez pas une dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Vous devez informer votre médecin si vous pensez être (ou suspectez de devenir) enceinte. ANCINE PLUS est déconseillé en début de grossesse, et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte de plus de 3 mois. Il est important de prévenir votre médecin avant de prendre ANCINE PLUS :

- si vous avez déjà eu un gonflement du visage, des lèvres, de la gorge ou de la langue, si vous prenez des diurétiques, si vous faites un régime sans sel, si vous avez ou avez eu des vomissements importants et/ou des diarrhées, si vous avez une insuffisance cardiaque, si votre fonction hépatique est altérée, si vous avez un rétrécissement des artères rénales (sténose artérielle rénale) ou avec un rein fonctionnel unique, si vous avez une sténose des valves aortique ou mitrale (rétrécissement des valves du cœur) ou une cardiopathie hyperthyroïde (une maladie induisant un épaississement du muscle cardiaque), si vous êtes diabétique, si vous avez de la goutte, si vous avez un taux élevé de calcium ou de potassium dans votre sang, ou si vous suivez un régime pauvre en potassium vous êtes sportif et allez sur un contrôle anti-dopage, prévenez votre médecin car ANCINE PLUS contient des principes actifs qui peuvent entraîner des résultats positifs aux tests.

Il est possible que ANCINE PLUS soit moins efficace chez les personnes de race noire. En raison de la présence de lactose ce médicament est contre indiqué en cas de galactosémié congénital, de syndrome de mal absorption du glucose et du galactose, ou de déficit en lactase.

Risque du cancer de la peau non-mélanome :

Les patients qui prennent de l'hydrochlorothiazide seul ou en association avec d'autres médicaments doivent être informés de ce risque et de la nécessité de vérifier régulièrement l'état de leur peau afin de détecter toute nouvelle lésion ou modification de lésion existante et à signaler toute lésion cutanée suspecte.

Les lésions cutanées suspectes doivent être examinées. Le recours à la biopsie peut être nécessaire pour le diagnostic histologique.

Afin de réduire le risque de cancer de la peau, il sera conseillé aux patients de limiter l'exposition au soleil et aux rayons UV et d'avoir une protection adéquate en cas d'exposition solaire.

L'utilisation d'Hydrochlorothiazide doit aussi être réexamnée avec attention chez les patients présentant un antécédent de cancer de la peau.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Chez les patients subissant une chirurgie majeure, ou durant l'anesthésie avec des agents causant l'hypotension, losartan bloque l'action d'angiotensine II après une sécrétion de rénine compensatoire.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES :

D'une façon générale, signaler à votre médecin ou à votre pharmacien tout médicament pris pendant le traitement par ANCINE PLUS.

- les anti-inflammatoires non stéroïdiens peuvent être un antagoniste des effets antihypertenseurs de ANCINE PLUS en causant la rétention hydro sodique et / ou l'inhibition de la synthèse des prostaglandines rénales comme avec d'autres médicaments qui inhibent l'angiotensine II ou ses effets. L'administration concomitante de diurétiques épargneurs de potassium, de suppléments potassiques ou de substituts de sel contenant du potassium peut provoquer une hyperkaliémie. Un contrôle de la kaliémie est recommandé. ANCINE PLUS réduit l'excrétion du lithium, entraînant une augmentation de la lithium pouvant atteindre des valeurs toxiques. Les profils ci-dessous peuvent interagir avec les diurétiques thiazidiques en cas de prise concomitante : D'autres médicaments pour abaisser la pression sanguine. Des corticoïdes. Des médicaments pour le traitement de la goutte. Des antalgiques. Des médicaments contenant de la carbamazépine, de la clozapine ou un sel de calcium. Certains neuroleptiques. Cholestyramine. Des médicaments myorelaxants. L'adrénaline ou autre médicaments de la même classe. Des médicaments pour le traitement du diabète. Des produits de contraste iodés. Alcool

EFFETS INDÉSIRABLES :

Comme tous les médicaments, ANCINE PLUS peut provoquer des effets indésirables, bien qu'ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. Les effets indésirables rapportés sont les suivants :

Fréquent

- Insomnie, céphalées, étourdissements. Toux, infection des voies respiratoires supérieures, congestion du nez, sinusite, problème de sinus. Diarrhée, douleur abdominale, nausées, indigestion. Crampes musculaires, douleur de la jambe, douleur lombaire. Faiblesse, fatigue, douleurs thoraciques. Hyperkaliémie, diminution de l'hématoctitre et de l'hémoglobine.

Peu fréquents

- Anémie, purpura rhumatoïde, ecchymoses, hémolyse. Anorexie, goutte. Anxiété, peur panique, confusion, dépression, réves anormaux, troubles du sommeil, somnolence, troubles de la mémoire. Nervosité, paresthésie, neuropathie périphérique, tremblement, migraine, syncope. Vision trouble, sensation de brûlure ou de picotement dans les yeux, conjonctivite, baisse de l'acuité visuelle. Acouphènes, vertiges. Hypotension, hypotension orthostatique, angor, accident vasculaire cérébral, infarctus du myocarde, palpitations, arythmie. Gêne pharyngée, pharyngie, laryngie, dyspnée, bronchite, rhinite, congestion pulmonaire. Constipation, flatulence, vomissements, sécheresse de la bouche, douleur dentaire. Sécheresse de la peau, atopie, dermatite, érythème, bouffées de chaleur, photosensibilité, prurit, rash, urticaire, sudation. Douleur du bras, des épaules, les hanches, les genoux ou autres articulations, gonflement des articulations, raideur, faiblesse musculaire. Mictions fréquentes, nycturie, infection des voies urinaires. Baisse de la libido, impuissance. Edème du visage, fièvre.

Rare

- Hépatite.

Fréquence indéterminée

- Anomalie de la fonction hépatique.

Risque de cancer de peau non-mélanome :

Si vous ressentez un ou plusieurs effets mentionnés comme grave ou si vous présentez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

Grossesse :

Par mesure de précaution, il est préférable de ne pas utiliser ANCINE PLUS pendant le 1er trimestre de la grossesse. L'administration de ANCINE PLUS est contre indiquée pendant le 2ème et le 3ème trimestre de la grossesse.

Sous réserve que vous êtes enceinte pendant le traitement, consulter votre médecin car lui seul pourra adapter le traitement à votre état.

Allaitement :

L'allaitement est contre indiqué au cours du traitement.

SURDOSE :

Les symptômes possibles de surdosage par ANCINE PLUS incluent la bradycardie due à la stimulation vagale, hypotension avec tachycardie. Le traitement doit être symptomatique.

Surveiller par l'Hydrochlorothiazide ont été liés à des désordres hydrolytiques (hypokaliémie, hypotonie). Ni le Losartan ni son métabolite actif ne peuvent être éliminés par la diurèse.

CONDUITE ET UTILISATION DE MACHINES :

Les conducteurs de véhicules ou utilisateurs de machines doivent être avertis que les traitements antihypertenseurs peuvent parfois provoquer des étourdissements ou une somnolence lors d'une utilisation de la poseologie.

CONDITIONS PARTICULIERS DE CONSERVATION :

A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

Ne pas dépasser la date limite figurant sur le conditionnement extérieur.

Date d'approbation de la notice :

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 25/11/14.

Liste I

CECI EST UN MÉDICAMENT

- Un médicament est un produit, mais pas comme les autres.
- Un médicament est un produit qui a pour votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Respecter rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous expose a prescrit.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses indications et ses contre-indications.
- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.
- Ne le reprenez pas, n'en augmentez pas, n'en doses sans consulter votre médecin.
- Ne laissez jamais les médicaments à la portée des enfants.



Fabriqué par le laboratoire Pharmaceutique NOVOPHARMA
Z.I.I₂ Tit Mellil - Casablanca -

ANCINE PLUS® 50mg/12,5mg

30 comprimés pelliculés



6 118000 141051

LOT : 143

PER : 06/24

PPV : 64,20 DH

ANCINE PLUS®

Losartan - Hydrochlorothiazide

FORME, PRÉSENTATIONS ET COMPOSITION :

Comprimés pelliculés à 100mg/25mg, boîtes de 15 et de 30 sous plaquettes thermoformées.

Losartan (exprimé en losartan potassique)

Hydrochlorothiazide

Excipient q.s.p.

Comprimés pelliculés à 50mg/12,5mg, boîtes de 15 et de 30 sous plaquettes thermoformées.

Losartan (exprimé en losartan potassique)

Hydrochlorothiazide

Excipient q.s.p.

Excipients : microcristalline cellulose, lactose monohydraté, amidon prégalatiné, magnésium stearate, opadry OY jaune

Excipient à effet rotatoire : Lactose

CLASSE PHARMACO-THERAPIQUE :

Antihypertenseur, association d'un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II et d'un diurétique.

INDICATIONS :

- Traitement de l'hypertension artérielle essentielle chez les patients dont la pression artérielle n'est pas suffisamment contrôlée par le losartan ou l'hydrochlorothiazide en monothérapie.

CONTRE - INDICATIONS :

- Hypersensibilité à l'un des constituants du médicament. Au cours du 2ème et 3ème trimestres de la grossesse. En cas d'allaitement. Insuffisance rénale et hépatique sévère, hypotonie réfractaire. Hypokaliémie. Hypercalcémie.

Goutte. Anémie.

MODE, VOIE D'ADMINISTRATION ET POSOLOGIE :

Voir orale.

Dose initiale : 50mg/12,5mg une fois par jour chez certains patients ne répondant pas de façon adéquate, la posologie peut être augmentée à 2 comprimés de ANCINE PLUS (50mg/12,5mg) en une ou 2 prises quotidiennes ou à 1 comprimé de ANCINE PLUS (100mg/25mg). Une posologie supérieure à 1 comprimé / jour de ANCINE PLUS (100mg/25mg) n'est pas recommandée. ANCINE PLUS peut être pris pendant ou à distance des repas. La posologie initiale (losartan 50mg/Hydrochlorothiazide 12,5mg) chez les patients âgés de 65 ans ou plus est inchangée. Le Losartan/Hydrochlorothiazide ne doit pas être utilisé chez l'enfant et l'adolescent (en dessous de 18 ans). Pour que ANCINE PLUS, comprimés pelliculés soit pleinement efficace, suivez attentivement l'ordonnance de votre médecin et respectez la dose prescrite sans l'augmenter ni la diminuer.

Si vous oubliez de prendre ANCINE PLUS, comprimé pelliculé ne prenez pas une dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Vous devez informer votre médecin si vous pensez être (ou suspectez de devenir) enceinte. ANCINE PLUS est déconseillé en début de grossesse, et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte de plus de 3 mois. Il est important de prévenir votre médecin avant de prendre ANCINE PLUS :

- si vous avez déjà eu un gonflement du visage, des lèvres, de la gorge ou de la langue, si vous prenez des diurétiques, si vous faites un régime sans sel, si vous avez ou avez eu des vomissements importants et/ou des diarrhées, si vous avez une insuffisance cardiaque, si votre fonction hépatique est altérée, si vous avez un rétrécissement des artères rénales (sténose artérielle rénale) ou avec un rein fonctionnel unique, si vous avez une sténose des valves aortique ou mitrale (rétrécissement des valves du cœur) ou une cardiopathie hyperthyroïde (une maladie induisant un épaississement du muscle cardiaque), si vous êtes diabétique, si vous avez de la goutte, si vous avez un taux élevé de calcium ou de potassium dans votre sang, ou si vous suivez un régime pauvre en potassium vous êtes sportif et allez sur un contrôle anti-dopage, prévenez votre médecin car ANCINE PLUS contient des principes actifs qui peuvent entraîner des résultats positifs aux tests.

Il est possible que ANCINE PLUS soit moins efficace chez les personnes de race noire. En raison de la présence de lactose ce médicament est contre indiqué en cas de galactosémié congénital, de syndrome de mal absorption du glucose et du galactose, ou de déficit en lactase.

Risque du cancer de la peau non-mélanome :

Les patients qui prennent de l'hydrochlorothiazide seul ou en association avec d'autres médicaments doivent être informés de ce risque et de la nécessité de vérifier régulièrement l'état de leur peau afin de détecter toute nouvelle lésion ou modification de lésion existante et à signaler toute lésion cutanée suspecte.

Les lésions cutanées suspectes doivent être examinées. Le recours à la biopsie peut être nécessaire pour le diagnostic histologique.

Afin de réduire le risque de cancer de la peau, il sera conseillé aux patients de limiter l'exposition au soleil et aux rayons UV et d'avoir une protection adéquate en cas d'exposition solaire.

L'utilisation d'Hydrochlorothiazide doit aussi être réexamnée avec attention chez les patients présentant un antécédent de cancer de la peau.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Chez les patients subissant une chirurgie majeure, ou durant l'anesthésie avec des agents causant l'hypotension, losartan bloque l'action d'angiotensine II après une sécrétion de rénine compensatoire.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES :

D'une façon générale, signaler à votre médecin ou à votre pharmacien tout médicament pris pendant le traitement par ANCINE PLUS.

- les anti-inflammatoires non stéroïdiens peuvent être un antagoniste des effets antihypertenseurs de ANCINE PLUS en causant la rétention hydro sodique et / ou l'inhibition de la synthèse des prostaglandines rénales comme avec d'autres médicaments qui inhibent l'angiotensine II ou ses effets. L'administration concomitante de diurétiques épargneurs de potassium, de suppléments potassiques ou de substituts de sel contenant du potassium peut provoquer une hyperkaliémie. Un contrôle de la kaliémie est recommandé. ANCINE PLUS réduit l'excrétion du lithium, entraînant une augmentation de la lithium pouvant atteindre des valeurs toxiques. Les profils ci-dessous peuvent interagir avec les diurétiques thiazidiques en cas de prise concomitante : D'autres médicaments pour abaisser la pression sanguine. Des corticoïdes. Des médicaments pour le traitement de la goutte. Des antalgiques. Des médicaments contenant de la carbamazépine, de la clozapine ou un sel de calcium. Certains neuroleptiques. Cholestyramine. Des médicaments myorelaxants. L'adrénaline ou autre médicaments de la même classe. Des médicaments pour le traitement du diabète. Des produits de contraste iodés. Alcool

EFFETS INDÉSIRABLES :

Comme tous les médicaments, ANCINE PLUS peut provoquer des effets indésirables, bien qu'ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. Les effets indésirables rapportés sont les suivants :

Fréquent

- Insomnie, céphalées, étourdissements. Toux, infection des voies respiratoires supérieures, congestion du nez, sinusite, problème de sinus. Diarrhée, douleur abdominale, nausées, indigestion. Crampes musculaires, douleur de la jambe, douleur lombaire. Faiblesse, fatigue, douleurs thoraciques. Hyperkaliémie, diminution de l'hématoctitre et de l'hémoglobine.

Peu fréquents

- Anémie, purpura rhumatoïde, ecchymoses, hémolyse. Anorexie, goutte. Anxiété, peur panique, confusion, dépression, réves anormaux, troubles du sommeil, somnolence, troubles de la mémoire. Nervosité, paresthésie, neuropathie périphérique, tremblement, migraine, syncope. Vision trouble, sensation de brûlure ou de picotement dans les yeux, conjonctivite, baisse de l'acuité visuelle. Acouphènes, vertiges. Hypotension, hypotension orthostatique, angor, accident vasculaire cérébral, infarctus du myocarde, palpitations, arythmie. Gêne pharyngée, pharyngie, laryngie, dyspnée, bronchite, rhinite, congestion pulmonaire. Constipation, flatulence, vomissements, sécheresse de la bouche, douleur dentaire. Sécheresse de la peau, atopie, dermatite, érythème, bouffées de chaleur, photosensibilité, prurit, rash, urticaire, sudation. Douleur du bras, des épaules, les hanches, les genoux ou autres articulations, gonflement des articulations, raideur, faiblesse musculaire. Mictions fréquentes, nycturie, infection des voies urinaires. Baisse de la libido, impuissance. Edème du visage, fièvre.

Rare

- Hépatite.

Fréquence indéterminée

- Anomalie de la fonction hépatique.

Risque de cancer de peau non-mélanome :

Si vous ressentez un ou plusieurs effets mentionnés comme grave ou si vous présentez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

Grossesse :

Par mesure de précaution, il est préférable de ne pas utiliser ANCINE PLUS pendant le 1er trimestre de la grossesse. L'administration de ANCINE PLUS est contre indiquée pendant le 2ème et le 3ème trimestre de la grossesse.

Allaitemnt :

L'allaitement est contre indiqué au cours du traitement.

SURDOSE :

Les symptômes possibles de surdosage par ANCINE PLUS incluent la bradycardie due à la stimulation vagale, hypotension avec tachycardie. Le traitement doit être symptomatique.

Surveiller par l'Hydrochlorothiazide ont été liés à des désordres hydrolytiques (hypokaliémie, hypotonie). Ni le Losartan ni son métabolite actif ne peuvent être éliminés par la dialyse.

CONDUITE ET UTILISATION DE MACHINES :

Les conducteurs de véhicules ou utilisateurs de machines doivent être avertis que les traitements antihypertenseurs peuvent parfois provoquer des étourdissements ou une somnolence lors d'une utilisation de la poseologie.

CONDITIONS PARTICULIERS DE CONSERVATION :

A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

Ne pas dépasser la date limite figurant sur le conditionnement extérieur.

Date d'approbation de la notice :

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 25/11/14.

Liste I

CECI EST UN MÉDICAMENT

- Un médicament est un produit, mais pas comme les autres.
- Un médicament est un produit qui a pour votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Respecter rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous expose a prescrit.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses indications et ses contre-indications.
- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.
- Ne le reprenez pas, n'en augmentez pas, n'en doses sans consulter votre médecin.
- Ne laissez jamais les médicaments à la portée des enfants.



Fabriqué par le laboratoire Pharmaceutique NOVOPHARMA
Z.I.2 Tit Mellil - Casablanca -

ANCINE PLUS® 50mg/12,5mg

30 comprimés pelliculés



6 118000 141051

LOT : 143
PER : 06/24
PPV : 64,20 DH

ANCINE PLUS®

Losartan - Hydrochlorothiazide

FORME, PRÉSENTATIONS ET COMPOSITION :

Comprimés pelliculés à 100mg/25mg, boîtes de 15 et de 30 sous plaquettes thermoformées.

Losartan (exprimé en losartan potassique)

Hydrochlorothiazide

Excipient q.s.p.

Comprimés pelliculés à 50mg/12,5mg, boîtes de 15 et de 30 sous plaquettes thermoformées.

Losartan (exprimé en losartan potassique)

Hydrochlorothiazide

Excipient q.s.p.

Excipients : microcristalline cellulose, lactose monohydraté, amidon prégalatiné, magnésium stearate, opadry OY jaune

Excipient à effet rotatoire : Lactose

CLASSE PHARMACO-THERAPIQUE :

Antihypertenseur, association d'un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II et d'un diurétique.

INDICATIONS :

- Traitement de l'hypertension artérielle essentielle chez les patients dont la pression artérielle n'est pas suffisamment contrôlée par le losartan ou l'hydrochlorothiazide en monothérapie.

CONTRE - INDICATIONS :

- Hypersensibilité à l'un des constituants du médicament. Au cours du 2ème et 3ème trimestres de la grossesse. En cas d'allaitement. Insuffisance rénale et hépatique sévère, hypotonie réfractaire. Hypokaliémie. Hypercalcémie.

Goutte. Anémie.

MODE, VOIE D'ADMINISTRATION ET POSOLOGIE :

Voir orale.

Dose initiale : 50mg/12,5mg une fois par jour chez certains patients ne répondant pas de façon adéquate, la posologie peut être augmentée à 2 comprimés de ANCINE PLUS (50mg/12,5mg) en une ou 2 prises quotidiennes ou à 1 comprimé de ANCINE PLUS (100mg/25mg). Une posologie supérieure à 1 comprimé / jour de ANCINE PLUS (100mg/25mg) n'est pas recommandée. ANCINE PLUS peut être pris pendant ou à distance des repas. La posologie initiale (losartan 50mg/Hydrochlorothiazide 12,5mg) chez les patients âgés de 65 ans ou plus est inchangée. Le Losartan/Hydrochlorothiazide ne doit pas être utilisé chez l'enfant et l'adolescent (en dessous de 18 ans). Pour que ANCINE PLUS, comprimés pelliculés soit pleinement efficace, suivez attentivement l'ordonnance de votre médecin et respectez la dose prescrite sans l'augmenter ni la diminuer.

Si vous oubliez de prendre ANCINE PLUS, comprimé pelliculé ne prenez pas une dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Vous devez informer votre médecin si vous pensez être (ou suspectez de devenir) enceinte. ANCINE PLUS est déconseillé en début de grossesse, et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte de plus de 3 mois. Il est important de prévenir votre médecin avant de prendre ANCINE PLUS :

- si vous avez déjà eu un gonflement du visage, des lèvres, de la gorge ou de la langue, si vous prenez des diurétiques, si vous faites un régime sans sel, si vous avez ou avez eu des vomissements importants et/ou des diarrhées, si vous avez une insuffisance cardiaque, si votre fonction hépatique est altérée, si vous avez un rétrécissement des artères rénales (sténose artérielle rénale) ou avec un rein fonctionnel unique, si vous avez une sténose des valves aortique ou mitrale (rétrécissement des valves du cœur) ou une cardiopathie hyperthyroïde (une maladie induisant un épaississement du muscle cardiaque), si vous êtes diabétique, si vous avez de la goutte, si vous avez un taux élevé de calcium ou de potassium dans votre sang, ou si vous suivez un régime pauvre en potassium vous êtes sportif et allez sur un contrôle anti-dopage, prévenez votre médecin car ANCINE PLUS contient des principes actifs qui peuvent entraîner des résultats positifs aux tests.

Il est possible que ANCINE PLUS soit moins efficace chez les personnes de race noire. En raison de la présence de lactose ce médicament est contre indiqué en cas de galactosémié congénital, de syndrome de mal absorption du glucose et du galactose, ou de déficit en lactase.

Risque du cancer de la peau non-mélanome :

Les patients qui prennent de l'hydrochlorothiazide seul ou en association avec d'autres médicaments doivent être informés de ce risque et de la nécessité de vérifier régulièrement l'état de leur peau afin de détecter toute nouvelle lésion ou modification de lésion existante et à signaler toute lésion cutanée suspecte.

Les lésions cutanées suspectes doivent être examinées. Le recours à la biopsie peut être nécessaire pour le diagnostic histologique.

Afin de réduire le risque de cancer de la peau, il sera conseillé aux patients de limiter l'exposition au soleil et aux rayons UV et d'avoir une protection adéquate en cas d'exposition solaire.

L'utilisation d'Hydrochlorothiazide doit aussi être réexamnée avec attention chez les patients présentant un antécédent de cancer de la peau.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Chez les patients subissant une chirurgie majeure, ou durant l'anesthésie avec des agents causant l'hypotension, losartan bloque l'action d'angiotensine II après une sécrétion de rénine compensatoire.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES :

D'une façon générale, signaler à votre médecin ou à votre pharmacien tout médicament pris pendant le traitement par ANCINE PLUS.

- les anti-inflammatoires non stéroïdiens peuvent être un antagoniste des effets antihypertenseurs de ANCINE PLUS en causant la rétention hydro sodique et / ou l'inhibition de la synthèse des prostaglandines rénales comme avec d'autres médicaments qui inhibent l'angiotensine II ou ses effets. L'administration concomitante de diurétiques épargneurs de potassium, de suppléments potassiques ou de substituts de sel contenant du potassium peut provoquer une hyperkaliémie. Un contrôle de la kaliémie est recommandé. ANCINE PLUS réduit l'excrétion du lithium, entraînant une augmentation de la lithium pouvant atteindre des valeurs toxiques. Les profils ci-dessous peuvent interagir avec les diurétiques thiazidiques en cas de prise concomitante : D'autres médicaments pour abaisser la pression sanguine. Des corticoïdes. Des médicaments pour le traitement de la goutte. Des antalgiques. Des médicaments contenant de la carbamazépine, de la clozapine ou un sel de calcium. Certains neuroleptiques. Cholestyramine. Des médicaments myorelaxants. L'adrénaline ou autre médicaments de la même classe. Des médicaments pour le traitement du diabète. Des produits de contraste iodés. Alcool

EFFETS INDÉSIRABLES :

Comme tous les médicaments, ANCINE PLUS peut provoquer des effets indésirables, bien qu'ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. Les effets indésirables rapportés sont les suivants :

Fréquent

- Insomnie, céphalées, étourdissements. Toux, infection des voies respiratoires supérieures, congestion du nez, sinusite, problème de sinus. Diarrhée, douleur abdominale, nausées, indigestion. Crampes musculaires, douleur de la jambe, douleur lombaire. Faiblesse, fatigue, douleurs thoraciques. Hyperkaliémie, diminution de l'hématoctitre et de l'hémoglobine.

Peu fréquents

- Anémie, purpura rhumatoïde, ecchymoses, hémolyse. Anorexie, goutte. Anxiété, peur panique, confusion, dépression, réves anormaux, troubles du sommeil, somnolence, troubles de la mémoire. Nervosité, paresthésie, neuropathie périphérique, tremblement, migraine, syncope. Vision trouble, sensation de brûlure ou de picotement dans les yeux, conjonctivite, baisse de l'acuité visuelle. Acouphènes, vertiges. Hypotension, hypotension orthostatique, angor, accident vasculaire cérébral, infarctus du myocarde, palpitations, arythmie. Gêne pharyngée, pharyngie, laryngie, dyspnée, bronchite, rhinite, congestion pulmonaire. Constipation, flatulence, vomissements, sécheresse de la bouche, douleur dentaire. Sécheresse de la peau, atopie, dermatite, érythème, bouffées de chaleur, photosensibilité, prurit, rash, urticaire, sudation. Douleur du bras, des épaules, les hanches, les genoux ou autres articulations, gonflement des articulations, raideur, faiblesse musculaire. Mictions fréquentes, nycturie, infection des voies urinaires. Baisse de la libido, impuissance. Edème du visage, fièvre.

Rare

- Hépatite.

Fréquence indéterminée

- Anomalie de la fonction hépatique.

Risque de cancer de peau non-mélanome :

Si vous ressentez un ou plusieurs effets mentionnés comme grave ou si vous présentez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

Grossesse :

Par mesure de précaution, il est préférable de ne pas utiliser ANCINE PLUS pendant le 1er trimestre de la grossesse. L'administration de ANCINE PLUS est contre indiquée pendant le 2ème et le 3ème trimestre de la grossesse.

Allaitemnt :

L'allaitement est contre indiqué au cours du traitement.

SURDOSE :

Les symptômes possibles de surdosage par ANCINE PLUS incluent la bradycardie due à la stimulation vagale, hypotension avec tachycardie. Le traitement doit être symptomatique.

Surveiller par l'Hydrochlorothiazide ont été liés à des désordres hydrolytiques (hypokaliémie, hypotonie). Ni le Losartan ni son métabolite actif ne peuvent être éliminés par la dialyse.

CONDUITE ET UTILISATION DE MACHINES :

Les conducteurs de véhicules ou utilisateurs de machines doivent être avertis que les traitements antihypertenseurs peuvent parfois provoquer des étourdissements ou une somnolence lors d'une utilisation de la poseologie.

CONDITIONS PARTICULIERS DE CONSERVATION :

A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

Ne pas dépasser la date limite figurant sur le conditionnement extérieur.

Date d'approbation de la notice :

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 25/11/14.

Liste I

CECI EST UN MÉDICAMENT

- Un médicament est un produit, mais pas comme les autres.
- Un médicament est un produit qui a pour votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Respecter rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous expose a prescrit.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses indications et ses contre-indications.
- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.
- Ne le reprenez pas, n'en augmentez pas, n'en doses sans consulter votre médecin.
- Ne laissez jamais les médicaments à la portée des enfants.



Fabriqué par le laboratoire Pharmaceutique NOVOPHARMA
Z.I.2 Tit Mellil - Casablanca -

ANCINE PLUS® 50mg/12,5mg

30 comprimés pelliculés



6 118000 141051

LOT : 143
PER : 06/24
PPV : 64,20 DH

- Hypersensibilité à l'un des composants ;
- Ulcère gastroduodénal ;
- Hypertension artérielle sévère ou mal équilibrée par le traitement ;
- Glaucome ;
- Adénome de la prostate ;
- Insuffisance hépatique et/ou rénale graves ;
- Antécédents d'accident vasculaire cérébral ou de facteurs de risque susceptibles de favoriser la survenue d'accident vasculaire cérébral, en raison de l'activité sympathomimétique alpha du vasoconstricteur ;
- En association avec d'autres médicaments contenant un vasoconstricteur ;
- Insuffisance coronarienne sévère ;
- Antécédents de convulsions.

En cas de doute, demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Eviter la prise prolongée de ce médicament.
- La consommation de boissons et de médicaments alcoolisés est déconseillée pendant le traitement.
- L'attention est attirée chez :
 - Les diabétiques : sur la présence de saccharose. En tenir compte.
 - Les sportifs : sur la possibilité d'interférence de la pseudoéphédrine dans les résultats de leur contrôle antidopage.
 - Les conducteurs de véhicules et ceux qui doivent faire attention à leur somnolence.

RHUMIX® est un médicament, ne pas le prendre sans ordonnance.

EN CAS DE DOUTE DEMANDEZ À VOTRE PHARMACIEN.

Autres médicaments et RHUMIX® :

Prise ou utilisation d'autres médicaments :

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament obtenu sans ordonnance, demandez à votre pharmacien.

RHUMIX® est un médicament associé à d'autres médicaments. Il existe des interactions possibles avec certains d'entre eux. Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament obtenu sans ordonnance, demandez à votre pharmacien.

Rhumix®

Boîte de 10 sachets

P.P.V. : 22,00 DH



6 118000 191032

- Hypersensibilité à l'un des composants ;
- Ulcère gastroduodénal ;
- Hypertension artérielle sévère ou mal équilibrée par le traitement ;
- Glaucome ;
- Adénome de la prostate ;
- Insuffisance hépatique et/ou rénale graves ;
- Antécédents d'accident vasculaire cérébral ou de facteurs de risque susceptibles de favoriser la survenue d'accident vasculaire cérébral, en raison de l'activité sympathomimétique alpha du vasoconstricteur ;
- En association avec d'autres médicaments contenant un vasoconstricteur ;
- Insuffisance coronarienne sévère ;
- Antécédents de convulsions.

En cas de doute, demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Eviter la prise prolongée de ce médicament.
- La consommation de boissons et de médicaments alcoolisés est déconseillée pendant le traitement.
- L'attention est attirée chez :
 - Les diabétiques : sur la présence de saccharose. En tenir compte.
 - Les sportifs : sur la possibilité d'interférence de la pseudoéphédrine dans les résultats de leur contrôle antidopage.
 - Les conducteurs de véhicules et ceux qui souffrent de somnolence.

RHUMIX® est un médicament, ne pas l'utiliser sans prescription.

EN CAS DE DOUTE DEMANDEZ À VOTRE PHARMACIEN.

Autres médicaments et RHUMIX® :

Prise ou utilisation d'autres médicaments :

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament obtenu sans ordonnance, consultez votre pharmacien.

RHUMIX® est un médicament associé à d'autres médicaments. Il existe des interactions possibles avec certains d'entre eux. Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament obtenu sans ordonnance, consultez votre pharmacien. Il est potentiellement dangereux d'associer ce médicament à d'autres médicaments.

Rhumix®

Boîte de 10 sachets

P.P.V. : 22,00 DH



6 118000 191032