

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Education :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Prothétique :

En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Alial Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Alial Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

110000

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

## Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1985 Société : R.A.M.

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : BOUDCHAR M'HAMED

Date de naissance : 17.7.1955

Adresse : Habitaelle

Tél. : 0661199384 Total des frais engagés : ..... Dhs

## Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Docteur EL MEHDI M.  
Spécialiste des Maladies des Reins  
Centre d'Hémodialyse  
126, Bd Oujda Fétidéâ - Casablanca  
IN.P : 09105829

Date de consultation : .....

Nom et prénom du malade : Boudchar M'hamed

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie : Géméritome floride charac. g.

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : 22.01.122

Signature de l'adhérent(e) : B.M

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
22/11/2021	6	Ca	300\$ (W)	Docteur El Mekki, Spécialiste des maladies de l'oreille, du nez et du palais. Centre d'Entomologie et de Médecine de l'oreille. N.P. : 091055207

## EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien et du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
<b>PHARMACIE EL ALIA</b> Dr. KHAUD ZIOUL 394 Bd. El Houda El Alia Tél: 03 23 32 77 88	22/1/2022	280,40

## ANALYSES - RADIOPHGRAPHS

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
	18/03/22	B660 + 1PC	800 francs

## AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	
	.....					.....
	.....					.....
	.....					.....
	.....					.....
	.....					.....

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### Important:

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de la

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXÉCUTION

# مركز أمراض الكلى والكلية الاصطناعية بلفدير

CENTRE D'HÉMODIALYSE ET DE NEPHROLOGIE - BELVÉDÈRE

Dr. M. EL MEHDI

Docteur d'Etat Français de Médecine

Spécialiste des Maladies des Reins

(Major de promotion du CES Français)


Ex Prof Assistant au CHU de Marseille.

Ex Attaché d'enseignement à la Faculté de Médecine de Marseille.

Ex Chef de Service de Néphrologie Hémodialyse de la Polyclinique de la CNSS de Casablanca.

Ex 1<sup>er</sup> Vice Président de la Société Marocaine de Néphrologie (SMN).

Ex Secrétaire Général de la Société Marocaine des Maladies Rénale.



الدكتور م.المهدي

الدكتورة الفرنسية للطب

اختصاصي في أمراض الكلى

(متعدد البقع في اختصاص أمراض الكلى في فرنسا)

أستاذ مساعد بمستشفى مارسييليا سابقا.

ملحق بالتعليم سابقا بكلية الطب مارسييليا.

رئيس مصلحة أمراض الكلى و الكلية الاصطناعية.

سابقا بمصحة الضمان الاجتماعي بالدار البيضاء.

Casablanca, le

22/12/22



090001330

- Mr Baudchaw Mohamed

(22,80) x 2

1 - Cortancyl 55

(42,20) x 2 14 1/2/j

2 - Calcifix D3

35,20) x 2 14 pris le 2 Juin

PHARMACIE EL AYL  
Dr. KHALID ZIOLU  
94 Bd. EL JOUNA EL AYL - 9000 - Casablanca  
Tél: 05 22 40 07 56 - 05 22 40 96 96 - Email: almehdim55@gmail.com

Dr. M. EL MEHDI M.  
Spécialiste des Maladies des Reins  
Centre d'Hémodialyse  
125, Bd Oujda Belvédère Casablanca  
T.N.P. 091058297

126, Bd.d'Oujda - 2<sup>me</sup> étage - Belvédère (face gare des voyageurs) Casablanca - شارع وجدة - بلفدير ( أمام محطة المسافرين) الدار البيضاء

Tel : 05 22 40 07 56 / 24 61 43 : المائف - Fax : 05 22 40 96 96 : البريد الالكتروني : Site web : [www.hemodialysebelvedere.ma](http://www.hemodialysebelvedere.ma) : الموقع الالكتروني

ICE : 001691193000054 - IF : 46700800 - ت. - Cr. - TVA : 625043 - Patente : 32502235

ص.ب. - ق.م : 2342468 - Patente : 32502235

The safety of amlodipine in human pregnancy has not been established. If you think you might be pregnant, or are planning to get pregnant, you must tell your doctor before you take AMEP®.

**Breast-feeding:**

It has been shown that amlodipine is passing into breast milk in small amounts. If you are breast-feeding or about to start breast-feeding you must tell your doctor before taking AMEP®.

If you are pregnant or breast-feeding, think you may be pregnant or are planning to have a baby, ask your doctor or pharmacist for advice before taking this medicine. The possible effects on the ability to drive and use machines

AMEP® may affect your ability to drive or use machines. If the tablets make you feel sick, dizzy or tired, or give you a headache, do not drive or use machines and contact your doctor immediately.

**Notices relating to excipients with known effect**

Not applicable.

**3. How to take AMEP® tablets?**

Always take this medicine exactly as your doctor or pharmacist has told you. Check with your doctor or pharmacist if you are not sure.

The recommended initial dose of AMEP® is 5 mg once daily. The dose can be increased to 10 mg of AMEP® once daily.

This medicine can be used before or after the consumption of food and drinks. You should take this medicine at the same time each day with a drink of water. Do not take AMEP® with grapefruit juice.

**Use by children and adolescents**

For children and adolescents (6-17 years old), the recommended usual starting dose is 2.5mg a day. The maximum recommended dose is 5 mg a day. The tablets of AMEP® 2.5 mg are not currently available.

It is important to keep taking the tablets. Do not wait until your tablets are finished before seeing your doctor.

**If you take more AMEP® tablets than you should:**

Taking too many tablets may cause your blood pressure to become low or even dangerously low. You may feel dizzy, lightheaded, faint or weak. If blood pressure drop is severe enough shock can occur. Your skin could feel cool and clammy and you could lose consciousness. Seek immediate medical attention if you take too many AMEP®.

**If you forget to take AMEP® tablets:**

Do not worry. If you forget to take a tablet, leave out that dose completely. Take your next dose at the right time. Do not take a double dose to make up for a forgotten dose.

**If you stop taking AMEP® tablets:**

Your doctor will advise you how long to take this medicine. Your condition may return if you stop using this medicine before you are advised.

If you have any further questions on the use of this medicine, ask your doctor or pharmacist.

**4. What are the possible side effects?**

Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets them.

Visit your doctor immediately if you experience any of the following side effects after taking this medicine.

• Sudden wheeziness, chest pain, shortness of breath or difficulty in breathing

• Swelling of eyelids, face or lips

• Swelling of the tongue and throat which causes great difficulty breathing

• Severe skin reactions including intense skin rash, hives, reddening of the skin over your whole body, severe itching, blistering, peeling and swelling of the skin, inflammation of mucous membranes (Stevens-Johnson Syndrome, toxic epidermal necrolysis) or other allergic reactions.

• Heart attack, abnormal heart beat.

• Inflamed pancreas which may cause severe abdominal and back pain accompanied with feeling very unwell.

The following very common side effect has been reported. If this causes you problems or if it lasts for more than one week, you should contact your doctor.

**Very common side effects: may affect more than 1 in 10 people**

The following common side effects have been reported. If any of these cause you problems or if they last for more than one week, you should contact your doctor.

**Common side effects: may affect up to 1 in 10 people**

• Headache, dizziness, sleepiness (especially at the beginning of treatment)

• Palpitations (awareness of your heart beat), flushing

• Abdominal pain, nausea

• Altered bowel habits, diarrhea, constipation, indigestion

• Tiredness, weakness

• Visual disturbances, double vision

• Muscle cramps

• Ankle swelling

Other side effects that have been reported include the following list. If any of these get serious, or if you notice any side effects not listed in this leaflet, please tell your doctor or pharmacist.

**Uncommon side effects: may affect up to 1 in 100 people**

• Mood changes, anxiety, depression, sleeplessness

• Trembling, taste abnormalities, fainting

• Numbness or tingling sensation in your limbs, loss of pain sensation

• Ringing in the ears

• Low blood pressure

• Sneezing and running nose caused by inflammation of the lining of the nose (rhinitis)

• Cough

• Dry mouth, vomiting (being sick)

• Hair loss, increased sweating, itchy skin, red patches on skin, skin discolouration

• Disorder in passing urine, increased need to urinate at night, increased number of times of passing urine

• Inability to obtain an erection, discomfort or enlargement of the breasts in men

• Pain, feeling unwell

• Joint or muscle pain, back pain

• Weight increase or decrease

**Rare side effects: may affect up to 1 in 1 000 people**

• Confusion

**Very rare side effects: may affect up to 1 in 10 000 people**

• Decreased numbers of white blood cells, decrease in blood platelets which result in unusual bruising or easy bleeding

• Excess sugar in blood (hyperglycaemia)

• A disorder of the nerves which can cause muscular weakness, tingling or numbness

• Swelling of the gums

• Abdominal bloating (gastritis)

• Abnormal liver function, inflammation of the liver (hepatitis), yellowing of the skin (jaundice), liver enzymes increase which may have an effect on some medical tests

• Increased muscle tension

• Inflammation of blood vessels, often with skin rash

• Sensitivity to light

• Disorders combining rigidity, tremor, and/or movement disorders

**Reporting of side effects**

The declaration of suspected side effects after authorization of the medicinal product is important. It allows continuous monitoring of the benefit / risk ratio of drugs.

**5. How to store Amlodipine AMEP® Tablets?**

• No special storage conditions.

• Keep out of the reach and sight of children

• Do not use this medicine after the expiry date which is stated on the pack

• Medicines should not be disposed of via wastewater or household waste. Ask your pharmacist how to dispose of medicines no longer required. These measures will help protect the environment.

**6. Further Informations:**

What AMEP® Tablets contains ?

For one tablet

**Active substance:**

Amlodipine besylate

Equivalent to amlodipine

AMEP 10  
mg

6.95

13.90  
10.00

5.00

Excipients: Microcrystalline cellulose, calcium hydrogen phosphate dihydrate, silica colloidal anhydrous, carboxymethyl starch (Type A), magnesium stearate.

List of Excipients with known effect: Not applicable.

Name and address of Marketing Authorisation Holder in Morocco



41, rue Mohamed Diouri 20110 Casablanca

This leaflet was last revised in : January 2019

Conditions of regulation and delivery

Table A (list 1).

The safety of amlodipine in human pregnancy has not been established. If you think you might be pregnant, or are planning to get pregnant, you must tell your doctor before you take AMEP®.

**Breast-feeding:**

It has been shown that amlodipine is passing into breast milk in small amounts. If you are breast-feeding or about to start breast-feeding you must tell your doctor before taking AMEP®.

If you are pregnant or breast-feeding, think you may be pregnant or are planning to have a baby, ask your doctor or pharmacist for advice before taking this medicine. The possible effects on the ability to drive and use machines

AMEP® may affect your ability to drive or use machines. If the tablets make you feel sick, dizzy or tired, or give you a headache, do not drive or use machines and contact your doctor immediately.

**Notices relating to excipients with known effect**

Not applicable.

**3. How to take AMEP® tablets?**

Always take this medicine exactly as your doctor or pharmacist has told you. Check with your doctor or pharmacist if you are not sure.

The recommended initial dose of AMEP® is 5 mg once daily. The dose can be increased to 10 mg of AMEP® once daily.

This medicine can be used before or after the consumption of food and drinks. You should take this medicine at the same time each day with a drink of water. Do not take AMEP® with grapefruit juice.

**Use by children and adolescents**

For children and adolescents (6-17 years old), the recommended usual starting dose is 2.5mg a day. The maximum recommended dose is 5 mg a day. The tablets of AMEP® 2.5 mg are not currently available.

It is important to keep taking the tablets. Do not wait until your tablets are finished before seeing your doctor.

**If you take more AMEP® tablets than you should:**

Taking too many tablets may cause your blood pressure to become low or even dangerously low. You may feel dizzy, lightheaded, faint or weak. If blood pressure drop is severe enough shock can occur. Your skin could feel cool and clammy and you could lose consciousness. Seek immediate medical attention if you take too many AMEP®.

**If you forget to take AMEP® tablets:**

Do not worry. If you forget to take a tablet, leave out that dose completely. Take your next dose at the right time. Do not take a double dose to make up for a forgotten dose.

**If you stop taking AMEP® tablets:**

Your doctor will advise you how long to take this medicine. Your condition may return if you stop using this medicine before you are advised.

If you have any further questions on the use of this medicine, ask your doctor or pharmacist.

**4. What are the possible side effects?**

Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets them.

Visit your doctor immediately if you experience any of the following side effects after taking this medicine.

• Sudden wheeziness, chest pain, shortness of breath or difficulty in breathing

• Swelling of eyelids, face or lips

• Swelling of the tongue and throat which causes great difficulty breathing

• Severe skin reactions including intense skin rash, hives, reddening of the skin over your whole body, severe itching, blistering, peeling and swelling of the skin, inflammation of mucous membranes (Stevens-Johnson Syndrome, toxic epidermal necrolysis) or other allergic reactions.

• Heart attack, abnormal heart beat.

• Inflamed pancreas which may cause severe abdominal and back pain accompanied with feeling very unwell.

The following very common side effect has been reported. If this causes you problems or if it lasts for more than one week, you should contact your doctor.

**Very common side effects: may affect more than 1 in 10 people**

The following common side effects have been reported. If any of these cause you problems or if they last for more than one week, you should contact your doctor.

**Common side effects: may affect up to 1 in 10 people**

• Headache, dizziness, sleepiness (especially at the beginning of treatment)

• Palpitations (awareness of your heart beat), flushing

• Abdominal pain, nausea

• Altered bowel habits, diarrhea, constipation, indigestion

• Tiredness, weakness

• Visual disturbances, double vision

• Muscle cramps

• Ankle swelling

Other side effects that have been reported include the following list. If any of these get serious, or if you notice any side effects not listed in this leaflet, please tell your doctor or pharmacist.

**Uncommon side effects: may affect up to 1 in 100 people**

• Mood changes, anxiety, depression, sleeplessness

• Trembling, taste abnormalities, fainting

• Numbness or tingling sensation in your limbs, loss of pain sensation

• Ringing in the ears

• Low blood pressure

• Sneezing and running nose caused by inflammation of the lining of the nose (rhinitis)

• Cough

• Dry mouth, vomiting (being sick)

• Hair loss, increased sweating, itchy skin, red patches on skin, skin discolouration

• Disorder in passing urine, increased need to urinate at night, increased number of times of passing urine

• Inability to obtain an erection, discomfort or enlargement of the breasts in men

• Pain, feeling unwell

• Joint or muscle pain, back pain

• Weight increase or decrease

**Rare side effects: may affect up to 1 in 1 000 people**

• Confusion

**Very rare side effects: may affect up to 1 in 10 000 people**

• Decreased numbers of white blood cells, decrease in blood platelets which result in unusual bruising or easy bleeding

• Excess sugar in blood (hyperglycaemia)

• A disorder of the nerves which can cause muscular weakness, tingling or numbness

• Swelling of the gums

• Abdominal bloating (gastritis)

• Abnormal liver function, inflammation of the liver (hepatitis), yellowing of the skin (jaundice), liver enzymes increase which may have an effect on some medical tests

• Increased muscle tension

• Inflammation of blood vessels, often with skin rash

• Sensitivity to light

• Disorders combining rigidity, tremor, and/or movement disorders

**Reporting of side effects**

The declaration of suspected side effects after authorization of the medicinal product is important. It allows continuous monitoring of the benefit / risk ratio of drugs.

**5. How to store Amlodipine AMEP® Tablets?**

• No special storage conditions.

• Keep out of the reach and sight of children

• Do not use this medicine after the expiry date which is stated on the pack

• Medicines should not be disposed of via wastewater or household waste. Ask your pharmacist how to dispose of medicines no longer required. These measures will help protect the environment.

**6. Further Informations:**

What AMEP® Tablets contains ?

For one tablet

**Active substance:**

Amlodipine besylate

Equivalent to amlodipine

AMEP 10  
mg

6.95

13.90  
10.00

5.00

Excipients: Microcrystalline cellulose, calcium hydrogen phosphate dihydrate, silica colloidal anhydrous, carboxymethyl starch (Type A), magnesium stearate.

List of Excipients with known effect: Not applicable.

Name and address of Marketing Authorisation Holder in Morocco



41, rue Mohamed Diouri 20110 Casablanca

This leaflet was last revised in : January 2019

Conditions of regulation and delivery

Table A (list 1).

## Cortancyl® 5 mg

### Prédnisone

## Comprimé sécable

sanofi aventis

## IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

## Composition

**Prédnisone** 5 mg

Excipients : amidon de maïs, lactose, stéarate de magnésium, talc pour un comprimé sécable.

## Forme pharmaceutique

Comprimé sécable (boîte de 30).

## Classe pharmaco-thérapeutique

#### **GLUCOCORTICOIDE - USAGE SYSTEMIQUE**

(H : Hormones non sexuelles)

## DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament est un corticoïde.

Il est indiqué dans certaines maladies, où il est utilisé pour son effet anti-inflammatoire.

## ATTENTION !

#### Dans quel cas ne pas utiliser ce médicament

Ce médicament NÉ DOIT PAS ETRE UTILISÉ dans les cas suivants :

- la plupart des infections,
  - certaines maladies virales en évolution (hépatites, varicelle, zona),
  - certains troubles mentaux non traités
  - vaccination par des vaccins vivants
  - antécédent d'allergie à l'un des composants

24/83

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE CONSULTER VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

### Mises en garde spéciales

Ce médicament doit être pris sous s

#### AVANT LE TRAITEMENT :

Prévenir votre médecin en cas de vac.

#### **Prévenir l'auto-titif de maladies du côlon, d'interventio**

l'intestin, de diabète, d'hypertension artérielle, d'infection (mouvement)



2480

## Cortancyl® 5 mg

## Prédnisone

## Comprimé sécable

sanofi aventis

## IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT

## Composition

Prépnisone 5 mg

Excipients : amidon de maïs, lactose, stéarate de magnésium, talc pour un comprimé sécable.

### Forme pharmaceutique

Comprimé sécable (boîte de 30).

## Classe pharmaco-thérapeutique

## **CLASSE PHARMACEUTIQUE GLUCOCORTICOIDE - USAGE SYSTEMIQUE (H : Hormones non sexuelles)**

## DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament est un corticoïde.

Il est indiqué dans certaines maladies, où il est utilisé pour son effet anti-inflammatoire.

## ATTENTION !

### Dans quel cas ne pas utiliser ce médicament

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- la plupart des infections,
  - certaines maladies virales en évolution (hépatites virales, herpes, varicelle, zona),
  - certains troubles mentaux non traités
  - vaccination par des vaccins vivants
  - antécédent d'allergie à l'un des composants

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE CONSULTER VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

### Mises en garde spéciales

Ce médicament doit être pris sous s

#### AVANT LE TRAITEMENT :

Prévenir votre médecin en cas de vac.

#### **Prévenir votre risque de maladie colonique**

l'intestin, de diabète, d'hypertension artérielle, à infection...ent



2480



Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Elle contient des informations importantes sur votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

#### DÉNOMINATION

CALCIFIX® D3 500 mg/400 UI

#### COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Carbonate de calcium correspondant à calcium élément ..... 500 mg

Cholécalciférol enrobé à 100 000 UI/g\* correspondant à cholécalciférol (vitamine D3) ..... 400 UI

Excipients ..... q.s.p. un comprimé

\* mélange de cholécalciférol, d'alphatocophérol, de graisses alimentaires, de gélatine, de saccharose et d'amidon de maïs.

#### FORME PHARMACEUTIQUE ET PRÉSENTATION

Boîte de 30 comprimés à croquer ou à sucer.

#### CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE

APPORT VITAMINO D-CALCIQUE.

#### DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Ce médicament est indiqué :

- chez le sujet âgé, en cas de carences en
- en association aux traitements de l'

#### ATTENTION !

##### a) DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ

- antécédents d'allergie à la vitamine D ou

- immobilisation prolongée,

- quantité de calcium dans le sang anormale

- élimination exagérée de calcium par l'urine

- calculs rénaux (lithiasie calcique),

- phénylcétourie (maladie héréditaire due à

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE

4280





Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Elle contient des informations importantes sur votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

#### DÉNOMINATION

CALCIFIX® D3 500 mg/400 UI

#### COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Carbonate de calcium correspondant à calcium élément ..... 500 mg

Cholécalciférol enrobé à 100 000 UI/g\* correspondant à cholécalciférol (vitamine D3) ..... 400 UI

Excipients ..... q.s.p. un comprimé

\* mélange de cholécalciférol, d'alphatocophérol, de graisses alimentaires, de gélatine, de saccharose et d'amidon de maïs.

#### FORME PHARMACEUTIQUE ET PRÉSENTATION

Boîte de 30 comprimés à croquer ou à sucer.

#### CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE

APPORT VITAMINO D-CALCIQUE.

#### DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Ce médicament est indiqué :

- chez le sujet âgé, en cas de carences en
- en association aux traitements de l'

#### ATTENTION !

##### a) DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ

- antécédents d'allergie à la vitamine D ou

- immobilisation prolongée,

- quantité de calcium dans le sang anormale

- élimination exagérée de calcium par l'urine

- calculs rénaux (lithiasie calcique),

- phénylettonurie (maladie héréditaire due à

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE

4280



# مركز أمراض الكلى والكلية الاصطناعية بلفدير

## CENTRE D'HÉMODIALYSE ET DE NEPHROLOGIE - BELVÉDÈRE

Dr. M. EL MEHDI

Docteur d'Etat Français de Médecine  
**Spécialiste des Maladies des Reins**  
 (Major de promotion du CES Français)  
 Ex Prof Assistant au CHU de Marseille.  
 Ex Attaché d'enseignement à la Faculté  
 de Médecine de Marseille.  
 Ex Chef de Service de Néphrologie Hémodialyse  
 de la Polyclinique de la CNSS de Casablanca.  
 Ex 1<sup>er</sup> Vice Président de la Société Marocaine de Néphrologie (SMN).  
 Ex Secrétaire Général de la Société Marocaine des Maladies Rénales.



الدكتور م.المعدي

الدكتورة الفرنسية للطب  
 اختصاصي في أمراض الكلى  
 (متفوق الدقة في اختصاص أمراض الكلى في فرنسا)  
 أستاذ مساعد بمستشفيات مارسيليا سابقا.  
 ملحق بالتعليم سابقا بكلية الطب مارسيليا.  
 رئيس مصلحة أمراض الكلى و الكلية الاصطناعية.  
 سابقا بمصحة الضمان الاجتماعي بالدار البيضاء.

Casablanca, le .....

22/11/29



*Dr. El Mehdi M.  
 Casablanca / F.N.S.P  
 Professeur / Professeur  
 du 2<sup>nd</sup> year SN  
 de l'Institut d'Anatomie  
 et de Pathologie*

*Dr. EL MEHDI M.  
 Spécialiste des Maladies des Reins  
 Centre d'Hémodialyse  
 126, Bd Oujda Belvédère - Casablanca  
 Tél: 05 23 31 20 31  
 \* Laboratoire Centre  
 Dr. EL HAJAJI  
 Mohamed  
 Tél: 05 23 31 20 31*

*Docteur EL MEHDI M.  
 Spécialiste des Maladies des Reins  
 Centre d'Hémodialyse  
 126, Bd Oujda Belvédère - Casablanca  
 T.N.P: 091058297*

*Docteur EL MEHDI M.  
 Spécialiste des Maladies des Reins  
 Centre d'Hémodialyse  
 126, Bd Oujda Belvédère - Casablanca  
 T.N.P: 091058297*

# LABORATOIRE CENTRAL D'ANALYSES MEDICALES

Dr. EL HAJAJI MOHAMED  
Abderahmane serghni- Mohammedia.

ICE: 001855144000069

INPE: 093002509

Pat: 39574999

IF: 20719572

## FACTURE N° : 220300681

MOHAMMEDIA le 18-03-2022

Mr BOUDCHAR M HAMED  
2203180035

### Récapitulatif des analyses

CN	Analyse	Val	Clefs
9105	Prélèvement sanguin	E25	E
0111	Créatinine	B30	B
0216	Numération formule	B80	B
0439	Vitamine D	B450	B
	Rapport protéinurie sur créatinurie	B100	B
	MDRD	-	HN

Total des B : 660

TOTAL DOSSIER : 800.00 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de : huit cents dirham s.





LABORATOIRE  
CENTRAL

# الخبر المركزي للتحاليل الطبية

## LABORATOIRE CENTRAL ANALYSES MEDICALES

الحمدية - (في إتجاه باب القصبة)

Microbiologie - Hématologie - Toxicologie - Biochimie - Hormonologie - Immunologie - Fécondation in vitro

Dr. Mohamed EL HAJAJI

الدكتور محمد الحاجي

Date du prélèvement : 18-03-2022 à 08:58

Code patient : 1811070066

Né(e) le : 17-07-1955 (66 ans)

Edition du : 18-03-2022

Mr BOUDCHAR M HAMED

Référence : 2203180035

Prescripteur : Dr EL MEHDI.M

### HEMATOLOGIE

#### NUMERATION FORMULE SANGUIN

(Cytométrie en flux Sysmex XT-1800i)

21-01-2022

#### GLOBULES ROUGES

Hémoglobine

Hématocrite

VGM

TCMH

CCMH

#### GLOBULES BLANCS

#### FORMULE LEUCOCYTAIRE

Poly. Neutrophiles

Soit:

Poly. Eosinophiles

Soit:

Poly. Basophiles

Soit:

Lymphocytes

Soit:

Monocytes

Soit:

Total

	4.73	M/mm3	(4.20-5.00)	4.89
Hémoglobine	14.90	g/dl	(12.00-16.00)	16.10
Hématocrite	46.40	%	(35.00-51.00)	45.20
VGM	<u>98</u>	$\mu$ 3	(83-93)	92
TCMH	32	pg	(26-35)	33
CCMH	32	g/100ml	(31-37)	36
<b>GLOBULES BLANCS</b>	<b>13 040</b>	/mm3	(4 000-10 000)	13 930
<b>FORMULE LEUCOCYTAIRE</b>				
Poly. Neutrophiles	50.00	%		46.90
Soit:	6 520	/mm3	(2 000-7 500)	6 533
Poly. Eosinophiles	3.60	%		3.20
Soit:	<u>469</u>	/mm3	(100-400)	446
Poly. Basophiles	0.30	%		0.50
Soit:	39	/mm3	(0-150)	70
Lymphocytes	37.30	%		39.20
Soit:	<u>4 864</u>	/mm3	(1 000-4 000)	5 461
Monocytes	8.80	%		10.20
Soit:	<u>1 148</u>	/mm3	(100-1 000)	1 421
Total	100	%		100


#### NUMERATION DES PLAQUETTES

#### PLAQUETTES

#### FROTTIS SANGUIN

287 000 /mm3 (150 000-400 000) 184 000

Leucocytose,lymphocytose



Dr. Mohamed EL HAJAJI

[www.labocentral.ma](http://www.labocentral.ma)

الطابق السفلي عمارة الحر ، شارع عبد الرحيم السرغيني (في إتجاه القصبة) - المحمدية

RDC : 1 Immeuble EL HORE , Blv Abderahmane Serghini - Mohammedia - Maroc

Tél. : 05 23 31 20 31 / Fax : 05 23 31 01 46 - GSM : 06 61 17 89 24 - E-mail: lc2amohammedia@gmail.com

Pour le Prélèvement à Domicile Veuillez Contacter : 06 73 74 73 88



LABORATOIRE  
CENTRAL

# الختبر المركزي للتحاليل الطبية

## LABORATOIRE CENTRAL ANALYSES MEDICALES



الحمدية - (في إتجاه باب القصبة)

Microbiologie - Hématologie - Toxicologie - Biochimie - Hormonologie - Immunologie - Fécondation in vitro

Dr. Mohamed EL HAJAJI

الدكتور محمد الحاجي

Date du prélèvement : 18-03-2022 à 08:58

Code patient : 1811070066

Né(e) le : 17-07-1955 (66 ans)

Edition du : 18-03-2022

Mr BOUDCHAR M HAMED

Référence : 2203180035

Prescripteur : Dr EL MEHDI.M

### BIOCHIMIE SANGUINE

#### Créatinine

(Test de coloration cinétique)

10.587 mg/L

(8.100-14.400)

93.2 µmol/L

(71.3-126.7)

#### Clairance calculée:

(par méthode de filtration glomérulaire MDRD)

75 ml/mn/1.73<sup>2</sup>

#### Interprétation (Selon l'ANASE):

- >ou=60 : Absence d'atteinte rénale si aucun marqueur anormal
- >ou=60 : Maladie rénale chronique si un ou plusieurs marqueurs (Stade 1)
- 30-59 : Insuffisance rénale modérée (Stade 2)
- 15-29 : Insuffisance rénale sévère (Stade 3)
- <15 : Insuffisance rénale terminale (Stade 4)

### BIOCHIMIE URINAIRE

#### Rapport protéinurie / créatinurie sur échantillon urinaire

##### Créatinurie:

992.40 mg/l


##### Protéinurie :

175.00 mg/l

##### Rapport protéinurie sur créatinurie:

0.18 g/g

(0.00-0.15)



[www.labocentral.ma](http://www.labocentral.ma)

الطبقة السفلية عمارة الدرر ، شارع عبد الرحمن السرغيني (في اتجاه القصبة) - المحمدية

RDC : 1 Immeuble EL HORE , Blv Abderahmane Serghini - Mohammedia - Maroc

Tél. : 05 23 31 20 31 / Fax : 05 23 31 01 46 - GSM : 06 61 17 89 24 - E-mail: lc2amohammedia@gmail.com

Pour le Prélèvement à Domicile Veuillez Contacter : 06 73 74 73 88



LABORATOIRE  
CENTRAL

# الخبر المركزي للتحاليل الطبية

## LABORATOIRE CENTRAL ANALYSES MEDICALES



الحمدية - (في إتجاه باب القصبة)

Microbiologie - Hématologie - Toxicologie - Biochimie - Hormonologie - Immunologie - Fécondation in vitro

Dr. Mohamed EL HAJAJI

الدكتور محمد الحاجي

Date du prélèvement : 18-03-2022 à 08:58

Code patient : 1811070066

Né(e) le : 17-07-1955 (66 ans)

Édition du : 18-03-2022

Mr BOUDCHAR M HAMED

Référence : 2203180035

Prescripteur : Dr EL MEHDI.M

### VITAMINES

#### VITAMINE D (25-OHD)

Technique ELFA Mini Vidas

Titre.....: 39.70 ng/ml


#### INTERPRETATION

Carence	: <20 ng/ml
Insuffisant	: 20 - 29 ng/ml
suffisant	: 30 -100 ng/ml
Toxicité	: >100 ng/ml

*Résultats confirmés (RC)*

*En vous remerciant pour votre confiance*

[www.labocentral.ma](http://www.labocentral.ma)



Dr. Mohamed EL HAJAJI

الطابق السفلي عمارة الدرر ، شارع عبد الرحمن السرغيني (في اتجاه القصبة) - المحمدية

RDC : 1 Immeuble EL HORE , Blv Abderahmane Serghini - Mohammedia - Maroc

Tél. : 05 23 31 20 31 / Fax : 05 23 31 01 46 - GSM : 06 61 17 89 24 - E-mail: lc2amohammedia@gmail.com

Pour le Prélèvement à Domicile Veuillez Contacter : 06 73 74 73 88