

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.



MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

N° W19-528917

*pa
couver*

☒ **Maladie** ☐ **Dentaire** ☐ **Optique** ☐ **Autres**

Cadre réservé à l'adhérent (e) : 5113 Société : RAM

Matricule : 5113

☐ Actif ☒ Pensionné(e) ☐ Autre :

Nom & Prénom : AMMARI FOUAD

Date de naissance : 07.11.1958

Adresse : BRANES 1 RIAD RUE CHAHM MOHAMED
BEN CAIRIB n° 50 TANGER

Tél. : 06 66049062 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin : 25.12.2022

Cachet du médecin : DR HAFIDI MADINI

Date de consultation : 25.12.2022

Nom et prénom du malade : Fouad Ammari Age : 64

Lien de parenté : ☐ Lui-même ☒ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : Dialyse type II

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : TANGER Le : 25/12/2022

Signature de l'adhérent(e) : Fouad Ammari

VOLET ADHERENT

Déclaration de maladie N° W19-528917

Remplissez ce volet, découpez le et conservez le.
Il sera nécessaire de le présenter pour toute réclamation ultérieure.

Coupon à conserver par l'adhérent(e).

Matricule : 5113
Nom de l'adhérent(e) : AMMARI
Total des frais engagés :
Date de dépôt :

Adresses Mails utiles

- O Réclamation : contact@mupras.com
- O Prise en charge : pec@mupras.com
- O Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge
Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
25-02-22	9	1	250	INPE: 161073987

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Pharmacie EL QUADAFINE Hay Banes I - TANGER Tél: 05 39 31 18 27 N° 162102628 Quartier Boughaz El 70A N° 1 Bis Wahda Melania Tél: 05 39 35 01 38 ICE: 000000000	25-02-22	PL: 112.00
	25/02/22	€ 202.90

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

VOLET ADHERENT

* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP :																
				COEFFICIENT DES TRAVAUX																
				MONTANTS DES SOINS																
				DEBUT D'EXECUTION																
				FIN D'EXECUTION																
O.D.F. PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU CCEFFICIENT MASTICATOIRE																			
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">H</td> </tr> <tr> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">D</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> <tr> <td colspan="2">B</td> </tr> <tr> <td colspan="2">G</td> </tr> </table>			H		25533412	21433552	00000000	00000000	D		00000000	00000000	35533411	11433553	B		G		COEFFICIENT DES TRAVAUX
	H																			
	25533412	21433552																		
	00000000	00000000																		
	D																			
	00000000	00000000																		
	35533411	11433553																		
	B																			
	G																			
	[Création, remont, adjonction]			MONTANTS DES SOINS																
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			DATE DU DEVIS																	
			DATE DE L'EXECUTION																	

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr. ALI HARIRI MADINI

Médecine générale

33, Av. Mly Ali CHARIF (face cinéma TARIK)

Tel.: 05 39 95 40 54

Tanger

الدكتور علي الحريري المدني

الطب العام

33, شارع مولاي علي الشريف (أمام سينما طارق) بني مكادة

الهاتف: 05 39 95 40 54

طنجة

25.02.2022
Tanger, le : طنجة, في

Sarofi-aventis Maroc
Route de Rabat - R.P.1
Ain sebaa Casablanca
Aptidra 100U/ml inj 01 sty
P.P.V. : 98.40 DH
18001 081621

sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat - R.P.1
Ain sebaa 20250 - Casablanca
LANTUS SOLOSTAR 100U/ML SOL INJ B1
P.P.V. : 152DH50
6 118001 081608

Pharmacie MOUADAFINE
Quartier Boughaz Rue 784 N° 1 Bis
Meknes Marrakech - Tanger
Tel.: 05 36 85 01 38
ICE: 00508660100095

Pharmacie TAJ EDDINE
Rue Echarid Denlancien n°568
Hay Branes I - TANGER
T405 39 31 18 27

Dr. ALI HARIRI MADINI
الهاتف: 05 39 95 40 54
33, شارع مولاي علي الشريف (أمام سينما طارق) بني مكادة

[illegible]

Glucophage contient de la metformine. C'est un médicament appartenant à la classe de médicaments dits hypoglycémiants (qui abaissent le taux de glucose dans le sang). L'insuline est un hormone produite par le pancréas et le glucose (sucre) qu'il transporte dans le sang. Votre corps utilise le glucose pour l'énergie.

Quand vous prenez du Glucophage, votre pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline ou votre corps n'est pas capable d'utiliser correctement l'insuline qu'il produit. Ceci aboutit à un taux de glucose élevé dans votre sang. Glucophage aide à faire baisser votre taux de glucose sans jusqu'à un niveau assez normal que possible.

Si vous avez une maladie ou des problèmes, la prise de Glucophage à long terme permet également d'éviter les risques de complications associées au diabète. Glucophage est associé à une stabilité pondérale ou une modestie perte de poids.

Glucophage est utilisé pour traiter le diabète de type 2 (aussi appelé "diabète non insulino-dépendant") lorsque le régime alimentaire et l'exercice physique seuls n'ont pas suffi à contrôler le taux de glucose sanguin. Il est particulièrement utilisé chez les patients en surpoids. Les patients diabétiques peuvent prendre Glucophage seul ou avec d'autres médicaments pour contrôler le taux de glucose.

Les femmes de 10 ans et plus et les adolescents pourront prendre Glucophage seul ou avec d'autres médicaments.

Glucophage : Précautions :

5. Contient de l'émulsiifiant et autres informations.

4. **Glucophage** : composition, contre-indications, code ATC : A10BA02

3. **Glucophage** : contre-indications, contre-indications

2. **Glucophage** : contre-indications, contre-indications

1. **Glucophage** : contre-indications, contre-indications

[illegible]

un médecin au hôpital le plus
actuel, car cette affection peut
figurer
rarement

238

Si vous devez recevoir une injection d'un produit de contraste contenant l'iode, par exemple, pour une radiographie ou un scanner, vous devrez arrêter de prendre Glucophage avant ou au moment de l'injection. Votre médecin décidera du moment où vous devrez arrêter et reprendre la prise de

- Des médicaments utilisés pour traiter la douleur et l'inflammation (AINS ou inhibiteurs de la COX-2).
- Les médicaments qui augmentent la production d'urine (diurétiques).

- Corticostéroïdes (utilisés pour traiter diverses affections, notamment des inflammations sévères de la peau ou l'asthme);
- Les médicaments qui peuvent modifier la quantité de Glucocorticoïde dans le sang, en particulier si vous avez une fonction rénale réduite (comme le verapamil, la nifédipine, la cimétidine, le

Utilisation en cas de grossesse et d'allaitement : augmenter les apports en vitamines et en minéraux pendant la grossesse et l'allaitement, car ces nutriments sont particulièrement importants pour le développement du fœtus et du nouveau-né.

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'information à votre

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ce médicament ?

1. QU'EST-CE QUE GLUCOPHAGE, comprimé pillicel
Classe pharmacothérapeutique - code ATC : A10BA02
Indications thérapeutiques :
 Glucophage contient de la metformine. C'est un médicament

Lorsque vous avez du diabète, votre pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline ou votre corps n'est pas capable d'utiliser correctement l'insuline qu'il produit. Ceci aboutit à un taux de glucose élevé dans votre sang. GlucoPhage aide à faire baisser votre taux de glucose sanguin jusqu'à un

Les patients adultes pourront prendre du GlucoPhages seul ou avec d'autres médicaments contre le diabète. Il est particulièrement utile chez les patients en suppositoires.

Contre-indications :
Ne prenez jamais GLUCOPHAGE, comprimé pellicule :
• Si vous êtes allergique (hypersensible) à la metformine ou à l'un des autres composants contenus

glycosée dans le sang), des nausées, des vomissements, une perte de poids rapide, une adosose lactique (voir « Risque d'adosose lactique » et « D-éssous ») ou une adocitoïse, les substances appelées « corps cétoniques » s'accroissent dans le sang ce qui peut conduire à un coma diabétique. Les symptômes comprennent des douleurs à l'estomac, une

- Si vous avez une infection grave, par exemple une infection des poumons ou des bronches, ou une infection des reins. Des infections sévères peuvent entraîner des problèmes de reins qui peuvent vous mettre en danger d'accider à chaque fois que vous prenez un traitement contre l'asthme par inhalation.
- Si vous prenez un traitement contre l'asthme par inhalation, il est important de continuer à prendre votre médicament.

Si l'un des cas ci-dessus s'applique à vous, parlez-en à votre médecin avant de commencer à prendre ce médicament.

Veillez à demander conseil à votre médecin si :

- Vous devez passer un examen radiographique ou un scanner indolore pour obtenir l'injection d'un produit de contraste à base d'iode dans votre circulation sanguine
- Vous devez subir une intervention chirurgicale majeure

Vous devez arrêter de prendre Glucophage un certain temps avant et après de tels examens ou

28.

un médecin ou l'hôpital le plus
proche, car cette affection peut
entraîner de graves complications.
Pendant ce temps, vous devez continuer à vous hydrater et à vous reposer.
Si vous avez des symptômes de déshydratation (soif intense, urines
concentrées, fatigue, maux de tête), consultez un médecin.
L'absence de symptômes ne signifie pas que l'infection est guérie.
Le diagnostic est basé sur l'analyse de l'urine et du sang.
Le traitement est basé sur l'antibiotique approprié.
Le pronostic est généralement bon, mais il est important de suivre les
recommandations du médecin.

Les médicaments et GLUCOPHAGE, compris pédiatrie :
Si vous devez recevoir une injection d'un produit de contraste contenant du Iode, par exemple, pour une radiographie ou un scanner, vous devez arrêter de prendre Glucophage avant ou au moment de l'examen. Votre médecin décidera du moment où vous devez arrêter et reprendre la prise de votre médicament.
Après l'examen, vous devrez peut-être arrêter de prendre Glucophage pendant un certain temps.
Informez votre médecin si vous prenez, avez récemment pris ou pouvez prendre tout autre médicament. Vous devrez peut-être passer plus fréquemment des tests de la glycémie ou de la fonction rénale ou votre médecin devra peut-être ajuster la posologie de Glucophage. Il est particulièrement important de signaler les médicaments suivants :
Les médicaments qui augmentent la production d'urine (diurétiques).
Des médicaments utilisés pour traiter la douleur et l'inflammation (AINS ou inhibiteurs de la COX-2).
Les médicaments qui agissent sur le système digestif et le côlon.
Certains médicaments utilisés pour traiter l'hypertension artérielle (inhibiteurs de l'ECA et analogues des récepteurs de l'angiotensine II).
Ajustez les récepteurs bêta-2-adrénérgiques comme le salbutamol ou la terbutaline (utilisés pour traiter l'asthme).
Ajustez les récepteurs bêta-2-adrénérgiques comme le salbutamol ou la terbutaline (utilisés

[illegible]

Ce médicament n'est pas recommandé si vous allaitez votre enfant ou si vous avez l'intention de le faire.

[illegible][illegible][illegible]

Vous devez subir une intervention chirurgicale majeure
Vous devez arrêter de prendre Glucophage un certain temps avant et après de tels examens ou