

ECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR VER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

ons générales :

cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie. validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

en cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

phacie :

les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

que :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

ducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

taire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

ladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com
Prise en charge : pec@mupras.com
Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données caractére personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél.: 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 7585 Société : 110147

Actif

Pensionné(e)

Autre

Nom & Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

Tél. : Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : / /

Nom et prénom du malade : Age :

Lien de parenté : **Lui-même**

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

Affection longue durée ou chronique : **ALD** **ALC** Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :

VOLET ADHERENT

Déclaration de maladie M22- N° 001300

Remplissez ce volet, découpez le et conservez le.

Il sera nécessaire de le présenter pour toute réclamation ultérieure.

Coupon à conserver par l'adhérent(e).

Matricule :

Nom de l'adhérent(e) :

Total des frais engagés :

Date de dépôt :

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Alal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Alal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° W19-578879

Par courrier

<input type="checkbox"/> Maladie	<input type="checkbox"/> Dentaire	<input type="checkbox"/> Optique	<input type="checkbox"/> Autres
Cadre réservé à l'adhérent (e)			
Matricule : 7585	Société : RAM		
<input type="checkbox"/> Actif	<input type="checkbox"/> Pensionné(e)	<input type="checkbox"/> Autre :	
Nom & Prénom : BOUKTIB DRISS			
Date de naissance : 30.06.1952			
Adresse : B-P 1001 Beldi Banka			
Principale			
Tél. : 06 10000603 Total des frais engagés : 1309,70 Dhs			

Cadre réservé au Médecin			
Cachet du médecin :			
18/03/22 AATAB Aïcha			
Date de consultation :			
Nom et prénom du malade :			
Lien de parenté : <input type="checkbox"/> Lui-même <input type="checkbox"/> Conjoint <input type="checkbox"/> Enfant			
Nature de la maladie : Affection Médicale Longue durée			
En cas d'accident préciser les causes et circonstances :			
Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.			


J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.
Fait à : Casablanca Le : 21/03/2022
Signature de l'adhérent(e) : SC

VOLET ADHERENT	
Déclaration de maladie	N° W19-578879
Remplissez ce volet, découpez le et conservez le. Il sera nécessaire de le présenter pour toute réclamation ultérieure.	
Coupon à conserver par l'adhérent(e).	
Matricule :	
Nom de l'adhérent(e) :	
Total des frais engagés :	
Date de dépôt :	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
18/02/22	Opér	gratuit		INP : 421466871
22/03/22	Opér	gratuit		DR. RAY SAIDIA HADIA

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fourisseur	Date	Montant de la Facture
	23.03.22	877,50

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

ANALYSES - RADIOGRAPHIES			
Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
laboratoire JAMAL Analyses Médicales Dr. KARISOUNI Jamal Av. des FAR Chalets Inezgane 1/Fax 05 28 33 12 12	21/12/22	0.370	432 DH
			INPE : 043001239

AUXILIAIRES MEDICAUX

VIOLET ADHERENT



* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la défnt traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP : <input type="text"/>														
				CŒFFICIENT DES TRAVAUX														
																		
O.D.F PROTHÉSES DENTAIRES	DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE																	
	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">H</td> <td style="text-align: center;">G</td> </tr> <tr> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">D</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">B</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">35533411 11433553</td> </tr> </table>				H	G	25533412	21433552	00000000	00000000	D		B		35533411 11433553			
	H	G																
	25533412	21433552																
	00000000	00000000																
	D																	
	B																	
	35533411 11433553																	
	CŒFFICIENT DES TRAVAUX																	
[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession																		
DATE DU DEVIS																		
DATE DE L'EXÉCUTION																		
VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS																		
VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXÉCUTION																		

ORDONNANCE

Le: 23/03/22

AATAAB AI Cha
160.00x3 

1°/ Co-anafrax

1/1000 

2°/ Lasiliz 1/1000

49.40 

3°/ Amcord 5 mg



Montant
222.03 mdt

75.20x3 on 2 cp le 6 in
4°/ Amcord 10 mg

40.00x3 1/4 le 6 in

5°/ Geprid 1 mg
877.75 1/4 le 6 in



LOT 21100
PER 12/14
PF 240 DH

GEPRID® 2 mg

Glimépiride
30 comprimés
PROMOPHARM S.A.



6 118000 241461

Propriétés :

Antidiabétique oral (sulfamique appartenant à la classe des sulfonylurées), utilisé dans le diabète sucré non-insulino-dépendant.

Indications thérapeutiques :

Diabète sucré non insulinodépendants (de type II) chez l'adulte, lorsque le régime alimentaire, l'exercice physique et la réduction pondérale seuls ne sont pas suffisants pour rétablir l'équilibre glycémique.

Contre-indications :

Diabète insulinodépendant, troubles rénaux ou hépatiques, hypersensibilité au glimépiride, à l'un des constituants ou aux autres sulfonylurées.

Ne pas utiliser ce médicament en cas de grossesse ou d'allaitement.

Effets indésirables :

Possibilité de troubles digestifs, ou d'une éruption cutanée. En cas de doute, signalez-le à votre médecin. Exceptionnellement, ce médicament peut provoquer une jaunisse.

En cas d'hypoglycémie, on observe les manifestations secondaires suivantes : sueurs froides, pouls rapide, faim, anxiété et difficultés respiratoires. En cas de doute, consommez des sucres rapides. En cas d'hypoglycémie grave contactez votre médecin traitant ou les urgences médicales.

Précautions d'emploi :

Les sujets âgés, les nourrissons et les enfants ne doivent prendre ce traitement que sous contrôle médical. L'utilisation prolongée de ce médicament potentialise le risque d'apparition de ses effets indésirables. Les conducteurs de véhicules doivent être particulièrement prudents (risque de malaise dû à l'hypoglycémie). Vous devez connaître les risques d'hypoglycémie et apprendre à en reconnaître les signes. Demandez conseil à votre médecin traitant.

La prise du médicament doit s'accompagner d'une surveillance régulière de la glycémie et de la glycosurie (taux de sucre dans le sang et les urines).

Certains médicaments, comme le miconazole ou la phénylbutazone, potentialisent le risque d'hypoglycémie, tandis que d'autre, comme les corticoïdes, ont l'effet inverse, et diminuent l'effet de ces antidiabétiques.

Les bêta-bloquants peuvent masquer les signes de l'hypoglycémie.

Si vous prenez un autre médicament, signalez-le toujours au médecin ou au pharmacien.

Eviter la consommation d'alcool (effet antabuse). L'alcool augmente l'effet hypoglycémiant des sulfamides.

Mode d'emploi et posologie :

La base d'un traitement efficace du diabète est un régime alimentaire adapté, une activité physique régulière ainsi que des contrôles sanguins et urinaires réguliers. Le non-respect du régime alimentaire ne peut être compensé par la prise de comprimés ou un traitement par l'insuline.

La posologie dépend des résultats de la glycémie et de la glycosurie.

Se conformer à la prescription médicale.

Formes et présentations :

GEPRID® 1 mg - boîte de 30, 60 et 90 comprimés

GEPRID® 2 mg - boîte de 30, 60 et 90 comprimés

GEPRID® 3 mg - boîte de 30, 60 et 90 comprimés

GEPRID® 4 mg - boîte de 30, 60 et 90 comprimés

Liste I (tableau A)

Conserver à température < 30 degrés et à l'abri de l'humidité.

PRID®

imépiride

GEPRID® 3 mg	GEPRID® 4 mg
3 mg	4 mg
(dont lactose et E172) q.s.p.	(dont lactose et E172) q.s.p.



LOT 21100
PER 12/14
PF 240 DH

GEPRID® 2 mg

Glimépiride
30 comprimés
PROMOPHARM S.A.



6 118000 241461

Propriétés :

Antidiabétique oral (sulfamique appartenant à la classe des sulfonylurées), utilisé dans le diabète sucré non-insulino-dépendant.

Indications thérapeutiques :

Diabète sucré non insulinodépendants (de type II) chez l'adulte, lorsque le régime alimentaire, l'exercice physique et la réduction pondérale seuls ne sont pas suffisants pour rétablir l'équilibre glycémique.

Contre-indications :

Diabète insulinodépendant, troubles rénaux ou hépatiques, hypersensibilité au glimépiride, à l'un des constituants ou aux autres sulfonylurées.

Ne pas utiliser ce médicament en cas de grossesse ou d'allaitement.

Effets indésirables :

Possibilité de troubles digestifs, ou d'une éruption cutanée. En cas de doute, signalez-le à votre médecin. Exceptionnellement, ce médicament peut provoquer une jaunisse.

En cas d'hypoglycémie, on observe les manifestations secondaires suivantes : sueurs froides, pouls rapide, faim, anxiété et difficultés respiratoires. En cas de doute, consommez des sucres rapides. En cas d'hypoglycémie grave contactez votre médecin traitant ou les urgences médicales.

Précautions d'emploi :

Les sujets âgés, les nourrissons et les enfants ne doivent prendre ce traitement que sous contrôle médical. L'utilisation prolongée de ce médicament potentialise le risque d'apparition de ses effets indésirables. Les conducteurs de véhicules doivent être particulièrement prudents (risque de malaise dû à l'hypoglycémie). Vous devez connaître les risques d'hypoglycémie et apprendre à en reconnaître les signes. Demandez conseil à votre médecin traitant.

La prise du médicament doit s'accompagner d'une surveillance régulière de la glycémie et de la glycosurie (taux de sucre dans le sang et les urines).

Certains médicaments, comme le miconazole ou la phénylbutazone, potentialisent le risque d'hypoglycémie, tandis que d'autre, comme les corticoïdes, ont l'effet inverse, et diminuent l'effet de ces antidiabétiques.

Les bêta-bloquants peuvent masquer les signes de l'hypoglycémie.

Si vous prenez un autre médicament, signalez-le toujours au médecin ou au pharmacien.

Eviter la consommation d'alcool (effet antabuse). L'alcool augmente l'effet hypoglycémiant des sulfamides.

Mode d'emploi et posologie :

La base d'un traitement efficace du diabète est un régime alimentaire adapté, une activité physique régulière ainsi que des contrôles sanguins et urinaires réguliers. Le non-respect du régime alimentaire ne peut être compensé par la prise de comprimés ou un traitement par l'insuline.

La posologie dépend des résultats de la glycémie et de la glycosurie.

Se conformer à la prescription médicale.

Formes et présentations :

GEPRID® 1 mg - boîte de 30, 60 et 90 comprimés

GEPRID® 2 mg - boîte de 30, 60 et 90 comprimés

GEPRID® 3 mg - boîte de 30, 60 et 90 comprimés

GEPRID® 4 mg - boîte de 30, 60 et 90 comprimés

Liste I (tableau A)

Conserver à température < 30 degrés et à l'abri de l'humidité.

PRID®

imépiride

GEPRID® 3 mg	GEPRID® 4 mg
3 mg	4 mg
(dont lactose et E172) q.s.p.	(dont lactose et E172) q.s.p.



LOT 21100
PER 12/14
PF 240 DH

GEPRID® 2 mg

Glimépiride
30 comprimés
PROMOPHARM S.A.



6 118000 241461

Propriétés :

Antidiabétique oral (sulfamique appartenant à la classe des sulfonylurées), utilisé dans le diabète sucré non-insulino-dépendant.

Indications thérapeutiques :

Diabète sucré non insulinodépendants (de type II) chez l'adulte, lorsque le régime alimentaire, l'exercice physique et la réduction pondérale seuls ne sont pas suffisants pour rétablir l'équilibre glycémique.

Contre-indications :

Diabète insulinodépendant, troubles rénaux ou hépatiques, hypersensibilité au glimépiride, à l'un des constituants ou aux autres sulfonylurées.

Ne pas utiliser ce médicament en cas de grossesse ou d'allaitement.

Effets indésirables :

Possibilité de troubles digestifs, ou d'une éruption cutanée. En cas de doute, signalez-le à votre médecin. Exceptionnellement, ce médicament peut provoquer une jaunisse.

En cas d'hypoglycémie, on observe les manifestations secondaires suivantes : sueurs froides, pouls rapide, faim, anxiété et difficultés respiratoires. En cas de doute, consommez des sucres rapides. En cas d'hypoglycémie grave contactez votre médecin traitant ou les urgences médicales.

Précautions d'emploi :

Les sujets âgés, les nourrissons et les enfants ne doivent prendre ce traitement que sous contrôle médical. L'utilisation prolongée de ce médicament potentialise le risque d'apparition de ses effets indésirables. Les conducteurs de véhicules doivent être particulièrement prudents (risque de malaise dû à l'hypoglycémie). Vous devez connaître les risques d'hypoglycémie et apprendre à en reconnaître les signes. Demandez conseil à votre médecin traitant.

La prise du médicament doit s'accompagner d'une surveillance régulière de la glycémie et de la glycosurie (taux de sucre dans le sang et les urines).

Certains médicaments, comme le miconazole ou la phénylbutazone, potentialisent le risque d'hypoglycémie, tandis que d'autre, comme les corticoïdes, ont l'effet inverse, et diminuent l'effet de ces antidiabétiques.

Les bêta-bloquants peuvent masquer les signes de l'hypoglycémie.

Si vous prenez un autre médicament, signalez-le toujours au médecin ou au pharmacien.

Eviter la consommation d'alcool (effet antabuse). L'alcool augmente l'effet hypoglycémiant des sulfamides.

Mode d'emploi et posologie :

La base d'un traitement efficace du diabète est un régime alimentaire adapté, une activité physique régulière ainsi que des contrôles sanguins et urinaires réguliers. Le non-respect du régime alimentaire ne peut être compensé par la prise de comprimés ou un traitement par l'insuline.

La posologie dépend des résultats de la glycémie et de la glycosurie.

Se conformer à la prescription médicale.

Formes et présentations :

GEPRID® 1 mg - boîte de 30, 60 et 90 comprimés

GEPRID® 2 mg - boîte de 30, 60 et 90 comprimés

GEPRID® 3 mg - boîte de 30, 60 et 90 comprimés

GEPRID® 4 mg - boîte de 30, 60 et 90 comprimés

Liste I (tableau A)

Conserver à température < 30 degrés et à l'abri de l'humidité.

PRID®

imépiride

GEPRID® 3 mg	GEPRID® 4 mg
3 mg	4 mg
(dont lactose et E172) q.s.p.	(dont lactose et E172) q.s.p.



Amcard® 5 mg et 10 mg

Amlodipine

Comprimés

L'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

Si la notice est détruite, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous avez des questions, demandez à votre pharmacien. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques.

Si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre pharmacien.

semaines de traitement et s'atténuent lors de sa poursuite.

Comme avec les autres dihydropyridines, un œdème des chevilles et/ou de la face peut apparaître. Son apparition est plus fréquente aux doses élevées.

On observe plus rarement : tachycardies, palpitations, syncope, alopecie, augmentation de la sudation, réaction allergique incluant prurit, éruption et angio-œdème, douleurs abdominales, dyspepsie, dysguepsie, perte de l'appétit, nausées, diarrhée, constipation, bouche sèche, crampes musculaires, myalgie, arthralgie, hépatite, ictere, dyspnée, pollakiurie, impuissance, gynécomastie, asthénie, sensations vertigineuses, troubles du sommeil, parasthésies, tremblements, troubles de la vue, troubles dépressifs, malaise, thrombopénie, vascularité.

Comme avec les autres antagonistes calciques, les événements suivants ont été rarement rapportés : douleurs angineuses, infarctus du myocarde, arythmie. Ils peuvent être liés à la pathologie préexistante au traitement et doivent faire discuter la poursuite du traitement.

INTERACTIONS MÉDAMENTEUSES :

Déconseillée (par mesure de prudence) :

- Dantrolène (perfusion) : l'association d'un antagoniste du calcium et de Dantrolène est potentiellement dangereuse. Cependant, quelques patients ont reçu l'association Nifédipine et Dantrolène sans inconvenients.

Nécessitant des précautions d'emploi :

- Alpha-1-bloquants (alfuzosine, prazosine) : majoration de l'effet hypotenseur.

- Baclofène : majoration de l'effet antihypertenseur.

- Rifampicine : diminution des concentrations plasmatiques de l'antagoniste du calcium par augmentation de son métabolisme hépatique.

- Itraconazole : risque majoré d'œdèmes par diminution du métabolisme hépatique de la dihydropyridine.

A prendre en compte :

- Béta-bloquants : hypotension, défaillance cardiaque chez les malades en insuffisance cardiaque latente ou non contrôlée.

- Antidépresseurs imipraminiques (tricycliques) : effet antihypertenseur et risque d'hypotension orthostatique majorés (effet additif).

- Corticoïdes, tétracosactide par voie générale : diminution de l'effet antihypertenseur (rétenzione hydrosodée des corticoïdes).

- Neuroleptiques : effet antihypertenseur et risque d'hypotension orthostatique majorés (effet additif).

Autres associations :

Digoxine : l'Amlodipine ne modifie pas les taux plasmatiques ou la clairance rénale de la digoxine chez le volontaire sain.

SURDOSSAGE :

Un surdosage massif pourrait provoquer une importante vasodilatation périphérique entraînant une hypotension systémique marquée et probablement prolongée. Toute hypotension consecutive à une intoxication aiguë nécessite une surveillance en unité de soins intensifs cardiologiques. Un vasoconstricteur peut être utilisé pour restaurer le tonus vasculaire et la pression artérielle. L'Amlodipine n'est pas dialysable.

STOCKAGE :

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation indiquée en clair sur l'emballage. Conserver à une température comprise entre 15 °C et 30 °C.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

PRÉSENTATIONS :

Amcard 5 mg : boîte de 7, 14 et 28 comprimés.

Amcard 10 mg : boîte de 7, 14 et 28 comprimés.

CONDITION DE DELIVRANCE :

Liste I (Tableau A), uniquement sur ordonnance médicale.

Dernière mise à jour : juin 2011

Laboratoires GENPHARMA

254-260, Z.I. El Jadida - Maroc

<p

Amcard® 5 mg et 10 mg

Amlodipine

Comprimés

L'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

Si la notice est détruite, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous avez des questions, demandez à votre pharmacien. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques.

Si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre pharmacien.

semaines de traitement et s'atténuent lors de sa poursuite.

Comme avec les autres dihydropyridines, un œdème des chevilles et/ou de la face peut apparaître. Son apparition est plus fréquente aux doses élevées.

On observe plus rarement : tachycardies, palpitations, syncope, alopecie, augmentation de la sudation, réaction allergique incluant prurit, éruption et angio-œdème, douleurs abdominales, dyspepsie, dysguepsie, perte de l'appétit, nausées, diarrhée, constipation, bouche sèche, crampes musculaires, myalgie, arthralgie, hépatite, ictere, dyspnée, pollakiurie, impuissance, gynécomastie, asthénie, sensations vertigineuses, troubles du sommeil, parasthésies, tremblements, troubles de la vue, troubles dépressifs, malaise, thrombopénie, vascularité.

Comme avec les autres antagonistes calciques, les événements suivants ont été rarement rapportés : douleurs angineuses, infarctus du myocarde, arythmie. Ils peuvent être liés à la pathologie préexistante au traitement et doivent faire discuter la poursuite du traitement.

INTERACTIONS MÉDAMENTEUSES :

Déconseillée (par mesure de prudence) :

- Dantrolène (perfusion) : l'association d'un antagoniste du calcium et de Dantrolène est potentiellement dangereuse. Cependant, quelques patients ont reçu l'association Nifédipine et Dantrolène sans inconvenients.

Nécessitant des précautions d'emploi :

- Alpha-1-bloquants (alfuzosine, prazosine) : majoration de l'effet hypotenseur.

- Baclofène : majoration de l'effet antihypertenseur.

- Rifampicine : diminution des concentrations plasmatiques de l'antagoniste du calcium par augmentation de son métabolisme hépatique.

- Itraconazole : risque majoré d'œdèmes par diminution du métabolisme hépatique de la dihydropyridine.

A prendre en compte :

- Béta-bloquants : hypotension, défaillance cardiaque chez les malades en insuffisance cardiaque latente ou non contrôlée.

- Antidépresseurs imipraminiques (tricycliques) : effet antihypertenseur et risque d'hypotension orthostatique majorés (effet additif).

- Corticoïdes, tétracosactide par voie générale : diminution de l'effet antihypertenseur (rétenzione hydrosodée des corticoïdes).

- Neuroleptiques : effet antihypertenseur et risque d'hypotension orthostatique majorés (effet additif).

Autres associations :

Digoxine : l'Amlodipine ne modifie pas les taux plasmatiques ou la clairance rénale de la digoxine chez le volontaire sain.

SURDOSSAGE :

Un surdosage massif pourrait provoquer une importante vasodilatation périphérique entraînant une hypotension systémique marquée et probablement prolongée. Toute hypotension consecutive à une intoxication aiguë nécessite une surveillance en unité de soins intensifs cardiologiques. Un vasoconstricteur peut être utilisé pour restaurer le tonus vasculaire et la pression artérielle. L'Amlodipine n'est pas dialysable.

STOCKAGE :

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation indiquée en clair sur l'emballage. Conserver à une température comprise entre 15 °C et 30 °C.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

PRÉSENTATIONS :

Amcard 5 mg : boîte de 7, 14 et 28 comprimés.

Amcard 10 mg : boîte de 7, 14 et 28 comprimés.

CONDITION DE DELIVRANCE :

Liste I (Tableau A), uniquement sur ordonnance médicale.

Dernière mise à jour : juin 2011

Laboratoires GENPHARMA

254-260, Z.I. El Jadida - Maroc

<p

Amcard® 5 mg et 10 mg

Amlodipine

Comprimés

L'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

Si la notice est détruite, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous avez des questions, demandez à votre pharmacien. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques.

Si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre pharmacien.

semaines de traitement et s'atténuent lors de sa poursuite.

Comme avec les autres dihydropyridines, un œdème des chevilles et/ou de la face peut apparaître. Son apparition est plus fréquente aux doses élevées.

On observe plus rarement : tachycardies, palpitations, syncope, alopecie, augmentation de la sudation, réaction allergique incluant prurit, éruption et angio-œdème, douleurs abdominales, dyspepsie, dysguepsie, perte de l'appétit, nausées, diarrhée, constipation, bouche sèche, crampes musculaires, myalgie, arthralgie, hépatite, ictere, dyspnée, pollakiurie, impuissance, gynécomastie, asthénie, sensations vertigineuses, troubles du sommeil, parasthésies, tremblements, troubles de la vue, troubles dépressifs, malaise, thrombopénie, vascularité.

Comme avec les autres antagonistes calciques, les événements suivants ont été rarement rapportés : douleurs angineuses, infarctus du myocarde, arythmie. Ils peuvent être liés à la pathologie préexistante au traitement et doivent faire discuter la poursuite du traitement.

INTERACTIONS MÉDAMENTEUSES :

Déconseillée (par mesure de prudence) :

- Dantrolène (perfusion) : l'association d'un antagoniste du calcium et de Dantrolène est potentiellement dangereuse. Cependant, quelques patients ont reçu l'association Nifédipine et Dantrolène sans inconvenients.

Nécessitant des précautions d'emploi :

- Alpha-1-bloquants (alfuzosine, prazosine) : majoration de l'effet hypotenseur.

- Baclofène : majoration de l'effet antihypertenseur.

- Rifampicine : diminution des concentrations plasmatiques de l'antagoniste du calcium par augmentation de son métabolisme hépatique.

- Itraconazole : risque majoré d'œdèmes par diminution du métabolisme hépatique de la dihydropyridine.

A prendre en compte :

- Béta-bloquants : hypotension, défaillance cardiaque chez les malades en insuffisance cardiaque latente ou non contrôlée.

- Antidépresseurs imipraminiques (tricycliques) : effet antihypertenseur et risque d'hypotension orthostatique majorés (effet additif).

- Corticoïdes, tétracosactide par voie générale : diminution de l'effet antihypertenseur (rétenzione hydrosodée des corticoïdes).

- Neuroleptiques : effet antihypertenseur et risque d'hypotension orthostatique majorés (effet additif).

Autres associations :

Digoxine : l'Amlodipine ne modifie pas les taux plasmatiques ou la clairance rénale de la digoxine chez le volontaire sain.

SURDOSSAGE :

Un surdosage massif pourrait provoquer une importante vasodilatation périphérique entraînant une hypotension systémique marquée et probablement prolongée. Toute hypotension consecutive à une intoxication aiguë nécessite une surveillance en unité de soins intensifs cardiologiques. Un vasoconstricteur peut être utilisé pour restaurer le tonus vasculaire et la pression artérielle. L'Amlodipine n'est pas dialysable.

STOCKAGE :

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation indiquée en clair sur l'emballage. Conserver à une température comprise entre 15 °C et 30 °C.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

PRÉSENTATIONS :

Amcard 5 mg : boîte de 7, 14 et 28 comprimés.

Amcard 10 mg : boîte de 7, 14 et 28 comprimés.

CONDITION DE DELIVRANCE :

Liste I (Tableau A), uniquement sur ordonnance médicale.

Dernière mise à jour : juin 2011

Laboratoires GENPHARMA

254-260, Z.I. El Jadida - Maroc

10 mg 28
qsp un comprimé

10 mg
qsp un comprimé



Amcard® 5 mg et 1

Amlodipine.....	5 mg.....	10 mg
Excipients.....	qsp un comprimé.....	qsp un comprimé

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE :

Inhibiteur calcique sélectif à effet vasculaire (code ATC : C08CA01).

INDICATIONS :

- Ce médicament est un vasodilatateur, il est utilisé dans :
- Traitement préventif des crises d'angine de poitrine.
 - Traitement de l'hypertension artérielle.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION :

Les comprimés doivent être avalés avec un verre d'eau.

La dose initiale est d'un comprimé (5 mg) une fois par jour, qui pourra être augmentée à 10 mg par jour en une seule prise en fonction de la réponse au traitement. La dose quotidienne maximale est de 10 mg.

Il n'est pas nécessaire d'adapter la posologie chez le sujet âgé et l'insuffisant rénal.

Il n'est pas nécessaire d'adapter la posologie en cas d'association avec des diurétiques thiazidiques, des bêta-bloquants ou des inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine.

ATTENTION :

SI VOUS AVEZ PRIS PLUS D'AMCARD QUE VOUS N'AURIEZ DÛ :

l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament. Si vous avez des doutes, demandez plus d'informations à votre médecin prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même si vous remarquez un effet indésirable non mentionné.

semaines de traitement et s'atténue. Comme avec les autres dihydropyridines, la face peut apparaître. Son apparence peut être élevée.

On observe plus rarement : tachycardie, augmentation de la sudation, réaction angio-oedème, douleurs abdominales, diminution de l'appétit, nausées, diarrhée, crampes musculaires, myalgie, arthralgie, impuissance, gynécomastie, asthénie, insomnie, paresthésies, tremblements, dépressions, malaise, thrombopénie. Comme avec les autres antagonistes de la calcium, les effets indésirables ont été rarement rapportés : douleurs cardiaques, arythmie. Ils peuvent être liés à la posologie et doivent faire discuter la poursuite du traitement.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES
Déconseillée (par mesure de précaution) :

- Dantrolène (perfusion) : L'association de Dantrolène est potentiellement dangereuse.

Le 18/02/2012

ORDONNANCE

AATAR aïcha

- CT, TR
- urée / créatin
- Ac. urique
- protéinurie de 24h
- Hb, Ht
- Bon fonctionnement Na^+, K^+

Laboratoire JAMAL
d'Analyses Médicales
Dr. EL KASSOUNI Jamal
35, Av. des FAR Chalets Inezgan
Tél/Fax: 05 28 33 39 75



LABORATOIRE JAMAL D'ANALYSES MEDICALES
 1 AV DES FAR, LES CHALETS, 86350 INEZGANE. Tél/Fax : 05.28.33.39.75
 PAT 49300046 INP 043001239 IF 76936360×ICE 1626255000008

Assuré

Bénéficiaire : Mme AATAB Aicha

FACTURE N° 2202212125

Prescripteur : DR SANTE CENTRE DE

Facturé le : 21/02/2022

Récapitulatif des analyses

<i>CN</i>	<i>Analyse</i>	<i>Val</i>	<i>Clefs</i>
PSA	Prélèvement sang adulte	E25	E
0100	Acide urique	B30	B
0106	Cholestérol total	B30	B
0111	Créatinine	B30	B
0119	Hémoglobine glycosylée	B100	B
0130	Protéines	B30	B
0131	Potassium	B30	B
0133	Sodium	B30	B
0134	Triglycérides	B60	B
0135	Urée	B30	B

Total	370	TOTAL DOSSIER : 432 Dhs
B :		

Arrêtée la présente facture à la somme de : quatre cent trente-deux dirhams

Laboratoire JAMAL
d'Analyses Médicales
 Dr. EL KATTSOUNI Jamal
 35, Av. des FAR Chalets Inezgane
 Tél/Fax: 05 28 33 39 75