

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

ditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

armacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

ntaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

ladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

110021

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 875

Actif

Pensionné(e)

Nom & Prénom : KARBAJ

Date de naissance : 01/01/1949

Adresse : 11, Rue des Bouzouks offis
carabec 02

Tél. : 0661 31 02 11

Total des frais engagés : 250 + 134,88 / 1598,88 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr. G. KARBAJ
Gynécologue Obstétricien
400, Bd. Zerkouni 2^e Eig N
Tél. : 05 22 17 18 80

Date de consultation : 21/03/22

Nom et prénom du malade : KARBAJ BENNAH Naima

Age : 71 ans

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie : Goutte et hypertension

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :


Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca

Le : 21/03/2021

Signature de l'adhérent(e) :



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
<i>Pharmacie de Bouvreuil Rue des Bouvreuils Oasis Casablanca Tél 022.99.64 10</i>	<i>21.03.22</i>	<i>1348,80</i>

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
00000000	00000000
35533411	11433553
B	

[Création, remont, adjonction]

A diagram of a dental arch (maxilla) showing the upper teeth. The teeth are numbered 1 through 8 on both the left and right sides. Number 1 is at the top, 2 is below it, 3 is to the left of 2, 4 is to the right of 2, 5 is to the left of 3, 6 is to the right of 3, 7 is to the left of 4, and 8 is to the right of 4. A vertical arrow labeled 'H' points upwards, a horizontal arrow labeled 'D' points to the left, and a horizontal arrow labeled 'G' points to the right. The teeth are arranged in a curve, with the first four teeth on each side being upper incisors and the last four being upper molars.

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur KABBAJ Ghita Ep. SEBTI
Gynécologue Obstétricienne

Diplômée de la Faculté de médecine
de Casablanca
Ancien médecin interne
au CHU Ibn Rochd

الدكتورة قباج غيثة زوجة السبتي
طبيبة اختصاصية في أمراض النساء والتوليد

خريجة كلية الطب بالدار البيضاء
طبيبة داخلية سابقا
بالمراكز الاستشفائية الجامعية ابن رشد

Casablanca le 21-03-2022 الدار البيضاء في

Amé Kabbaj Naim

30.60 x 10
1 | Esidrex 25 caps.V 2 caps matin x 3 mois

43.70 x 4
2 | Zyloric 300 mg 1 cp / Soir S.V x 3 mois

185.70 x 4
3 | Crestor 10 mg 1 cp le soir S.V x 3 mois

14.00 x 2
4 | Dolymaine 1000 mg 1 cp x 2 à 3/j S.V

49.60 x 2
5 | Dcure f. 100.000 1 amp / 15 j x 3 puis S.V

1 amp / 10 mn x 3 (25g)

1348,80

 Pharmacie ABOUDABIA
Rue des Bouvreuils
Oasis Casablanca
Tél 022.99.64.10

*Dr. G. KABBAGH SEBTI
Gynécologue Obstétricienne
400 Bd. Zerkouni 2ème étage
Tel: 05 22 47 16 89 - E-mail: kabbaj_ghita2008@yahoo.fr*

إقامة بيزنس بلازا، رقم 400 شارع الزرقطوني (إتجاه مسجد الحسن الثاني) الطابق الثاني رقم 14 - الدار البيضاء
Business Plaza, N° 400 Bd. Zerkouni (Direction Mosquée Hassan II) 2ème étage, N° 14 - Casablanca
Tél: 05 22 47 16 89 - البريد الإلكتروني : kabbaj_ghita2008@yahoo.fr

ESIDREX® 25 mg, Comprimés sécables, Boîte de Hydrochlorothiazide

Pour les médicaments soumis à la prescription médicale :

Veuillez lire cette notice. Elle contient des informations avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

* Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

* Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été prescrit personnellement prescrit. Ne le donnez pas à quelqu'un d'autre. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

* Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Que contient cette notice :

2. Qu'est-ce que ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables et dans quels cas est-il utilisé ?

3. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

4. Comment prendre ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

5. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

6. Comment conserver ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

7. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE ESIDREX® 25 mg, COMPRIMES SECABLES ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

* Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :

ESIDREX appartient à une classe de médicaments appelée diurétiques thiazidiques.

Ce médicament augmente la quantité d'eau éliminée par les urines.

(Code ATC : C03A02)

* Indication thérapeutiques :

Ce médicament est utilisé :

- Pour traiter des gonflements (ou œdèmes).

- Pour traiter une tension artérielle élevée. Dans ce cas il peut être prescrit seul ou en association avec d'autres médicaments.

2. QU'EST CE QUE LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

* Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolerance à certains sucre, contactez-le pour prendre ce médicament.

Conseil important :

Ne prenez jamais ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active (l'hydrochlorothiazide) ou à l'un des autres composants contenue dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

- Si vous êtes incapable d'uriner (présentez une anurie), ou vous avez une insuffisance rénale sévère.

- Si vous êtes allergique (hypersensible) au bleu, en raison de la présence d'amidon de maïs.

Si vous êtes dans une des situations décrites ci-dessus, prévenez votre médecin avant de prendre ESIDREX® 25 mg, comprimé sécable.

Minimisez spéciales et Précautions particulières d'emploi :

Faites attention avec ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables :

Avant de prendre le traitement, prévenez votre médecin :

- Si vous avez une maladie grave des reins ou du foie.

- Si vous prenez des médicaments contre la tension (rétroflexion des vaisseaux sanguins des deux reins ou un rein unique).

- Si vous avez un diabète (taux élevé de sucre dans le sang).

- Si votre taux sanguin de cholestérol ou de triglycérides est élevé.

- Si vous avez ou avez déjà eu une maladie appelée "lupus erythémateux" (appelée également "lupus" ou "maladie de Sjögren").

- Si votre taux sanguin de potassium est trop bas (avec ou sans symptômes tels qu'une faiblesse musculaire, des spasmes musculaires ou un rythme cardiaque abnormal).

- Si votre taux sanguin de sodium est trop bas (avec ou sans symptômes tels de la fatigue, un état dépressif, des convulsions ou des convulsions).

- Si votre taux sanguin de calcium est élevé (avec ou sans symptômes tels que des nausées, des vomissements, une constipation, des douleurs à l'estomac, une envie fréquente d'uriner, une sensation de soif, une faiblesse musculaire ou des contractions musculaires).

- Si vous souffrez de crises de goutte (cristaux d'acide urique dans les articulations). Si vous prenez des médicaments contre la goutte.

Le goutte peut être une cause de crises de goutte. Ce peut peut être les symptômes d'une augmentation de la pression dans votre œil, pouvant survenir dans les heures ou les semaines qui suivent la prise d'ESIDREX. Ceci peut entraîner des troubles permanents de la vision, en l'absence de traitement.

- Si vous souffrez d'allergie ou d'asthme.

- Si vous présentez des réactions cutanées telles qu'une éruption après une exposition au soleil.

- Si vous prenez tout autre médicament.

- Si vous êtes enceinte ou désirez débutez une grossesse.

Exposition au soleil ou aux UV :

Si vous avez déjà eu des réactions au soleil à cause de ce médicament et que votre médecin vous a prévenu de faire attention, vous devrez protéger votre peau des rayons du soleil et ne pas faire d'exposition au soleil (par exemple, éteindre la rubrique 6).

Ce médicament contient du potassium présentant une faible dose de malabsorption syndrome de malabsorption crânien.

Ce médicament peut être, si d'absorption du gluten par l'intestin, seulement à l'exception, et est atteint d'une maladie de celiac.

COMMENT PRENDRE ESIDREX

* Instruction pour un bon usage

Posologie et mode d'administration

Il faut prendre ce médicament par voie orale.

PPV :

Exp :

N° Lot :

30,60

Esidrex® 25 mg
Hydrochlorothiazide
20 comprimés sécables

6 118000 181194

كلاوروبتا

ESIDREX® 25 mg, Comprimés sécables, Boîte de Hydrochlorothiazide

Pour les médicaments soumis à la prescription médicale :

Veuillez lire cette notice. Elle contient des informations avant de prendre ce médicament, car elle contient des informations importantes pour vous.

* Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

* Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été prescrit personnellement prescrit. Ne le donnez pas à quelqu'un d'autre. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

* Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Que contient cette notice :

2. Qu'est-ce que ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables et dans quels cas est-il utilisé ?

3. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

4. Comment prendre ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

5. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

6. Comment conserver ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

7. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE ESIDREX® 25 mg, COMPRIMES SECABLES ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

* Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :

ESIDREX appartient à une classe de médicaments appelée diurétiques thiazidiques.

Ce médicament augmente la quantité d'eau éliminée par les urines.

(Code ATC : C03A02)

* Indication thérapeutiques :

Ce médicament est utilisé :

- Pour traiter des gonflements (ou œdèmes).

- Pour traiter une tension artérielle élevée. Dans ce cas il peut être prescrit seul ou en association avec d'autres médicaments.

2. QU'EST CE QUE LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

* Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolerance à certains sucre, contactez-le pour prendre ce médicament.

Conseil important :

Ne prenez jamais ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active (l'hydrochlorothiazide) ou à l'un des autres composants contenue dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

- Si vous êtes incapable d'uriner (présentez une anurie), ou vous avez une insuffisance rénale sévère.

- Si vous êtes allergique (hypersensible) au bleu, en raison de la présence d'amidon de maïs.

Si vous êtes dans une des situations décrites ci-dessus, prévenez votre médecin avant de prendre ESIDREX® 25 mg, comprimé sécable.

Minimisez spéciales et Précautions particulières d'emploi :

Faites attention avec ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables :

Avant de prendre le traitement, prévenez votre médecin :

- Si vous avez une maladie grave des reins ou du foie.

- Si vous prenez des médicaments contre la tension (rétroflexion des vaisseaux sanguins des deux reins ou un rein unique).

- Si vous avez un diabète (taux élevé de sucre dans le sang).

- Si votre taux sanguin de cholestérol ou de triglycérides est élevé.

- Si vous avez ou avez déjà eu une maladie appelée "lupus érythémateux" (appelée également "lupus" ou "maladie de Sjögren").

- Si votre taux sanguin de potassium est trop bas (avec ou sans symptômes tels qu'une faiblesse musculaire, des spasmes musculaires ou un rythme cardiaque abnormal).

- Si votre taux sanguin de sodium est trop bas (avec ou sans symptômes tels de la fatigue, un état dépressif, des convulsions ou des convulsions).

- Si votre taux sanguin de calcium est élevé (avec ou sans symptômes tels que des nausées, des vomissements, une constipation, des douleurs à l'estomac, une envie fréquente d'uriner, une sensation de soif, une faiblesse musculaire ou des contractions musculaires).

- Si vous souffrez de crises de goutte (cristaux d'acide urique dans les articulations).

- Si vous avez une maladie de l'œil (œdème de la rétine). Ce peut être les symptômes d'une augmentation de la pression dans votre œil, pouvant survenir dans les heures ou les semaines qui suivent la prise d'ESIDREX. Ceci peut entraîner des troubles permanents de la vision, en l'absence de traitement.

- Si vous souffrez d'allergie ou d'asthme.

- Si vous présentez des réactions cutanées telles qu'une éruption après une exposition au soleil.

- Si vous prenez tout autre médicament.

- Si vous êtes enceinte ou désirez débuter une grossesse.

Exposition au soleil ou aux UV :

Si vous avez déjà eu des réactions au soleil à cause de ce médicament et que votre médecin vous a prévenu de l'arrêter, vous devrez protéger votre peau des rayons du soleil et ne pas faire d'exposition au soleil (par exemple, en restant à l'abri du soleil et en portant des vêtements et des lunettes de soleil).

Ce médicament contient du potassium présentant une faible dose de malabsorption syndrome de malabsorption crânien).

Ce médicament peut être, si d'absorption du gluten par l'intestin, seulement à l'exception, et est atteint d'une maladie de celiac.

COMMENT PRENDRE ESIDREX

* Instruction pour un bon usage

Posologie et mode d'administration :

Il faut prendre ce médicament à votre médecin ou pharmacien.

Vérifiez auprès de votre médecin.

Posologie

Il faut toujours prendre ce médicament à votre médecin ou pharmacien.

Il faut prendre ce médicament à votre médecin ou pharmacien.

La dose habituelle en début d'effet peut décliner.

La dose sera ensuite réduite progressivement.

La dose recommandée est :

Veillez à toujours prendre ce médicament à votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin en cas de doute.

Mode d'administration

Ce médicament est à prendre par voie orale.

Il faut prendre ce médicament à votre médecin ou pharmacien.

Fréquence d'administration

Ce médicament a un effet diurétique (c'est-à-dire que vous allez uriner plus souvent).

Compte tenu de cet effet, il est préférable de ne pas prendre la dernière dose tard dans la journée, afin d'éviter d'éventuels réveils la nuit.

Si vous devez prendre vos comprimés sécables en une seule fois, prenez le(s) le matin.

Durée du traitement

Votre médecin vous dira pendant combien de temps vous devez utiliser ce médicament.

Il faut prendre ce médicament à votre médecin.

ESIDREX® 25 mg, Comprimés sécables, Boîte de Hydrochlorothiazide

Pour les médicaments soumis à la prescription médicale :

Veuillez lire cette notice. Elle contient des informations avant de prendre ce médicament, car elle contient des informations importantes pour vous.

* Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

* Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été prescrit personnellement prescrit. Ne le donnez pas à quelqu'un d'autre. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

* Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Que contient cette notice :

2. Qu'est-ce que ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables et dans quels cas est-il utilisé ?

3. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

4. Comment prendre ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

5. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

6. Comment conserver ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

7. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE ESIDREX® 25 mg, COMPRIMES SECABLES ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

* Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :

ESIDREX appartient à une classe de médicaments appelée diurétiques thiazidiques.

Ce médicament augmente la quantité d'eau éliminée par les urines.

(Code ATC : C03A02)

* Indication thérapeutiques :

Ce médicament est utilisé :

- Pour traiter des gonflements (ou œdèmes).

- Pour traiter une tension artérielle élevée. Dans ce cas il peut être prescrit seul ou en association avec d'autres médicaments.

2. QU'EST CE QUE LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

* Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolerance à certains sucre, contactez-le pour prendre ce médicament.

Conseil important :

Ne prenez jamais ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active (l'hydrochlorothiazide) ou à l'un des autres composants contenue dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

- Si vous êtes incapable d'uriner (présentez une anurie),

- Si vous avez une insuffisance rénale sévère,

- Si vous êtes allergique (hypersensible) au bleu, en raison de la présence d'amidon de bleu.

Si vous êtes dans une des situations décrites ci-dessus, prévenez votre médecin avant de prendre ESIDREX® 25 mg, comprimé sécable.

Minimisez spéciales et Précautions particulières d'emploi :

Faites attention avec ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables :

Avant de prendre le traitement, prévenez votre médecin :

- Si vous avez une maladie grave des reins ou du foie.

- Si vous prenez des médicaments contre la tension (rétroflexion des vaisseaux sanguins des deux reins ou un rein unique).

- Si vous avez un diabète (taux élevé de sucre dans le sang).

- Si votre taux sanguin de cholestérol ou de triglycérides est élevé.

- Si vous avez ou avez déjà eu une maladie appelée "lupus erythémateux" (appelée également "lupus" ou "maladie de Sjögren").

- Si votre taux sanguin de potassium est trop bas (avec ou sans symptômes tels qu'une faiblesse musculaire, des spasmes musculaires ou un rythme cardiaque abnormal).

- Si votre taux sanguin de sodium est trop bas (avec ou sans symptômes tels de la fatigue, un état dépressif, des convulsions ou des convulsions).

- Si votre taux sanguin de calcium est élevé (avec ou sans symptômes tels que des nausées, des vomissements, une constipation, des douleurs à l'estomac, une envie fréquente d'uriner, une sensation de soif, une faiblesse musculaire ou des contractions musculaires).

- Si vous souffrez de crises de goutte (cristaux d'acide urique dans les articulations).

- Si vous avez une maladie de l'œil (œdème de l'œil). Ce peut être les symptômes d'une augmentation de la pression dans votre œil, pouvant survenir dans les heures ou les semaines qui suivent la prise d'ESIDREX. Ceci peut entraîner des troubles permanents de la vision, en l'absence de traitement.

- Si vous souffrez d'allergie ou d'asthme.

- Si vous présentez des réactions cutanées telles qu'une éruption après une exposition au soleil.

- Si vous prenez tout autre médicament.

- Si vous êtes enceinte ou désirez débutez une grossesse.

Exposition au soleil ou aux UV :

Si vous avez déjà eu des réactions au soleil à cause de ce médicament et que votre médecin vous a prévenu de faire attention, vous devrez protéger votre peau des rayons du soleil et ne pas faire d'exposition au soleil (par exemple, éteindre la rubrique 6).

Ce médicament contient du potassium présentant une faible dose de malabsorption syndrome.

Ce médicament peut être, ai d'absorption du gluten par l'intestin, seul ou à l'échelle, trace, et est atteint d'une maladie cœliaque.

COMMENT PRENDRE ESIDREX

* Instruction pour un bon usage

Posologie et mode d'administration :

Il faut prendre ce médicament à votre pharmacien.

Vérifiez auprès de votre pharmacien.

Posologie

Il faut toujours prendre ce médicament à votre pharmacien.

Vérifiez auprès de votre pharmacien.

La dose habituelle en début d'effet peut décliner.

La dose sera ensuite réduite progressivement.

La dose recommandée est :

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant les instructions de votre pharmacien. Vérifiez auprès de votre pharmacien en cas de doute.

Mode d'administration

Ce médicament est à prendre par voie orale.

Ayez le(s) comprimé(s) sécable(s) avec un verre d'eau.

Fréquence d'administration

Ce médicament a un effet diurétique (c'est-à-dire que vous allez uriner plus souvent).

Compte tenu de cet effet, il est préférable de ne pas prendre la dernière dose tard dans la journée, afin d'éviter d'éventuels réveils la nuit.

Si vous devez prendre vos comprimés sécables en une seule fois, prenez le(s) le matin.

Durée du traitement

Votre médecin vous dira pendant combien de temps vous devez utiliser ce médicament.

Votre médecin fera régulièrement des contrôles afin de s'assurer que le traitement entraîne les effets attendus.

Si vous avez des questions sur la durée du traitement, parlez-en à votre pharmacien.

Symptômes et conduite à tenir en cas de surdosage :

Symptômes avec plus pris de ESIDREX 25 mg, comprimé sécable que vous n'auriez du :

Consultez immédiatement votre médecin ou les urgences si vous ressentez des symptômes, une somnolence, des contractions musculaires, des troubles du rythme cardiaque (arythmie cardiaque), une tension artérielle basse (reconnaisable par des taches dans les yeux), des troubles de la vision, des troubles de la urination.

Conduite à tenir en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses :

Si vous oubliez de prendre une dose, prenez-la le plus rapidement possible le jour même et continuez votre traitement normalement. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

ESIDREX® 25 mg, Comprimés sécables, Boîte de Hydrochlorothiazide

Pour les médicaments soumis à la prescription médicale :

Veuillez lire cette notice. Elle contient des informations avant de prendre ce médicament, car elle contient des informations importantes pour vous.

* Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

* Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été prescrit personnellement prescrit. Ne le donnez pas à quelqu'un d'autre. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

* Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Que contient cette notice :

2. Qu'est-ce que ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables et dans quels cas est-il utilisé ?

3. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

4. Comment prendre ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

5. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

6. Comment conserver ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

7. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE ESIDREX® 25 mg, COMPRIMES SECABLES ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

* Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :

ESIDREX appartient à une classe de médicaments appelée diurétiques thiazidiques.

Ce médicament augmente la quantité d'eau éliminée par les urines.

(Code ATC : C03A02)

* Indication thérapeutiques :

Ce médicament est utilisé :

- Pour traiter des gonflements (ou œdèmes).

- Pour traiter une tension artérielle élevée. Dans ce cas il peut être prescrit seul ou en association avec d'autres médicaments.

2. QU'EST CE QUE LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

* Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolerance à certains sucre, contactez-le pour prendre ce médicament.

Conseil important :

Ne prenez jamais ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active (l'hydrochlorothiazide) ou à l'un des autres composants contenue dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

- Si vous êtes incapable d'uriner (présentez une anurie), ou vous avez une insuffisance rénale sévère.

- Si vous êtes allergique (hypersensible) au bleu, en raison de la présence d'amidon de maïs.

Si vous êtes dans une des situations décrites ci-dessus, prévenez votre médecin avant de prendre ESIDREX® 25 mg, comprimé sécable.

Minimisez spéciales et Précautions particulières d'emploi :

Faites attention avec ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables :

Avant de prendre le traitement, prévenez votre médecin :

- Si vous avez une maladie grave des reins ou du foie.

- Si vous prenez des médicaments contre la tension (rétroflexion des vaisseaux sanguins des deux reins ou un rein unique).

- Si vous avez un diabète (taux élevé de sucre dans le sang).

- Si votre taux sanguin de cholestérol ou de triglycérides est élevé.

- Si vous avez ou avez déjà eu une maladie appelée "lupus érythémateux" (appelée également "lupus" ou "maladie de Sjögren").

- Si votre taux sanguin de potassium est trop bas (avec ou sans symptômes tels qu'une faiblesse musculaire, des spasmes musculaires ou un rythme cardiaque abnormal).

- Si votre taux sanguin de sodium est trop bas (avec ou sans symptômes tels de la fatigue, un état dépressif, des convulsions ou des convulsions).

- Si votre taux sanguin de calcium est élevé (avec ou sans symptômes tels que des nausées, des vomissements, une constipation, des douleurs à l'estomac, une envie fréquente d'uriner, une sensation de soif, une faiblesse musculaire ou des contractions musculaires).

- Si vous souffrez de crises de goutte (cristaux d'acide urique dans les articulations).

- Si vous avez une maladie de l'œil (œdème de la rétine). Ce peut être les symptômes d'une augmentation de la pression dans votre œil, pouvant survenir dans les heures ou les semaines qui suivent la prise d'ESIDREX. Ceci peut entraîner des troubles permanents de la vision, en l'absence de traitement.

- Si vous souffrez d'allergie ou d'asthme.

- Si vous présentez des réactions cutanées telles qu'une éruption après une exposition au soleil.

- Si vous prenez tout autre médicament.

- Si vous êtes enceinte ou désirez débuter une grossesse.

Exposition au soleil ou aux UV :

Si vous avez déjà eu des réactions au soleil à cause de ce médicament et que votre médecin vous a prévenu de l'arrêter, vous devrez protéger votre peau des rayons du soleil et ne pas faire d'exposition au soleil (par exemple, en restant à l'abri du soleil et en portant des vêtements et des lunettes de soleil).

Ce médicament contient du potassium présentant une faible dose de malabsorption syndrome de malabsorption crânien).

Ce médicament peut être, si d'absorption du gluten par l'intestin, seulement à l'exception, et est atteint d'une maladie de celiac.

COMMENT PRENDRE ESIDREX

* Instruction pour un bon usage

Posologie et mode d'administration :

Il faut prendre ce médicament à votre médecin ou pharmacien.

Vérifiez auprès de votre médecin.

Posologie

Il faut toujours prendre ce médicament à votre médecin ou pharmacien.

Il faut prendre ce médicament à votre médecin ou pharmacien.

La dose habituelle en début d'effet peut décliner.

La dose sera ensuite réduite progressivement.

La dose recommandée est :

Il faut toujours prendre ce médicament à votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin en cas de doute.

Mode d'administration

Ce médicament est à prendre par voie orale.

Il faut prendre ce médicament à votre médecin ou pharmacien.

Fréquence d'administration

Ce médicament a un effet diurétique (c'est-à-dire que vous allez uriner plus souvent).

Compte tenu de cet effet, il est préférable de ne pas prendre la dernière dose tard dans la journée, afin d'éviter d'éventuels réveils la nuit.

Si vous devez prendre vos comprimés sécables en une seule fois, prenez le(s) le matin.

Durée du traitement

Votre médecin vous dira pendant combien de temps vous devez utiliser ce médicament.

Il faut prendre ce médicament à votre médecin.

Symptômes et conduite à tenir en cas de surdosage :

Symptômes avec plus pris de ESIDREX 25 mg, comprimé sécable que vous n'auriez du :

Consultez immédiatement votre médecin ou les urgences si vous ressentez des symptômes, une somnolence, des contractions musculaires, des troubles du rythme cardiaque (arythmie cardiaque), une tension artérielle basse (reconnaissable par des taches dans les yeux), des troubles de la vision ou des troubles de la conscience.

Conduite à tenir en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses :

Si vous oubliez de prendre une dose, prenez-la le plus rapidement possible le jour même et continuez votre traitement normalement. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous devez prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous devez prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous interrompez le traitement, votre tension artérielle ne sera plus contrôlée (voir aussi le paragraphe "Durée du traitement").

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre pharmacien.

3. QU'EST CE QUE LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Effets nécessitant l'arrêt du traitement :

Vous devez interrompre le traitement et consulter un médecin ou les urgences immédiatement si vous réagissez aux rayons du soleil (réaction sur la peau).

Effets indésirables très fréquents (peuvent affecter plus de 1 patient sur 10) :

- Augmentation du taux de lipides dans le sang (hyperlipidémie).

- Diminution du taux de potassium dans le sang (hypokaliémie).

Effets indésirables fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 patient sur 10) :

- Eruption cutanée avec démangeaisons (urticaire) et autres formes d'éruptions cutanées.

- Perte d'appétit, nausées, vomissements, diarrhées.

- Chute de la pression artérielle lors du passage de la position allongée à debout.

- Incapacité à obtenir ou à maintenir une érection (impotence).

- Diminution du taux de magnésium dans le sang (hypomagnésémie).

- Augmentation du taux d'acide urique dans le sang (hyperuricémie).

Effets indésirables peu fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 patient sur 100) :

- Insuffisance rénale aigüe (diminution importante du débit urinaire).

Effets indésirables rares (peuvent affecter jusqu'à 1 patient sur 1000) :

- Aggravation de l'insuffisance cardiaque.

- Sensibilité allergique à la peau au soleil.

- Sensibilité allergique à l'antidiabétique, constipation.

PPV :

Exp :

N° Lot :

30,60

Esidrex® 25 mg
Hydrochlorothiazide
20 comprimés sécables

6 118000 181194

ESIDREX® 25 mg, Comprimés sécables, Boîte de Hydrochlorothiazide

Pour les médicaments soumis à la prescription médicale :

Veuillez lire cette notice. Elle contient des informations avant de prendre ce médicament, car elle contient des informations importantes pour vous.

* Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

* Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été prescrit personnellement prescrit. Ne le donnez pas à quelqu'un d'autre. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

* Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Que contient cette notice :

2. Qu'est-ce que ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables et dans quels cas est-il utilisé ?

3. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

4. Comment prendre ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

5. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

6. Comment conserver ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

7. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE ESIDREX® 25 mg, COMPRIMES SECABLES ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

* Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :

ESIDREX appartient à une classe de médicaments appelée diurétiques thiazidiques. Ce médicament augmente la quantité d'eau éliminée par les urines.

(Code ATC : C03A02)

* Indication thérapeutiques :

Ce médicament est utilisé :

- Pour traiter des gonflements (ou œdèmes).

- Pour traiter une tension artérielle élevée. Dans ce cas il peut être prescrit seul ou en association avec d'autres médicaments.

2. QUELS SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

* Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolerance à certains sucre, contactez-le pour prendre ce médicament.

Contre-indication :

Ne prenez jamais ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active (l'hydrochlorothiazide) ou à l'un des autres composants contenue dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

- Si vous êtes incapable d'uriner (présentez une anurie),

- Si vous avez une insuffisance rénale sévère,

- Si vous êtes allergique (hypersensible) au bleu, en raison de la présence d'amidon de maïs.

Si vous êtes dans une des situations décrites ci-dessus, prévenez votre médecin avant de prendre ESIDREX® 25 mg, comprimé sécable.

Minimisant spéciales et Précautions particulières d'emploi :

Faites attention avec ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables :

Avant de prendre le traitement, prévenez votre médecin :

- Si vous avez une maladie grave des reins ou du foie.

- Si vous prenez des médicaments contre la tension (rétroflexion des vaisseaux sanguins des deux reins ou un rein unique).

- Si vous avez un diabète (taux élevé de sucre dans le sang).

- Si votre taux sanguin de cholestérol ou de triglycérides est élevé.

- Si vous avez ou avez déjà eu une maladie appelée "lupus erythémateux" (appelée également "lupus" ou "maladie de Sjögren").

- Si votre taux sanguin de potassium est trop bas (avec ou sans symptômes tels qu'une faiblesse musculaire, des spasmes musculaires ou un rythme cardiaque abnormal).

- Si votre taux sanguin de sodium est trop bas (avec ou sans symptômes tels de la fatigue, un état dépressif, des convulsions ou des convulsions).

- Si votre taux sanguin de calcium est élevé (avec ou sans symptômes tels que des nausées, des vomissements, une constipation, des douleurs à l'estomac, une envie fréquente d'uriner, une sensation de soif, une faiblesse musculaire ou des contractions musculaires).

- Si vous souffrez de crises de goutte (cristaux d'acide urique dans les articulations).

- Si vous avez une maladie de l'œil (œdème de la rétine). Ce peut être les symptômes d'une augmentation de la pression dans votre œil, pouvant survenir dans les heures ou les semaines qui suivent la prise d'ESIDREX. Ceci peut entraîner des troubles permanents de la vision, en l'absence de traitement.

- Si vous souffrez d'allergie ou d'asthme.

- Si vous présentez des réactions cutanées telles qu'une éruption après une exposition au soleil.

- Si vous prenez tout autre médicament.

- Si vous êtes enceinte ou désirez débutez une grossesse.

Exposition au soleil ou aux UV :

Si vous avez déjà eu des réactions au soleil à cause de ce médicament et que votre médecin vous a conseillé de prendre un traitement pour protéger votre peau des rayons du soleil et de l'UV, faites-le. Veuillez également à la rubrique 6.

Ce médicament contient du potassium présentant une meilleure absorption que les médicaments de malabsorption d'urée.

Ce médicament peut être, ai d'absorption du gluten par l'intestin, seul ou à l'échelle, trace, et est atteint d'une maladie cœliaque.

3. COMMENT PRENDRE ESIDREX®

* Instruction pour un bon usage

Posologie et mode d'administration :

Il faut prendre ce médicament par voie orale.

ESIDREX® 25 mg, Comprimés sécables, Boîte de Hydrochlorothiazide

Pour les médicaments soumis à la prescription médicale :

Veuillez lire cette notice. Elle contient des informations avant de prendre ce médicament, car elle contient des informations importantes pour vous.

* Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

* Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été prescrit personnellement prescrit. Ne le donnez pas à quelqu'un d'autre. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

* Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Que contient cette notice :

2. Qu'est-ce que ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables et dans quels cas est-il utilisé ?

3. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

4. Comment prendre ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

5. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

6. Comment conserver ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

7. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE ESIDREX® 25 mg, COMPRIMES SECABLES ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

* Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :

ESIDREX appartient à une classe de médicaments appelée diurétiques thiazidiques. Ce médicament augmente la quantité d'eau éliminée par les urines.

(Code ATC : C03A02)

* Indication thérapeutiques :

Ce médicament est utilisé :

- Pour traiter des gonflements (ou œdèmes).

- Pour traiter une tension artérielle élevée. Dans ce cas il peut être prescrit seul ou en association avec d'autres médicaments.

2. QUELS SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

* Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolerance à certains sucre, contactez-le pour prendre ce médicament.

Contre-indication :

Ne prenez jamais ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active (l'hydrochlorothiazide) ou à l'un des autres composants contenue dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

- Si vous êtes incapable d'uriner (présentez une anurie),

- Si vous avez une insuffisance rénale sévère,

- Si vous êtes allergique (hypersensible) au bleu, en raison de la présence d'amidon de maïs.

Si vous êtes dans une des situations décrites ci-dessus, prévenez votre médecin avant de prendre ESIDREX® 25 mg, comprimé sécable.

Minimisant spéciales et Précautions particulières d'emploi :

Faites attention avec ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables :

Avant de prendre le traitement, prévenez votre médecin :

- Si vous avez une maladie grave des reins ou du foie.

- Si vous prenez des médicaments contre la tension (rétroflexion des vaisseaux sanguins des deux reins ou un rein unique).

- Si vous avez un diabète (taux élevé de sucre dans le sang).

- Si votre taux sanguin de cholestérol ou de triglycérides est élevé.

- Si vous avez ou avez déjà eu une maladie appelée "lupus erythémateux" (appelée également "lupus" ou "maladie de Sjögren").

- Si votre taux sanguin de potassium est trop bas (avec ou sans symptômes tels qu'une faiblesse musculaire, des spasmes musculaires ou un rythme cardiaque abnormal).

- Si votre taux sanguin de sodium est trop bas (avec ou sans symptômes tels de la fatigue, un état dépressif, des convulsions ou des convulsions).

- Si votre taux sanguin de calcium est élevé (avec ou sans symptômes tels que des nausées, des vomissements, une constipation, des douleurs à l'estomac, une envie fréquente d'uriner, une sensation de soif, une faiblesse musculaire ou des contractions musculaires).

- Si vous souffrez de crises de goutte (cristaux d'acide urique dans les articulations). Si vous prenez des médicaments contre la tension.

Le goutte peut être une maladie qui entraîne des crises de goutte. Ce peut être les symptômes d'une augmentation de la pression dans votre œil, pouvant survenir dans les heures ou les semaines qui suivent la prise d'ESIDREX. Ceci peut entraîner des troubles permanents de la vision, en l'absence de traitement.

- Si vous souffrez d'allergie ou d'asthme.

- Si vous présentez des réactions cutanées telles qu'une éruption après une exposition au soleil.

- Si vous prenez tout autre médicament.

- Si vous êtes enceinte ou désirez débuter une grossesse.

Exposition au soleil ou aux UV :

Si vous avez déjà eu des réactions au soleil à cause de ce médicament et que votre médecin vous a prévenu de faire attention, vous devrez protéger votre peau des rayons du soleil et ne pas faire d'exposition au soleil (par exemple, éteindre la rubrique "Exposition au soleil ou aux UV").

Ce médicament contient du potassium présentant une faible dose de malabsorption syndrome.

Ce médicament peut être, ai d'absorption du gluten par l'intestin, mais il n'est pas recommandé, et est atteint d'une maladie cœliaque.

3. COMMENT PRENDRE ESIDREX® 25 mg

* Instruction pour un bon usage

Posologie et mode d'administration :

Il faut prendre ce médicament à votre pharmacien.

Vérifiez auprès de votre pharmacien.

Posologie :

Il faut prendre ce médicament à votre pharmacien.

Vérifiez auprès de votre pharmacien.

Posologie :

Il faut prendre ce médicament à votre pharmacien.

Vérifiez auprès de votre pharmacien.

Posologie :

Il faut prendre ce médicament à votre pharmacien.

Vérifiez auprès de votre pharmacien.

Posologie :

Il faut prendre ce médicament à votre pharmacien.

Vérifiez auprès de votre pharmacien.

Posologie :

Il faut prendre ce médicament à votre pharmacien.

Vérifiez auprès de votre pharmacien.

Posologie :

Il faut prendre ce médicament à votre pharmacien.

Vérifiez auprès de votre pharmacien.

Posologie :

Il faut prendre ce médicament à votre pharmacien.

Vérifiez auprès de votre pharmacien.

Posologie :

Il faut prendre ce médicament à votre pharmacien.

Vérifiez auprès de votre pharmacien.

Posologie :

Il faut prendre ce médicament à votre pharmacien.

Vérifiez auprès de votre pharmacien.

Posologie :

Il faut prendre ce médicament à votre pharmacien.

Vérifiez auprès de votre pharmacien.

Posologie :

Il faut prendre ce médicament à votre pharmacien.

Vérifiez auprès de votre pharmacien.

Posologie :

Il faut prendre ce médicament à votre pharmacien.

Vérifiez auprès de votre pharmacien.

Posologie :

Il faut prendre ce médicament à votre pharmacien.

Vérifiez auprès de votre pharmacien.

Posologie :

Il faut prendre ce médicament à votre pharmacien.

Vérifiez auprès de votre pharmacien.

Posologie :

Il faut prendre ce médicament à votre pharmacien.

Vérifiez auprès de votre pharmacien.

Posologie :

Il faut prendre ce médicament à votre pharmacien.

Vérifiez auprès de votre pharmacien.

Posologie :

Il faut prendre ce médicament à votre pharmacien.

Vérifiez auprès de votre pharmacien.

Posologie :

Il faut prendre ce médicament à votre pharmacien.

Vérifiez auprès de votre pharmacien.

Posologie :

Il faut prendre ce médicament à votre pharmacien.

Vérifiez auprès de votre pharmacien.

Posologie :

Il faut prendre ce médicament à votre pharmacien.

Vérifiez auprès de votre pharmacien.

Posologie :

Il faut prendre ce médicament à votre pharmacien.

Vérifiez auprès de votre pharmacien.

Posologie :

Il faut prendre ce médicament à votre pharmacien.

Vérifiez auprès de votre pharmacien.

Posologie :

Il faut prendre ce médicament à votre pharmacien.

Vérifiez auprès de votre pharmacien.

Posologie :

Il faut prendre ce médicament à votre pharmacien.

Vérifiez auprès de votre pharmacien.

Posologie :

Il faut prendre ce médicament à votre pharmacien.

Vérifiez auprès de votre pharmacien.

Posologie :

Il faut prendre ce médicament à votre pharmacien.

Vérifiez auprès de votre pharmacien.

Posologie :

Il faut prendre ce médicament à votre pharmacien.

Vérifiez auprès de votre pharmacien.

Posologie :

Il faut prendre ce médicament à votre pharmacien.

Vérifiez auprès de votre pharmacien.

Posologie :

Il faut prendre ce médicament à votre pharmacien.

Vérifiez auprès de votre pharmacien.

Posologie :

Il faut prendre ce médicament à votre pharmacien.

Vérifiez auprès de votre pharmacien.

Posologie :

Il faut prendre ce médicament à votre pharmacien.

Vérifiez auprès de votre pharmacien.

Posologie :

Il faut prendre ce médicament à votre pharmacien.

Vérifiez auprès de votre pharmacien.

Posologie :

Il faut prendre ce médicament à votre pharmacien.

Vérifiez auprès de votre pharmacien.

Posologie :

Il faut prendre ce médicament à votre pharmacien.

Vérifiez auprès de votre pharmacien.

Posologie :

Il faut prendre ce médicament à votre pharmacien.

Vérifiez auprès de votre pharmacien.

Posologie :

Il faut prendre ce médicament à votre pharmacien.

Vérifiez auprès de votre pharmacien.

Posologie :

Il faut prendre ce médicament à votre pharmacien.

Vérifiez auprès de votre pharmacien.

Posologie :

Il faut prendre ce médicament à votre pharmacien.

Vérifiez auprès de votre pharmacien.

Posologie :

Il faut prendre ce médicament à votre pharmacien.

Vérifiez auprès de votre pharmacien.

Posologie :

Il faut prendre ce médicament à votre pharmacien.

Vérifiez auprès de votre pharmacien.

Posologie :

Il faut prendre ce médicament à votre pharmacien.

Vérifiez auprès de votre pharmacien.

Posologie :

Il faut prendre ce médicament à votre pharmacien.

Vérifiez auprès de votre pharmacien.

Posologie :

Il faut prendre ce médicament à votre pharmacien.

Vérifiez auprès de votre pharmacien.

Posologie :

Il faut prendre ce médicament à votre pharmacien.

Vérifiez auprès de votre pharmacien.

Posologie :

Il faut prendre ce médicament à votre pharmacien.

Vérifiez auprès de votre pharmacien.

Posologie :

Il faut prendre ce médicament à votre pharmacien.

Vérifiez auprès de votre pharmacien.

Posologie :

Il faut prendre ce médicament à votre pharmacien.

Vérifiez auprès de votre pharmacien.

Posologie :

Il faut prendre ce médicament à votre pharmacien.

Vérifiez auprès de votre pharmacien.

Posologie :

Il faut prendre ce médicament à votre pharmacien.

Vérifiez auprès de votre pharmacien.

Posologie :

Il faut prendre ce médicament à votre pharmacien.

Vérifiez auprès de votre pharmacien.

Posologie :

Il faut prendre ce médicament à votre pharmacien.

Vérifiez auprès de votre pharmacien.

Posologie :

Il faut prendre ce médicament à votre pharmacien.

Vérifiez auprès de votre pharmacien.

Posologie :

Il faut prendre ce médicament à votre pharmacien.

Vérifiez auprès de votre pharmacien.

Posologie :

Il faut prendre ce médicament à votre pharmacien.

Vérifiez auprès de votre pharmacien.

Posologie :

Il faut prendre ce médicament à votre pharmacien.

Vérifiez auprès de votre pharmacien.

Posologie :

Il faut prendre ce médicament à votre pharmacien.

Vérifiez auprès de votre pharmacien.

Posologie :

Il faut prendre ce médicament à votre pharmacien.

Vérifiez auprès de votre pharmacien.

Posologie :

Il faut prendre ce médicament à votre pharmacien.

Vérifiez auprès de votre pharmacien.

Posologie :

Il faut prendre ce médicament à votre pharmacien.

Vérifiez auprès de votre pharmacien.

Posologie :

Il faut prendre ce médicament à votre pharmacien.

Vérifiez auprès de votre pharmacien.

Posologie :

Il faut prendre ce médicament à votre pharmacien.

Vérifiez auprès de votre pharmacien.

Posologie :

Il faut prendre ce médicament à votre pharmacien.

Vérifiez auprès de votre pharmacien.

Posologie :

Il faut prendre ce médicament à votre pharmacien.

Vérifiez auprès de votre pharmacien.

Posologie :

Il faut prendre ce médicament à votre pharmacien.

Vérifiez auprès de votre pharmacien.

Posologie :

Il faut prendre ce médicament à votre pharmacien.

Vérifiez auprès de votre pharmacien.

Posologie :

Il faut prendre ce médicament à votre pharmacien.

Vérifiez auprès de votre pharmacien.

Posologie :

Il faut prendre ce médicament à votre pharmacien.

Vérifiez auprès de votre pharmacien.

Posologie :

Il faut prendre ce médicament à votre pharmacien.

Vérifiez auprès de votre pharmacien.

Posologie :

Il faut prendre ce médicament à votre pharmacien.

Vérifiez auprès de votre pharmacien.

Posologie :

Il faut prendre ce médicament à votre pharmacien.

Vérifiez auprès de votre pharmacien.

Posologie :

Il faut prendre ce médicament à votre pharmacien.

Vérifiez auprès de votre pharmacien.

Posologie :

Il faut prendre ce médicament à votre pharmacien.

Vérifiez auprès de votre pharmacien.

Posologie :

Il faut prendre ce médicament à votre pharmacien.

Vérifiez auprès de votre pharmacien.

ESIDREX® 25 mg, Comprimés sécables, Boîte de Hydrochlorothiazide

Pour les médicaments soumis à la prescription médicale :

Veuillez lire cette notice. Elle contient des informations avant de prendre ce médicament, car elle contient des informations importantes pour vous.

* Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

* Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été prescrit personnellement prescrit. Ne le donnez pas à quelqu'un d'autre. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

* Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Que contient cette notice :

2. Qu'est-ce que ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables et dans quels cas est-il utilisé ?

3. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

4. Comment prendre ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

5. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

6. Comment conserver ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

7. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE ESIDREX® 25 mg, COMPRIMES SECABLES ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

* Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :

ESIDREX appartient à une classe de médicaments appelée diurétiques thiazidiques.

Ce médicament augmente la quantité d'eau éliminée par les urines.

(Code ATC : C03A02)

* Indication thérapeutiques :

Ce médicament est utilisé :

- Pour traiter des gonflements (ou œdèmes).

- Pour traiter une tension artérielle élevée. Dans ce cas il peut être prescrit seul ou en association avec d'autres médicaments.

2. QU'EST CE QUE LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

* Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolerance à certains sucre, contactez-le pour prendre ce médicament.

Conseil important :

Ne prenez jamais ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active (l'hydrochlorothiazide) ou à l'un des autres composants contenue dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

- Si vous êtes incapable d'uriner (présentez une anurie),

- Si vous avez une insuffisance rénale sévère,

- Si vous êtes allergique (hypersensible) au bleu, en raison de la présence d'amidon de bleu.

Si vous êtes dans une des situations décrites ci-dessus, prévenez votre médecin avant de prendre ESIDREX® 25 mg, comprimé sécable.

Minimisez spéciales et Précautions particulières d'emploi :

Faites attention avec ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables :

Avant de prendre le traitement, prévenez votre médecin :

- Si vous avez une maladie grave des reins ou du foie.

- Si vous prenez des médicaments contre la tension (rétroémission des vaisseaux sanguins des deux reins ou un rein unique).

- Si vous avez un diabète (taux élevé de sucre dans le sang).

- Si votre taux sanguin de cholestérol ou de triglycérides est élevé.

- Si vous avez ou avez déjà eu une maladie appelée "lupus erythémateux" (appelée également "lupus" ou "maladie de Sjögren").

- Si votre taux sanguin de potassium est trop bas (avec ou sans symptômes tels qu'une faiblesse musculaire, des spasmes musculaires ou un rythme cardiaque abnormal).

- Si votre taux sanguin de sodium est trop bas (avec ou sans symptômes tels de la fatigue, un état dépressif, des convulsions ou des convulsions).

- Si votre taux sanguin de calcium est élevé (avec ou sans symptômes tels que des nausées, des vomissements, une constipation, des douleurs à l'estomac, une envie fréquente d'uriner, une sensation de soif, une faiblesse musculaire ou des contractions musculaires).

- Si vous souffrez de crises de goutte (cristaux d'acide urique dans les articulations). Si vous prenez des médicaments contre la goutte.

Le goutte peut être une cause de crises de goutte. Ce peut peut être les symptômes d'une augmentation de la pression dans votre œil, pouvant survenir dans les heures ou les semaines qui suivent la prise d'ESIDREX. Ceci peut entraîner des troubles permanents de la vision, en l'absence de traitement.

- Si vous souffrez d'allergie ou d'asthme.

- Si vous présentez des réactions cutanées telles qu'une éruption après une exposition au soleil.

- Si vous prenez tout autre médicament.

- Si vous êtes enceinte ou désirez débiter une grossesse.

Exposition au soleil ou aux UV :

Si vous avez déjà eu des réactions au soleil à cause de ce médicament et que votre médecin vous a conseillé de prendre un crème pour protéger votre peau des rayons du soleil et de l'UV, faites-le. Vous devrez également à la rubrique 6.

Ce médicament contient du potassium présentant une faible dose de malabsorption syndrome.

Ce médicament peut être, si d'absorption du gluten par l'intestin, seulement à l'exception, et est atteint d'une maladie de celiac.

3. COMMENT PRENDRE ESIDREX®

* Instruction pour un bon usage

Posologie et mode d'administration :

Il faut prendre ce médicament à votre pharmacien.

Vérifiez auprès de votre médecin.

4. POSSOLOGIE

Il faut toujours prendre ce médicament à votre pharmacien.

Vérifiez auprès de votre pharmacien.

La dose habituelle en début d'effet peut décliner.

La dose sera ensuite réduite progressivement.

La dose recommandée est :

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant les instructions de votre pharmacien. Vérifiez auprès de votre pharmacien en cas de doute.

5. MODE D'ADMINISTRATION

Ce médicament est à prendre par voie orale.

Ayez le(s) comprimé(s) sécable(s) avec un verre d'eau.

6. FREQUENCE D'ADMINISTRATION

Ce médicament a un effet diurétique (c'est-à-dire que vous allez uriner plus souvent).

Compte tenu de cet effet, il est préférable de ne pas prendre la dernière dose tard dans la journée, afin d'éviter d'éventuels réveils la nuit.

Si vous devez prendre vos comprimés sécables en une seule fois, prenez le(s) le matin.

7. DUREE DU TRAITEMENT

Votre médecin vous dira pendant combien de temps vous devez utiliser ce médicament.

Votre médecin fera régulièrement des contrôles afin de s'assurer que le traitement entraîne les effets attendus.

Si vous avez des questions sur la durée du traitement, parlez-en à votre pharmacien.

8. SYMPTOMES ET CONDUITE A TENIR EN CAS DE SURDOSSAGE :

Symptômes avec plus pris de ESIDREX 25 mg, comprimé sécable que vous n'auriez du :

Consultez immédiatement votre médecin ou les urgences si vous ressentez des symptômes, une somnolence, des contractions musculaires, des troubles du rythme cardiaque (arythmie cardiaque), une tension artérielle basse (reconnaissable par des taches dans les yeux), des troubles de la vision, des troubles de la uriner ou une faiblesse.

9. CONDUITE A TENIR EN CAS D'OMISSION D'UNE OU DE PLUSIEURS DOSES :

Si vous oubliez de prendre une dose, prenez-la le plus rapidement possible le jour même et continuez votre traitement normalement. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

10. CONDUITE A TENIR EN CAS DE PRENDRE ESIDREX® 25 mg, comprimé sécable :

Si vous préférez de prendre ESIDREX® 25 mg, comprimé sécable :

Si vous préférez de prendre ESIDREX® 25 mg, comprimé sécable :

Si vous interrompez le traitement, votre tension artérielle ne sera plus contrôlée (voir aussi le paragraphe "Durée du traitement").

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre pharmacien.

11. QU'EST CE QUE LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

12. EFFETS NECESSITANT L'ARRET DU TRAITEMENT :

Vous devez interrompre le traitement et consulter un médecin ou les urgences si vous ressentez des symptômes, une réaction au rayons du soleil (réaction sur la peau).

13. EFFETS INDESIRABLES TRES FREQUENTS (PEUVENT AFFECTER PLUS DE 1 PATIENT SUR 10) :

- Augmentation du taux de lipides dans le sang (hyperlipidémie).

- Diminution du taux de potassium dans le sang (hypopotasémie).

14. EFFETS INDESIRABLES FREQUENTS (PEUVENT AFFECTER JUSQU'A 1 PATIENT SUR 10) :

- Eruption cutanée avec démangeaisons (urticaire) et autres formes d'éruptions cutanées.

- Perte d'appétit, nausées, vomissements, diarrhées.

- Chute de la pression artérielle lors du passage de la position allongée à debout.

- Incapacité à obtenir ou à maintenir une érection (impotance).

- Diminution du taux de magnésium dans le sang (hypomagnésémie).

- Augmentation du taux de calcium dans le sang (hypercalcémie).

- Augmentation du taux d'acide urique dans le sang (hyperuricémie).

15. EFFETS INDESIRABLES PEU FREQUENTS (PEUVENT AFFECTER JUSQU'A 1 PATIENT SUR 100) :

- Insuffisance rénale aigüe (diminution importante du débit urinaire).

16. EFFETS INDESIRABLES RARES (PEUVENT AFFECTER JUSQU'A 1 PATIENT SUR 1000) :

- Aggravation de l'insuffisance rénale.

- Sensibilité allergique endométriale, constipation.

PPV :

Exp :

N° Lot :

30,60

Esidrex® 25 mg
Hydrochlorothiazide
20 comprimés sécables

6 118000 181194

ESIDREX® 25 mg, Comprimés sécables, Boîte de Hydrochlorothiazide

Pour les médicaments soumis à la prescription médicale :

Veuillez lire cette notice. Elle contient des informations avant de prendre ce médicament, car elle contient des informations importantes pour vous.

* Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

* Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été prescrit personnellement prescrit. Ne le donnez pas à quelqu'un d'autre. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

* Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Que contient cette notice :

2. Qu'est-ce que ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables et dans quels cas est-il utilisé ?

3. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

4. Comment prendre ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

5. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

6. Comment conserver ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

7. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE ESIDREX® 25 mg, COMPRIMES SECABLES ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

* Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :

ESIDREX appartient à une classe de médicaments appelée diurétiques thiazidiques.

Ce médicament augmente la quantité d'eau éliminée par les urines.

(Code ATC : C03A02)

* Indication thérapeutiques :

Ce médicament est utilisé :

- Pour traiter des gonflements (ou œdèmes).

- Pour traiter une tension artérielle élevée. Dans ce cas il peut être prescrit seul ou en association avec d'autres médicaments.

2. QU'EST CE QUE LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

* Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolerance à certains sucre, contactez-le pour prendre ce médicament.

Conseil important :

Ne prenez jamais ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active (l'hydrochlorothiazide) ou à l'un des autres composants contenue dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

- Si vous êtes incapable d'uriner (présentez une anurie),

- Si vous avez une insuffisance rénale sévère,

- Si vous êtes allergique (hypersensible) au bleu, en raison de la présence d'amidon de maïs.

Si vous êtes dans une des situations décrites ci-dessus, prévenez votre médecin avant de prendre ESIDREX® 25 mg, comprimé sécable.

Minimisez spéciales et Précautions particulières d'emploi :

Faites attention avec ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables :

Avant de prendre le traitement, prévenez votre médecin :

- Si vous avez une maladie grave des reins ou du foie.

- Si vous prenez des médicaments contre la tension (rétroémission des vaisseaux sanguins des deux reins ou un rein unique).

- Si vous avez un diabète (taux élevé de sucre dans le sang).

- Si votre taux sanguin de cholestérol ou de triglycérides est élevé.

- Si vous avez ou avez déjà eu une maladie appelée "lupus erythémateux" (appelée également "lupus" ou "maladie de Sjögren").

- Si votre taux sanguin de potassium est trop bas (avec ou sans symptômes tels qu'une faiblesse musculaire, des spasmes musculaires ou un rythme cardiaque abnormal).

- Si votre taux sanguin de sodium est trop bas (avec ou sans symptômes tels de la fatigue, un état dépressif, des convulsions ou des convulsions).

- Si votre taux sanguin de calcium est élevé (avec ou sans symptômes tels que des nausées, des vomissements, une constipation, des douleurs à l'estomac, une envie fréquente d'uriner, une sensation de soif, une faiblesse musculaire ou des contractions musculaires).

- Si vous souffrez de crises de goutte (cristaux d'acide urique dans les articulations).

- Si vous avez une maladie de l'œil (cataracte).

Leur peut être les symptômes d'une augmentation de la pression dans votre œil, pouvant survenir dans les heures ou les semaines qui suivent la prise d'ESIDREX. Ceci peut entraîner des troubles permanents de la vision, en l'absence de traitement.

- Si vous souffrez d'allergie ou d'asthme.

- Si vous présentez des réactions cutanées telles qu'une éruption après une exposition au soleil.

- Si vous prenez tout autre médicament.

- Si vous êtes enceinte ou désirez débutez une grossesse.

Exposition au soleil ou aux UV :

Si vous avez déjà eu des réactions au soleil à cause de ce médicament et que votre médecin vous a prévenu de faire attention, vous devrez protéger votre peau des rayons du soleil et ne pas faire d'exposition au soleil (par exemple, éteindre la rubrique "Exposition au soleil ou aux UV").

Ce médicament contient du potassium présentant une faible dose de malabsorption syndrome de malabsorption crânien).

Ce médicament peut être, si d'absorption du gluten par l'intestin, seulement à l'exception, et est atteint d'une maladie cœliaque.

COMMENT PRENDRE ESIDREX

* Instruction pour un bon usage

Posologie et mode d'administration

Il faut prendre ce médicament par voie orale.

Comment prendre ce médicament par voie orale.

Posologie

Il faut toujours prendre ce médicament par voie orale.

Comment prendre ce médicament par voie orale.

Posologie

Il faut toujours prendre ce médicament par voie orale.

Comment prendre ce médicament par voie orale.

Posologie

Il faut toujours prendre ce médicament par voie orale.

Comment prendre ce médicament par voie orale.

Posologie

Il faut toujours prendre ce médicament par voie orale.

Comment prendre ce médicament par voie orale.

Posologie

Il faut toujours prendre ce médicament par voie orale.

Comment prendre ce médicament par voie orale.

Posologie

Il faut toujours prendre ce médicament par voie orale.

Comment prendre ce médicament par voie orale.

Posologie

Il faut toujours prendre ce médicament par voie orale.

Comment prendre ce médicament par voie orale.

Posologie

Il faut toujours prendre ce médicament par voie orale.

Comment prendre ce médicament par voie orale.

Posologie

Il faut toujours prendre ce médicament par voie orale.

Comment prendre ce médicament par voie orale.

Posologie

Il faut toujours prendre ce médicament par voie orale.

Comment prendre ce médicament par voie orale.

Posologie

Il faut toujours prendre ce médicament par voie orale.

Comment prendre ce médicament par voie orale.

Posologie

Il faut toujours prendre ce médicament par voie orale.

Comment prendre ce médicament par voie orale.

Posologie

Il faut toujours prendre ce médicament par voie orale.

Comment prendre ce médicament par voie orale.

Posologie

Il faut toujours prendre ce médicament par voie orale.

Comment prendre ce médicament par voie orale.

Posologie

Il faut toujours prendre ce médicament par voie orale.

Comment prendre ce médicament par voie orale.

Posologie

Il faut toujours prendre ce médicament par voie orale.

Comment prendre ce médicament par voie orale.

Posologie

Il faut toujours prendre ce médicament par voie orale.

Comment prendre ce médicament par voie orale.

Posologie

Il faut toujours prendre ce médicament par voie orale.

Comment prendre ce médicament par voie orale.

Posologie

Il faut toujours prendre ce médicament par voie orale.

Comment prendre ce médicament par voie orale.

Posologie

Il faut toujours prendre ce médicament par voie orale.

Comment prendre ce médicament par voie orale.

Posologie

Il faut toujours prendre ce médicament par voie orale.

Comment prendre ce médicament par voie orale.

Posologie

Il faut toujours prendre ce médicament par voie orale.

Comment prendre ce médicament par voie orale.

Posologie

Il faut toujours prendre ce médicament par voie orale.

Comment prendre ce médicament par voie orale.

Posologie

Il faut toujours prendre ce médicament par voie orale.

Comment prendre ce médicament par voie orale.

Posologie

Il faut toujours prendre ce médicament par voie orale.

Comment prendre ce médicament par voie orale.

Posologie

Il faut toujours prendre ce médicament par voie orale.

Comment prendre ce médicament par voie orale.

Posologie

Il faut toujours prendre ce médicament par voie orale.

Comment prendre ce médicament par voie orale.

Posologie

Il faut toujours prendre ce médicament par voie orale.

Comment prendre ce médicament par voie orale.

Posologie

Il faut toujours prendre ce médicament par voie orale.

Comment prendre ce médicament par voie orale.

Posologie

Il faut toujours prendre ce médicament par voie orale.

Comment prendre ce médicament par voie orale.

Posologie

Il faut toujours prendre ce médicament par voie orale.

Comment prendre ce médicament par voie orale.

Posologie

Il faut toujours prendre ce médicament par voie orale.

Comment prendre ce médicament par voie orale.

Posologie

Il faut toujours prendre ce médicament par voie orale.

Comment prendre ce médicament par voie orale.

Posologie

Il faut toujours prendre ce médicament par voie orale.

Comment prendre ce médicament par voie orale.

Posologie

Il faut toujours prendre ce médicament par voie orale.

Comment prendre ce médicament par voie orale.

Posologie

Il faut toujours prendre ce médicament par voie orale.

Comment prendre ce médicament par voie orale.

Posologie

Il faut toujours prendre ce médicament par voie orale.

Comment prendre ce médicament par voie orale.

Posologie

Il faut toujours prendre ce médicament par voie orale.

Comment prendre ce médicament par voie orale.

Posologie

Il faut toujours prendre ce médicament par voie orale.

Comment prendre ce médicament par voie orale.

Posologie

Il faut toujours prendre ce médicament par voie orale.

Comment prendre ce médicament par voie orale.

Posologie

Il faut toujours prendre ce médicament par voie orale.

Comment prendre ce médicament par voie orale.

Posologie

Il faut toujours prendre ce médicament par voie orale.

Comment prendre ce médicament par voie orale.

Posologie

Il faut toujours prendre ce médicament par voie orale.

Comment prendre ce médicament par voie orale.

Posologie

Il faut toujours prendre ce médicament par voie orale.

Comment prendre ce médicament par voie orale.

Posologie

Il faut toujours prendre ce médicament par voie orale.

Comment prendre ce médicament par voie orale.

Posologie

Il faut toujours prendre ce médicament par voie orale.

Comment prendre ce médicament par voie orale.

Posologie

Il faut toujours prendre ce médicament par voie orale.

Comment prendre ce médicament par voie orale.

Posologie

Il faut toujours prendre ce médicament par voie orale.

Comment prendre ce médicament par voie orale.

Posologie

Il faut toujours prendre ce médicament par voie orale.

Comment prendre ce médicament par voie orale.

Posologie

Il faut toujours prendre ce médicament par voie orale.

Comment prendre ce médicament par voie orale.

Posologie

Il faut toujours prendre ce médicament par voie orale.

Comment prendre ce médicament par voie orale.

Posologie

Il faut toujours prendre ce médicament par voie orale.

Comment prendre ce médicament par voie orale.

Posologie

Il faut toujours prendre ce médicament par voie orale.

Comment prendre ce médicament par voie orale.

Posologie

Il faut toujours prendre ce médicament par voie orale.

Comment prendre ce médicament par voie orale.

Posologie

Il faut toujours prendre ce médicament par voie orale.

Comment prendre ce médicament par voie orale.

Posologie

Il faut toujours prendre ce médicament par voie orale.

Comment prendre ce médicament par voie orale.

Posologie

Il faut toujours prendre ce médicament par voie orale.

Comment prendre ce médicament par voie orale.

Posologie

Il faut toujours prendre ce médicament par voie orale.

Comment prendre ce médicament par voie orale.

Posologie

Il faut toujours prendre ce médicament par voie orale.

Comment prendre ce médicament par voie orale.

Posologie

Il faut toujours prendre ce médicament par voie orale.

Comment prendre ce médicament par voie orale.

Posologie

Il faut toujours prendre ce médicament par voie orale.

Comment prendre ce médicament par voie orale.

Posologie

Il faut toujours prendre ce médicament par voie orale.

Comment prendre ce médicament par voie orale.

Posologie

Il faut toujours prendre ce médicament par voie orale.

Comment prendre ce médicament par voie orale.

Posologie

Il faut toujours prendre ce médicament par voie orale.

Comment prendre ce médicament par voie orale.

Posologie

Il faut toujours prendre ce médicament par voie orale.

Comment prendre ce médicament par voie orale.

Posologie

Il faut toujours prendre ce médicament par voie orale.

Comment prendre ce médicament par voie orale.

Posologie

Il faut toujours prendre ce médicament par voie orale.

Comment prendre ce médicament par voie orale.

Posologie

Il faut toujours prendre ce médicament par voie orale.

Comment prendre ce médicament par voie orale.

Posologie

Il faut toujours prendre ce médicament par voie orale.

Comment prendre ce médicament par voie orale.

Posologie

Il faut toujours prendre ce médicament par voie orale.

ESIDREX® 25 mg, Comprimés sécables, Boîte de Hydrochlorothiazide

Pour les médicaments soumis à la prescription médicale :

Veuillez lire cette notice. Elle contient des informations avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

* Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

* Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été prescrit personnellement prescrit. Ne le donnez pas à quelqu'un d'autre. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

* Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Que contient cette notice :

2. Qu'est-ce que ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables et dans quels cas est-il utilisé ?

3. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

4. Comment prendre ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

5. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

6. Comment conserver ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

7. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE ESIDREX® 25 mg, COMPRIMES SECABLES ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

* Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :

ESIDREX appartient à une classe de médicaments appelée diurétiques thiazidiques.

Ce médicament augmente la quantité d'eau éliminée par les urines.

(Code ATC : C03A02)

* Indication thérapeutiques :

Ce médicament est utilisé :

- Pour traiter des gonflements (ou œdèmes).

- Pour traiter une tension artérielle élevée. Dans ce cas il peut être prescrit seul ou en association avec d'autres médicaments.

2. QU'EST CE QUE LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

* Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolerance à certains sucre, contactez-le pour prendre ce médicament.

Conseil important :

Ne prenez jamais ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active (l'hydrochlorothiazide) ou à l'un des autres composants contenue dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

- Si vous êtes incapable d'uriner (présentez une anurie), ou vous avez une insuffisance rénale sévère.

- Si vous êtes allergique (hypersensible) au bleu, en raison de la présence d'amidon de maïs.

Si vous êtes dans une des situations décrites ci-dessus, prévenez votre médecin avant de prendre ESIDREX® 25 mg, comprimé sécable.

Minimisez spéciales et Précautions particulières d'emploi :

Faites attention avec ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables :

Avant de prendre le traitement, prévenez votre médecin :

- Si vous avez une maladie grave des reins ou du foie.

- Si vous prenez des médicaments contre la tension (rétroflexion des vaisseaux sanguins des deux reins ou un rein unique).

- Si vous avez un diabète (taux élevé de sucre dans le sang).

- Si votre taux sanguin de cholestérol ou de triglycérides est élevé.

- Si vous avez ou avez déjà eu une maladie appelée "lupus erythémateux" (appelée également "lupus" ou "maladie de Sjögren").

- Si votre taux sanguin de potassium est trop bas (avec ou sans symptômes tels qu'une faiblesse musculaire, des spasmes musculaires ou un rythme cardiaque abnormal).

- Si votre taux sanguin de sodium est trop bas (avec ou sans symptômes tels de la fatigue, un état dépressif, des convulsions ou des convulsions).

- Si votre taux sanguin de calcium est élevé (avec ou sans symptômes tels que des nausées, des vomissements, une constipation, des douleurs à l'estomac, une envie fréquente d'uriner, une sensation de soif, une faiblesse musculaire ou des contractions musculaires).

- Si vous souffrez de crises de goutte (cristaux d'acide urique dans les articulations). Si vous prenez des médicaments contre la goutte.

- Ce médicament peut entraîner une augmentation de la pression dans votre œil. Ce peut être les symptômes d'une augmentation de la pression dans votre œil, pouvant survenir dans les heures ou les semaines qui suivent la prise d'ESIDREX. Ceci peut entraîner des troubles permanents de la vision, en l'absence de traitement.

- Si vous souffrez d'allergie ou d'asthme.

- Si vous présentez des réactions cutanées telles qu'une éruption après une exposition au soleil.

- Si vous prenez tout autre médicament.

- Si vous êtes enceinte ou désirez débutez une grossesse.

Exposition au soleil ou aux UV :

Si vous avez déjà eu des réactions au soleil à cause de ce médicament et que votre médecin vous a prévenu de faire attention, vous devrez protéger votre peau des rayons du soleil et ne pas faire d'exposition au soleil (par exemple, éteindre la rubrique 6).

Ce médicament contient du potassium présentant une faible dose de malabsorption syndrome de malabsorption crânien).

Ce médicament peut être, si d'absorption du gluten par l'intestin, seulement à l'exception, et est atteint d'une maladie de celiac.

COMMENT PRENDRE ESIDREX

* Instruction pour un bon usage

Posologie et mode d'administration

Il faut prendre ce médicament par voie orale.

Prenez ce médicament par voie orale.

Posologie

Il faut toujours prendre ce médicament par voie orale.

Prenez ce médicament par voie orale.

La dose habituelle en début d'après votre médecin peut décliner.

La dose sera ensuite réduite.

La dose recommandée est :

Veillez à toujours prendre ce médicament par voie orale.

Mode d'administration

Ce médicament est à prendre par voie orale.

Avalez le(s) comprimé(s) sécable(s) avec un verre d'eau.

Fréquence d'administration

Ce médicament a un effet diurétique (c'est-à-dire que vous allez uriner plus souvent).

Compte tenu de cet effet, il est préférable de ne pas prendre la dernière dose tard dans la journée, afin d'éviter d'éventuels réveils la nuit.

Si vous devez prendre vos comprimés sécables en une seule fois, prenez le(s) le matin.

Durée du traitement

Votre médecin vous dira pendant combien de temps vous devez utiliser ce médicament.

Mode d'administration

Ce médicament a un effet diurétique (c'est-à-dire que vous allez uriner plus souvent).

Compte tenu de cet effet, il est préférable de ne pas prendre la dernière dose tard dans la journée, afin d'éviter d'éventuels réveils la nuit.

Si vous devez prendre vos comprimés sécables en une seule fois, prenez le(s) le matin.

Durée du traitement

Votre médecin vous dira pendant combien de temps vous devez utiliser ce médicament.

Mode d'administration

Ce médicament a un effet diurétique (c'est-à-dire que vous allez uriner plus souvent).

Compte tenu de cet effet, il est préférable de ne pas prendre la dernière dose tard dans la journée, afin d'éviter d'éventuels réveils la nuit.

Si vous devez prendre vos comprimés sécables en une seule fois, prenez le(s) le matin.

Symptômes et conduite à tenir en cas de surdosage :

Symptômes avec plus pris de ESIDREX 25 mg, comprimé sécable que vous n'auriez du :

Consultez immédiatement votre médecin ou les urgences si vous ressentez des symptômes, une somnolence, des contractions musculaires, des troubles du rythme cardiaque (arythmie cardiaque), une tension artérielle basse (reconnaissable par des taches dans les yeux), des troubles de la vision, des troubles de la uriner ou une faiblesse.

Conduite à tenir en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses :

Si vous oubliez de prendre une dose, prenez-la le plus rapidement possible le jour même et continuez votre traitement normalement. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

PPV :

Exp :

N° Lot :

30,60

Esidrex® 25 mg
Hydrochlorothiazide
20 comprimés sécables

6 118000 181194

کلوروتیاب

ESIDREX® 25 mg, Comprimés sécables, Boîte de Hydrochlorothiazide

Pour les médicaments soumis à la prescription médicale :

Veuillez lire cette notice. Elle contient des informations avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

* Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

* Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été prescrit personnellement prescrit. Ne le donnez pas à quelqu'un d'autre. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

* Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Que contient cette notice :

2. Qu'est-ce que ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables et dans quels cas est-il utilisé ?

3. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

4. Comment prendre ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

5. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

6. Comment conserver ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

7. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE ESIDREX® 25 mg, COMPRIMES SECABLES ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

* Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :

ESIDREX appartient à une classe de médicaments appelée diurétiques thiazidiques.

Ce médicament augmente la quantité d'eau éliminée par les urines.

(Code ATC : C03A02)

* Indication thérapeutiques :

Ce médicament est utilisé :

- Pour traiter des gonflements (ou œdèmes).

- Pour traiter une tension artérielle élevée. Dans ce cas il peut être prescrit seul ou en association avec d'autres médicaments.

2. QU'EST CE QUE LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

* Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolerance à certains sucre, contactez-le pour prendre ce médicament.

Conseil important :

Ne prenez jamais ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active (l'hydrochlorothiazide) ou à l'un des autres composants contenue dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

- Si vous êtes incapable d'uriner (présentez une anurie), ou vous avez une insuffisance rénale sévère.

- Si vous êtes allergique (hypersensible) au bleu, en raison de la présence d'amidon de maïs.

Si vous êtes dans une des situations décrites ci-dessus, prévenez votre médecin avant de prendre ESIDREX® 25 mg, comprimé sécable.

Minimisez spéciales et Précautions particulières d'emploi :

Faites attention avec ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables :

Avant de prendre le traitement, prévenez votre médecin :

- Si vous avez une maladie grave des reins ou du foie.

- Si vous prenez des médicaments contre la tension (rétroflexion des vaisseaux sanguins des deux reins ou un rein unique).

- Si vous avez un diabète (taux élevé de sucre dans le sang).

- Si votre taux sanguin de cholestérol ou de triglycérides est élevé.

- Si vous avez ou avez déjà eu une maladie appelée "lupus erythémateux" (appelée également "lupus" ou "maladie de Sjögren").

- Si votre taux sanguin de potassium est trop bas (avec ou sans symptômes tels qu'une faiblesse musculaire, des spasmes musculaires ou un rythme cardiaque abnormal).

- Si votre taux sanguin de sodium est trop bas (avec ou sans symptômes tels de la fatigue, un état dépressif, des convulsions ou des convulsions).

- Si votre taux sanguin de calcium est élevé (avec ou sans symptômes tels que des nausées, des vomissements, une constipation, des douleurs à l'estomac, une envie fréquente d'uriner, une sensation de soif, une faiblesse musculaire ou des contractions musculaires).

- Si vous souffrez de crises de goutte (cristaux d'acide urique dans les articulations).

- Si vous avez une maladie de l'œil (œdème de la rétine). Ce peut être les symptômes d'une augmentation de la pression dans votre œil, pouvant survenir dans les heures ou les semaines qui suivent la prise d'ESIDREX. Ceci peut entraîner des troubles permanents de la vision, en l'absence de traitement.

- Si vous souffrez d'allergie ou d'asthme.

- Si vous présentez des réactions cutanées telles qu'une éruption après une exposition au soleil.

- Si vous prenez tout autre médicament.

- Si vous êtes enceinte ou désirez débuter une grossesse.

Exposition au soleil ou aux UV :

Si vous avez déjà eu des réactions au soleil à cause de ce médicament et que votre médecin vous a prévenu de l'arrêter, vous devrez protéger votre peau des rayons du soleil et ne pas faire d'exposition au soleil (par exemple, en restant à l'abri du soleil et en portant des vêtements et un chapeau appropriés).

Ce médicament contient du potassium présentant une faible dose de malabsorption syndrome de malabsorption crânien).

Ce médicament peut être, si d'absorption du gluten par l'intestin, seulement à l'exception, et est atteint d'une maladie de celiac.

COMMENT PRENDRE ESIDREX

* Instruction pour un bon usage

Posologie et mode d'administration :

Il faut prendre ce médicament à votre médecin ou pharmacien.

Vérifiez auprès de votre médecin.

Posologie

Il faut toujours prendre ce médicament à votre médecin ou pharmacien.

Il faut prendre ce médicament à votre médecin ou pharmacien.

La dose habituelle en début d'effet peut décliner.

La dose sera ensuite réduite progressivement.

La dose recommandée est :

Veillez à toujours prendre ce médicament à votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin en cas de doute.

Mode d'administration

Ce médicament est à prendre par voie orale.

Il faut prendre ce médicament à votre médecin ou pharmacien.

Fréquence d'administration

Ce médicament a un effet diurétique (c'est-à-dire que vous allez uriner plus souvent).

Compte tenu de cet effet, il est préférable de ne pas prendre la dernière dose tard dans la journée, afin d'éviter d'éventuels réveils la nuit.

Si vous devez prendre vos comprimés sécables en une seule fois, prenez le(s) le matin.

Durée du traitement

Votre médecin vous dira pendant combien de temps vous devez utiliser ce médicament.

Il faut prendre ce médicament à votre médecin.

ZYLORIC® 100 mg, 200 mg, 300 mg, comprimé ALLOPURINOL

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

43,20

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE ZYLORIC, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ZYLORIC, comprimé ?
3. COMMENT PRENDRE ZYLORIC, comprimé ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER ZYLORIC, comprimé ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE ZYLORIC, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

INHIBITEUR DE LA SYNTHÈSE D'ACIDE URIQUE.

Ce médicament est préconisé pour le traitement et la prévention des troubles liés à l'excès d'acide urique tels que gouttes, calculs,...

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ZYLORIC, comprimé ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

N'utilisez jamais ZYLORIC, comprimé :

- en cas d'allergie connue à l'allopurinol ou à l'un des constituants du produit,
- chez l'enfant de moins de 6 ans (contre-indication liée à la forme pharmaceutique),
- en cas d'allaitement.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec ZYLORIC, comprimé :

Mises en garde spéciales

CE MEDICAMENT NE DOIT ETRE PRIS QUE SOUS SURVEILLANCE MEDICALE.

Au cours du traitement, avertir immédiatement votre médecin en cas de :

- manifestations cutanées de type démangeaisons, rougeurs, vésicules, décollement de la peau pouvant rapidement s'étendre de façon très grave à tout le corps,
- fièvre associée à une atteinte de l'état général, éruption cutanée, atteinte du foie ou du rein.

Ces manifestations rares peuvent être graves et imposent le plus souvent l'arrêt immédiat du traitement.

En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares).

Précautions d'emploi

Afin d'éviter le déclenchement d'une crise de goutte, ce médicament devra (pendant les premiers mois de traitement) être associé à la colchicine. Il ne doit pas être utilisé lors d'une crise aiguë de goutte.

AVANT DE PRENDRE CE MEDICAMENT, PREVENIR VOTRE MEDECIN en cas de :

ZYLORIC® 100 mg, 200 mg, 300 mg, comprimé ALLOPURINOL

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

43,20

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE ZYLORIC, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ZYLORIC, comprimé ?
3. COMMENT PRENDRE ZYLORIC, comprimé ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER ZYLORIC, comprimé ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE ZYLORIC, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

INHIBITEUR DE LA SYNTHÈSE D'ACIDE URIQUE.

Ce médicament est préconisé pour le traitement et la prévention des troubles liés à l'excès d'acide urique tels que gouttes, calculs,...

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ZYLORIC, comprimé ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

N'utilisez jamais ZYLORIC, comprimé :

- en cas d'allergie connue à l'allopurinol ou à l'un des constituants du produit,
- chez l'enfant de moins de 6 ans (contre-indication liée à la forme pharmaceutique),
- en cas d'allaitement.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec ZYLORIC, comprimé :

Mises en garde spéciales

CE MEDICAMENT NE DOIT ETRE PRIS QUE SOUS SURVEILLANCE MEDICALE.

Au cours du traitement, avertir immédiatement votre médecin en cas de :

- manifestations cutanées de type démangeaisons, rougeurs, vésicules, décollement de la peau pouvant rapidement s'étendre de façon très grave à tout le corps,
- fièvre associée à une atteinte de l'état général, éruption cutanée, atteinte du foie ou du rein.

Ces manifestations rares peuvent être graves et imposent le plus souvent l'arrêt immédiat du traitement.

En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares).

Précautions d'emploi

Afin d'éviter le déclenchement d'une crise de goutte, ce médicament devra (pendant les premiers mois de traitement) être associé à la colchicine. Il ne doit pas être utilisé lors d'une crise aiguë de goutte.

AVANT DE PRENDRE CE MEDICAMENT, PREVENIR VOTRE MEDECIN en cas de :

ZYLORIC® 100 mg, 200 mg, 300 mg, comprimé ALLOPURINOL

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

43,20

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE ZYLORIC, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ZYLORIC, comprimé ?
3. COMMENT PRENDRE ZYLORIC, comprimé ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER ZYLORIC, comprimé ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE ZYLORIC, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

INHIBITEUR DE LA SYNTHÈSE D'ACIDE URIQUE.

Ce médicament est préconisé pour le traitement et la prévention des troubles liés à l'excès d'acide urique tels que gouttes, calculs,...

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ZYLORIC, comprimé ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

N'utilisez jamais ZYLORIC, comprimé :

- en cas d'allergie connue à l'allopurinol ou à l'un des constituants du produit,
- chez l'enfant de moins de 6 ans (contre-indication liée à la forme pharmaceutique),
- en cas d'allaitement.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec ZYLORIC, comprimé :

Mises en garde spéciales

CE MEDICAMENT NE DOIT ETRE PRIS QUE SOUS SURVEILLANCE MEDICALE.

Au cours du traitement, avertir immédiatement votre médecin en cas de :

- manifestations cutanées de type démangeaisons, rougeurs, vésicules, décollement de la peau pouvant rapidement s'étendre de façon très grave à tout le corps,
- fièvre associée à une atteinte de l'état général, éruption cutanée, atteinte du foie ou du rein.

Ces manifestations rares peuvent être graves et imposent le plus souvent l'arrêt immédiat du traitement.

En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares).

Précautions d'emploi

Afin d'éviter le déclenchement d'une crise de goutte, ce médicament devra (pendant les premiers mois de traitement) être associé à la colchicine. Il ne doit pas être utilisé lors d'une crise aiguë de goutte.

AVANT DE PRENDRE CE MEDICAMENT, PREVENIR VOTRE MEDECIN en cas de :

ZYLORIC® 100 mg, 200 mg, 300 mg, comprimé ALLOPURINOL

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

43,20

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE ZYLORIC, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ZYLORIC, comprimé ?
3. COMMENT PRENDRE ZYLORIC, comprimé ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER ZYLORIC, comprimé ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE ZYLORIC, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

INHIBITEUR DE LA SYNTHÈSE D'ACIDE URIQUE.

Ce médicament est préconisé pour le traitement et la prévention des troubles liés à l'excès d'acide urique tels que gouttes, calculs,...

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ZYLORIC, comprimé ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

N'utilisez jamais ZYLORIC, comprimé :

- en cas d'allergie connue à l'allopurinol ou à l'un des constituants du produit,
- chez l'enfant de moins de 6 ans (contre-indication liée à la forme pharmaceutique),
- en cas d'allaitement.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec ZYLORIC, comprimé :

Mises en garde spéciales

CE MEDICAMENT NE DOIT ETRE PRIS QUE SOUS SURVEILLANCE MEDICALE.

Au cours du traitement, avertir immédiatement votre médecin en cas de :

- manifestations cutanées de type démangeaisons, rougeurs, vésicules, décollement de la peau pouvant rapidement s'étendre de façon très grave à tout le corps,
- fièvre associée à une atteinte de l'état général, éruption cutanée, atteinte du foie ou du rein.

Ces manifestations rares peuvent être graves et imposent le plus souvent l'arrêt immédiat du traitement.

En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares).

Précautions d'emploi

Afin d'éviter le déclenchement d'une crise de goutte, ce médicament devra (pendant les premiers mois de traitement) être associé à la colchicine. Il ne doit pas être utilisé lors d'une crise aiguë de goutte.

AVANT DE PRENDRE CE MEDICAMENT, PREVENIR VOTRE MEDECIN en cas de :

Notice

JE. Belgique.



Remboursable

1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT :**D-CURE® FORTE 100.000 U.I.,
solution buvable en ampoule, boîtes d'**

Substance active : Cholécalciférol (Vitamine D 3).

 PPU: 49,50 DH
 LOT: 19F18/B
 EXP 106/2022

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toutes autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

2. COMPOSITION DU MÉDICAMENT :

Ampoules buvables de 1 ml de solution huileuse :

Principe actif : Cholécalciférol 100.000 U.I.

Excipients :

Acétate d'alpha-Tocophérol – Essence d'écorce d'orange douce – Oléate de Polyglycérol (E475) – Huile d'olive raffinée pour faire 1 ml (= une ampoule).

3. CLASSE PHARMACEUTIQUE :

Vitamines.

4. INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES :

D-CURE FORTE 100.000 UI est utilisé en tant que traitement d'attaque pour la carence en vitamine D.

5. POSOLOGIE :**Mode et voies d'administration :**

Administration orale.

Les ampoules doivent être prises ou administrées conformément aux instructions de dosage.

La dose sera prise telle quelle ou en mélange avec des liquides.

Fréquence d'administration-durée du traitement :

Utilisez toujours D-CURE FORTE conformément aux instructions de votre médecin. En cas de doute, consultez à nouveau votre médecin ou pharmacien.

Le dosage doit être déterminé au cas par cas par le médecin traitant. S'il ne vous a pas été prescrit, il est recommandé de prendre une dose unique ou une dose cumulée de 100.000 UI sur 1 semaine.

Il est possible d'administrer 1 ampoule de D-CURE FORTE 100 000 U.I. en une seule dose ou 4 ampoules de D-CURE 25.000 U.I. par semaine. (100.000 U.I.).

6. CONTRE INDICATION :**N'utilisez pas D-CURE FORTE :**

- * si vous êtes allergique (hypersensible) au cholécalciférol ou à tout autre excipient de D-CURE FORTE.

* si vous avez moins de 18 ans.

Notice

JE. Belgique.



Remboursable

1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT :**D-CURE® FORTE 100.000 U.I.,
solution buvable en ampoule, boîtes d'**

Substance active : Cholécalciférol (Vitamine D 3).

 PPU: 49,50 DH
 LOT: 19F18/B
 EXP 106/2022

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toutes autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

2. COMPOSITION DU MÉDICAMENT :

Ampoules buvables de 1 ml de solution huileuse :

Principe actif : Cholécalciférol 100.000 U.I.

Excipients :

Acétate d'alpha-Tocophérol – Essence d'écorce d'orange douce – Oléate de Polyglycérol (E475) – Huile d'olive raffinée pour faire 1 ml (= une ampoule).

3. CLASSE PHARMACEUTIQUE :

Vitamines.

4. INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES :

D-CURE FORTE 100.000 UI est utilisé en tant que traitement d'attaque pour la carence en vitamine D.

5. POSOLOGIE :**Mode et voies d'administration :**

Administration orale.

Les ampoules doivent être prises ou administrées conformément aux instructions de dosage.

La dose sera prise telle quelle ou en mélange avec des liquides.

Fréquence d'administration-durée du traitement :

Utilisez toujours D-CURE FORTE conformément aux instructions de votre médecin. En cas de doute, consultez à nouveau votre médecin ou pharmacien.

Le dosage doit être déterminé au cas par cas par le médecin traitant. S'il ne vous a pas été prescrit, il est recommandé de prendre une dose unique ou une dose cumulée de 100.000 UI sur 1 semaine.

Il est possible d'administrer 1 ampoule de D-CURE FORTE 100 000 U.I. en une seule dose ou 4 ampoules de D-CURE 25.000 U.I. par semaine. (100.000 U.I.).

6. CONTRE INDICATION :**N'utilisez pas D-CURE FORTE :**

- * si vous êtes allergique (hypersensible) au cholécalciférol ou à tout autre excipient de D-CURE FORTE.

* si vous avez moins de 18 ans.

Doliprane

PARACETAMOL

Doliprane® 1000 mg

PARACÉTAMOL

10 Comprimés



6 118000 040972

PPV: 14DH00

PER: 11/24

LOT: K3205

DOLIPRANE® 1000 mg, comprimé

La substance active est : paracétamol 1000 mg (1111,11 mg), pour un comprimé.

Les autres composants sont : croscarmell mais prégélatinisé, acide stéarique (origine

QU'EST-CE QUE DOLIPRANE® 1000 mg, COMPRIMÉ ?

Ce médicament contient du paracétamol. Il est indiqué en cas de douleur et/ou fièvre telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures, règles douloureuses. Il peut également être prescrit par votre médecin dans les douleurs de l'arthrose.

Cette présentation est réservée à l'adulte (à partir de 15 ans) :

Lire attentivement la rubrique "Posologie".

Pour les enfants de moins de 15 ans, il existe d'autres présentations de paracétamol. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

QUELLES SONT LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES AVANT DE PRENDRE DOLIPRANE® 1000 mg, COMPRIMÉ ?

Contre-indications :

Ne pas prendre DOLIPRANE® 1000 mg, comprimé dans les cas suivants : allergie connue au paracétamol, maladie grave du foie, enfant de moins de 15 ans.

PRENDRE DES PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES AVEC DOLIPRANE® 1000 mg, COMPRIMÉ :

Précautions Particulières :

Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours ou en cas d'efficacité insuffisante ou de survenue de tout autre signe, ne pas continuer le traitement sans l'avis de votre médecin.

En cas de maladie grave du foie ou des reins, il est nécessaire de consulter votre médecin avant de prendre du paracétamol.

Mises en garde :

En cas de surdosage ou de prise par erreur d'une dose trop élevée, consultez immédiatement votre médecin.

Ce médicament contient du paracétamol. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée (cf. chapitre "Posologie").

Grossesse et allaitement :

Le Paracétamol, dans les conditions normales d'utilisation, peut être utilisé pendant la grossesse ainsi qu'en cas d'allaitement.



Doliprane

PARACÉTAMOL

DOLIPRANE® 1000 mg, comprimé :

La substance active est : paracétamol 1000 mg (1111,11 mg), pour un comprimé.

Les autres composants sont : croscarmellos maïs prégelatinisé, acide stéarique (origine végétale)

QU'EST-CE QUE DOLIPRANE® 1000 mg ? CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament contient du paracétamol. Il réduit la fièvre telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures, règles douloureuses. Il peut également être prescrit par votre médecin dans les douleurs de l'arthrose.

Cette présentation est réservée à l'adulte (à partir de 15 ans) :

Lire attentivement la rubrique "Posologie".

Pour les enfants de moins de 15 ans, il existe d'autres présentations de paracétamol. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

QUELLES SONT LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES AVANT DE PRENDRE DOLIPRANE® 1000 mg, COMPRIMÉ ?

Contre-indications :

Ne pas prendre DOLIPRANE® 1000 mg, comprimé, si :

PPV: 14DH00
PER: 07/24
LOT: K1852

Doliprane® 1000 mg

PARACÉTAMOL

10 comprimés



6 118000 0409 72

Notice : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

CRESTOR 5 mg, comprimé pelliculé

CRESTOR 10 mg, comprimé pelliculé

CRESTOR 20 mg, comprimé pelliculé

Rosuvastatine

Maphar
Bd Aklimia N° 6, Ql,
Sidi Bernoussi, Casablanca
Crestor 10 mg Cd pell b30
P.P.V : 188,70 DH



Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

que contient cette notice ?

Qu'est-ce que CRESTOR, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?

Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CRESTOR, comprimé pelliculé ?

Comment prendre CRESTOR, comprimé pelliculé ?

Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comment conserver CRESTOR, comprimé pelliculé ?

Contenu de l'emballage et autres informations.

QU'EST-CE QUE CRESTOR, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Indication pharmacothérapeutique : Inhibiteur de l'HMG-CoA réductase - de ATC : C10A A07

CRESTOR appartient au groupe des médicaments appelés statines.

CRESTOR vous a été prescrit parce que :

Vous avez un taux élevé de cholestérol ce qui signifie que vous présentez un risque de faire une attaque cardiaque ou un accident vasculaire cérébral. CRESTOR est utilisé chez les adultes, les adolescents et les enfants âgés de 6 ans et plus pour traiter un taux de cholestérol élevé.

Ne prenez jamais CRESTOR, comprimé pelliculé :

- Si vous êtes allergique à la rosuvastatine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- Si vous êtes enceinte, si vous allaitez, arrêtez immédiatement le traitement et prévenez votre médecin ; il convient de prendre un contraceptif approprié pour éviter d'être enceinte pendant le traitement par CRESTOR.
- Si vous avez actuellement des problèmes hépatiques.
- Si vous avez des problèmes rénaux graves (si vous avez un doute, demandez à votre médecin).
- Si vous avez des troubles musculaires appelés myopathie (douleurs musculaires répétées ou inexpliquées).
- Si vous prenez de la cyclosporine (utilisée par exemple lors de greffes d'organes).

Si vous êtes concernés par l'une de ces situations (ou si vous avez un doute), parlez-en à votre médecin.

De plus, vous ne devez pas prendre 40 mg de CRESTOR (dosage le plus élevé) si :

- Vous avez une insuffisance rénale modérée (en cas de doute, demandez à votre médecin) ;
- Vous avez des troubles de la thyroïde ;
- Vous avez des douleurs musculaires répétées ou inexpliquées, des antécédents personnels ou familiaux de problèmes musculaires ou si vous avez déjà présenté des douleurs musculaires avec un autre médicament abaissant les taux de cholestérol ;
- Vous consommez régulièrement des quantités importantes d'alcool ;
- Vous êtes d'origine asiatique (japonais, chinois, philippin, vietnamien, coréen et indien) ;
- Vous êtes déjà traité par un autre médicament abaissant les taux de cholestérol appelé fibrate.

Si vous êtes concernés par l'une de ces situations (ou si vous avez un doute), parlez-en à votre médecin.

Notice : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

CRESTOR 5 mg, comprimé pelliculé

CRESTOR 10 mg, comprimé pelliculé

CRESTOR 20 mg, comprimé pelliculé

Rosuvastatine

Maphar
Bd Aklimia N° 6, Ql,
Sidi Bernoussi, Casablanca
Crestor 10 mg Cd pell b30
P.P.V : 188,70 DH



Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

que contient cette notice ?

Qu'est-ce que CRESTOR, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?

Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CRESTOR, comprimé pelliculé ?

Comment prendre CRESTOR, comprimé pelliculé ?

Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comment conserver CRESTOR, comprimé pelliculé ?

Contenu de l'emballage et autres informations.

QU'EST-CE QUE CRESTOR, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Indication pharmacothérapeutique : Inhibiteur de l'HMG-CoA réductase - de ATC : C10A A07

CRESTOR appartient au groupe des médicaments appelés statines.

CRESTOR vous a été prescrit parce que :

Vous avez un taux élevé de cholestérol ce qui signifie que vous présentez un risque de faire une attaque cardiaque ou un accident vasculaire cérébral. CRESTOR est utilisé chez les adultes, les adolescents et les enfants âgés de 6 ans et plus pour traiter un taux de cholestérol élevé.

Ne prenez jamais CRESTOR, comprimé pelliculé :

- Si vous êtes allergique à la rosuvastatine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- Si vous êtes enceinte, si vous allaitez, arrêtez immédiatement le traitement et prévenez votre médecin ; il convient de prendre un contraceptif approprié pour éviter d'être enceinte pendant le traitement par CRESTOR.
- Si vous avez actuellement des problèmes hépatiques.
- Si vous avez des problèmes rénaux graves (si vous avez un doute, demandez à votre médecin).
- Si vous avez des troubles musculaires appelés myopathie (douleurs musculaires répétées ou inexpliquées).
- Si vous prenez de la ciclosporine (utilisée par exemple lors de greffes d'organes).

Si vous êtes concernés par l'une de ces situations (ou si vous avez un doute), parlez-en à votre médecin.

De plus, vous ne devez pas prendre 40 mg de CRESTOR (dosage le plus élevé) si :

- Vous avez une insuffisance rénale modérée (en cas de doute, demandez à votre médecin) ;
- Vous avez des troubles de la thyroïde ;
- Vous avez des douleurs musculaires répétées ou inexpliquées, des antécédents personnels ou familiaux de problèmes musculaires ou si vous avez déjà présenté des douleurs musculaires avec un autre médicament abaissant les taux de cholestérol ;
- Vous consommez régulièrement des quantités importantes d'alcool ;
- Vous êtes d'origine asiatique (japonais, chinois, philippin, vietnamien, coréen et indien) ;
- Vous êtes déjà traité par un autre médicament abaissant les taux de cholestérol appelé fibrate.

Si vous êtes concernés par l'une de ces situations (ou si vous avez un doute), parlez-en à votre médecin.

Notice : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

CRESTOR 5 mg, comprimé pelliculé

CRESTOR 10 mg, comprimé pelliculé

CRESTOR 20 mg, comprimé pelliculé

Rosuvastatine

Maphar
Bd Aklimia N° 6, Ql,
Sidi Bernoussi, Casablanca
Crestor 10 mg Cd pell b30
P.P.V : 188,70 DH



Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

que contient cette notice ?

Qu'est-ce que CRESTOR, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?

Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CRESTOR, comprimé pelliculé ?

Comment prendre CRESTOR, comprimé pelliculé ?

Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comment conserver CRESTOR, comprimé pelliculé ?

Contenu de l'emballage et autres informations.

QU'EST-CE QUE CRESTOR, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Indication pharmacothérapeutique : Inhibiteur de l'HMG-CoA réductase - de ATC : C10A A07

CRESTOR appartient au groupe des médicaments appelés statines.

CRESTOR vous a été prescrit parce que :

Vous avez un taux élevé de cholestérol ce qui signifie que vous présentez un risque de faire une attaque cardiaque ou un accident vasculaire cérébral. CRESTOR est utilisé chez les adultes, les adolescents et les enfants âgés de 6 ans et plus pour traiter un taux de cholestérol élevé.

Ne prenez jamais CRESTOR, comprimé pelliculé :

- Si vous êtes allergique à la rosuvastatine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- Si vous êtes enceinte, si vous allaitez, arrêtez immédiatement le traitement et prévenez votre médecin ; il convient de prendre un contraceptif approprié pour éviter d'être enceinte pendant le traitement par CRESTOR.
- Si vous avez actuellement des problèmes hépatiques.
- Si vous avez des problèmes rénaux graves (si vous avez un doute, demandez à votre médecin).
- Si vous avez des troubles musculaires appelés myopathie (douleurs musculaires répétées ou inexpliquées).
- Si vous prenez de la ciclosporine (utilisée par exemple lors de greffes d'organes).

Si vous êtes concernés par l'une de ces situations (ou si vous avez un doute), parlez-en à votre médecin.

De plus, vous ne devez pas prendre 40 mg de CRESTOR (dosage le plus élevé) si :

- Vous avez une insuffisance rénale modérée (en cas de doute, demandez à votre médecin) ;
- Vous avez des troubles de la thyroïde ;
- Vous avez des douleurs musculaires répétées ou inexpliquées, des antécédents personnels ou familiaux de problèmes musculaires ou si vous avez déjà présenté des douleurs musculaires avec un autre médicament abaissant les taux de cholestérol ;
- Vous consommez régulièrement des quantités importantes d'alcool ;
- Vous êtes d'origine asiatique (japonais, chinois, philippin, vietnamien, coréen et indien) ;
- Vous êtes déjà traité par un autre médicament abaissant les taux de cholestérol appelé fibrate.

Si vous êtes concernés par l'une de ces situations (ou si vous avez un doute), parlez-en à votre médecin.

Notice : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

CRESTOR 5 mg, comprimé pelliculé

CRESTOR 10 mg, comprimé pelliculé

CRESTOR 20 mg, comprimé pelliculé

Rosuvastatine

Maphar
Bd Aklimia N° 6, Ql,
Sidi Bernoussi, Casablanca
Crestor 10 mg Cd pell b30
P.P.V : 188,70 DH



Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

que contient cette notice ?

Qu'est-ce que CRESTOR, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?

Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CRESTOR, comprimé pelliculé ?

Comment prendre CRESTOR, comprimé pelliculé ?

Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comment conserver CRESTOR, comprimé pelliculé ?

Contenu de l'emballage et autres informations.

QU'EST-CE QUE CRESTOR, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Indication pharmacothérapeutique : Inhibiteur de l'HMG-CoA réductase - de ATC : C10A A07

CRESTOR appartient au groupe des médicaments appelés statines.

CRESTOR vous a été prescrit parce que :

Vous avez un taux élevé de cholestérol ce qui signifie que vous présentez un risque de faire une attaque cardiaque ou un accident vasculaire cérébral. CRESTOR est utilisé chez les adultes, les adolescents et les enfants âgés de 6 ans et plus pour traiter un taux de cholestérol élevé.

Ne prenez jamais CRESTOR, comprimé pelliculé :

- Si vous êtes allergique à la rosuvastatine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- Si vous êtes enceinte, si vous allaitez, arrêtez immédiatement le traitement et prévenez votre médecin ; il convient de prendre un contraceptif approprié pour éviter d'être enceinte pendant le traitement par CRESTOR.
- Si vous avez actuellement des problèmes hépatiques.
- Si vous avez des problèmes rénaux graves (si vous avez un doute, demandez à votre médecin).
- Si vous avez des troubles musculaires appelés myopathie (douleurs musculaires répétées ou inexpliquées).
- Si vous prenez de la cyclosporine (utilisée par exemple lors de greffes d'organes).

Si vous êtes concernés par l'une de ces situations (ou si vous avez un doute), parlez-en à votre médecin.

De plus, vous ne devez pas prendre 40 mg de CRESTOR (dosage le plus élevé) si :

- Vous avez une insuffisance rénale modérée (en cas de doute, demandez à votre médecin) ;
- Vous avez des troubles de la thyroïde ;
- Vous avez des douleurs musculaires répétées ou inexpliquées, des antécédents personnels ou familiaux de problèmes musculaires ou si vous avez déjà présenté des douleurs musculaires avec un autre médicament abaissant les taux de cholestérol ;
- Vous consommez régulièrement des quantités importantes d'alcool ;
- Vous êtes d'origine asiatique (japonais, chinois, philippin, vietnamien, coréen et indien) ;
- Vous êtes déjà traité par un autre médicament abaissant les taux de cholestérol appelé fibrate.

Si vous êtes concernés par l'une de ces situations (ou si vous avez un doute), parlez-en à votre médecin.