

ECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR VER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Sons générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.



Déclaration de Maladie

M22- N° 001511

22/03/2021

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1952 Société : AFM

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : Sayadi DRIS

Date de naissance :

Adresse :

Tél. :

Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : / /

Nom et prénom du malade : Age :

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Age :

Enfant

Nature de la maladie :

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC

Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :



RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR OBTENIR LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Informations générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 [LG] - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° M20- 090792

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1352 Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

Sayouti Dris

Date de naissance :

1948

Adresse :

187 Rue 29 Hay Onfa

Tél. 06 75 777 335 Total des frais engagés :

Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : 30/03/2022

Nom et prénom du malade : SAYOUTI DRIS Age :

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

- 8RO 19 QUE ALLAH DRIS

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : / / /

Signature de l'adhérent(e) :

(Signature)

VOLET ADHERENT

Déclaration de maladie N° M20 0792

Remplissez ce volet, découpez-le et conservez-le.

Il sera nécessaire de le présenter pour toute réclamation ultérieure.

Coupon à conserver par l'adhérent(e).

Matricule :

Nom de l'adhérent(e) :

Total des frais engagés :

Date de dépôt :

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
30/03/2022 Ve			Marie TOUABL OGUE 2500H Abdullah-Cass 22/3/2022	J. Touabl OGUE Abdullah-Cass 22/3/2022

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE BOUKHARI Dr RFI K717 KOHIA Av.Oued Draa Rue 33 N° 43- El Oulfa Tel :0522 90 52 23 Casa	30/3/22	1009.10

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

VOLET ADHERENT



* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan


SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	H 25533412 00000000 D 00000000 35533411	21433552 00000000 G 00000000 11433553	B	COEFFICIENT DES TRAVAUX
	(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr. Khalid TOUABI
CHIRURGIEN UROLOGUE

Maladie du Rein et de l'Appareil Urinaire
Maladie Sexuellement Transmissibles
Stérilité Masculine - Impuissance Sexuelle
Lithotriptie extra-corporelle
Membre de l'Association Française d'Urologie
Diplômé de l'université de Nice
Sophia-Antipolis (France)



الدكتور خالد توابي

اختصاصي في أمراض الكلية
والمسالك البولية - العقم الجنسي
الأمراض التناسلية - تفتيت الحصى

عضو الجمعية الفرنسية
لأمراض الكلية و المسالك البولية
خريج كلية الطب بنين (فرنسا)

Casablanca, Le:

80 / 03 / 2014
Dr. Khalid Touabi
11 Rue Prince My Abdellah Casablanca
Tél.: 05 22.27.22.41 / 05 22.19.30

19310

· constipation



109 1652

163,20X5

Durka



1 CP

PHARMACIE BOUKHA
Dr. RFIKI KHA
Av. Oued Draa Rue F44/H4
El Oufia Tel: 0522 90 52 23 Casablanca

PPV: 193DH10

CODE No: MP/DRUGS/25/24/83

Médicament Autorisé N°: 213/14 DMP/21/NNP

5 mn

100910

Dr. Khalid TOUABI
UROLOGUE
11 Rue Prince My Abdellah-Casablanca
Tél.: 05 22.27.22.41 / 05 22.19.30

AS

زنقة الأمير مولاي عبد الله (فوق ياق زوشي) - الدار البيضاء

11, Rue Prince My Abdelleah (au dessus de Yves Rocher) - Casablanca

البريد الإلكتروني : Email : urotk@yahoo.fr - الهاتف : Tél.: 05 22.27.22.41 / 05 22.27.19.30

fax : 05 22.27.59.43 - الفاكس :



DUSTA® 0.5 Mg

Boîtes de 30 et 90 capsules molles

Dutasteride

PPV : 163 Dhs 20

N° de LOT.: LF24830A

Date d'EXP: 10/2023



nt. Elle contient des informatic

édecin ou votre pharmacien.

d'autres personnes. Il pourrait être.

et indésirable non mentionné

Comment prendre Dusta ?

Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comment conserver Dusta ?

Informations supplémentaires.

- QU'EST-CE QUE DUSTA® ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe Pharmaco thérapeutique :

La substance active est le Dutasteride. Il appartient à une classe de médicaments appelée inhibiteurs de la 5-alpha réductase.

Indications Thérapeutiques :

Dusta est utilisé dans le traitement de l'hypertrophie bénigne de la prostate (augmentation du volume de la prostate) chez les hommes. C'est un grossissement non cancéreux de la glande prostatique, provoqué par la production trop importante d'une hormone appelée Dihydrotestostérone.

L'augmentation du volume de la prostate peut provoquer des problèmes urinaires, tels que des difficultés pour commencer à uriner et une envie fréquente d'uriner. Le jet d'urine peut également être ralenti et moins puissant. Si elle n'est pas traitée, il y a un risque que votre écoulement urinaire soit complètement bloqué (réception aiguë d'urine). Ceci nécessite un traitement médical immédiat. Dans certains cas, le recours à la chirurgie est nécessaire pour enlever ou réduire la taille de la glande prostatique. Dusta diminue la production de Dihydrotestostérone, ce qui permet de réduire la taille de la prostate et d'améliorer les symptômes. Ceux-ci réduisent le risque de réception aiguë d'urine et le recours à la chirurgie.

Dusta peut également être utilisé avec un autre médicament appelé Tamsulosine (utilisé dans le traitement des symptômes de l'hypertrophie de la prostate).

- QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAITRE AVANT DE PRENDRE DUSTA® ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Sans objet

Contre-indications :

Ne prenez jamais Dusta :

- Si vous êtes allergique au Dutasteride, aux autres inhibiteurs de la 5-alpha-réductase, au soja, à la cacahuète ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).
- Si vous avez une maladie hépatique sévère (maladie du foie).
- Si vous pensez que l'un de ces cas vous concerne, ne prenez pas ce médicament tant que vous n'avez pas vérifié auprès de votre médecin.

Ce médicament est indiqué uniquement chez l'homme adulte. Il ne doit pas être pris par les femmes, les enfants ou les adolescents.

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à l'arachide ou au soja, en raison de la présence d'huile de soja.

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Avertissements et précautions :

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Dusta.

• Dans certaines études cliniques, les patients prenant du Dutasteride avec un autre médicament appelé alpha-bloquant (comme la Tamsulosine) ont été plus nombreux à avoir une insuffisance cardiaque que les patients prenant uniquement du Dutasteride ou un alpha-bloquant. L'insuffisance cardiaque signifie que votre cœur ne pompe pas le sang aussi bien qu'il le devrait.

• Assurez-vous que votre médecin soit informé de vos troubles hépatiques (maladie du foie). Si vous avez eu des maladies ayant affecté votre foie, vous devrez éventuellement vous soumettre à des examens complémentaires au cours du traitement par Dusta.

• Les femmes, les enfants et les adolescents ne doivent pas manipuler les capsules de Dusta endommagées, car la substance active peut être absorbée par la peau. S'il y a un contact avec la peau, lavez immédiatement la zone concernée à l'eau et au savon.

• Utilisez un préservatif lors des rapports sexuels. Le Dutasteride a été retrouvé dans

• Si votre partenaire est enceinte ou est susceptible de l'être.

• Assurez-vous où le Dutasteride peut affecter le désir.

• Le Dutasteride diminue la



DUSTA® 0.5 Mg
Boîtes de 30 et 90 capsules molles
Dutasteride

PPV : 163 Dhs 20

N° de LOT.: LF24830A

Date d'EXP: 10/2023



nt. Elle contient des informatic

édecin ou votre pharmacien.

d'autres personnes. Il pourrait être.

et indésirable non mentionné

Comment prendre Dusta ?

Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comment conserver Dusta ?

Informations supplémentaires.

- QU'EST-CE QUE DUSTA® ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe Pharmaco thérapeutique :

La substance active est le Dutasteride. Il appartient à une classe de médicaments appelée inhibiteurs de la 5-alpha réductase.

Indications Thérapeutiques :

Dusta est utilisé dans le traitement de l'hypertrophie bénigne de la prostate (augmentation du volume de la prostate) chez les hommes. C'est un grossissement non cancéreux de la glande prostatique, provoqué par la production trop importante d'une hormone appelée Dihydrotestostérone.

L'augmentation du volume de la prostate peut provoquer des problèmes urinaires, tels que des difficultés pour commencer à uriner et une envie fréquente d'uriner. Le jet d'urine peut également être ralenti et moins puissant. Si elle n'est pas traitée, il y a un risque que votre écoulement urinaire soit complètement bloqué (réception aiguë d'urine). Ceci nécessite un traitement médical immédiat. Dans certains cas, le recours à la chirurgie est nécessaire pour enlever ou réduire la taille de la glande prostatique. Dusta diminue la production de Dihydrotestostérone, ce qui permet de réduire la taille de la prostate et d'améliorer les symptômes. Ceux-ci réduisent le risque de réception aiguë d'urine et le recours à la chirurgie.

Dusta peut également être utilisé avec un autre médicament appelé Tamsulosine (utilisé dans le traitement des symptômes de l'hypertrophie de la prostate).

- QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAITRE AVANT DE PRENDRE DUSTA® ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Sans objet

Contre-indications :

Ne prenez jamais Dusta :

- Si vous êtes allergique au Dutasteride, aux autres inhibiteurs de la 5-alpha-réductase, au soja, à la cacahuète ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6),
- Si vous avez une maladie hépatique sévère (maladie du foie),
- Si vous pensez que l'un de ces cas vous concerne, ne prenez pas ce médicament tant que vous n'avez pas vérifié auprès de votre médecin.

Ce médicament est indiqué uniquement chez l'homme adulte. Il ne doit pas être pris par les femmes, les enfants ou les adolescents.

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à l'arachide ou au soja, en raison de la présence d'huile de soja.

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Avertissements et précautions :

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Dusta.

• Dans certaines études cliniques, les patients prenant du Dutasteride avec un autre médicament appelé alpha-bloquant (comme la Tamsulosine) ont été plus nombreux à avoir une insuffisance cardiaque que les patients prenant uniquement du Dutasteride ou un alpha-bloquant. L'insuffisance cardiaque signifie que votre cœur ne pompe pas le sang aussi bien qu'il le devrait.

• Assurez-vous que votre médecin soit informé de vos troubles hépatiques (maladie du foie). Si vous avez eu des maladies ayant affecté votre foie, vous devrez éventuellement vous soumettre à des examens complémentaires au cours du traitement par Dusta.

• Les femmes, les enfants et les adolescents ne doivent pas manipuler les capsules de Dusta endommagées, car la substance active peut être absorbée par la peau. S'il y a un contact avec la peau, lavez immédiatement la zone concernée à l'eau et au savon.

• Utilisez un préservatif lors des rapports sexuels. Le Dutasteride a été retrouvé dans

• Si votre partenaire est enceinte ou est susceptible de l'être.

• Assurez-vous où le Dutasteride peut affecter le désir.

• Le Dutasteride diminue la libido.



DUSTA® 0.5 Mg
Boîtes de 30 et 90 capsules molles
Dutasteride

PPV : 163 Dhs 20

N° de LOT.: LF24830A

Date d'EXP: 10/2023



nt. Elle contient des informatic

édecin ou votre pharmacien.

d'autres personnes. Il pourrait être.

et indésirable non mentionné

Comment prendre Dusta ?

Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comment conserver Dusta ?

Informations supplémentaires.

- QU'EST-CE QUE DUSTA® ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe Pharmaco thérapeutique :

La substance active est le Dutasteride. Il appartient à une classe de médicaments appelée inhibiteurs de la 5-alpha réductase.

Indications Thérapeutiques :

Dusta est utilisé dans le traitement de l'hypertrophie bénigne de la prostate (augmentation du volume de la prostate) chez les hommes. C'est un grossissement non cancéreux de la glande prostatique, provoqué par la production trop importante d'une hormone appelée Dihydrotestostérone.

L'augmentation du volume de la prostate peut provoquer des problèmes urinaires, tels que des difficultés pour commencer à uriner et une envie fréquente d'uriner. Le jet d'urine peut également être ralenti et moins puissant. Si elle n'est pas traitée, il y a un risque que votre écoulement urinaire soit complètement bloqué (réception aiguë d'urine). Ceci nécessite un traitement médical immédiat. Dans certains cas, le recours à la chirurgie est nécessaire pour enlever ou réduire la taille de la glande prostatique. Dusta diminue la production de Dihydrotestostérone, ce qui permet de réduire la taille de la prostate et d'améliorer les symptômes. Ceux-ci réduisent le risque de réception aiguë d'urine et le recours à la chirurgie.

Dusta peut également être utilisé avec un autre médicament appelé Tamsulosine (utilisé dans le traitement des symptômes de l'hypertrophie de la prostate).

- QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAITRE AVANT DE PRENDRE DUSTA® ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Sans objet

Contre-indications :

Ne prenez jamais Dusta :

- Si vous êtes allergique au Dutasteride, aux autres inhibiteurs de la 5-alpha-réductase, au soja, à la cacahuète ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6),
- Si vous avez une maladie hépatique sévère (maladie du foie),
- Si vous pensez que l'un de ces cas vous concerne, ne prenez pas ce médicament tant que vous n'avez pas vérifié auprès de votre médecin.

Ce médicament est indiqué uniquement chez l'homme adulte. Il ne doit pas être pris par les femmes, les enfants ou les adolescents.

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à l'arachide ou au soja, en raison de la présence d'huile de soja.

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Avertissements et précautions :

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Dusta.

• Dans certaines études cliniques, les patients prenant du Dutasteride avec un autre médicament appelé alpha-bloquant (comme la Tamsulosine) ont été plus nombreux à avoir une insuffisance cardiaque que les patients prenant uniquement du Dutasteride ou un alpha-bloquant. L'insuffisance cardiaque signifie que votre cœur ne pompe pas le sang aussi bien qu'il le devrait.

• Assurez-vous que votre médecin soit informé de vos troubles hépatiques (maladie du foie). Si vous avez eu des maladies ayant affecté votre foie, vous devrez éventuellement vous soumettre à des examens complémentaires au cours du traitement par Dusta.

• Les femmes, les enfants et les adolescents ne doivent pas manipuler les capsules de Dusta endommagées, car la substance active peut être absorbée par la peau. S'il y a un contact avec la peau, lavez immédiatement la zone concernée à l'eau et au savon.

• Utilisez un préservatif lors des rapports sexuels. Le Dutasteride a été retrouvé dans

• Si votre partenaire est enceinte ou est susceptible de l'être.

• Assurez-vous où le Dutasteride peut affecter le désir.

• Le Dutasteride diminue la



DUSTA® 0.5 Mg
Boîtes de 30 et 90 capsules molles
Dutasteride

PPV : 163 Dhs 20

N° de LOT.: LF24830A

Date d'EXP: 10/2023



nt. Elle contient des informatic

édecin ou votre pharmacien.

d'autres personnes. Il pourrait être.

et indésirable non mentionné

Comment prendre Dusta ?

Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comment conserver Dusta ?

Informations supplémentaires.

- QU'EST-CE QUE DUSTA® ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe Pharmaco thérapeutique :

La substance active est le Dutasteride. Il appartient à une classe de médicaments appelée inhibiteurs de la 5-alpha réductase.

Indications Thérapeutiques :

Dusta est utilisé dans le traitement de l'hypertrophie bénigne de la prostate (augmentation du volume de la prostate) chez les hommes. C'est un grossissement non cancéreux de la glande prostatique, provoqué par la production trop importante d'une hormone appelée Dihydrotestostérone.

L'augmentation du volume de la prostate peut provoquer des problèmes urinaires, tels que des difficultés pour commencer à uriner et une envie fréquente d'uriner. Le jet d'urine peut également être ralenti et moins puissant. Si elle n'est pas traitée, il y a un risque que votre écoulement urinaire soit complètement bloqué (réception aiguë d'urine). Ceci nécessite un traitement médical immédiat. Dans certains cas, le recours à la chirurgie est nécessaire pour enlever ou réduire la taille de la glande prostatique. Dusta diminue la production de Dihydrotestostérone, ce qui permet de réduire la taille de la prostate et d'améliorer les symptômes. Ceux-ci réduisent le risque de réception aiguë d'urine et le recours à la chirurgie.

Dusta peut également être utilisé avec un autre médicament appelé Tamsulosine (utilisé dans le traitement des symptômes de l'hypertrophie de la prostate).

- QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAITRE AVANT DE PRENDRE DUSTA® ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Sans objet

Contre-indications :

Ne prenez jamais Dusta :

- Si vous êtes allergique au Dutasteride, aux autres inhibiteurs de la 5-alpha-réductase, au soja, à la cacahuète ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6),
- Si vous avez une maladie hépatique sévère (maladie du foie),
- Si vous pensez que l'un de ces cas vous concerne, ne prenez pas ce médicament tant que vous n'avez pas vérifié auprès de votre médecin.

Ce médicament est indiqué uniquement chez l'homme adulte. Il ne doit pas être pris par les femmes, les enfants ou les adolescents.

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à l'arachide ou au soja, en raison de la présence d'huile de soja.

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Avertissements et précautions :

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Dusta.

• Dans certaines études cliniques, les patients prenant du Dutasteride avec un autre médicament appelé alpha-bloquant (comme la Tamsulosine) ont été plus nombreux à avoir une insuffisance cardiaque que les patients prenant uniquement du Dutasteride ou un alpha-bloquant. L'insuffisance cardiaque signifie que votre cœur ne pompe pas le sang aussi bien qu'il le devrait.

• Assurez-vous que votre médecin soit informé de vos troubles hépatiques (maladie du foie). Si vous avez eu des maladies ayant affecté votre foie, vous devrez éventuellement vous soumettre à des examens complémentaires au cours du traitement par Dusta.

• Les femmes, les enfants et les adolescents ne doivent pas manipuler les capsules de Dusta endommagées, car la substance active peut être absorbée par la peau. S'il y a un contact avec la peau, lavez immédiatement la zone concernée à l'eau et au savon.

• Utilisez un préservatif lors des rapports sexuels. Le Dutasteride a été retrouvé dans

• Si votre partenaire est enceinte ou est susceptible de l'être.

• Assurez-vous où le Dutasteride peut affecter le désir.

• Le Dutasteride diminue la



DUSTA® 0.5 Mg
Boîtes de 30 et 90 capsules molles
Dutasteride

PPV : 163 Dhs 20

N° de LOT.: LF24830A

Date d'EXP: 10/2023



nt. Elle contient des informatic

édecin ou votre pharmacien.

d'autres personnes. Il pourrait être.

et indésirable non mentionné

Comment prendre Dusta ?

Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comment conserver Dusta ?

Informations supplémentaires.

- QU'EST-CE QUE DUSTA® ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe Pharmaco thérapeutique :

La substance active est le Dutasteride. Il appartient à une classe de médicaments appelée inhibiteurs de la 5-alpha réductase.

Indications Thérapeutiques :

Dusta est utilisé dans le traitement de l'hypertrophie bénigne de la prostate (augmentation du volume de la prostate) chez les hommes. C'est un grossissement non cancéreux de la glande prostatique, provoqué par la production trop importante d'une hormone appelée Dihydrotestostérone.

L'augmentation du volume de la prostate peut provoquer des problèmes urinaires, tels que des difficultés pour commencer à uriner et une envie fréquente d'uriner. Le jet d'urine peut également être ralenti et moins puissant. Si elle n'est pas traitée, il y a un risque que votre écoulement urinaire soit complètement bloqué (réception aiguë d'urine). Ceci nécessite un traitement médical immédiat. Dans certains cas, le recours à la chirurgie est nécessaire pour enlever ou réduire la taille de la glande prostatique. Dusta diminue la production de Dihydrotestostérone, ce qui permet de réduire la taille de la prostate et d'améliorer les symptômes. Ceux-ci réduisent le risque de réception aiguë d'urine et le recours à la chirurgie.

Dusta peut également être utilisé avec un autre médicament appelé Tamsulosine (utilisé dans le traitement des symptômes de l'hypertrophie de la prostate).

- QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAITRE AVANT DE PRENDRE DUSTA® ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Sans objet

Contre-indications :

Ne prenez jamais Dusta :

- Si vous êtes allergique au Dutasteride, aux autres inhibiteurs de la 5-alpha-réductase, au soja, à la cacahuète ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6),
- Si vous avez une maladie hépatique sévère (maladie du foie),
- Si vous pensez que l'un de ces cas vous concerne, ne prenez pas ce médicament tant que vous n'avez pas vérifié auprès de votre médecin.

Ce médicament est indiqué uniquement chez l'homme adulte. Il ne doit pas être pris par les femmes, les enfants ou les adolescents.

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à l'arachide ou au soja, en raison de la présence d'huile de soja.

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Avertissements et précautions :

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Dusta.

• Dans certaines études cliniques, les patients prenant du Dutasteride avec un autre médicament appelé alpha-bloquant (comme la Tamsulosine) ont été plus nombreux à avoir une insuffisance cardiaque que les patients prenant uniquement du Dutasteride ou un alpha-bloquant. L'insuffisance cardiaque signifie que votre cœur ne pompe pas le sang aussi bien qu'il le devrait.

• Assurez-vous que votre médecin soit informé de vos troubles hépatiques (maladie du foie). Si vous avez eu des maladies ayant affecté votre foie, vous devrez éventuellement vous soumettre à des examens complémentaires au cours du traitement par Dusta.

• Les femmes, les enfants et les adolescents ne doivent pas manipuler les capsules de Dusta endommagées, car la substance active peut être absorbée par la peau. S'il y a un contact avec la peau, lavez immédiatement la zone concernée à l'eau et au savon.

• Utilisez un préservatif lors des rapports sexuels. Le Dutasteride a été retrouvé dans

• Si votre partenaire est enceinte ou est susceptible de l'être.

• Assurez-vous où le Dutasteride peut affecter le désir.

• Le Dutasteride diminue la