

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données caractére personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 14887 Société : RAM

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : K.TIRI AMINA

Date de naissance :

Adresse : Habituelle

Tél. : 06.66.93.96.26 Total des frais engagés : 13.83.50 + 300 / 16.83.50 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr. Hind EL FILALI ADIB  
Cardiologue  
Cardiologue Interventionnelle  
120, Bd. My Idriss 1er- Résidence My Idriss  
2ème Etage - N° A CASABLANCA  
0522 26 20 74 Fax: 0522 26 20 78  
0522 26 20 74 ICE : 001624837000081

Date de consultation :

Nom et prénom du malade : K.TIRI AMINA

Lien de parenté :  Lui-même  Conjoint

Nature de la maladie : Hypertension Artérielle

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca Le : ..... / ..... / .....

Signature de l'adhérent(e) : 

## **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le paiement des Actes
05/02/2022	DS		30,00	 <b>Dr. Hind El Filali</b> Cardiologue Interventionnelle 20, Bd My Idriss 1er - Résidence My Idriss Casablanca - Maroc - Tel: 0523 86 20 74 - Fax: 0523 86 20 78 091628537000091

## **EXECUTION DES ORDONNANCES**

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
SAF PHARMACEUTICALS LTD.	05/03/2022	1383,50

## **ANALYSES - RADIOGRAPHIES**

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Cœfficients	Montant des Honoraires

## AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.


#### **Important :**

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de

O.D.F  
PROTHESES DENTAIRES

## DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
D	C
00000000	00000000
35533411	11433553



#### **[Création, remont, adjonction]**

VISA ET SAGUET DU PRATICIEN ATTESTANT LE REVIS

VISA ET SACHEZ DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION



**Dr Hind EL FILALI ADIB**

Cardiologue

Cardiologue Interventionnelle

Diplômée de la faculté de médecine de Bordeaux

Epreuve d'effort-Echographie cardiaque  
Réadaptation cardiaque

الدكتورة هند الفيلالي أديب  
أخصائية في أمراض القلب والشرايين  
أخصائية في قسطرة أمراض القلب والشرايين  
خريجة كلية الطب ببوردو

فحص القلب بالصدى - اختبار الجهد  
إعادة التأهيل القلبي

Casablanca, le : 05/03/2022

**Ordonnance**

**Mme KTIRI AMINA**

315470  
3X ARTEMON 5/5mg 1CP/J LE MATIN  
68,90  
FLUDEX LP 1.5mg 1CP/J LE MATIN  
50  
NEOVIMAG PLUS 1GELX2/J  
84,00  
MELATONINE 2CP/J LE SOIR  
32+ 49,60  
D CURE FORTE 100.000 UI 1 AMPOULE A BOIRE TOUS LES 15J

QSP 3 MOIS

Dr. Hind EL FILALI ADIB  
Cardiologue  
Cardiologue Interventionnelle  
120, Bd. My Idriss 1er- Résidence My Idriss  
2ème Etage - N° 4 CASABLANCA  
Tél: 0522 86 20 74 - Fax: 0522 86 20 76  
ICP : 001625537000001

Docteur Hind EL FILALI

PPV: 49,60 DH  
TOT: 21129  
EXP: 09/2024

PPV: 49,60 DH  
TOT: 21129  
EXP: 09/2024

## أرتمون<sup>(٤)</sup> 5 ملغ 10 ملغ

علبة تحتوي على 30 جبنة  
بيراندوريل أرجين/المورفين

## أرتمون<sup>(٤)</sup> 10 ملغ 10 ملغ

علبة تحتوي على 30 جبنة  
بيراندوريل أرجين/المورفين

## أرتمون<sup>(٤)</sup> 5 ملغ 5 ملغ

علبة تحتوي على 30 جبنة  
بيراندوريل أرجين/المورفين

## أرتمون<sup>(٤)</sup> 10 ملغ 5 ملغ

علبة تحتوي على 30 جبنة  
بيراندوريل أرجين/المورفين

LOT N°

EXP:

PPV:

154,30

يجب التقدّم للطبيب الذي وصفها لك طبيب، فلن شكّوك بالي أمر، عليك بمراعحة الطبيب أو الصيدلي.

تناول حبة مع كأس من الماء، ويستحسن اخذها في الوقت ذاته أي كل يوم في الصباح قبل وجبة الإفطار.

إن طيبك هو الذي يقرر الجرعة المناسبة لوضعك، الجرعة العاديّة عبارة عن جبنة واحدة في اليوم.

يوصى أرتمون<sup>(٤)</sup> عادةً للمتذوقين بواسطة البراندوريل والأمورفين بجعات مقتضنة.

الأعراض والتسلّيات في حال الهرة الزائدة الهرة إن طرأ وأخذت جبنة مقتضنة، (فصل قوراً بالقرب من مستنقع الطوارئ) أو بطيئك الخامس.

فكّر ما تحصل وقوفة في حال الإفراط في حبوب الضغط الشرياني، تناول عنه آخر من دوحة وذهوله، فإن حدث هذا، يمكن ملائكته بمقدار المريض مع رفع السقين للأعلى.

الإشكالات في حالة الشفاعة وحل محل كلارن من هرمونات من الهراء

من الهمج جاد الدواء وبعدها بصورة مقتضنة كي يعطي أفضل مفعوله، فإن سهوته عنأخذ جرعة أرتمون<sup>(٤)</sup> أطيلك بالذلة الحرقة الثانية في اليوم التالي وفي وقتها المحدد، ولا يجوز على

الاطفال مضايضة الجرعة تعويضاً عن السهر.

مفعول الاستحسان إن العلاج بواسطة أرتمون<sup>(٤)</sup> يستمر طيلة الحياة، لذا يجب أن تستشير طيبك قبل التوقف عن تناول هذا الدواء.

إذا كانت لديك أي أسلمة إضافية تتعلق باستعمال هذا الدواء، فالرجاء طلب المزيد من المعلومات من طيبك أو الصيدلي.

4 - ما هي الآثار الجانبية المختلطة؟

وصف الآثار الجانبية كما هو الحال مع كل دواء، قد تظهر مع أرتمون<sup>(٤)</sup> بعض الأعراض المرجعية رغم أنها لا تخص كافة المرضى.

إذا اطلعت حدوث أي من التأثيرات الجانبية المذكورة فيما يلي، عليك أن تتوقف مباشرةً عن تناول هذا الدواء، وأن تصلح بيتك على الفور:

• شعور مفاجئ بالإرهاق أو اضطراب أو اضطراب أو ضيق التنفس أو صعوبة التنفس،

• تضخم في السنان، أو في التجويف مما يسبب صعوبة شديدة في التنفس،

• تفاعلات حادة خطيرة تؤدي إلى انتفاخات جلدية كثيفة، طفح وحرار الحد المتناثر في جميع أنحاء الجسم، حكة شديدة وتكتل برواطات، وحرار الحد التورم، التهاب الأعصاب المحيطة (متلازمة سفينزون)، أو غير ذلك من التفاعلات الحساسية،

• درجة حرارة أو ارتفاع،

• التهاب البكرياس الذي يودي إلى الام شديد في البطن والظهر مع شعور بالإعماق الشديد،

تم الإبلاغ عن حدوث التأثيرات الجانبية الشائعة التالية، إذا كان أي منها قد يبيك لك مشكلة أو

- يرجى قراءة هذا الاشعار بعناية قبل اتخاذ هذا الدواء لأنّه يحتوي على معلومات هامة بالنسبة لك - أيقى هذه التشوه، قد تتحاج لقرأتها مرة أخرى .

- أصال طبتك أو الصيدلي إذا كان لديك استثناءة أخرى .

- قد وصف هذا الدواء لك لغرض تعطيله لأخرين، قد تضرّهم، حتى لو لم يأعرضهم هي نفس أعراضك .

- تحدث مع طيبك أو الصيدلي إذا أحستت باثار جانبية . وهذا يطبق أيضاً على أي اثار جانبية متعلقة غير المدرجة في هذه النشرة .

في هذه النشرة:

1 - فهو أرتمون<sup>(٤)</sup> وباي الحالات يتم استخدامه؟

2 - ما يجب اتباعه قبل استخدام أرتمون<sup>(٤)</sup>؟

3 - كيف يستخدم أرتمون<sup>(٤)</sup>؟

4 - ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟

5 - كيف يتم تذكر أرتمون<sup>(٤)</sup>؟

6 - معلومات إضافية.

1 - ما هو أرتمون<sup>(٤)</sup> وباي الحالات يتم استخدامه؟

ال النوع الصيدلي والمعلماني: متبلل للحمير المجزولة للأنيجوتين(IEC) و حاصر للكلسيوم.

يوصى أرتمون<sup>(٤)</sup> لعلاج ارتفاع ضغط الشريان و/أو لعلاج الأمراض الالكتيلية الثابتة (في حال تناوله، أو لارتفاع الدام الاردار للقلب)

فيزيد المتذوقين بواسطة البراندوريل والأمورفين بأخذ المذكى في حبة واحدة من أرتمون<sup>(٤)</sup>.

إن أرتمون<sup>(٤)</sup> بذرة عن مزيج من مثبتات قنوات البراندوريل والأمورفين(IEC) أو الأمورفين حاصر للكلسيوم.

إن البراندوريل يطبق للحمير المجزولة للأنيجوتين(IEC) أو الأمورفين حاصر للكلسيوم (dihydropyridines)، وإن الذين يتناولون مما

في توسيع وإرخاء الأوعية الدموية، سمّة كلارن تقلّب في سخ الماء.

2 - ما يجب مراعاته قبل استخدام أرتمون<sup>(٤)</sup>؟

لا تستعمل على الأطفال أرتمون<sup>(٤)</sup> في الحالات التالية: إن كانت لك حساسية خاصةً ضد البراندوريل أو ضد مثبتات قنوات البراندوريل للأنيجوتين(IEC)، أو أن المركبات الكالسيوم الأخرى، أو من آية مادة أخرى تدخل في تركيب أرتمون<sup>(٤)</sup>.

إن كل حامل في أكثر من 3 أشهر (من الأصل تجنب أرتمون<sup>(٤)</sup> في أول العمل (نظر إلى مقطع العمل والاصحاح).

إن سق وحصلت لك أعراض كالصفير في النفس، تضخم في الرجه أو في السنان، حكة شديدة أو ترتقي بطيئاً عليه ندح في الماء، أو مثبتات قنوات البراندوريل(IEC)، أو إن كانت تلك الأعراض مبالغة (السمسة بالرطوبة العالية) قد سق وحصلت في أي وضع لاحظ أفاده.

إن كان لديك حساسية ضد الكافر أو ضد الكلر أو ضد توكيل، وكانت تجاه (من خلال دواء تجنب على الميكروكيرن) لتخفيف ضغط الدم.

إن كانت تشكّوك من متبلل المسلم الأبيوري (احتضن، ليهري) أو من التصور القلبي (الحالة التي يعجز فيها القلب عن ضخ الكمية الكافية من الماء إلى الجسم)،

إن كنت تشكّوك من نفسك شديد في الضغط المائي (ضغط ماء مخصوص).

إن كنت تشكّوك من قليل في تأثيره على الأصلية بذرة قوية.

إن كانت تشكّوك من إعاقة الحالات الثالثة دائمةً (دواء تجنب على عصلة القلب)، أو تضيق في الشريان.

إن كانت تشكّوك من إعاقة تضيق في القلب (أي إعاقة في عصلة القلب)، أو تضيق ماء مخصوص.

## أرتمون<sup>(٤)</sup> 5 ملغ 10 ملغ

علبة تحتوي على 30 جبنة  
بيراندوريل أرجين/المورفين

## أرتمون<sup>(٤)</sup> 10 ملغ 10 ملغ

علبة تحتوي على 30 جبنة  
بيراندوريل أرجين/المورفين

## أرتمون<sup>(٤)</sup> 5 ملغ 5 ملغ

علبة تحتوي على 30 جبنة  
بيراندوريل أرجين/المورفين

## أرتمون<sup>(٤)</sup> 10 ملغ 5 ملغ

علبة تحتوي على 30 جبنة  
بيراندوريل أرجين/المورفين

LOT N°

EXP:

PPV:

154,30

يجب التقدّم للطبيب الذي وصفها لك طبيب، فلن شكّوك بالي أمر، عليك بمراعحة الطبيب أو الصيدلي.

تناول حبة مع كأس من الماء، ويستحسن اخذها في الوقت ذاته أي كل يوم في الصباح قبل وجبة الإفطار.

إن طيبك هو الذي يقرر الجرعة المناسبة لوضعك، الجرعة العاديّة عبارة عن جبنة واحدة في اليوم.

يوصى أرتمون<sup>(٤)</sup> عادةً للمتذكّرين بواسطة البراندوريل والأمورفين بجعات مقتضنة.

الأعراض والتّبيّنات في حال الهرة الزائدة الهرة إن طرأ وأخذت جبنة مقتضنة، (فصل قورا بالقرب من مستشفى الطوارئ) أو بطيئك الشخص.

فكّر ما تحصل وقوفة في حال الإفراط بالجرعة، هو موعد الضغط الشرياني، تناول عنه آخر من دوحة وذهول، فإن حدث هذا، يمكن ملائكته بمقدمة المريض مع رفع السقين للأعلى.

الإشكالات في حالة الشفاعة وحلّ محلّ لكل من مرحلة من الهرة جبنة أخذ الدواء وبعها صورة مقتضنة كي يعطي أفضل مفعوله، فإن سهوت عنأخذ

جرعة أرتمون<sup>(٤)</sup> عليك بالأخذ بجرعة الثانية في اليوم التالي وفي وقتها المحدد، ولا يجوز على الإطلاق مضاعفة الجرعة تعويضاً عن السهو.

مفعول الاستحسان إن العلاج بواسطة أرتمون<sup>(٤)</sup> يستمر طيلة الحياة، إذا يجب أن تستثير طيبك قبل التوقف عن تناول هذا الدواء.

إذا كانت لديك أي أسلطة إضافية تتطلّب باستعمال هذا الدواء، فالرجاء طلب المزيد من المعلومات من طيبك أو الصيدلي.

**٤ - ما هي الآثار الجانبية المختلطة؟**

وصف الآثار الجانبية كما هو الحال مع كل دواء، قد تظهر مع أرتمون<sup>(٤)</sup> بعض الأعراض المرجعية رغم أنها لا تخص كافة المرضى.

إذا اطلعت حدوث أي من التّأثيرات الجانبية المذكورة فيما يلي، عليك أن تتوقف مباشرةً عن تناول هذا الدواء، وأن تصلّب طيبك من القوى:

• شعور مفاجئ بالإرهاق أو اضطراب أو اضطراب أو ضيق التنفس أو صعوبة التنفس،

• تضخم في السنان، أو في التجويف مما يسبّب صعوبة شديدة في التنفس،

• تفاعلات جلدية شديدة تختصر الدّايمات جلدية كثيرة، طفح وحصار الأنف وتورّه، التهاب الأعصاب المخاطية (متلازمة سفينزون)، أو غير ذلك من التفاعلات الحساسية،

• درجة حرارة أو ارتفاع،

• التهاب العصب ال Cranialis الذي يدري إلى الأم شديدة في البطن والظهر مع شعور بالإعماق الشديد،

تم الإبلاغ عن حدوث التّأثيرات الجانبية الشائعة التالية، إذا كان أي منها قد يسبّب لك مشكلة أو

- يرجى قراءة هذه الاشعار بعناية قبل اتخاذ هذا الدواء لأنّه يحتوي على معلومات هامة بالنسبة لك - أيقى هذه التشوه، قد تتحاج لقرأتها مرة أخرى .

- أصال طيفك أو الصيدلي إذا كان لديك استهلاك آخر .

- قد وصف هذا الدواء لك لغرض تعطيله لأخرين، قد تضرّهم، حتى لو لم يأعرضهم هي نفس أعراضك .

- تحدث مع طيفك أو الصيدلي إذا أحسست بآثار جانبية مختلفة غير المدرجة في هذه النشرة .

في هذه النشرة:

1 - فهو أرتمون<sup>(٤)</sup> وباي الحالات يتم استخدامه؟

2 - ما يجب اتباعه قبل استخدام أرتمون<sup>(٤)</sup>؟

3 - كيف يستخدم أرتمون<sup>(٤)</sup>؟

4 - ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟

5 - كيف يتم تذكر أرتمون<sup>(٤)</sup>؟

6 - معلومات إضافية.

1 - ما هو أرتمون<sup>(٤)</sup> وباي الحالات يتم استخدامه؟

ال النوع الصيدلي والمعلماني: متبلل للحمير المجزأة للأنيجوتين(IEC) و حاصر للكلسيوم.

يوصى أرتمون<sup>(٤)</sup> لعلاج ارتفاع ضغط الشريان وإلّا لعلاج الأمراض الالكتيلية الثابتة (في حال تناول أو اقطاع الدم الاردار للقلب)

فيزيائي المتذكّرين بواسطة البراندوريل والأمورفين إنّ أخذ المذكّر في جهة واحدة من

أرتمون<sup>(٤)</sup> بزيارة عن طريق من مائتين قفّتين: البراندوريل والأندوبيدين.

إن البراندوريل متبلل للحمير المجزأة للأنيجوتين(IEC) وإن المورفين حاصر للكلسيوم(dihydropyridines)، وإن الذين يتناولون ما تناولوا قبل تناول المذكّر في جميع الدم غيرها.

في تزويع وإرهاص الرّئة الدموي، مساعدة على تناول المذكّر في جميع الدم غيرها.

2 - ما يجب مراعاته قبل استخدام أرتمون<sup>(٤)</sup>؟

لا تستعمل على الأطفال أرتمون<sup>(٤)</sup> في الحالات التالية:

إن كانت لك حساسية ضدّ المركبات التي تحتوي على المورفين أو مركبات المورفين المجزأة للأنيجوتين(IEC)، أو أن المورفين، أو حاصر الكالسيوم الأخرى، أو من آية مادة أخرى تتكلّل في تركيب أرتمون<sup>(٤)</sup>.

إن كنت حاصل في أكثر من ٣ شهور (من الأصل تجنب أرتمون<sup>(٤)</sup> في أول العمل (نظر إلى مفعول العمل والإرهاص).

إن سبق وحصلت لك أعراض كالصفير في النفس، تختصر في الرجه أو في اللسان، حكة شديدة

أو ترتّبج على يديه ندح عن متناوله بواسطة مثبتات حمّرة (الترودين)، أو إن كانت تلك

الأعراض (المساء بالرّاحة العلية) قد سبق وحصلت في أي وضع لاحظ أفاده.

إن كنت لديك حساسية ضدّ الكافر أو ضدّ الكلرولين، وكانت تتعالج (من خلال دواء تنتهي على الميكروكيرين) لتخفيف ضغط الدم.

إن كنت تشكّ من حساسية المسلم الأبيوري (احتقني، ليوري) أو من التصور القلبي (الحالة التي يعجز فيها القلب عن ضخ الكميّة الكافية من الدم إلى الجسم).

إن كنت تشكّ من حساسية ضدّ في الصبغة المائية (صبغة ماء مخصوص).

إن كنت تشكّ من قليل قليل تالي للأصلية بتركيبة قوية.

إن كنت تشكّ من إعاقة الحالات الثالثة دائمة لوضيق القلب، على عراك، بمراعحة الطبيب قبل أخذ أرتمون<sup>(٤)</sup>.

إن كانت إحدى الحالات الثالثة دائمة لوضيق القلب (أعطال في عصلة القلب) أو تضيق ماء مخصوص.

## أرتمون<sup>(٤)</sup> 5 ملغ 10 ملغ

علبة تحتوي على 30 جبنة  
بيراندوريل أرجين/المورفين

## أرتمون<sup>(٤)</sup> 10 ملغ 10 ملغ

علبة تحتوي على 30 جبنة  
بيراندوريل أرجين/المورفين

LOT N°

EXP:

PPV:

154,30

يجب التقدّم للطبيب الذي وصفها لك طبيب، فلن شكّوك بالي امر، عليك بمراجعة الطبيب او الصيدلي.

تناول حبة مع كأس من الماء، ويستحسن اخذها في الوقت ذاته أي كل يوم في الصباح قبل وجبة الافطار.

إن طبيب هو الذي يقرر الجرعة المناسبة لوضعكم، الجرعة العاديّة عبارة عن جبنة واحدة في اليوم.

يوصى أرتمون<sup>(٤)</sup> عادةً للتدابير بواسطة البراندوريل والأمورفين بجعات مقتضنة.

**الأعراض والتسلّمات في حال الهرة الزائدة الهرة**  
إن طرا واحتضن جبنة معتقدة، (الصل فوراً بأقرب مستشفى الطوارئ) أو بطيء الفحص.

فكثير ما يحصل وقوعه في حال الإفراج الضغط الشرياني، تنتفع عنه أعراض دوخة وذهول، فإن حدث هذا، يمكن ملاحظته بمقدار المريض مع رفع السقوف للأعلى.

**الإشكالات في حالة الشفاعة وحلّ مشكلة تناول حبة**  
من الهم جداً أن الدواء وبها بصورة معتقدة كي يعطي أفضل مفعوله، فإن سهوت عنأخذ

جرعة أرتمون<sup>(٤)</sup> أطريق بالذلة الهرة الثانية في اليوم التالي وفي وقتها المحدد، ولا يجوز على

الاطفال مضغها الجرة العاديّة تعرضاً عن السوء.

**مفعول الاستحسان**  
إن العلاج بواسطة أرتمون<sup>(٤)</sup> يستمر طيلة الحياة، إذا يجب أن تستشير طبيب قبل التوقف عن تناول

هذا الدواء، إذا كانت لديك أي أسلمة إضافية تتعلق باستعمال هذا الدواء، فالرجاء طلب المزيد من المعلومات من طبيبك أو الصيدلي.

**4 - ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟**

وصف الآثار الجانبية  
كما هو الحال مع كل دواء، قد تظهر مع أرتمون<sup>(٤)</sup> بعض الأعراض المرجعية رغم أنها لا

تخصّ كلّة المرضى.  
إذا اطلعت حدوث أي من التأثيرات الجانبية المذكورة فيما يلي، عليك أن تتوقف مباشرةً عن

تناول هذا الدواء، وأن تصلّم بطيءك إلى الطبيب أو العيادة:

• شعور مفاجئ بالإرهاق أو ضيق التنفس أو ضيق الصدر أو صعوبة التنفس،

• تضخم في اللسان، أو في التجويف مما يسبب صعوبة شديدة في التنفس،

• تفاعلات جلدية شديدة تتضمن الدخانات جلدية كثيفة، طفح وحصار الأنف وتورم، التهاب الأعصاب المحيطة (متلازمة سفينزون)، أو غير ذلك من التفاعلات الحساسية،

• درجة حرارة أو إلهاق،

• التهاب العصب ال Cranial، الذي يدري إلى الام شديدة في البطن والظهر مع شعور بالإعماق الشديد.

تم الإبلاغ عن حدوث التأثيرات الجانبية الشائعة التالية، إذا كان أي منها قد يبيّن لك مشكلة أو

## أرتمون<sup>(٤)</sup> 5 ملغ 5 ملغ

علبة تحتوي على 30 جبنة  
بيراندوريل أرجين/المورفين

## أرتمون<sup>(٤)</sup> 10 ملغ 5 ملغ

علبة تحتوي على 30 جبنة  
بيراندوريل أرجين/المورفين

- يرجى قراءة هذه الاشعار بعناية قبل اتخاذ هذا الدواء لأنّه يحتوي على معلومات هامة بالنسبة لك  
- إنّي أثق في هذه الشفاعة، قد تتحاج لغيرها مرة أخرى .

- أصال طبيك أو الصيدلي إذا كان لديك استثناءة أخرى .

- قد وصف هذا الدواء لك لغرض تعطيله لأخرين، قد تضرّهم، حتى لو لم يأعرضهم هي نفس أعراضك .

- تحدث مع طبيك أو الصيدلي إذا أحسست بآثار جانبية، وهذا يطبق أيضاً على أي آثار جانبية متعلقة غير المدرجة في هذه النشرة .

في هذه النشرة:

1 - فهو أرتمون<sup>(٤)</sup> وباي الحالات يتم استخدامه؟

2 - ما يجب اتباعه قبل استخدام أرتمون<sup>(٤)</sup>؟

3 - كيف يستخدم أرتمون<sup>(٤)</sup>؟

4 - ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟

5 - كيف يتم تذكر أرتمون<sup>(٤)</sup>؟

6 - معلومات إضافية.

1 - ما هو أرتمون<sup>(٤)</sup> وباي الحالات يتم استخدامه؟

النوع الصيدلي والمعلمي: متبلل للحمير المجزأة للأنيجوتين(IEC) و حاصر للكلسيوم.

يوصى أرتمون<sup>(٤)</sup> لعلاج ارتفاع ضغط الشريان وألوّعاج الأمراض الالكتيلية الثابتة (في حال

تنفس أو اضطراب الدم الارterي للقلب)

فيزيائي المتدابرون بواسطة البراندوريل والأمورفين إنّي أخذوا كل المذكور في جهة واحدة من

أرتمون<sup>(٤)</sup> بذرة عن مزج من مائتين قففون: البراندوريل والأندوبيدين.

إن البراندوريل متبلل للحمير المجزأة للأنيجوتين(IEC) أو الأمورفين حاصر للكلسيوم (dihydropyridines)، وإن مائتين مذكور في جانبي

في توسيع وإرخاء الأوعية الدموية، مساعدة لاحق في نفخ الدم عبرها.

2 - ما يجب مراعاته قبل استخدام أرتمون<sup>(٤)</sup>؟

لا تستعمل على الأطفال أرتمون<sup>(٤)</sup> في الحالات التالية:

إن كانت لك حساسية خاصةً بـ البراندوريل أو ماء البراندوريل، أو من صفت آخر لمحليات المخمرة المجزأة للأنيجوتين(IEC)، أو أن الآلدوبينيين، أو من حاصرات الكالسيوم الأخرى، أو من آية مادة أخرى تدخل في تركيب أرتمون<sup>(٤)</sup>.

إن كنت حاصل في أكثر من 3 أشهر من الأصل تجنب أرتمون<sup>(٤)</sup> في أول العمل (نظر

إلى مقطع "الحمل والرضاع".

إن سبق وحصلت لك أعراض كالصفير في النفس، تختفي في الواقع أو في اللسان، حكة شديدة

أو ترتقي بطيءاً بهم نفخ في الماء أو بسطة المخمرة (المخمرة للحوبي)، وإن كانت تلك

الأعراض (المسامة بالروحة العليلة) قد سبق وحصلت في أي وضع لاحظ أفاده.

إن كنت لديك حساسية ضد الكافر أو ضد الكافل والتوبر، وكانت تتعالج (من خلال دواء تجنب على

المكروبات) لتخفيف حضن الماء.

إن كنت تشك من حساسية المسلم الأبيوري (احتضن، ليهري) أو من التصور القافي (الحالة التي

يجربها القلب) بنفخ من الكمية الكافية من الماء إلى الجسم).

إن كنت تشك من حساسية ضد في الصبغة التي (صبغة ماء مخصوص).

إن كنت تشك من فعل قففون على الأصلية بذرة قففون.

إن كنت تشك من احتلال في الشفاعة بذرة قففون.

إن كنت تشك من احتلال تضخم القلب (احتلال في عصلة القلب) أو تضيق ماء مخصوص.

إن كنت تشك من احتلال تضخم القلب (احتلال في عصلة القلب) أو تضيق ماء مخصوص.

# FLUDEX® LP

INDAPAMIDE 1,5 MG

**30 comprimé pelliculé à Libération Prolongée**

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique «Quels sont les effets indésirables éventuels ?».

**Que contient cette notice ?**

1. Qu'est-ce que FLUDEX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre FLUDEX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée ?
3. Comment prendre FLUDEX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver FLUDEX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

**1-QU'EST-CE QUE FLUDEX 1,5 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ À LIBÉRATION PROLONGÉE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

FLUDEX 1,5 mg est un comprimé pelliculé à libération prolongée et contient de l'indapamide comme principe actif. L'indapamide est un diurétique. La plupart des diurétiques augmentent la quantité d'urine produite par les reins. Toutefois, l'indapamide est différent des autres diurétiques car il n'entraîne qu'une légère augmentation de la quantité d'urine produite.

Ce médicament est indiqué pour réduire la pression artérielle élevée (hypertension) chez l'adulte.

**2-QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE FLUDEX 1,5 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ À LIBÉRATION PROLONGÉE ?**

**Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament**

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolerance à certains sucrels, contactez le avant de prendre ce médicament.

**Ne prenez jamais FLUDEX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée:**

- si vous êtes allergique (hypersensible) à l'indapamide ou à tout autre sulfamide ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.
- si vous avez une maladie grave du rein,
- si vous avez une maladie grave du foie ou si vous souffrez d'une encéphalopathie hépatique (maladie dégénérative du cerveau),
- si vous avez un taux bas de potassium dans le sang.

**Avertissements et précautions**

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre FLUDEX 1,5 mg :

- si vous avez une maladie du foie,
- si vous êtes diabétique,
- si vous souffrez de goutte,
- si vous avez des troubles du rythme cardiaque ou des problèmes rénaux,
- si vous devez faire un examen de votre glande parathyroïde.

Vous devez informer votre médecin si vous avez eu des réactions de photosensibilité.

Votre médecin peut être amené à vous prescrire des examens biologiques afin de surveiller des taux faibles de sodium ou de potassium ou des taux élevés de calcium dans le sang.

Si vous pensez être concernés par ces situations ou si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption.

sorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

**Enfants et adolescents**

Sans objet

**Autres médicaments et FLUDEX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée**

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Evitez de prendre FLUDEX 1,5 mg avec du lithium (utilisé pour traiter la dépression), en raison du risque d'augmentation des taux de lithium dans le sang.

Si vous prenez l'un des médicaments suivants, parlez-en à votre médecin, certaines précautions d'emploi particulières peuvent être nécessaires :

- médicaments utilisés pour des troubles du rythme cardiaque (ex : quinidine, hydroquinidine, disopyramide, amioclardine, sotalol, ibutilide, dofetilide, digoxine),
- médicaments utilisés pour traiter des troubles mentaux tels que dépression, anxiété, schizophrénie... (ex : antidépresseurs tricycliques, antipsychotiques, neuroleptiques),
- bêpridé (utilisé pour traiter l'angine de poitrine, maladie provoquant des douleurs dans la poitrine),
- cisapride, diphenoxylate (utilisés pour traiter les troubles gastro-intestinaux),
- sparflaxfone, moxifloxacine, érythromycine par injection (antibiotiques utilisés pour traiter des infections),
- vincamine par injection (utilisé pour traiter des troubles cognitifs symptomatiques chez les patients âgés, y compris la perte de mémoire),
- halofantrine (antiparasitaire utilisé pour traiter certains types de paludisme),
- pentamidine (utilisé pour traiter certains types de pneumonie),
- mizolastine (utilisé pour traiter les réactions allergiques comme le rhume des foins),
- anti-inflammatoires non-stéroïdiens pour soulager la douleur (ex : ibuprofène) ou fortes doses d'acide acétylsalicylique,
- inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC) (utilisés pour traiter l'hypertension artérielle et l'insuffisance cardiaque),
- amphotéricine B par injection (médicaments antifongiques),
- corticostéroïdes oraux utilisés pour traiter divers troubles : asthme sévère et arthrite rhumatoïde,
- laxatifs stimulants,
- baclofène (pour traiter la raideur musculaire survenant de maladie comme la sclérose multiple),
- allopurinol (pour le traitement de la goutte)
- diurétiques épargneurs de potassium (amiloride, spironolactone, triamterène),
- metformine (pour traiter le diabète),
- produits de contrastes iodés (utilisés pour les examens aux rayons X),
- comprimés de calcium ou autres suppléments calciques,
- ciclosporine, tacrolimus ou autres immunosuppresseurs utilisés suite à une transplantation d'organe, pour le traitement de maladies auto-immunes ou de maladies rhumatisantes ou dermatologiques graves,
- tétracosactide (pour traiter la maladie de Crohn).

**FLUDEX 1,5 mg comprimé pelliculé à libération prolongée avec des aliments et boissons**

Sans objet

**Grossesse et allaitement**

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant la grossesse. Lorsqu'une grossesse est planifiée ou confirmée, un traitement alternatif doit être initié dès que possible.

Prévenez votre médecin si vous êtes enceinte ou si vous souhaitez l'être.

Le principe actif est excrété dans le lait maternel. L'allaitement est déconseillé si vous prenez ce médicament.

**Sportifs**

Sportifs, attention, cette spécialité contient un principe actif pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles antidopage.

# FLUDEX® LP

INDAPAMIDE 1,5 MG

**30 comprimé pelliculé à Libération Prolongée**

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique «Quels sont les effets indésirables éventuels ?».

#### Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que FLUDEX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre FLUDEX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée ?
3. Comment prendre FLUDEX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver FLUDEX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

#### 1-QU'EST-CE QUE FLUDEX 1,5 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ À LIBÉRATION PROLONGÉE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

FLUDEX 1,5 mg est un comprimé pelliculé à libération prolongée et contient de l'indapamide comme principe actif. L'indapamide est un diurétique. La plupart des diurétiques augmentent la quantité d'urine produite par les reins. Toutefois, l'indapamide est différent des autres diurétiques car il n'entraîne qu'une légère augmentation de la quantité d'urine produite.

Ce médicament est indiqué pour réduire la pression artérielle élevée (hypertension) chez l'adulte.

#### 2-QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE FLUDEX 1,5 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ À LIBÉRATION PROLONGÉE ?

##### Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolerance à certains sucrels, contactez le avant de prendre ce médicament.

##### Ne prenez jamais FLUDEX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée:

- si vous êtes allergique (hypersensible) à l'indapamide ou à tout autre sulfamide ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.
- si vous avez une maladie grave du rein,
- si vous avez une maladie grave du foie ou si vous souffrez d'une encéphalopathie hépatique (maladie dégénérative du cerveau),
- si vous avez un taux bas de potassium dans le sang.

##### Avertissements et précautions

Adresssez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre FLUDEX 1,5 mg :

- si vous avez une maladie du foie,
- si vous êtes diabétique,
- si vous souffrez de goutte,
- si vous avez des troubles du rythme cardiaque ou des problèmes rénaux,
- si vous devez faire un examen de votre glande parathyroïde.

Vous devez informer votre médecin si vous avez eu des réactions de photosensibilité.

Votre médecin peut être amené à vous prescrire des examens biologiques afin de surveiller des taux faibles de sodium ou de potassium ou des taux élevés de calcium dans le sang.

Si vous pensez être concernés par ces situations ou si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption.

sorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

##### Enfants et adolescents

Sans objet

#### Autres médicaments et FLUDEX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Evitez de prendre FLUDEX 1,5 mg avec du lithium (utilisé pour traiter la dépression), en raison du risque d'augmentation des taux de lithium dans le sang.

Si vous prenez l'un des médicaments suivants, parlez-en à votre médecin, certaines précautions d'emploi particulières peuvent être nécessaires :

- médicaments utilisés pour des troubles du rythme cardiaque (ex : quinidine, hydroquinidine, disopyramide, amioclardine, sotalol, ibutilide, dofetilide, digoxine),
- médicaments utilisés pour traiter des troubles mentaux tels que dépression, anxiété, schizophrénie... (ex : antidiépresseurs tricycliques, antipsychotiques, neuroleptiques),
- bêpridé (utilisé pour traiter l'angine de poitrine, maladie provoquant des douleurs dans la poitrine),
- cisapride, diphenoxylate (utilisés pour traiter les troubles gastro-intestinaux),
- sparflaxoxine, moxifloxacine, érythromycine par injection (antibiotiques utilisés pour traiter des infections),
- vincamine par injection (utilisé pour traiter des troubles cognitifs symptomatiques chez les patients âgés, y compris la perte de mémoire),
- halofantrine (antiparasitaire utilisé pour traiter certains types de paludisme),
- pentamidine (utilisé pour traiter certains types de pneumonie),
- mizolastine (utilisé pour traiter les réactions allergiques comme le rhume des foins),
- anti-inflammatoires non-stéroïdiens pour soulager la douleur (ex : ibuprofène) ou fortes doses d'acide acétylsalicylique,
- inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC) (utilisés pour traiter l'hypertension artérielle et l'insuffisance cardiaque),
- amphotéricine B par injection (médicaments antifongiques),
- corticostéroïdes oraux utilisés pour traiter divers troubles : asthme sévère et arthrite rhumatoïde,
- laxatifs stimulants,
- baclofène (pour traiter la raideur musculaire survenant de maladie comme la sclérose multiple),
- allopurinol (pour le traitement de la goutte)
- diurétiques épargneurs de potassium (amiloride, spironolactone, triamterène),
- metformine (pour traiter le diabète),
- produits de contrastes iodés (utilisés pour les examens aux rayons X),
- comprimés de calcium ou autres suppléments calciques,
- ciclosporine, tacrolimus ou autres immunosuppresseurs utilisés suite à une transplantation d'organe, pour le traitement de maladies auto-immunes ou de maladies rhumatologiques ou dermatologiques graves,
- tétracosactide (pour traiter la maladie de Crohn).

#### FLUDEX 1,5 mg comprimé pelliculé à libération prolongée avec des aliments et boissons

Sans objet

##### Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant la grossesse. Lorsqu'une grossesse est planifiée ou confirmée, un traitement alternatif doit être initié dès que possible.

Prévenez votre médecin si vous êtes enceinte ou si vous souhaitez l'être.

Le principe actif est excrété dans le lait maternel. L'allaitement est déconseillé si vous prenez ce médicament.

##### Sportifs

Sportifs, attention, cette spécialité contient un principe actif pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles antidopage.

# FLUDEX® LP

INDAPAMIDE 1,5 MG

**30 comprimé pelliculé à Libération Prolongée**

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique «Quels sont les effets indésirables éventuels ?».

#### Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que FLUDEX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre FLUDEX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée ?
3. Comment prendre FLUDEX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver FLUDEX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

#### 1-QU'EST-CE QUE FLUDEX 1,5 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ À LIBÉRATION PROLONGÉE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

FLUDEX 1,5 mg est un comprimé pelliculé à libération prolongée et contient de l'indapamide comme principe actif. L'indapamide est un diurétique. La plupart des diurétiques augmentent la quantité d'urine produite par les reins. Toutefois, l'indapamide est différent des autres diurétiques car il n'entraîne qu'une légère augmentation de la quantité d'urine produite.

Ce médicament est indiqué pour réduire la pression artérielle élevée (hypertension) chez l'adulte.

#### 2-QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE FLUDEX 1,5 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ À LIBÉRATION PROLONGÉE ?

##### Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolerance à certains sucrels, contactez le avant de prendre ce médicament.

##### Ne prenez jamais FLUDEX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée:

- si vous êtes allergique (hypersensible) à l'indapamide ou à tout autre sulfamide ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.
- si vous avez une maladie grave du rein,
- si vous avez une maladie grave du foie ou si vous souffrez d'une encéphalopathie hépatique (maladie dégénérative du cerveau),
- si vous avez un taux bas de potassium dans le sang.

##### Avertissements et précautions

Adresssez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre FLUDEX 1,5 mg :

- si vous avez une maladie du foie,
- si vous êtes diabétique,
- si vous souffrez de goutte,
- si vous avez des troubles du rythme cardiaque ou des problèmes rénaux,
- si vous devez faire un examen de votre glande parathyroïde.

Vous devez informer votre médecin si vous avez eu des réactions de photosensibilité.

Votre médecin peut être amené à vous prescrire des examens biologiques afin de surveiller des taux faibles de sodium ou de potassium ou des taux élevés de calcium dans le sang.

Si vous pensez être concernés par ces situations ou si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption.

sorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

##### Enfants et adolescents

Sans objet

#### Autres médicaments et FLUDEX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Evitez de prendre FLUDEX 1,5 mg avec du lithium (utilisé pour traiter la dépression), en raison du risque d'augmentation des taux de lithium dans le sang.

Si vous prenez l'un des médicaments suivants, parlez-en à votre médecin, certaines précautions d'emploi particulières peuvent être nécessaires :

- médicaments utilisés pour des troubles du rythme cardiaque (ex : quinidine, hydroquinidine, disopyramide, amioclardine, sotalol, ibutilide, dofetilide, digoxine),
- médicaments utilisés pour traiter des troubles mentaux tels que dépression, anxiété, schizophrénie... (ex : antidépresseurs tricycliques, antipsychotiques, neuroleptiques),
- bêpridé (utilisé pour traiter l'angine de poitrine, maladie provoquant des douleurs dans la poitrine),
- cisapride, diphenoxylate (utilisés pour traiter les troubles gastro-intestinaux),
- sparflaxoxine, moxifloxacine, érythromycine par injection (antibiotiques utilisés pour traiter des infections),
- vincamine par injection (utilisé pour traiter des troubles cognitifs symptomatiques chez les patients âgés, y compris la perte de mémoire),
- halofantrine (antiparasitaire utilisé pour traiter certains types de paludisme),
- pentamidine (utilisé pour traiter certains types de pneumonie),
- mizolastine (utilisé pour traiter les réactions allergiques comme le rhume des foins),
- anti-inflammatoires non-stéroïdiens pour soulager la douleur (ex : ibuprofène) ou fortes doses d'acide acétylsalicylique,
- inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC) (utilisés pour traiter l'hypertension artérielle et l'insuffisance cardiaque),
- amphotéricine B par injection (médicaments antifongiques),
- corticostéroïdes oraux utilisés pour traiter divers troubles : asthme sévère et arthrite rhumatoïde,
- laxatifs stimulants,
- baclofène (pour traiter la raideur musculaire survenant de maladie comme la sclérose multiple),
- allopurinol (pour le traitement de la goutte)
- diurétiques épargneurs de potassium (amiloride, spironolactone, triamterène),
- metformine (pour traiter le diabète),
- produits de contrastes iodés (utilisés pour les examens aux rayons X),
- comprimés de calcium ou autres suppléments calciques,
- ciclosporine, tacrolimus ou autres immunosuppresseurs utilisés suite à une transplantation d'organe, pour le traitement de maladies auto-immunes ou de maladies rhumatologiques ou dermatologiques graves,
- tétracosactide (pour traiter la maladie de Crohn).

#### FLUDEX 1,5 mg comprimé pelliculé à libération prolongée avec des aliments et boissons

Sans objet

##### Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant la grossesse. Lorsqu'une grossesse est planifiée ou confirmée, un traitement alternatif doit être initié dès que possible.

Prévenez votre médecin si vous êtes enceinte ou si vous souhaitez l'être.

Le principe actif est excrété dans le lait maternel. L'allaitement est déconseillé si vous prenez ce médicament.

##### Sportifs

Sportifs, attention, cette spécialité contient un principe actif pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles antidopage.



# NEOVIMAG® PLUS

Lot : NP03

À consommer de  
préférence avant le : 01/2025

PPC : 84,50 DH

## FORME ET PRÉSENTATION :

Gélules, boîte de 30.

## COMPOSITION (par 2 gélules) :

Magnésium marin (300 mg), extrait de Mélisse, Vitamine B6 (2mg), stéarate de magnésium, amidon de maïs, gélatine d'origine végétale (hypromellose).

## PROPRIÉTÉS :

**NEOVIMAG® PLUS** est à base de 3 actifs synergiques : le Magnésium marin, la Vitamine B6 qui contribuent à réduire la fatigue nerveuse et la tension musculaire ainsi que la Mélisse aux propriétés apaisantes et anti-stress. **NEOVIMAG® PLUS** permet de lutter efficacement contre le stress et l'anxiété.

## CONSEILS D'UTILISATION :

1 gélule 2 fois par jour, ou suivre les recommandations d'un professionnel de la santé.

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION :

- Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.
- Ne pas laisser à la portée des enfants.
- A conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité.

Complément alimentaire, ce n'est pas un médicament.

Fabriqué par BIOXPERT, Fès - Maroc

Distribué au Maroc par MEDIPRO Pharma - Casablanca.

Autorisation du ministère de la santé N° : DA 20181412011DMP/20UCA/MAv3



# NEOVIMAG® PLUS

Lot : NP03

À consommer de  
préférence avant le : 01/2025

PPC : 84,50 DH

## FORME ET PRÉSENTATION :

Gélules, boîte de 30.

## COMPOSITION (par 2 gélules) :

Magnésium marin (300 mg), extrait de Mélisse, Vitamine B6 (2mg), stéarate de magnésium, amidon de maïs, gélatine d'origine végétale (hypromellose).

## PROPRIÉTÉS :

**NEOVIMAG® PLUS** est à base de 3 actifs synergiques : le Magnésium marin, la Vitamine B6 qui contribuent à réduire la fatigue nerveuse et la tension musculaire ainsi que la Mélisse aux propriétés apaisantes et anti-stress. **NEOVIMAG® PLUS** permet de lutter efficacement contre le stress et l'anxiété.

## CONSEILS D'UTILISATION :

1 gélule 2 fois par jour, ou suivre les recommandations d'un professionnel de la santé.

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION :

- Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.
- Ne pas laisser à la portée des enfants.
- A conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité.

Complément alimentaire, ce n'est pas un médicament.

Fabriqué par BIOXPERT, Fès - Maroc

Distribué au Maroc par MEDIPRO Pharma - Casablanca.

Autorisation du ministère de la santé N° : DA 20181412011DMP/20UCA/MAv3



# NEOVIMAG® PLUS

Lot : NP03

À consommer de  
préférence avant le : 01/2025

PPC : 84,50 DH

## FORME ET PRÉSENTATION :

Gélules, boîte de 30.

## COMPOSITION (par 2 gélules) :

Magnésium marin (300 mg), extrait de Mélisse, Vitamine B6 (2mg), stéarate de magnésium, amidon de maïs, gélatine d'origine végétale (hypromellose).

## PROPRIÉTÉS :

**NEOVIMAG® PLUS** est à base de 3 actifs synergiques : le Magnésium marin, la Vitamine B6 qui contribuent à réduire la fatigue nerveuse et la tension musculaire ainsi que la Mélisse aux propriétés apaisantes et anti-stress. **NEOVIMAG® PLUS** permet de lutter efficacement contre le stress et l'anxiété.

## CONSEILS D'UTILISATION :

1 gélule 2 fois par jour, ou suivre les recommandations d'un professionnel de la santé.

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION :

- Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.
- Ne pas laisser à la portée des enfants.
- A conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité.

Complément alimentaire, ce n'est pas un médicament.

Fabriqué par BIOXPERT, Fès - Maroc

Distribué au Maroc par MEDIPRO Pharma - Casablanca.

Autorisation du ministère de la santé N° : DA 20181412011DMP/20UCA/MAv3