

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| 0 Réclamation | : contact@mupras.com |
| 0 Prise en charge | : pec@mupras.com |
| 0 Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

N° W21-675707

110475

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Matricule 0560

Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

Mr. ABAKIL

R. A. M

Date de naissance :

01 - 07 - 2022

Adresse :

LOT. BENI-YAKHLEF N° 119
Rue ALGHOFRANE Mohammmedia
023 3352118

Tél.

1153,80

Dhs

Total des frais engagés :

Autorisation CNDP N° : A-A-215/2019

Cadre réservé au Médecin



Cachet du médecin :

Date de consultation :

29 Mars 2022

Nom et prénom du malade :

ABAKIL Hafid

Age: 78 ans

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

SIVI

HBP

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Mohammmedia

Le 30/03/2022

Signature de l'adhérent(e) :

(Signature)

BELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
9 MARS 2022	CS		300	INP : 1241210006 Tél. : 05 21 21 00 06

EXECUTION DES ORDONNANCES



Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	20/03/2023	853.80

ANALYSES - RADIOPHARMACIES

AUXILIAIRES MEDICAUX

VOLET ADHERENT

* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.

SOINS DENTAIRES		Traitées	Soins															
				COEFFICIENT DES TRAVAUX														
				MONTANTS DES SOINS														
				DEBUT D'EXECUTION														
				FIN D'EXECUTION														
O.D.F PROTHESES DENTAIRES		DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">H</td> </tr> <tr> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">D</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">B</td> </tr> </table> <p>[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession</p>		H		25533412	21433552	00000000	00000000	D		00000000	00000000	35533411	11433553	B		COEFFICIENT DES TRAVAUX
H																		
25533412	21433552																	
00000000	00000000																	
D																		
00000000	00000000																	
35533411	11433553																	
B																		
				MONTANTS DES SOINS														
				DATE DU DEVIS														
				DATE DE L'EXECUTION														

Dr Yassin SAYERH
Chirurgien Urologue
- Andrologue -
Fixe : 05 21 21 00 06
05 23 31 79 63



الدكتور يسن الطاين
أخصائى فى أمراض وجراحة الكلى
والمسالك البولية والأعضاء التناسلية
عضو فى الجمعية الأمريكية لجراحة المسالك البولية
Membre de L'American Urological
Association
Urgences : 06 64 21 43 99

Ordonnance

29 MARS 2022

A Mohammedia le :

Mr Hafid ABekil
121,00 x 3
of Umax 0,4
163,20 x 3 le ssir au autre

1g/100g

2 Dusta of



PPV : 163 Dhs 20
N° de LOT : LF24830A
Date d'EXP: 10/2023

PPV : 163 Dhs 20
N° de LOT : LF24830A
Date d'EXP: 10/2023



PPV : 163 Dhs 20
N° de LOT : LF24830A
Date d'EXP: 10/2023



63

Dr Yassin SAYERH
Chirurgien Urologue
- Andrologue -
Mohammedia - Tel : 05 21 21 00 06
12, Rue Bir Anzaran Résidence Fayçal (Derrière Carrefour KASBAH) 1er Etage Mohammedia

12، شارع بدر أنزران (إقامة فيصل) (وراء كارفور القصبة) الطابق الأول المحمدية



UMAX® 400 ug LP

Microgranules à libération prolongée en gélules - Boîte de 10,30 et de 60
(Chlorhydrate de tamsulosine)

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que UMAX® 400 ug LP Gélule et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre UMAX® 400 ug LP Gélule ?
3. Comment prendre UMAX® 400 ug LP Gélule ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver UMAX® 400 ug LP Gélule ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE UMAX® 400 ug LP Gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : Alpha-bloquants / Médicaments utilisés dans l'hypertrophie bénigne de la prostate - code ATC : G04CA02

UMAX® 400 ug LP Gélule contient de la tamsulosine, une substance qui appartient à une famille de médicaments appelée alpha-bloquants.

UMAX® 400 ug LP Gélule est utilisé dans le traitement de certains troubles qui peuvent vous empêcher d'uriner normalement suite à une augmentation de volume (hypertrophie) bénigne de votre prostate.

Ce médicament est utilisé uniquement chez l'homme dans le traitement des douleurs du bas appareil urinaire associé à un élargissement de la glande prostatique (hyperplasie bénigne de la prostate). Ces douleurs peuvent être des difficultés à uriner (débit urinaire faible), miction goutte à goutte, besoin urgent d'uriner et envie d'uriner fréquemment aussi bien la nuit que le jour.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE UMAX® 400 ug LP Gélule ?

Ne prenez jamais UMAX® 400 ug LP Gélule :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active (la tamsulosine) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (vous trouverez la liste des composants à la rubrique 6).
- Si vous êtes allergique (hypersensible) à un médicament de la même famille (les alpha-bloquants).
- Si vous avez déjà eu des gonflements (œdèmes) du visage, des lèvres et de certaines parties de votre corps (les muqueuses) après avoir pris ce médicament.
- Si vous avez déjà eu auparavant une baisse de votre tension artérielle lors d'un passage de la position couchée à la position debout pouvant s'accompagner de vertiges et de malaises (hypotension orthostatique).
- Si vous avez une maladie sévère du foie (insuffisance hépatique sévère).

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre UMAX® 400 ug LP Gélule. Vous devez prévenir votre médecin si :

- Vous prenez des médicaments pour traiter une tension artérielle élevée.
- Vous avez déjà eu des malaises alors que vous urinez ou après mictionnelle.
- Vous avez une maladie des reins (insuffisance rénale chronique).
- Vous avez plus de 65 ans.

• Vous avez des maladies du cœur (patient coronarien). En cas d'aggravation par ce médicament devra être interrompu.

Pendant le traitement, si vous avez des gonflements (œdèmes) de certaines parties de votre corps (les muqueuses), cela peut être allergique au médicament. Dans ce cas, vous devez arrêter le médicament immédiatement votre médecin.

Des malaises peuvent survenir rarement avec UMAX® 400 ug LP Gélule. Aux premiers signes de vertiges ou de faiblesse, vous devrez allonger jusqu'à ce que les sensations de malaise disparaissent.

Si vous devez faire opérer de la cataracte ou du glaucome. Si vous devez faire opérer prochainement de la cataracte ou du glaucome, et si vous avez été ou êtes actuellement ou prévoyez d'être UMAX® 400 ug LP Gélule, informez-en votre ophtalmologiste avant l'opération.

Le chirurgien pourra prendre des précautions appropriées en fonction de votre traitement au moment de l'intervention chirurgicale.

Recommandations concernant votre hygiène de vie

Durant le traitement vous devez respecter certaines mesures d'hygiène de vie et notamment :

- conservez une activité physique (marcher, faire du sport).
- faites attention à votre alimentation : ne prenez pas d'alcoolisés,

• ne buvez pas trop le soir,

• maintenez un transit intestinal régulier.

Enfants

Ne donnez pas ce médicament à des enfants pas d'effet thérapeutique dans cette population. Mentions relatives aux excipients à effet secondaire

• Saccharose : L'utilisation de ce médicament peut entraîner une intolérance au fructose, un syndrome de maladie de sucre/surcose/ isomaltase (maladies héréditaires).

• Colorants azoïques (azorubine, carmoisine) : ces agents colorants azoïques et peut provoquer des réactions allergiques.

• Hydroxybenzoate de méthyle et de propylate » et peut provoquer des réactions allergiques.

Autres médicaments et UMAX® 400 ug LP Gélule : Ce médicament DOIT ETRE EVITÉ en association avec certains médicaments thérapeutiques (alpha1-bloquants). Cette association peut entraîner une baisse de la tension artérielle.

Informez votre médecin ou à votre pharmacien pourriez prendre tout autre médicament, y compris les médicaments de vente libre, sans ordonnance.

Il est important d'informer votre médecin ou à votre pharmacien pourront diminuer l'efficacité de certains médicaments (ketoconazole, érythromycine).

UMAX® 400 ug LP Gélule avec des aliments : Sans objet.

Grossesse, allaitement et fertilité

UMAX® 400 ug LP Gélule n'est pas indiqué dans le cours de la grossesse et son passage dans le lait maternel.

Chez l'homme, une éjaculation anormale a été rapportée. Cela signifie que le sperme ne sort pas par le canal éjaculateur (rétrograde) ou bien le volume d'éjaculation est très faible. Ce phénomène est sans gravité.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Ce médicament peut provoquer une baisse de la tension artérielle, des vertiges ou des malaises, notamment lors d'un changement de position. Il est déconseillé de conduire un véhicule ou d'utiliser des machines.

3. COMMENT PRENDRE UMAX® 400 ug LP Gélule ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en fonction des instructions de votre médecin ou les indications de votre pharmacien ou votre pharmacien en cas de doute.

Posologie

La dose recommandée est de 1 gélule par jour.

Mode d'administration

Le médicament est à utiliser par voie orale. Il est préférable de le croquer ou de le manger.

Fréquence d'administration

• Vous devez prendre votre dose quotidienne au réveil. Si la matin, vous ne prenez pas d'autre médicament.

LOT 210245
EXP 10/2022
PPV 121.40DH

Si vous avez des malaises ou des vertiges, veillez à prendre votre médicament. L'hypertrophie bénigne de la prostate peut entraîner des malaises et des vertiges. C'est pourquoi il est important de poursuivre le traitement que vous a prescrit, même si les troubles dont vous souffrez ont disparu.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut entraîner des effets indésirables.

UMAX® 400 ug LP

Microgranules à libération prolongée en gélules - Boîte de 10,30 et de 60
(Chlorhydrate de tamsulosine)

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que UMAX® 400 ug LP Gélule et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre UMAX® 400 ug LP Gélule ?
3. Comment prendre UMAX® 400 ug LP Gélule ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver UMAX® 400 ug LP Gélule ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE UMAX® 400 ug LP Gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : Alpha-bloquants / Médicaments utilisés dans l'hypertrophie bénigne de la prostate - code ATC : G04CA02

UMAX® 400 ug LP Gélule contient de la tamsulosine, une substance qui appartient à une famille de médicaments appelée alpha-bloquants.

UMAX® 400 ug LP Gélule est utilisé dans le traitement de certains troubles qui peuvent vous empêcher d'uriner normalement suite à une augmentation de volume (hypertrophie) bénigne de votre prostate.

Ce médicament est utilisé uniquement chez l'homme dans le traitement des douleurs du bas appareil urinaire associé à un élargissement de la glande prostatique (hyperplasie bénigne de la prostate). Ces douleurs peuvent être des difficultés à uriner (débit urinaire faible), miction goutte à goutte, besoin urgent d'uriner et envie d'uriner fréquemment aussi bien la nuit que le jour.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE UMAX® 400 ug LP Gélule ?

Ne prenez jamais UMAX® 400 ug LP Gélule :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active (la tamsulosine) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (vous trouverez la liste des composants à la rubrique 6).
- Si vous êtes allergique (hypersensible) à un médicament de la même famille (les alpha-bloquants).
- Si vous avez déjà eu des gonflements (œdèmes) du visage, des lèvres et de certaines parties de votre corps (les muqueuses) après avoir pris ce médicament.
- Si vous avez déjà eu auparavant une baisse de votre tension artérielle lors d'un passage de la position couchée à la position debout pouvant s'accompagner de vertiges et de malaises (hypotension orthostatique).
- Si vous avez une maladie sévère du foie (insuffisance hépatique sévère).

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre UMAX® 400 ug LP Gélule. Vous devez prévenir votre médecin si :

- Vous prenez des médicaments pour traiter une tension artérielle élevée.
- Vous avez déjà eu des malaises alors que vous urinez ou après mictionnelle.

• Vous avez une maladie des reins (insuffisance rénale chronique).

• Vous avez plus de 65 ans.

• Vous avez des maladies du cœur (patient coronarien). En cas d'aggravation par ce médicament devra être interrompu.

Pendant le traitement, si vous avez des gonflements (œdèmes) de certaines parties de votre corps (les muqueuses), cela peut être allergique au médicament. Dans ce cas, vous devez arrêter le médicament immédiatement votre médecin.

Des malaises peuvent survenir rarement avec UMAX® 400 ug LP Gélule. Aux premiers signes de vertiges ou de faiblesse, vous devrez allonger jusqu'à ce que les sensations de malaise disparaissent.

Si vous devez faire opérer de la cataracte ou du glaucome. Si vous devez faire opérer prochainement de la cataracte ou du glaucome, et si vous avez été ou êtes actuellement ou prévoyez d'être UMAX® 400 ug LP Gélule, informez-en votre ophtalmologiste avant l'opération.

Le chirurgien pourra prendre des précautions appropriées en fonction de votre traitement au moment de l'intervention chirurgicale.

Recommandations concernant votre hygiène de vie

Durant le traitement vous devez respecter certaines mesures d'hygiène de vie et notamment :

- conservez une activité physique (marcher, faire du sport).
- faites attention à votre alimentation : ne prenez pas d'alcoolisés,

• ne buvez pas trop le soir,

• maintenez un transit intestinal régulier.

Enfants

Ne donnez pas ce médicament à des enfants pas d'effet thérapeutique dans cette population. Mentions relatives aux excipients à effet secondaire

• Saccharose : L'utilisation de ce médicament peut entraîner une intolérance au fructose, un syndrome de maladie de sucre/ isomaltase (maladies héréditaires).

• Colorants azoïques (azorubine, carmoisine) : ces agents colorants azoïques et peut provoquer des réactions allergiques.

• Hydroxybenzoate de méthyle et de propylate » et peut provoquer des réactions allergiques.

Autres médicaments et UMAX® 400 ug LP Gélule : Ce médicament DOIT ETRE EVITÉ en association avec certains médicaments thérapeutiques (alpha1-bloquants). Cette association peut entraîner une baisse de la tension artérielle.

Informez votre médecin ou à votre pharmacien pourriez prendre tout autre médicament, ordonnance.

Il est important d'informer votre médecin ou pharmacien qui peuvent diminuer l'efficacité de certains médicaments (ketoconazole, érythromycine).

UMAX® 400 ug LP Gélule avec des aliments : Sans objet.

Grossesse, allaitement et fertilité

UMAX® 400 ug LP Gélule n'est pas indiqué dans le cours de la grossesse et son passage dans le lait maternel.

Chez l'homme, une éjaculation anormale a été rapportée. Cela signifie que le sperme ne sort pas par le canal éjaculateur (rétrograde) ou bien le volume d'éjaculation est très faible. Ce phénomène est sans gravité.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Ce médicament peut provoquer une baisse de la tension artérielle, des vertiges ou des malaises, notamment lors d'un changement de position. Il est déconseillé de conduire un véhicule ou d'utiliser des machines.

3. COMMENT PRENDRE UMAX® 400 ug LP Gélule ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en fonction des instructions de votre médecin ou les indications de votre pharmacien ou votre pharmacien en cas de doute.

Posologie

La dose recommandée est de 1 gélule par jour.

Mode d'administration

Le médicament est à utiliser par voie orale. Il est préférable de le croquer ou de le manger.

Fréquence d'administration

• Vous devez prendre votre dose quotidienne au réveil. Si la matin, vous ne prenez pas d'autre médicament.

LOT 210245
EXP 10/2022
PPV 121.40DH

Si vous avez des symptômes de malaise ou de vertiges, veillez à prendre votre médicament. L'hypertrophie bénigne de la prostate peut entraîner des symptômes de malaise. C'est pourquoi il est important de poursuivre le traitement que vous a prescrit, même si les symptômes sont devenus moins importants.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut entraîner des effets indésirables.

