

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR OBTENIR LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Consignes générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.



# MUPRAS

Mutuelle de Prévoyance  
& d'Actions Sociales  
de Royal Air Maroc

## Déclaration de Maladie

N° M21- 070708

☐ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

### Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 2225 Société : 111004

☐ Actif

☐ Pensionné(e)

☐ Autre :

Nom & Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

Tél. : Total des frais engagés : Dhs

### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : 06/04/2022

Nom et prénom du malade : DALI G. A. I. Age :

Lien de parenté : ☐ Lui-même

☐ Conjoint

☐ Enfant

Nature de la maladie : Diabète

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :

Autorisation CNDP N° : A-A-215 / 2019







# Docteur MIKOU Abdelhaq

Diplômé de la faculté de  
Médecine de Toulouse  
Spécialiste en  
Endocrinologie - Diabète  
Maladies de la nutrition

Obésité - Maigreux - Maladies du Cholestérol  
- Goitre -

Sur Rendez-vous

Membre de :

- SFD
- EASD
- MGSD

Société Francophone du Diabète  
Association Européenne pour l'Etude du Diabète  
Groupe Méditerranéen pour l'Etude du Diabète

Casablanca, le 06/04/2022

DARIFI EL BOULAD

$$85.00 \times 3 = 255.00$$

- subli inject 2x

1845 h 12

0845 h 30

$$38.10 \times 3 = 114.30$$

- Glyca 800

12x2

$$60.10$$

$$\times 7 =$$

$$420.70$$

Beyrouth 12x2

$$2270 \times 5 = 11350$$

$$903.50$$

الدكتور ميكو عبد الحق

خريج كلية الطب بتولوز

اختصاصي في

أمراض الغدد، مرض السكر

السمنة وأمراض الكوليسترول

بالموعد



PHARMACIE JERRADA  
61, Bd. Abdelrahim Bouabid  
Oasis - CASABLANCA  
Tél.: 05 22 31 06 74 - 05 22 31 06 75

Dr MIKOU A.  
ENDOCRINOLOGIE DIABETE  
39, BD. RAHAL EL MESKINI - CASA  
Tél.: 05 22 31 06 74 - 05 22 31 06 75



LOT212410 1  
EXP 09 2023  
RPV 35 00  
85.00

LOT212410 1  
EXP 09 2023  
RPV 35 00  
85.00

LOT212410 1  
EXP 09 2023  
RPV 35 00  
85.00





# Baycutène

LOT :

PER :

PPV :

22 30

## Formes et présentations

Baycutène® N crème : tube de 15 g de crème po

## Composition

Baycutène® N, crème pour application local  
100 g de crème contient 1 g de clotrimazo  
dexaméthasone (soit 0,04 g de dexamétha

Excipients : Alcool benzylique, Alcool cét  
chaîne moyenne, Hostaphat KW et l'eau p

## Classe Pharmaco-thérapeutique

Association d'un corticostéroïde et d'un an  
spectre d'action.

Anti-eczémateux.

## Indications

Baycutène® N crème est préconisé dans les infections fongiques  
cutanées à composante anti-inflammatoire importante.

## Contre-indications

Le traitement par Baycutène® N crème est contre-indiqué en cas de :

- Hypersensibilité au clotrimazole,
- Hypersensibilité à l'alcool cétostéarylique ou à l'un des autres composants,
- Affections cutanées spécifiques (syphilis, tuberculose),
- Infections cutanées d'origine virale (herpes, rosacée),
- Varicelle
- Réaction à la vaccination antivariolique,
- Dermatite péri buccale,
- Pansement occlusif en cas d'eczéma atopique,
- Durant le premier trimestre de la grossesse.

Pendant le reste de la grossesse ainsi que chez les nourrissons,  
Baycutène® N ne doit pas être appliqué sur des surfaces cutanées  
étendues ou pendant une longue durée. Il ne doit pas non plus être  
appliqué sur le sein allaitant.

Baycutène® N 15 g  
Crème



6 118000 170075





# Baycutène

LOT :

PER :

PPV :

22 30

## Formes et présentations

Baycutène® N crème : tube de 15 g de crème po

## Composition

Baycutène® N, crème pour application local  
100 g de crème contient 1 g de clotrimazo  
dexaméthasone (soit 0,04 g de dexamétha

Excipients : Alcool benzylique, Alcool cét  
chaîne moyenne, Hostaphat KW et l'eau p

## Classe Pharmaco-thérapeutique

Association d'un corticostéroïde et d'un an  
spectre d'action.

Anti-eczémateux.

## Indications

Baycutène® N crème est préconisé dans les infections fongiques  
cutanées à composante anti-inflammatoire importante.

## Contre-indications

Le traitement par Baycutène® N crème est contre-indiqué en cas de :

- Hypersensibilité au clotrimazole,
- Hypersensibilité à l'alcool cétostéarylique ou à l'un des autres composants,
- Affections cutanées spécifiques (syphilis, tuberculose),
- Infections cutanées d'origine virale (herpes, rosacée),
- Varicelle
- Réaction à la vaccination antivariolique,
- Dermatite péribuccale,
- Pansement occlusif en cas d'eczéma atopique,
- Durant le premier trimestre de la grossesse.

Pendant le reste de la grossesse ainsi que chez les nourrissons,  
Baycutène® N ne doit pas être appliqué sur des surfaces cutanées  
étendues ou pendant une longue durée. Il ne doit pas non plus être  
appliqué sur le sein allaitant.

Baycutène® N 15 g  
Crème



6 118000 170075





# Baycutène

LOT :

PER :

PPV :

22 30

## Formes et présentations

Baycutène® N crème : tube de 15 g de crème po

## Composition

Baycutène® N, crème pour application local  
100 g de crème contient 1 g de clotrimazo  
dexaméthasone (soit 0,04 g de dexamétha

Excipients : Alcool benzylique, Alcool cét  
chaîne moyenne, Hostaphat KW et l'eau p

## Classe Pharmaco-thérapeutique

Association d'un corticostéroïde et d'un an  
spectre d'action.

Anti-eczémateux.

## Indications

Baycutène® N crème est préconisé dans les infections fongiques  
cutanées à composante anti-inflammatoire importante.

## Contre-indications

Le traitement par Baycutène® N crème est contre-indiqué en cas de :

- Hypersensibilité au clotrimazole,
- Hypersensibilité à l'alcool cétostéarylique ou à l'un des autres composants,
- Affections cutanées spécifiques (syphilis, tuberculose),
- Infections cutanées d'origine virale (herpes, rosacée),
- Varicelle
- Réaction à la vaccination antivariolique,
- Dermatite péribuccale,
- Pansement occlusif en cas d'eczéma atopique,
- Durant le premier trimestre de la grossesse.

Pendant le reste de la grossesse ainsi que chez les nourrissons,  
Baycutène® N ne doit pas être appliqué sur des surfaces cutanées  
étendues ou pendant une longue durée. Il ne doit pas non plus être  
appliqué sur le sein allaitant.

Baycutène® N 15 g  
Crème



6 118000 170075





# Baycutène

LOT :

PER :

PPV :

22 30

## Formes et présentations

Baycutène® N crème : tube de 15 g de crème po

## Composition

Baycutène® N, crème pour application local  
100 g de crème contient 1 g de clotrimazo  
dexaméthasone (soit 0,04 g de dexamétha

Excipients : Alcool benzylique, Alcool cét  
chaîne moyenne, Hostaphat KW et l'eau p

## Classe Pharmaco-thérapeutique

Association d'un corticostéroïde et d'un an  
spectre d'action.

Anti-eczémateux.

## Indications

Baycutène® N crème est préconisé dans les infections fongiques  
cutanées à composante anti-inflammatoire importante.

## Contre-indications

Le traitement par Baycutène® N crème est contre-indiqué en cas de :

- Hypersensibilité au clotrimazole,
- Hypersensibilité à l'alcool cétostéarylique ou à l'un des autres composants,
- Affections cutanées spécifiques (syphilis, tuberculose),
- Infections cutanées d'origine virale (herpes, rosacée),
- Varicelle
- Réaction à la vaccination antivariolique,
- Dermatite péribuccale,
- Pansement occlusif en cas d'eczéma atopique,
- Durant le premier trimestre de la grossesse.

Pendant le reste de la grossesse ainsi que chez les nourrissons,  
Baycutène® N ne doit pas être appliqué sur des surfaces cutanées  
étendues ou pendant une longue durée. Il ne doit pas non plus être  
appliqué sur le sein allaitant.

Baycutène® N 15 g  
Crème



6 118000 170075





# Baycutène

LOT :

PER :

PPV :

22 30

## Formes et présentations

Baycutène® N crème : tube de 15 g de crème po

## Composition

Baycutène® N, crème pour application local  
100 g de crème contient 1 g de clotrimazo  
dexaméthasone (soit 0,04 g de dexamétha

Excipients : Alcool benzylique, Alcool cét  
chaîne moyenne, Hostaphat KW et l'eau p

## Classe Pharmaco-thérapeutique

Association d'un corticostéroïde et d'un an  
spectre d'action.

Anti-eczémateux.

## Indications

Baycutène® N crème est préconisé dans les infections fongiques  
cutanées à composante anti-inflammatoire importante.

## Contre-indications

Le traitement par Baycutène® N crème est contre-indiqué en cas de :

- Hypersensibilité au clotrimazole,
- Hypersensibilité à l'alcool cétostéarylique ou à l'un des autres composants,
- Affections cutanées spécifiques (syphilis, tuberculose),
- Infections cutanées d'origine virale (herpes, rosacée),
- Varicelle
- Réaction à la vaccination antivariolique,
- Dermatite péribuccale,
- Pansement occlusif en cas d'eczéma atopique,
- Durant le premier trimestre de la grossesse.

Pendant le reste de la grossesse ainsi que chez les nourrissons,  
Baycutène® N ne doit pas être appliqué sur des surfaces cutanées  
étendues ou pendant une longue durée. Il ne doit pas non plus être  
appliqué sur le sein allaitant.

Baycutène® N 15 g  
Crème



6 118000 170075



# GLYCAN®

## 1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

### a) dénomination commerciale

1. GLYCAN-500, comprimé
2. GLYCAN-850-RETARD, comprimé pelliculé

### b) Composition quantitative et qualitative

1. Chlorhydrate de metformine (N, N-diméthyl bigua)
2. Chlorhydrate de metformine (N, N-diméthyl bigua)

### c) Formes pharmaceutiques et présentations

1. GLYCAN-500 : comprimé, boîte de 50 et boîte de 100
2. GLYCAN-850-RETARD : comprimé pelliculé, boîtes de 30 et de 100

### d) Classe pharmaco-thérapeutique

A02 : Appareil digestif et métabolisme / Antidiabétiques oraux.

PPV

LOT

PER



GLYCAN® Retard 850

60 comprimés enrobés



6 118000 180203

## 2. DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

GLYCAN est un antidiabétique oral prescrit dans les diabètes y a surcharge pondérale, et lorsque le régime prescrit ne suffit, non traités à l'insuline, ou devenus résistants à l'insuline, il peut être associé à d'autres insulines dans certains cas, et peut aussi être associé à d'autres médicaments.

## 3. ATTENTION!

### a) Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament?

- Une défaillance des reins, même modérée, avec augmentation de l'azotémie dans le sang,
- Une infection avec fièvre élevée (urinaire, respiratoire, ...),
- Une insuffisance hépatique, cardiaque, ou respiratoire,
- En cas de vomissements ou de diarrées persistantes,
- Quand le diabète est déséquilibré, et/ou quand des vomissements, des douleurs abdominales, des crampes musculaires, accompagnent une grande fatigue et un malaise général,
- Avant et quelques jours après une opération chirurgicale avec anesthésie, ou une urographie veineuse ou une angiographie.
- En cas d'usage concomitant de l'antigonadotrope Danazol (DANATROL®), ou en cas de grossesse ou d'allaitement, bien informer le médecin prescripteur.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

### b) Précautions d'emploi

- L'élimination du GLYCAN est surtout urinaire : il faut donc boire assez d'eau de manière à maintenir une diurèse correcte, et surveiller la créatinine du sang toutes les 8 semaines.
- Un régime alimentaire hypocalorique et hypoglycémique reste impératif ainsi que le maintien d'une activité physique d'entretien pour lutter contre la sédentarité, quelque soit l'âge.
- En cas d'hospitalisation inopinée, la prise de GLYCAN sera signalée avant tout acte diagnostique invasif ou thérapeutique.



# GLYCAN®

## 1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

### a) dénomination commerciale

1. GLYCAN-500, comprimé
2. GLYCAN-850-RETARD, comprimé pelliculé

### b) Composition quantitative et qualitative

1. Chlorhydrate de metformine (N, N-diméthyl bigua)
2. Chlorhydrate de metformine (N, N-diméthyl bigua)

### c) Formes pharmaceutiques et présentations

1. GLYCAN-500 : comprimé, boîte de 50 et boîte de 100
2. GLYCAN-850-RETARD : comprimé pelliculé, boîtes de 30 et de 100

### d) Classe pharmaco-thérapeutique

A02 : Appareil digestif et métabolisme / Antidiabétiques oraux.

PPV

LOT

PER



GLYCAN® Retard 850

60 comprimés enrobés



6 118000 180203

## 2. DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

GLYCAN est un antidiabétique oral prescrit dans les diabètes y a surcharge pondérale, et lorsque le régime prescrit ne suffit, non traités à l'insuline, ou devenus résistants à l'insuline, il peut être associé à d'autres insulines dans certains cas, et peut aussi être associé à d'autres médicaments.

## 3. ATTENTION!

### a) Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament?

- Une défaillance des reins, même modérée, avec augmentation de l'azotémie.
- Une infection avec fièvre élevée (urinaire, respiratoire, ...).
- Une insuffisance hépatique, cardiaque, ou respiratoire.
- En cas de vomissements ou de diarrées persistantes.
- Quand le diabète est déséquilibré, et/ou quand des vomissements, des douleurs abdominales, des crampes musculaires, accompagnent une grande fatigue et un malaise général.
- Avant et quelques jours après une opération chirurgicale avec anesthésie, ou une urographie veineuse ou une angiographie.
- En cas d'usage concomitant de l'antigonadotrope Danazol (DANATROL®), ou en cas de grossesse ou d'allaitement, bien informer le médecin prescripteur.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

### b) Précautions d'emploi

- L'élimination du GLYCAN est surtout urinaire : il faut donc boire assez d'eau de manière à maintenir une diurèse correcte, et surveiller la créatinine du sang toutes les 8 semaines.
- Un régime alimentaire hypocalorique et hypoglycémique reste impératif ainsi que le maintien d'une activité physique d'entretien pour lutter contre la sédentarité, quelque soit l'âge.
- En cas d'hospitalisation inopinée, la prise de GLYCAN sera signalée avant tout acte diagnostique invasif ou thérapeutique.



# GLYCAN®

## 1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

### a) dénomination commerciale

1. GLYCAN-500, comprimé
2. GLYCAN-850-RETARD, comprimé pelliculé

### b) Composition quantitative et qualitative

1. Chlorhydrate de metformine (N, N-diméthyl bigua
2. Chlorhydrate de metformine (N, N-diméthyl bigua

### c) Formes pharmaceutiques et présentations

1. GLYCAN-500 : comprimé, boîte de 50 et boîte de 100
2. GLYCAN-850-RETARD : comprimé pelliculé, boîtes de 30 et 60

### d) Classe pharmaco-thérapeutique

A02 : Appareil digestif et métabolisme / Antidiabétiques oraux.

PPV

LOT

PER



GLYCAN® Retard 850

60 comprimés enrobés



6 118000 180203

## 2. DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

GLYCAN est un antidiabétique oral prescrit dans les diabètes y a surcharge pondérale, et lorsque le régime prescrit ne suffit, non traités à l'insuline, ou devenus résistants à l'insuline, il peut être associé à d'autres

## 3. ATTENTION!

### a) Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament?

- Une défaillance des reins, même modérée, avec augmentation de l'azotémie dans le sang,
- Une infection avec fièvre élevée (urinaire, respiratoire, ...),
- Une insuffisance hépatique, cardiaque, ou respiratoire,
- En cas de vomissements ou de diarrées persistantes,
- Quand le diabète est déséquilibré, et/ou quand des vomissements, des douleurs abdominales, des crampes musculaires, accompagnent une grande fatigue et un malaise général,
- Avant et quelques jours après une opération chirurgicale avec anesthésie, ou une urographie veineuse ou une angiographie.
- En cas d'usage concomitant de l'antigonadotrope Danazol (DANATROL®), ou en cas de grossesse ou d'allaitement, bien informer le médecin prescripteur.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

### b) Précautions d'emploi

- L'élimination du GLYCAN est surtout urinaire : il faut donc boire assez d'eau de manière à maintenir une diurèse correcte, et surveiller la créatinine du sang toutes les 8 semaines.
- Un régime alimentaire hypocalorique et hypoglycémique reste impératif ainsi que le maintien d'une activité physique d'entretien pour lutter contre la sédentarité, quelque soit l'âge.
- En cas d'hospitalisation inopinée, la prise de GLYCAN sera signalée avant tout acte diagnostique invasif ou thérapeutique.



# EPYCA® 50 mg, 75 mg et 150 mg

Prégabaline

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

## DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT

EPYCA 50 mg gélules, boîte de 14

EPYCA 75 mg gélules, boîte de 14

EPYCA 150 mg gélules, boîte de 14

## COMPOSITION DU MÉDICAMENT

(DCB): Prégabaline 50 mg, 75 mg, 150 mg

## Excipients :

Noyau :

lactose monohydraté, Amidon de maïs, Talc

Excipient à effet notoire : Lactose monohydraté

## CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE OU LE TYPE D'ACTIVITE

Epyca contient la prégabaline. Cette substance appartient à une classe de médicaments utilisés pour traiter l'épilepsie, les douleurs neuropathiques et le Trouble Anxieux Généralisé (TAG) chez l'adulte.

## INDICATIONS THERAPEUTIQUE

**Douleurs neuropathiques périphériques et centrales :** Epyca est utilisé pour traiter les douleurs persistantes causées par des lésions des nerfs. Différentes pathologies comme le diabète ou le zona peuvent induire des douleurs neuropathiques périphériques. Les manifestations douloureuses peuvent être décrites comme étant des sensations de chaleur, de brûlures, de douleur lancinante, d'engourdissement, de coup de poignard, de douleur fulgurante, de trépidation, d'engourdissement, de picotements, d'engourdissement, de picotements et de coups d'éclair. Les douleurs neuropathiques périphériques et centrales peuvent aussi être associées à des changements de l'humeur, des troubles du sommeil, de la fatigue, et peuvent avoir un impact sur le fonctionnement physique et social, et sur la qualité de vie en général.

**Épilepsie :** Epyca est utilisé pour traiter une forme particulière d'épilepsie (crises épileptiques partielles avec ou sans généralisation secondaire) chez l'adulte. Votre médecin vous prescrira Epyca pour aider à traiter votre épilepsie lorsque votre traitement actuel ne permet pas de contrôler complètement vos crises. Vous devez prendre Epyca en association à votre traitement actuel. Epyca ne doit pas être utilisé seul, mais doit toujours être utilisé en association à un autre traitement antiepileptique.

**Trouble Anxieux Généralisé :** Epyca est utilisé pour traiter le Trouble Anxieux Généralisé (TAG) chronique. Le TAG peut également induire une agitation ou une sensation d'excitation ou d'inériorité, une sensation d'être facilement fatigué, des difficultés à se concentrer ou des troubles de mémoire, une irritabilité, une tension musculaire ou des troubles du sommeil. Ceci est différent du stress et des tensions de la vie quotidienne.

## POSOLOGIE

### Mode et voie d'administration :

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Votre médecin déterminera la posologie qui convient dans votre cas.

Epyca est destiné à la voie orale uniquement.

**Douleurs neuropathiques périphériques et centrales, épilepsie ou Trouble Anxieux**

### Généralité :

- Prenez le nombre de gélules prescrit par votre médecin.
- La dose habituelle, qui a été adaptée à vous et à votre état, est comprise entre 150 mg et 600 mg par jour.

- Votre médecin vous dira si vous devez prendre Epyca deux fois ou trois fois par jour.

En cas de deux prises par jour, prenez Epyca une fois le matin et une fois le soir, environ aux mêmes heures chaque jour. En cas de trois prises par jour, prenez Epyca une fois le matin, une fois le midi et une fois le soir, environ aux mêmes heures chaque jour.

Si vous avez l'impression que l'effet d'Epyca est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien. Si vous êtes un patient âgé (de plus de 65 ans), vous devez prendre Epyca normalement sauf en cas de maladie des reins.

Votre médecin peut vous prescrire un horaire de prise et une dose différents en cas de maladie des reins.

Avalez la gélule entière avec de l'eau. Continuez à prendre Epyca jusqu'à ce que votre médecin vous dise d'arrêter.

## CONTRE-INDICATIONS

Ne prenez jamais Epyca :

- si vous êtes allergique (hypersensible) à la Prégabaline ou à l'un des autres composants contenus dans EPYCA.

## EFFETS INDESIRABLES

Comme tous les médicaments suivent pas systématiquement les effets indésirables listés ci-dessous :

- étourdissements, somnolence ;

- augmentation de l'appétit ;

- troubles de l'attention ;

- difficulté à parler, sensibilité à la fatigue, sensations de

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

Epyca® 50 mg

Prégabaline

14 gélules

PROMOPHARM S.A.









# EPYCA® 50 mg, 75 mg et 150 mg

Prégabaline

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

## DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT

EPYCA 50 mg gélules, boîte de 14

EPYCA 75 mg gélules, boîte de 14

EPYCA 150 mg gélules, boîte de 14

## COMPOSITION DU MÉDICAMENT

(DCB): Prégabaline 50 mg, 75 mg, 150 mg

## Excipients :

Noyau :

lactose monohydraté, Amidon de maïs, Talc

Excipient à effet notoire : Lactose monohydraté

## CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE OU LE TYPE D'ACTIVITE

Epyca contient la prégabaline. Cette substance appartient à une classe de médicaments utilisés pour traiter l'épilepsie, les douleurs neuropathiques et le Trouble Anxieux Généralisé (TAG) chez l'adulte.

## INDICATIONS THERAPEUTIQUE

**Douleurs neuropathiques périphériques et centrales :** Epyca est utilisé pour traiter les douleurs persistantes causées par des lésions des nerfs. Différentes pathologies comme le diabète ou le zona peuvent induire des douleurs neuropathiques périphériques. Les manifestations douloureuses peuvent être décrites comme étant des sensations de chaleur, de brûlures, de douleur lancinante, d'engourdissement, de coup de poignard, de douleur fulgurante, de trépidation, d'engourdissement, de picotements, d'engourdissement, de picotements et de coups d'éclair. Les douleurs neuropathiques périphériques et centrales peuvent aussi être associées à des changements de l'humeur, des troubles du sommeil, de la fatigue, et peuvent avoir un impact sur le fonctionnement physique et social, et sur la qualité de vie en général.

**Épilepsie :** Epyca est utilisé pour traiter une forme particulière d'épilepsie (crises épileptiques partielles avec ou sans généralisation secondaire) chez l'adulte. Votre médecin vous prescrira Epyca pour aider à traiter votre épilepsie lorsque votre traitement actuel ne permet pas de contrôler complètement vos crises. Vous devez prendre Epyca en association à votre traitement actuel. Epyca ne doit pas être utilisé seul, mais doit toujours être utilisé en association à un autre traitement antiepileptique.

**Trouble Anxieux Généralisé :** Epyca est utilisé pour traiter le Trouble Anxieux Généralisé (TAG) chronique. Le TAG peut également induire une agitation ou une sensation d'excitation ou d'inériorité, une sensation d'être facilement fatigué, des difficultés à se concentrer ou des troubles de mémoire, une irritabilité, une tension musculaire ou des troubles du sommeil. Ceci est différent du stress et des tensions de la vie quotidienne.

## POSOLOGIE

### Mode et voie d'administration :

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Votre médecin déterminera la posologie qui convient dans votre cas.

Epyca est destiné à la voie orale uniquement.

**Douleurs neuropathiques périphériques et centrales, épilepsie ou Trouble Anxieux**

### Généralité :

- Prenez le nombre de gélules prescrit par votre médecin.
- La dose habituelle, qui a été adaptée à vous et à votre état, est comprise entre 150 mg et 600 mg par jour.

- Votre médecin vous dira si vous devez prendre Epyca deux fois ou trois fois par jour.

En cas de deux prises par jour, prenez Epyca une fois le matin et une fois le soir, environ aux mêmes heures chaque jour. En cas de trois prises par jour, prenez Epyca une fois le matin, une fois le midi et une fois le soir, environ aux mêmes heures chaque jour.

Si vous avez l'impression que l'effet d'Epyca est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien. Si vous êtes un patient âgé (de plus de 65 ans), vous devez prendre Epyca normalement sauf en cas de maladie des reins.

Votre médecin peut vous prescrire un horaire de prise et une dose différents en cas de maladie des reins.

Avalez la gélule entière avec de l'eau. Continuez à prendre Epyca jusqu'à ce que votre médecin vous dise d'arrêter.

## CONTRE-INDICATIONS

Ne prenez jamais Epyca :

- si vous êtes allergique (hypersensible) à la Prégabaline ou à l'un des autres composants contenus dans EPYCA.

## EFFETS INDESIRABLES

Comme tous les médicaments suivent pas systématiquement les effets indésirables listés ci-dessous :

- étourdissements, somnolence ;

- augmentation de l'appétit ;

- troubles de l'attention ;

- difficulté à parler, sensibilité à la fatigue, sensations de

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

Epyca® 50 mg

Prégabaline

14 gélules

PROMOPHARM S.A.





# EPYCA® 50 mg, 75 mg et 150 mg

Prégabaline

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous. Vous pourrez avoir besoin de la relire.

- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

## DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT

EPYCA 50 mg gélules, boîte de 14

EPYCA 75 mg gélules, boîte de 14

EPYCA 150 mg gélules, boîte de 14

## COMPOSITION DU MÉDICAMENT

(DCB): Prégabaline 50 mg, 75 mg, 150 mg

## Excipients :

Noyau :

lactose monohydraté, Amidon de maïs, Talc

Excipient à effet notoire : Lactose monohydraté

## CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE OU LE TYPE D'ACTIVITE

Epyca contient la prégabaline. Cette substance appartient à une classe de médicaments utilisés pour traiter l'épilepsie, les douleurs neuropathiques et le Trouble Anxieux Généralisé (TAG) chez l'adulte.

## INDICATIONS THERAPEUTIQUE

**Douleurs neuropathiques périphériques et centrales :** Epyca est utilisé pour traiter les douleurs persistantes causées par des lésions des nerfs. Différentes pathologies comme le diabète ou le zona peuvent induire des douleurs neuropathiques périphériques. Les manifestations douloureuses peuvent être décrites comme étant des sensations de chaleur, de brûlures, de douleur lancinante, d'engourdissement, de coup de poignard, de douleur fulgurante, de crampes, d'endormissement, de picotements, d'engourdissement, de picotements et de coups d'éclair. Les douleurs neuropathiques périphériques et centrales peuvent aussi être associées à des changements de l'humeur, des troubles du sommeil, de la fatigue, et peuvent avoir un impact sur le fonctionnement physique et social, et sur la qualité de vie en général.

**Épilepsie :** Epyca est utilisé pour traiter une forme particulière d'épilepsie (crises épileptiques partielles avec ou sans généralisation secondaire) chez l'adulte. Votre médecin vous prescrira Epyca pour aider à traiter votre épilepsie lorsque votre traitement actuel ne permet pas de contrôler complètement vos crises. Vous devez prendre Epyca en association à votre traitement actuel. Epyca ne doit pas être utilisé seul, mais doit toujours être utilisé en association à un autre traitement antiepileptique.

**Trouble Anxieux Généralisé :** Epyca est utilisé pour traiter le Trouble Anxieux Généralisé (TAG) chronique. Le TAG peut également induire une agitation ou une sensation d'excitation ou d'inébranlabilité, une sensation d'être facilement fatigué, des difficultés à se concentrer ou des troubles de mémoire, une irritabilité, une tension musculaire ou des troubles du sommeil. Ceci est différent du stress et des tensions de la vie quotidienne.

## POSOLOGIE

### Mode et voie d'administration :

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Votre médecin déterminera la posologie qui convient dans votre cas.

Epyca est destiné à la voie orale uniquement.

**Douleurs neuropathiques périphériques et centrales, épilepsie ou Trouble Anxieux**

### Généralité :

- Prenez le nombre de gélules prescrit par votre médecin.
- La dose habituelle, qui a été adaptée à vous et à votre état, est comprise entre 150 mg et 600 mg par jour.

- Votre médecin vous dira si vous devez prendre Epyca deux fois ou trois fois par jour.

En cas de deux prises par jour, prenez Epyca une fois le matin et une fois le soir, environ aux mêmes heures chaque jour. En cas de trois prises par jour, prenez Epyca une fois le matin, une fois le midi et une fois le soir, environ aux mêmes heures chaque jour.

Si vous avez l'impression que l'effet d'Epyca est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien. Si vous êtes un patient âgé (de plus de 65 ans), vous devez prendre Epyca normalement sauf en cas de maladie des reins.

Votre médecin peut vous prescrire un horaire de prise et une dose différents en cas de maladie des reins.

Avalez la gélule entière avec de l'eau. Continuez à prendre Epyca jusqu'à ce que votre médecin vous dise d'arrêter.

## CONTRE-INDICATIONS

Ne prenez jamais Epyca :

- si vous êtes allergique (hypersensible) à la Prégabaline ou à l'un des autres composants contenus dans EPYCA.

## EFFETS INDESIRABLES

Comme tous les médicaments suivent pas systématiquement les effets indésirables.

Les effets indésirables les plus fréquents sont :

- étourdissements, somnolence ;

- augmentation de l'appétit ;

- troubles de l'attention ;

- difficulté à parler, sensibilité à la fatigue, sensations de

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

Epyca® 50 mg

Prégabaline

14 gélules

PROMOPHARM S.A.





# EPYCA® 50 mg, 75 mg et 150 mg

Prégabaline

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous. Vous pourriez avoir besoin de la lire.

- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

## DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT

EPYCA 50 mg gélules, boîte de 14

EPYCA 75 mg gélules, boîte de 14

EPYCA 150 mg gélules, boîte de 14

## COMPOSITION DU MÉDICAMENT

(DCB): Prégabaline 50 mg, 75 mg, 150 mg

## Excipients :

Noyau :

lactose monohydraté, Amidon de maïs, Talc

Excipient à effet notoire : Lactose monohydraté

## CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE OU LE TYPE D'ACTIVITE

Epyca contient la prégabaline. Cette substance appartient à une classe de médicaments utilisés pour traiter l'épilepsie, les douleurs neuropathiques et le Trouble Anxieux Généralisé (TAG) chez l'adulte.

## INDICATIONS THERAPEUTIQUE

**Douleurs neuropathiques périphériques et centrales :** Epyca est utilisé pour traiter les douleurs persistantes causées par des lésions des nerfs. Différentes pathologies comme le diabète ou le zona peuvent induire des douleurs neuropathiques périphériques. Les manifestations douloureuses peuvent être décrites comme étant des sensations de chaleur, de brûlures, de douleur lancinante, d'engourdissement, de coup de poignard, de douleur fulgurante, de trépidation, d'engourdissement, de picotements, d'engourdissement, de picotements et de coups d'éclair. Les douleurs neuropathiques périphériques et centrales peuvent aussi être associées à des changements de l'humeur, des troubles du sommeil, de la fatigue, et peuvent avoir un impact sur le fonctionnement physique et social, et sur la qualité de vie en général.

**Épilepsie :** Epyca est utilisé pour traiter une forme particulière d'épilepsie (crises épileptiques partielles avec ou sans généralisation secondaire) chez l'adulte. Votre médecin vous prescrira Epyca pour aider à traiter votre épilepsie lorsque votre traitement actuel ne permet pas de contrôler complètement vos crises. Vous devez prendre Epyca en association à votre traitement actuel. Epyca ne doit pas être utilisé seul, mais doit toujours être utilisé en association à un autre traitement antiepileptique.

**Trouble Anxieux Généralisé :** Epyca est utilisé pour traiter le Trouble Anxieux Généralisé (TAG) chronique. Le TAG peut également induire une agitation ou une sensation d'excitation ou d'inériorité, une sensation d'être facilement fatigué, des difficultés à se concentrer ou des troubles de mémoire, une irritabilité, une tension musculaire ou des troubles du sommeil. Ceci est différent du stress et des tensions de la vie quotidienne.

## POSOLOGIE

### Mode et voie d'administration :

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Votre médecin déterminera la posologie qui convient dans votre cas.

Epyca est destiné à la voie orale uniquement.

**Douleurs neuropathiques périphériques et centrales, épilepsie ou Trouble Anxieux**

### Généralité :

- Prenez le nombre de gélules prescrit par votre médecin.
- La dose habituelle, qui a été adaptée à vous et à votre état, est comprise entre 150 mg et 600 mg par jour.

- Votre médecin vous dira si vous devez prendre Epyca deux fois ou trois fois par jour. En cas de deux prises par jour, prenez Epyca une fois le matin et une fois le soir, environ aux mêmes heures chaque jour. En cas de trois prises par jour, prenez Epyca une fois le matin, une fois le midi et une fois le soir, environ aux mêmes heures chaque jour.

Si vous avez l'impression que l'effet d'Epyca est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien. Si vous êtes un patient âgé (de plus de 65 ans), vous devez prendre Epyca normalement sauf en cas de maladie des reins.

Votre médecin peut vous prescrire un horaire de prise et une dose différents en cas de maladie des reins.

Avalez la gélule entière avec de l'eau. Continuez à prendre Epyca jusqu'à ce que votre médecin vous dise d'arrêter.

## CONTRE-INDICATIONS

Ne prenez jamais Epyca :

- si vous êtes allergique (hypersensible) à la Prégabaline ou à l'un des autres composants contenus dans EPYCA.

## EFFETS INDESIRABLES

Comme tous les médicaments suivent pas systématiquement les effets indésirables.

Les effets indésirables les plus fréquents sont :

- étourdissements, somnolence ;

- augmentation de l'appétit ;

- troubles de l'attention, difficulté à parler, sensibilité à la fatigue, sensations de

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

Epyca® 50 mg

Prégabaline

14 gélules

PROMOPHARM S.A.





# EPYCA® 50 mg, 75 mg et 150 mg

Prégabaline

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous. Vous pourriez avoir besoin de la lire.

- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

## DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT

EPYCA 50 mg gélules, boîte de 14

EPYCA 75 mg gélules, boîte de 14

EPYCA 150 mg gélules, boîte de 14

## COMPOSITION DU MÉDICAMENT

(DCB): Prégabaline 50 mg, 75 mg, 150 mg

## Excipients :

Noyau :

lactose monohydraté, Amidon de maïs, Talc

Excipient à effet notoire : Lactose monohydraté

## CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE OU LE TYPE D'ACTIVITE

Epyca contient la prégabaline. Cette substance appartient à une classe de médicaments utilisés pour traiter l'épilepsie, les douleurs neuropathiques et le Trouble Anxieux Généralisé (TAG) chez l'adulte.

## INDICATIONS THERAPEUTIQUE

**Douleurs neuropathiques périphériques et centrales :** Epyca est utilisé pour traiter les douleurs persistantes causées par des lésions des nerfs. Différentes pathologies comme le diabète ou le zona peuvent induire des douleurs neuropathiques périphériques. Les manifestations douloureuses peuvent être décrites comme étant des sensations de chaleur, de brûlures, de douleur lancinante, d'engourdissement, de coup de poignard, de douleur fulgurante, de crampes, d'endormissement, de picotements, d'engourdissement, de picotements et de coups d'éclair. Les douleurs neuropathiques périphériques et centrales peuvent aussi être associées à des changements de l'humeur, des troubles du sommeil, de la fatigue, et peuvent avoir un impact sur le fonctionnement physique et social, et sur la qualité de vie en général.

**Épilepsie :** Epyca est utilisé pour traiter une forme particulière d'épilepsie (crises épileptiques partielles avec ou sans généralisation secondaire) chez l'adulte. Votre médecin vous prescrira Epyca pour aider à traiter votre épilepsie lorsque votre traitement actuel ne permet pas de contrôler complètement vos crises. Vous devez prendre Epyca en association à votre traitement actuel. Epyca ne doit pas être utilisé seul, mais doit toujours être utilisé en association à un autre traitement antiepileptique.

**Trouble Anxieux Généralisé :** Epyca est utilisé pour traiter le Trouble Anxieux Généralisé (TAG) chronique. Le TAG peut également induire une agitation ou une sensation d'excitation ou d'inérvation, une sensation d'être facilement fatigué, des difficultés à se concentrer ou des troubles de mémoire, une irritabilité, une tension musculaire ou des troubles du sommeil. Ceci est différent du stress et des tensions de la vie quotidienne.

## POSOLOGIE

### Mode et voie d'administration :

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Votre médecin déterminera la posologie qui convient dans votre cas.

Epyca est destiné à la voie orale uniquement.

**Douleurs neuropathiques périphériques et centrales, épilepsie ou Trouble Anxieux**

### Généralité :

- Prenez le nombre de gélules prescrit par votre médecin.
- La dose habituelle, qui a été adaptée à vous et à votre état, est comprise entre 150 mg et 600 mg par jour.

- Votre médecin vous dira si vous devez prendre Epyca deux fois ou trois fois par jour.

En cas de deux prises par jour, prenez Epyca une fois le matin et une fois le soir, environ aux mêmes heures chaque jour. En cas de trois prises par jour, prenez Epyca une fois le matin, une fois le midi et une fois le soir, environ aux mêmes heures chaque jour.

Si vous avez l'impression que l'effet d'Epyca est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien. Si vous êtes un patient âgé (de plus de 65 ans), vous devez prendre Epyca normalement sauf en cas de maladie des reins.

Votre médecin peut vous prescrire un horaire de prise et une dose différents en cas de maladie des reins.

Avalez la gélule entière avec de l'eau. Continuez à prendre Epyca jusqu'à ce que votre médecin vous dise d'arrêter.

## CONTRE-INDICATIONS

Ne prenez jamais Epyca :

- si vous êtes allergique (hypersensible) à la Prégabaline ou à l'un des autres composants contenus dans EPYCA.

## EFFETS INDESIRABLES

Comme tous les médicaments suivent pas systématiquement les effets indésirables.

Les effets indésirables les plus fréquents sont :

- étourdissements, somnolence ;

- augmentation de l'appétit ;

- troubles de l'attention, difficulté à parler, sensibilité à la fatigue, sensations de

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

vision floue, vertiges, troubles de la

Epyca® 50 mg

Prégabaline

14 gélules

PROMOPHARM S.A.





# EPYCA® 50 mg, 75 mg et 150 mg

Prégabaline

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

## DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT

EPYCA 50 mg gélules, boîte de 14

EPYCA 75 mg gélules, boîte de 14

EPYCA 150 mg gélules, boîte de 14

## COMPOSITION DU MÉDICAMENT

(DCB): Prégabaline 50 mg, 75 mg, 150 mg

## Excipients :

Noyau :

lactose monohydraté, Amidon de maïs, Talc

Excipient à effet notoire : Lactose monohydraté

## CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE OU LE TYPE D'ACTIVITE

Epyca contient la prégabaline. Cette substance appartient à une classe de médicaments utilisés pour traiter l'épilepsie, les douleurs neuropathiques et le Trouble Anxieux Généralisé (TAG) chez l'adulte.

## INDICATIONS THERAPEUTIQUE

**Douleurs neuropathiques périphériques et centrales :** Epyca est utilisé pour traiter les douleurs persistantes causées par des lésions des nerfs. Différentes pathologies comme le diabète ou le zona peuvent induire des douleurs neuropathiques périphériques. Les manifestations douloureuses peuvent être décrites comme étant des sensations de chaleur, de brûlures, de douleur lancinante, d'engourdissement, de coup de poignard, de douleur fulgurante, de trépidation, d'engourdissement, de picotements, d'engourdissement, de picotements et de coups d'éclair. Les douleurs neuropathiques périphériques et centrales peuvent aussi être associées à des changements de l'humeur, des troubles du sommeil, de la fatigue, et peuvent avoir un impact sur le fonctionnement physique et social, et sur la qualité de vie en général.

**Épilepsie :** Epyca est utilisé pour traiter une forme particulière d'épilepsie (crises épileptiques partielles avec ou sans généralisation secondaire) chez l'adulte. Votre médecin vous prescrira Epyca pour aider à traiter votre épilepsie lorsque votre traitement actuel ne permet pas de contrôler complètement vos crises. Vous devez prendre Epyca en association à votre traitement actuel. Epyca ne doit pas être utilisé seul, mais doit toujours être utilisé en association à un autre traitement antiepileptique.

**Trouble Anxieux Généralisé :** Epyca est utilisé pour traiter le Trouble Anxieux Généralisé (TAG) chronique. Le TAG peut également induire une agitation ou une sensation d'excitation ou d'inériorité, une sensation d'être facilement fatigué, des difficultés à se concentrer ou des troubles de mémoire, une irritabilité, une tension musculaire ou des troubles du sommeil. Ceci est différent du stress et des tensions de la vie quotidienne.

## POSOLOGIE

### Mode et voie d'administration :

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Votre médecin déterminera la posologie qui convient dans votre cas.

Epyca est destiné à la voie orale uniquement.

**Douleurs neuropathiques périphériques et centrales, épilepsie ou Trouble Anxieux**

### Généralité :

- Prenez le nombre de gélules prescrit par votre médecin.
- La dose habituelle, qui a été adaptée à vous et à votre état, est comprise entre 150 mg et 600 mg par jour.

- Votre médecin vous dira si vous devez prendre Epyca deux fois ou trois fois par jour.

En cas de deux prises par jour, prenez Epyca une fois le matin et une fois le soir, environ aux mêmes heures chaque jour. En cas de trois prises par jour, prenez Epyca une fois le matin, une fois le midi et une fois le soir, environ aux mêmes heures chaque jour.

Si vous avez l'impression que l'effet d'Epyca est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien. Si vous êtes un patient âgé (de plus de 65 ans), vous devez prendre Epyca normalement sauf en cas de maladie des reins.

Votre médecin peut vous prescrire un horaire de prise et une dose différents en cas de maladie des reins.

Avalez la gélule entière avec de l'eau. Continuez à prendre Epyca jusqu'à ce que votre médecin vous dise d'arrêter.

## CONTRE-INDICATIONS

Ne prenez jamais Epyca :

- si vous êtes allergique (hypersensible) à la Prégabaline ou à l'un des autres composants contenus dans EPYCA.

## EFFETS INDESIRABLES

Comme tous les médicaments suivent pas systématiquement les effets indésirables.

Les effets indésirables les plus fréquents sont :

- étourdissements, somnolence ;

- augmentation de l'appétit ;

- troubles de l'attention ;

- difficulté à parler, sensibilité à la fatigue, sensations de

vision floue, vertiges, troubles de l'équilibre, troubles de la

sécheresse de la bouche, troubles de la

généralisation du tonus musculaire, troubles de l'attention, troubles de la

sensation d'être fatigué, prise de poids, crampes musculaires, mal de gorge

Peu fréquents :

- perte d'appétit ;

- modification de la

évaluation, effets indésirables de l'arrêt

- troubles de la vue du champ visuel, hyperactivité, tremblements, sensibilité au

yeux secs, yeux

- troubles du rythme du cœur, accélération du rythme cardiaque, augmentation de la pression

sanguine, modifications des battements du cœur, insuffisance cardiaque

- rougeur de la face, bouchée de chaleur

- difficulté à respirer, sécheresse du nez, congestion nasale

- augmentation de la salive, brûlures d'estomac, engourdissement autour de la bouche

- transpiration, rash cutané, insomnie, fièvre

- contractions musculaires, gonflements articulaires, rigidité musculaire, douleurs y compris

douleurs musculaires, douleurs de la nuque

- douleur dans les seins

- miction difficile ou douloureuse, incontinence

- sensation de faiblesse, sensation de soif, oppression dans la poitrine

- modifications des résultats des tests sanguins et de la bile (augmentation de la cristalline

phosphatase du sang, augmentation de l'alanine aminotransférase, augmentation de

l'aspartate aminotransférase, diminution du nombre des plaquettes, neutropénie, augmentation

de la cristalline dans le sang, diminution du potassium dans le sang)

- hypersensibilité, gonflement du visage, démangeaisons, urticaire, écoulement nasal, saignement

nasal, toux, ronflements

- douleurs menstruelles

- brûlures des mains et des pieds

**Rares :** hypersensibilité d'effets jusqu'à 1 personne sur 1 000

- troubles de l'audition, vision oscillante, altération de la perception de la profondeur, acuité visuelle,

perte de la vue

- dilatation des pupilles, strabisme

- suurs froides, contraction de la gorge, gonflement de la langue

- inflammation du pancréas

- difficultés à avaler

- mouvement lent ou réduit du corps

- difficultés à écrire correctement

- accumulation de liquide dans l'abdomen

- liquide dans les poumons

- convulsions

- modifications de l'enregistrement des paramètres électriques (ECG) du cœur correspondant à

des troubles du rythme du cœur

- lésion musculaire

- écoulement mammaire, croissance anormale des seins, augmentation de la taille des seins chez

l'homme

- interruption des règles

Lot N°: 3484

EXP.: 04/23

PPV.: 60DH10

Epyca® 50 mg

Prégabaline

14 gélules

PROMOPHARM S.A.





# GLYCAN®

formine chlorhydrate

PPV 38.10 DH

LOT E004 PER 10/24

## 1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

### a) dénomination commerciale

1. GLYCAN-500, comprimé
2. GLYCAN-850-RETARD, comprimé pelliculé

### b) Composition quantitative et qualitative

1. Chlorhydrate de metformine (N, N-diméthyl biguanide), 500 mg
2. Chlorhydrate de metformine (N, N-diméthyl biguanide), 850 mg

### c) Formes pharmaceutiques et présentations

1. GLYCAN-500 : comprimé, boîte de 50 et boîte hospitalière de 500
2. GLYCAN-850-RETARD : comprimé pelliculé, boîtes de 30 et de 300

### d) Classe pharmaco-thérapeutique

A02 : Appareil digestif et métabolisme / Antidiabétiques oraux.

comprimés enrobés

GLYCAN® Retard 850

60 comprimés enrobés



## 2. DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

GLYCAN est un antidiabétique oral prescrit dans les diabètes de l'adulte, en particulier quand il y a une surcharge pondérale, et lorsque le régime prescrit ne suffit pas pour corriger seul ces diabètes non traités à l'insuline, ou devenus résistants à l'insuline, il peut être prescrit en complément de l'insuline dans certains cas, et peut aussi être associé à d'autres antidiabétiques oraux sulfonylurés.

## 3. ATTENTION!

### a) Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament ?

- Une défaillance des reins, même modérée, avec augmentation de la créatinine dans le sang,
- Une infection avec fièvre élevée (urinaire, respiratoire, ...),
- Une insuffisance hépatique, cardiaque, ou respiratoire,
- En cas de vomissements ou de diarrhées persistantes,
- Quand le diabète est déséquilibré, et/ou quand des vomissements, des douleurs abdominales, des crampes musculaires, accompagnent une grande fatigue et un malaise général,
- Avant et quelques jours après une opération chirurgicale avec anesthésie, ou une urographie veineuse ou une angiographie.
- En cas d'usage concomitant de l'antigonadotrope Danazol (DANATROL®), ou en cas de grossesse ou d'allaitement, bien informer le médecin prescripteur.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

### b) Précautions d'emploi

- L'élimination du GLYCAN est surtout urinaire : il faut donc boire assez d'eau de manière à maintenir une diurèse correcte, et surveiller la créatinine du sang toutes les 8 semaines.
- Un régime alimentaire hypocalorique et hypoglycémique reste impératif ainsi que le maintien d'une activité physique d'entretien pour lutter contre la sédentarité, quelque soit l'âge.
- En cas d'hospitalisation inopinée, la prise de GLYCAN sera signalée avant tout acte diagnostique invasif ou thérapeutique.



# GLYCAN®

formine chlorhydrate

PPV 38.10 DH

LOT E004 PER 10/24

## 1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

### a) dénomination commerciale

1. GLYCAN-500, comprimé
2. GLYCAN-850-RETARD, comprimé pelliculé

### b) Composition quantitative et qualitative

1. Chlorhydrate de metformine (N, N-diméthyl biguanide), 500 mg
2. Chlorhydrate de metformine (N, N-diméthyl biguanide), 850 mg

### c) Formes pharmaceutiques et présentations

1. GLYCAN-500 : comprimé, boîte de 50 et boîte hospitalière de 500
2. GLYCAN-850-RETARD : comprimé pelliculé, boîtes de 30 et de 300

### d) Classe pharmaco-thérapeutique

A02 : Appareil digestif et métabolisme / Antidiabétiques oraux.

comprimés enrobés

GLYCAN® Retard 850

60 comprimés enrobés



6 118000 180203

## 2. DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

GLYCAN est un antidiabétique oral prescrit dans les diabètes de routine, en particulier quand il y a une surcharge pondérale, et lorsque le régime prescrit ne suffit pas pour corriger seul ces diabètes non traités à l'insuline, ou devenus résistants à l'insuline, il peut être prescrit en complément de l'insuline dans certains cas, et peut aussi être associé à d'autres antidiabétiques oraux sulfonylurés.

## 3. ATTENTION!

### a) Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament?

- Une défaillance des reins, même modérée, avec augmentation de la créatinine dans le sang,
- Une infection avec fièvre élevée (urinaire, respiratoire, ...),
- Une insuffisance hépatique, cardiaque, ou respiratoire,
- En cas de vomissements ou de diarrhées persistantes,
- Quand le diabète est déséquilibré, et/ou quand des vomissements, des douleurs abdominales, des crampes musculaires, accompagnent une grande fatigue et un malaise général,
- Avant et quelques jours après une opération chirurgicale avec anesthésie, ou une urographie veineuse ou une angiographie.
- En cas d'usage concomitant de l'antigonadotrope Danazol (DANATROL®), ou en cas de grossesse ou d'allaitement, bien informer le médecin prescripteur.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

### b) Précautions d'emploi

- L'élimination du GLYCAN est surtout urinaire : il faut donc boire assez d'eau de manière à maintenir une diurèse correcte, et surveiller la créatinine du sang toutes les 8 semaines.
- Un régime alimentaire hypocalorique et hypoglycémique reste impératif ainsi que le maintien d'une activité physique d'entretien pour lutter contre la sédentarité, quelque soit l'âge.
- En cas d'hospitalisation inopinée, la prise de GLYCAN sera signalée avant tout acte diagnostique invasif ou thérapeutique.



# GLYCAN®

formine chlorhydrate

PPV 38.10 DH

LOT E004 PER 10/24

## 1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

### a) dénomination commerciale

1. GLYCAN-500, comprimé
2. GLYCAN-850-RETARD, comprimé pelliculé

### b) Composition quantitative et qualitative

1. Chlorhydrate de metformine (N, N-diméthyl biguanide), 500 mg
2. Chlorhydrate de metformine (N, N-diméthyl biguanide), 850 mg

### c) Formes pharmaceutiques et présentations

1. GLYCAN-500 : comprimé, boîte de 50 et boîte hospitalière de 500
2. GLYCAN-850-RETARD : comprimé pelliculé, boîtes de 30 et de 300

### d) Classe pharmaco-thérapeutique

A02 : Appareil digestif et métabolisme / Antidiabétiques oraux.

comprimés enrobés

GLYCAN® Retard 850

60 comprimés enrobés



## 2. DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

GLYCAN est un antidiabétique oral prescrit dans les diabètes de l'adulte, en particulier quand il y a une surcharge pondérale, et lorsque le régime prescrit ne suffit pas pour corriger seul ces diabètes non traités à l'insuline, ou devenus résistants à l'insuline, il peut être prescrit en complément de l'insuline dans certains cas, et peut aussi être associé à d'autres antidiabétiques oraux sulfonylurés.

## 3. ATTENTION!

### a) Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament ?

- Une défaillance des reins, même modérée, avec augmentation de la créatinine dans le sang,
- Une infection avec fièvre élevée (urinaire, respiratoire, ...),
- Une insuffisance hépatique, cardiaque, ou respiratoire,
- En cas de vomissements ou de diarrhées persistantes,
- Quand le diabète est déséquilibré, et/ou quand des vomissements, des douleurs abdominales, des crampes musculaires, accompagnent une grande fatigue et un malaise général,
- Avant et quelques jours après une opération chirurgicale avec anesthésie, ou une urographie veineuse ou une angiographie.
- En cas d'usage concomitant de l'antigonadotrope Danazol (DANATROL®), ou en cas de grossesse ou d'allaitement, bien informer le médecin prescripteur.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

### b) Précautions d'emploi

- L'élimination du GLYCAN est surtout urinaire : il faut donc boire assez d'eau de manière à maintenir une diurèse correcte, et surveiller la créatinine du sang toutes les 8 semaines.
- Un régime alimentaire hypocalorique et hypoglycémique reste impératif ainsi que le maintien d'une activité physique d'entretien pour lutter contre la sédentarité, quelque soit l'âge.
- En cas d'hospitalisation inopinée, la prise de GLYCAN sera signalée avant tout acte diagnostique invasif ou thérapeutique.