

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR OBTENIR LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com
Prise en charge : pec@mupras.com
Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

N° M20- 0004165

12/18/19

☒ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1053

Société : R.A.M.

☐ Actif

☐ Pensionné(e)

☐ Autre : Retraite

Nom & Prénom : KHADIJOU Khadija

Date de naissance : 22/02/1948

Adresse : 362 Bd Oued oum Rabie ouf

Tél. : 066256446

Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Professeur Hassan EL GHOMARI
Spécialiste en Endocrinologie
Diabétologie et Nutrition
Addresse : Cas. 1er / 14ème Etage Bât. 1000
N° 313 - Casablanca - Tél. 05 22 22 78 18

Date de consultation : 11/03/2022

Nom et prénom du malade : KHADIJOU Khadija

Age :

Lien de parenté : ☐ Lui-même

☐ Conjoint

☐ Enfant

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :

[Signature]

Autorisation CNDP N° : A-A-215 / 2019

14 AVR. 2022

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
11/03/22			300,00	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	11/03/22	1658,30

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
Analyse Radiologiques Dr. S. EL HANANE Bd Oum Rahn - Casablanca Tél: 05 77 90 90 44 N° ICE: 000 798908000008	11/03/22	B. 290	330,00

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				Coefficient DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> H 25533412 00000000 D 00000000 35533411 </div> <div> H 21433552 00000000 G 00000000 11433553 B </div> </div>			Coefficient DES TRAVAUX
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Hassan EL GHOMARI

Professeur à la F.M.P.C

Spécialiste en Endocrinologie - Diabétologie

Nutrition & Croissance

Ancien Attaché à l'hôpital Saint Luc
de Montréal - Canada



الدكتور حسن الغماري

أستاذ جامعي بكلية الطب و الصيدلة

أخصائي أمراض الغدد - داء السكري

التغذية و النمو

طبيب سابقا بمستشفى سان لوك

مونترéal - كندا

Casablanca, le : 11.03.22 : الدار البيضاء في

Mme KHIDIOUI KHADIJA

54,30
89,00 x 2

DIAMICRON 30

45,20 x 5 1-0-0 pendant 3 Mois

GLUCOPHAGE 850 MG

307,00 x 3 0-1-1 pendant 3 Mois

LYRICA 75

180,00 0-0-1 pendant 3 Mois

VECA 5

99,00 1 - 0 - 1 pendant 3 Mois

OLOXINE 200MG

1 - 0 - 1 pendant 10 jours

1658,30

صيدلية المنار
Pharmacie El Manar
Dr. K. EL GHOMARI
320 Boulevard Anoual - Casablanca

Professeur Hassan EL GHOMARI
Spécialiste en Endocrinologie
Diabétologie et Nutrition
Abdelmoumen Center Angle Boulevard Anoual
et Abdelmoumen N° 313 - Casablanca - Tél. 05 22 86 42 42

مركز عبد المومن، زاوية شارع أنوال وشارع عبد المومن، الطابق الثالث - رقم 313 - الدار البيضاء

Abdelmoumen Center, Angle Bd. Anoual et Bd. Abdelmoumen, 3^{ème} étage - N° 313 - Casablanca

E-mail : hassanelghomari@yahoo.fr : البريد الإلكتروني - Tél. : 05 22 86 14 14 / 05 22 86 37 44 : الهاتف

N° INP : 091028506 - ICE : 001663750000032

DIAMICRON® 30 mg
Gliclazide

Gliclazide

Comprimé à Libération Modifiée

ette notice avant de prendre ce médicament
ations importantes pour vous.

pourriez avoir besoin de la relire.

stions, interrogez votre médecin ou votre

pharmaciens.

On m'expliquant aussi à l'été

illement prescrit. Ne le donnez pas à
tre nocif, même si les signes de leur

effet indésirable, parlez-en à votre
applique aussi à tout effet indésirable
cette notice. (voir rubrique 4).

qui ne serait pas intervenu dans une telle

on modifiée et dans quels

Indre DIAMICRON 30 mg.

ation modifiée ?

→ Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver DIAMICRON 30 mg, comprimé à libération modifiée ?

6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE DIAMICRON 30 MG, COMPRIMÉ À LIBÉRATION MODIFIÉE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : sulfamide hypoglycémiant – dérivé de l'urée, code

- si vous souffrez de troubles hormonaux particuliers (troubles de la glande thyroïdienne, de la glande hypophysaire ou du cortex surrénal)

- si votre fonction rénale ou hépatique est sévèrement diminuée.

Si vous avez une hypoglycémie, vous pouvez présenter les symptômes suivants : maux de tête, faim intense, nausées, vomissements, fatigue, troubles de la vision, agitation, agressivité, manque de concentration, vigilance et temps de réaction altérés, dépression, confusion, troubles de la parole ou de la vision, troubles sensoriels, vertiges et sensation d'impuissance.

Les signes et symptômes suivants peuvent aussi survenir : transpiration, anxiété, battements du cœur rapides ou irréguliers, augmentation artérielle, forte douleur subite dans la poitrine qui peut irradier dans le bras (angine de poitrine).

Si le taux de sucre dans le sang continue à baisser, vous pouvez présenter une confusion importante (délire), des convulsions, perdre votre conscience et votre respiration peut être superficielle et les battements de votre cœur peuvent devenir irréguliers. Vous pouvez perdre conscience.

Dans la plupart des cas, les symptômes d'une hypoglycémie disparaissent rapidement si vous consommez du sucre, par exemple des comprimés, des morceaux de sucre, jus de fruits, thé sucré.

Vous devez donc toujours avoir sur vous du sucre (comprimés de glucose ou de sucre). Souvenez-vous que les édulcorants ne sont pas efficaces. Contactez votre médecin ou l'hôpital le plus proche si la prise de sucre n'est pas efficace ou si les symptômes réapparaissent.

Les symptômes d'une hypoglycémie peuvent être absents, être moins développés, ou vous pouvez ne pas vous rendre compte que votre taux de sucre dans le sang a baissé.

Ceci peut se produire chez les personnes âgées qui prennent certains (par exemple les médicaments agissant sur le système nerveux central bloquants).

Si vous êtes en situation de stress (par exemple accidents, opération fièvre,...), votre médecin peut temporairement faire un relais par un traitement à l'insuline.

Les symptômes d'une hyperglycémie (fort taux de sucre dans le sang) peuvent survenir lorsque le traitement par gliclazide n'a pas encore suffisamment abaissé la glycémie, lorsque vous n'avez pas respecté le traitement prescrit par votre médecin, ou si vous prenez des préparations à base de Millonectine. Si vous remarquez

Lyrica



Lyrica® 75 mg – 56 gélules
P.P.V : 307,00 DH



6 118001 170678

Lyrica® 75 mg – 56 gélules
P.P.V : 307,00 DH



6 118001 170678

Lyrica® 75 mg – 56 gélules
P.P.V : 307,00 DH



6 118001 170678

Information de l'utilisateur

25 mg gélules

75 mg gélules

150 mg gélules

300 mg gélules

prégabaline

Lisez attentivement la notice avant de prendre ce médicament. Certaines informations sont importantes pour vous.

Vous pourriez avoir besoin de la relire.

Avant de commencer le traitement, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Le médicament ne doit être pris que sur prescription médicale.

Ne le donnez pas à d'autres personnes.

Ne prenez pas de médicaments sans avis médical.

En cas d'effet indésirable, parlez-en à votre médecin.

Cette notice s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne

figure pas dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que Lyrica et dans quels cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Lyrica
3. Comment prendre Lyrica
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Lyrica
6. Contenu de l'emballage et autres informations

GLUCOPHAGE 500 mg, comprimé pelliculé
GLUCOPHAGE 850 mg, comprimé pelliculé
GLUCOPHAGE 1000 mg, comprimé pelliculé

Chlorhydrate de metformine

de prendre ce médicament.

demandez plus d'information à votre

ne donnez jamais à quelqu'un d'autre, être nocif.

marquez un effet indésirable non mentionné pharmacien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que GLUCOPHAGE, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?

2. Comment devez-vous prendre GLUCOPHAGE, comprimé pelliculé ?

3. Quels sont les effets indésirables possibles ?

4. Quelles précautions devez-vous prendre ?

5. Quelles sont les interactions possibles ?

6. Quelles sont les contre-indications ?

7. Quelles sont les autres informations importantes ?

8. Quelles sont les autres informations importantes ?

9. Quelles sont les autres informations importantes ?

10. Quelles sont les autres informations importantes ?

11. Quelles sont les autres informations importantes ?

12. Quelles sont les autres informations importantes ?

13. Quelles sont les autres informations importantes ?

14. Quelles sont les autres informations importantes ?

15. Quelles sont les autres informations importantes ?

16. Quelles sont les autres informations importantes ?

17. Quelles sont les autres informations importantes ?

18. Quelles sont les autres informations importantes ?

19. Quelles sont les autres informations importantes ?

20. Quelles sont les autres informations importantes ?

21. Quelles sont les autres informations importantes ?

22. Quelles sont les autres informations importantes ?

23. Quelles sont les autres informations importantes ?

24. Quelles sont les autres informations importantes ?

25. Quelles sont les autres informations importantes ?

26. Quelles sont les autres informations importantes ?

27. Quelles sont les autres informations importantes ?

28. Quelles sont les autres informations importantes ?

29. Quelles sont les autres informations importantes ?

30. Quelles sont les autres informations importantes ?

31. Quelles sont les autres informations importantes ?

32. Quelles sont les autres informations importantes ?

33. Quelles sont les autres informations importantes ?

34. Quelles sont les autres informations importantes ?

35. Quelles sont les autres informations importantes ?

36. Quelles sont les autres informations importantes ?

37. Quelles sont les autres informations importantes ?

38. Quelles sont les autres informations importantes ?

39. Quelles sont les autres informations importantes ?

40. Quelles sont les autres informations importantes ?

41. Quelles sont les autres informations importantes ?

42. Quelles sont les autres informations importantes ?

43. Quelles sont les autres informations importantes ?

44. Quelles sont les autres informations importantes ?

45. Quelles sont les autres informations importantes ?

46. Quelles sont les autres informations importantes ?

47. Quelles sont les autres informations importantes ?

48. Quelles sont les autres informations importantes ?

49. Quelles sont les autres informations importantes ?

50. Quelles sont les autres informations importantes ?

51. Quelles sont les autres informations importantes ?

52. Quelles sont les autres informations importantes ?

53. Quelles sont les autres informations importantes ?

54. Quelles sont les autres informations importantes ?

55. Quelles sont les autres informations importantes ?

56. Quelles sont les autres informations importantes ?

57. Quelles sont les autres informations importantes ?

58. Quelles sont les autres informations importantes ?

59. Quelles sont les autres informations importantes ?

60. Quelles sont les autres informations importantes ?

interventions chirurgicales. Votre médecin décidera si vous avez besoin ou non d'un traitement d'arrêt pendant cette période. Il est important que vous suiviez précisément les instructions de votre médecin.

Mises en garde spéciales et précautions d'emploi :

Avertissements et précautions

Risque d'acidose lactique

Glucophage peut provoquer un effet indésirable rare, mais très grave, appelé « acidose lactique » en particulier si vous reins ne fonctionnent pas correctement. Le risque de développer une acidose lactique augmente également en cas de diabète mal contrôlé, d'infections graves, de jeûne prolongé ou de consommation d'alcool, de déshydratation (voir informations complémentaires ci-dessous), problèmes au foie et toutes autres affections médicales pour lesquelles une partie du corps reçoit un apport réduit en oxygène (les maladies cardiaques aiguës sévères, par exemple).

Si l'une de ces situations s'applique à vous, adressez-vous à votre médecin pour recevoir des instructions supplémentaires.

Arrêtez de prendre Glucophage pendant une courte période si vous souffrez d'une affection susceptible d'être associée à une déshydratation (perte importante de liquides corporels) tels que vomissements sévères, de la diarrhée, de la fièvre, une exposition à la chaleur ou si vous buvez moins de liquides qu'à l'habitude. Adressez-vous à votre médecin pour obtenir des instructions supplémentaires.

Arrêtez de prendre Glucophage et contactez immédiatement un médecin ou l'hôpital le plus proche si vous présentez les symptômes d'une acidose lactique, car cette affection peut entraîner un coma.

Les symptômes de l'acidose lactique comprennent :

- vomissements
- maux d'estomac (douleurs abdominales)
- crampes musculaires
- sensation générale de malaise associée à une grande fatigue
- difficultés à respirer
- diminution de la température corporelle et du rythme cardiaque

L'acidose lactique est une urgence médicale qui doit être traitée à l'hôpital.

Si vous devez subir une opération chirurgicale importante, arrêtez de prendre Glucophage au moment de l'opération et pendant un certain temps après l'intervention. Votre médecin décidera à quel moment vous devez arrêter et reprendre votre traitement par Glucophage.

Glucophage à lui seul ne provoque pas d'hypoglycémie (taux de sucre dans le sang trop faible). Cependant, si vous prenez Glucophage en même temps que d'autres médicaments pour traiter le diabète qui peuvent engendrer une hypoglycémie (comme les sulfamides hypoglycémifiants, l'insuline, les mégliténides), il y a un risque d'hypoglycémie. Si vous ressentez des symptômes d'hypoglycémie, tels que des faiblesses, des vertiges, une augmentation de la transpiration, des battements de cœur rapides, des troubles de la vision ou des difficultés à vous concentrer, boire ou manger quelque chose contenant du sucre devrait vous aider à vous sentir mieux.

Pendant votre traitement par Glucophage, votre médecin contrôlera votre fonction rénale au moins une fois par an ou plus fréquemment si vous êtes âgé(e) et/ou si votre fonction rénale s'est détériorée.

Enfants : Sans objet.

Liste des exceptions à effet notoire : Sans objet.

Interactions :

Autres médicaments et GLUCOPHAGE, comprimé pelliculé :

Si vous devez recevoir une injection d'un produit de contraste contenant de l'iode, par exemple, pour une radiographie ou un scanner, vous devrez arrêter de prendre Glucophage avant ou au moment de l'injection. Votre médecin décidera du moment où vous devrez arrêter et reprendre la prise de votre traitement par Glucophage.

Informez votre médecin si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament. Vous devrez peut-être passer plus fréquemment des tests de la glycémie ou de la fonction rénale ou votre médecin devra peut-être ajuster la posologie de Glucophage. Il est particulièrement important de signaler les médicaments suivants :

- Les médicaments qui augmentent la production d'urine (diurétiques).
- Des médicaments utilisés pour traiter la douleur et l'inflammation (AINS ou inhibiteurs de la COX) tels que l'ibuprofène et le célécoxib).
- Certains médicaments utilisés pour traiter l'hypertension artérielle (inhibiteurs de l'ECA et antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II).
- Agonistes des récepteurs bêta-2-adrénergiques comme le salbutamol ou la terbutaline (utilisés pour traiter l'asthme).
- Corticostéroïdes (utilisés pour traiter diverses affections, notamment des inflammations sévères de la peau ou l'asthme).
- Les médicaments qui peuvent modifier la quantité de Glucophage dans le sang, en particulier vous avez une fonction rénale réduite (comme le verapamil, la flécaïne, la cimétidine, le diltiazem, la ranitidine, le triméthoprime, le vandetanib, l'isavuconazole, le cizolnib et l'olaptes).
- Autres médicaments utilisés pour traiter le diabète.

Evitez une consommation excessive d'alcool pendant la prise de Glucophage, car cela peut augmenter le risque d'acidose lactique (voir la rubrique « Avertissements et précautions »).

Utilisation en cas de grossesse et d'allaitement :

Grossesse et allaitement :

Pendant la grossesse, vous avez besoin d'insuline pour traiter votre diabète. Informez votre médecin si vous êtes enceinte, pensez l'être ou prévoyez de l'être, afin qu'il/elle puisse modifier votre traitement. Ce médicament n'est pas recommandé si vous allaitez votre enfant ou si vous avez l'intention de le faire.

L'insuline est une hormone produite par le pancréas qui permet à votre corps de récupérer le glucose (sucre) présent dans le sang et de l'utiliser pour produire de l'énergie ou le stocker.

Si vous ne produisez pas suffisamment d'insuline ou que votre corps utilise mal le glucose, vous pouvez développer un diabète. Le diabète est une maladie chronique qui nécessite un traitement à long terme.

Glucophage à long terme permet également d'aider à contrôler le diabète. Glucophage est associé à une stabilité de la glycémie.

Glucophage est utilisé pour traiter le diabète de type 2 (aussi appelé « diabète non insulino-dépendant ») et l'exercice physique seuls n'ont pas suffi à contrôler votre glycémie.

Glucophage peut être utilisé seul ou avec d'autres médicaments contre le diabète.

Vous ne devez pas prendre Glucophage seul ou avec d'autres médicaments contre le diabète.

Ne prenez jamais GLUCOPHAGE, comprimé pelliculé, si vous êtes allergique à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.

Ne prenez jamais GLUCOPHAGE, comprimé pelliculé, si vous êtes allergique à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.

Ne prenez jamais GLUCOPHAGE, comprimé pelliculé, si vous êtes allergique à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.

Ne prenez jamais GLUCOPHAGE, comprimé pelliculé, si vous êtes allergique à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.

Ne prenez jamais GLUCOPHAGE, comprimé pelliculé, si vous êtes allergique à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.

Ne prenez jamais GLUCOPHAGE, comprimé pelliculé, si vous êtes allergique à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.

Ne prenez jamais GLUCOPHAGE, comprimé pelliculé, si vous êtes allergique à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.

Ne prenez jamais GLUCOPHAGE, comprimé pelliculé, si vous êtes allergique à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.

Ne prenez jamais GLUCOPHAGE, comprimé pelliculé, si vous êtes allergique à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.

Ne prenez jamais GLUCOPHAGE, comprimé pelliculé, si vous êtes allergique à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.

Ne prenez jamais GLUCOPHAGE, comprimé pelliculé, si vous êtes allergique à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.

Veca®

Comprimé pelliculé

LOT : 5862

UT. AV : 12-24

P.P.V : 108 DH 00

votre pharmacien.

- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que VECA®, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre VECA®, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre VECA®, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver VECA®, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE VECA®, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : Médicaments urologiques, médicaments de l'incontinence urinaire.

La solifénacine succinate (la substance active de VECA®)

de pompage du cœur insuffisante) ou une maladie du rein]. Si vous avez une infection urinaire, votre médecin vous prescrira un antibiotique (traitement contre certaines infections bactériennes).

Autres médicaments et VECA®, comprimé pelliculé

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament. Il est particulièrement important que vous préveniez votre médecin si vous prenez :

- D'autres médicaments anticholinergiques, car les effets et les effets indésirables des deux médicaments peuvent être accentués.
- Des médicaments cholinergiques, car ils peuvent réduire l'effet de VECA®, comprimé pelliculé.
- Des médicaments tels que le métoclopramide ou le cisapride, qui accélèrent le fonctionnement du tube digestif. VECA®, comprimé pelliculé peut réduire les effets de ces médicaments.
- Des médicaments tels que le kétoconazole, le ritonavir, le nelfinavir, l'itraconazole, le vérapamil ou le diltiazem, qui ralentissent la dégradation de VECA®, comprimé pelliculé dans l'organisme.
- Des médicaments tels que la rifampicine, la phénytoïne ou la carbamazépine, car ils peuvent accélérer la dégradation de VECA®, comprimé pelliculé dans l'organisme.
- Des médicaments tels que les bisphosphonates, qui peuvent déclencher ou aggraver une œsophagite (inflammation de l'œsophage).

VECA®, comprimé pelliculé contient du lactose :

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

VECA®, comprimé pelliculé avec des aliments et boissons

VECA®, comprimé pelliculé peut être pris indifféremment pendant ou en dehors des repas.

succinate. En cas de survenue d'un angioedème, la solifénacine succinate doit être immédiatement arrêté et un traitement et/ou des mesures appropriées doivent être pris.

VECA®, comprimé pelliculé peut provoquer les autres effets indésirables suivants :

Très fréquents (peut affecter plus de 1 personne sur 10)

- Sécheresse de la bouche.

Fréquents (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10)

- Vision trouble.
- Constipation, nausées, indigestion avec des symptômes tels que lourdeur abdominale, douleur abdominale, régurgitations, nausées et brûlures d'estomac (dyspepsie), gêne au niveau de l'estomac.

Peu fréquents (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 100)

- Infection urinaire, infection de la vessie.
- Somnolence.
- Perturbation du goût (dysgueusie).
- Sécheresse (irritation) des yeux.
- Sécheresse du nez.
- Reflux gastro-œsophagien.
- Sécheresse de la gorge.
- Sécheresse de la peau.
- Difficultés pour uriner.
- Fatigue.
- Accumulation de liquide dans les jambes (œdème).

Rares (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000)

- Accumulation d'une grande quantité de matières fécales dans le gros intestin (fécalome).
- Accumulation d'urine dans la vessie par impossibilité de vider la vessie (rétention urinaire).
- Sensations vertigineuses, maux de tête.
- Vomissements.
- Démangeaisons, rash.

OLOXINE® 200 mg



Ofloxacin

LOT: 069
EXP: SEP 2024
P: 99 DH 00

t :

Ofloxacin 200 mg
Excipients : Croscarmellose sodique ; Cellulose microcristalline ; Povidone ; Stéarate de magnésium ; Silice colloïdale ; HPC E-15 ; Dioxyde de titane ; Talc ; Propylène glycol ; Alcool isopropylique ; Oxyde de fer jaune, eau purifiée.

FORMES ET PRESENTATIONS :

Comprimés pelliculés, boîte de 10 et boîte de 20 cps sous blister.

PROPRIETES :

Ofloxacin est un antibiotique de synthèse à large spectre, appartenant à la famille des fluoroquinolones. Son activité est fortement bactéricide par inhibition de l'ADN-gyrase bactérienne.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

Elles procèdent de l'activité antibactérienne et des caractéristiques pharmacocinétiques de l'ofloxacin.

Ofloxacin est indiquée dans le traitement :

- des infections urinaires ;
- des infections sévères dans les manifestations prostatiques ;
- des infections gynécologiques hautes ;
- de relais des infections ostéoarticulaires ;
- de la suppuration bronchique, en l'absence de toute atteinte parenchymateuse ;
- des infections ORL.

CONTRE INDICATIONS :

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

Docteur Hassan EL GHOMARI

Professeur à la F.M.P.C

Spécialiste en Endocrinologie - Diabétologie

Nutrition & Croissance

Ancien Attaché à l'hôpital Saint Luc
de Montréal - Canada



الدكتور حسن الغماري

أستاذ جامعي بكلية الطب والصيدلة

أخصائي أمراض الغدد - داء السكري

التغذية و النمو

طبيب سابقا بمستشفى سان لوك

مونترéal - كندا

Casablanca, le : 11 03 2008 : الدار البيضاء في :

MME KHIDIQUI KHADIJA

Analyses :

Glycémie à jeun
Hémoglobine glycosylée
CRP
Calcémie
Créatinine

Professeur Hassan EL GHOMARI
Spécialiste en Endocrinologie
Diabétologie et Nutrition
Abdelmoumen Center Angle Boulevard Anoual
et Abdelmoumen N° 313 - Casa - Tél: 05 22 86 14 14

LABORATOIRE VCCIO
Analyses Médicales
Dr. Saïd EL HAFIANE
199 Bd Oum Rabil - Casablanca
Tél : 05.22.90.90.44
N° ICE : 001698808000008

Mme KHIDIQUI Khadija
22-02-1948 F




2203112014

A coller sur l'ordonnance

مركز عبد المومن، زاوية شارع أنوال و شارع عبد المومن، الطابق الثالث - رقم 313 - الدار البيضاء
Abdelmoumen Center, Angle Bd. Anoual et Bd. Abdelmoumen, 3^{ème} étage - N° 313 - Casablanca

الهاتف : 05 22 86 14 14 / 05 22 86 37 44 - البريد الإلكتروني : E-mail : hassanelghomari@yahoo.fr

N° INP : 091028506 - ICE : 00163750000032



مختبر التحليلات الطبية

LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE

ORBIO

Dr.Said EL HAFIANE : Pharmacien Biologiste, Ancien interne des hôpitaux de Nancy (France)

FACTURE N : 220300247

CASABLANCA le 11-03-2022

Mme Khadija KHIDIOUI

Demande N° 2203112014

Date de l'examen : 11-03-2022

Analyses :

Récapitulatif des analyses

CN	Analyse	Val	Clefs
PS	Prélèvement sang adulte	E10	E
0104	Calcium	B30	B
0111	Créatinine	B30	B
0118	Glycémie	B30	B
0119	Hémoglobine glycosylée	B100	B
0370	C R P (Protéine C réactive)	B100	B

Total des B : 290

TOTAL DOSSIER : 330.00DH

Arrêtée la présente facture à la somme de : trois cent trente dirhams

LABORATOIRE ORBIO
Analyses Médicales
Dr. Said EL HAFIANE
199 Bd Oum Rabi - Casablanca
Tél : 07.22.90.90.44
Fax : 07.22.90.90.44
N° de Facture : 2203000008

RIB BMCI : 013 78 001091 000 38 30013 648


Recto - Verso

www.orbio.ma - HORAIRES D'OUVERTURE

du Lundi au Vendredi de 7h30 à 18h30 / le Samedi 8h00 à 13h00

199 Boulevard Oum Rabi, EL OULFA Casablanca Tél.: +212 (0)5 22 90 90 44 / Fax : +212 (0)5 22 90 90 42 / Email : contact@orbio.ma

T P : 34044873 - I F : 15240654 - CNSS : 9115842 - ICE : 001698908000008



مختبر التحليلات الطبية

LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE

ORBIO

Dr.Said EL HAFIANE : Pharmacien Biologiste, Ancien interne des hôpitaux de Nancy (France)

A Casablanca, le Vendredi 11 Mars 2022

Dossier N° : 2203112014

Mme Khadija KHIDIOUI

Né(e) le : 22-02-1948

Prélevé le : au labo 11-03-2022 08:40

Prescription : Dr. HASSAN EL GHOMARI

BIOCHIMIE SANGUINE

Sang tube sec, gel, héparine

Glycémie à jeun

(Héxokinase)


Mme Khadija KHIDIOUI
CASABLANCA



1.20 g/l (0.74-1.15)
6.66 mmol/l (4.11-6.38)

25-10-2021

1.01



LABORATOIRE ORBIO
Analyses Médicales
Dr. Said EL HAFIANE
199 Bd Oum Rabii - Casablanca
Tél : 05 22 90 90 44
N° ICE : 001693708000003

Page 1 sur 3

Recto - Verso

www.orbio.ma - HORAIRES D'OUVERTURE

du Lundi au Vendredi de 7h30 à 18h30 / le Samedi 8h00 à 13h00

199 Boulevard Oum Rabii, EL OULFA Casablanca Tél.: +212 (0)5 22 90 90 44 / Fax : +212 (0)5 22 90 90 42 / Email : contact@orbio.ma

T.P : 36046873 - I.F : 15240654 - CNSS : 9115842 - ICE : 001693708000003

HbA1c :**7.2 %**

(4.0–6.5)

12-10-2021

6.8

(Méthode H.P.L.C Biorad D10, certifiée par les sociétés internationales de standardisation (IFCC), sang total)


Intervalles de références selon l'ANAES :

4.0 – 6.0 % : état non diabétique ou diabète très bien équilibré.

6.1 – 6.5 % : diabète bien équilibré.

6.6 – 8.0 % : diabète à surveiller. Modification du traitement à envisager en fonction de l'état clinique et du résultat du prochain contrôle d'HbA1c.

Sup. à 8 % : diabète non équilibré. Modification du traitement recommandé si un résultat équivalent est retrouvé lors du prochain dosage.

**Créatinine**

(Cinétique)

8.1 mg/l

(5.1–13.0)

04-02-2022

7.3

71.7 μ mol/l

(45.1–115.0)

Clairance – MDRD

(Clairance créatinine estimée : patient type Caucasiens)

74 ml/mn

04-02-2022

83

MDRD estimée pour un patient de type NON caucasien:

90 ml/mn

101

Intervalles de références

– 60 < DFG < 80 ml/mn : F.R. à évaluer en fonction de l'âge du patient.

– 30 < DFG < 60 ml/mn : I.R. modérée

– 10 < DFG < 30 ml/mn : IR sévère

– DFG < 10 ml/mn : IR terminale

Calcémie Ca

(ArsenazoIII)

91.8 mg/l

(88.0–102.0)

15-01-2020

89.0

2.29 mmol/l

(2.19–2.54)

CRP

(Immunturbidimétrie)


<5.0 mg/l

(<5.0)

12-10-2021

7.3

LABORATOIRE CRISTO
 Analyses Médicales
 Dr. Said El HAYANE
 199 Bd Oum Rabia Casablanca
 Tél : 05.22.90.90.44
 N° ICE: 00719968000000



مختبر التحليلات الطبية

LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE

ORBIO

Dr.Said EL HAFIANE : Pharmacien Biologiste, Ancien interne des hôpitaux de Nancy (France)

2203112014 — Mme Khadija KHIDIQUI

Validé biologiquement par le Dr BIOLOGISTE Assistant

DUPLICATE

LABORATOIRE ORBIO
Analyses Médicales
Dr. Said EL HAFIANE
199 Bd Oum Rabii - Casablanca
Tél : 05.22.90.90.44
N° ICE : 001698203000000

Page 3 sur 3

Recto - Verso

www.orbio.ma - HORAIRES D'OUVERTURE

du Lundi au Vendredi de 7h30 à 18h30 / le Samedi 8h00 à 13h00

199 Boulevard Oum Rabii , EL OULFA Casablanca Tél.: +212 (0)5 22 90 90 44 / Fax : +212 (0)5 22 90 90 42 / Email : contact@orbio.ma

T.P : 36046873 - I.F : 15240654 - CNSS : 9115842 - ICE : 001698203000000