

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR TIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## ditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## rmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## cique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## ntaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

## maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

119099

## Déclaration de Maladie : N° P19- 0016297

### Maladie

### Dentaire

### Optique

### Autres

#### Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1856

Société :

RAM -

RETRAITE -

Actif

Pensionné(e)

Autre

Nom & Prénom :

SLAOUI KITNATA

Date de naissance :

1956

Adresse :

50 lot KHALFAOUI oujba

Tél.:

061.87.05.00

Total des frais engagés : 538,20 Dhs

#### Cadre réservé au Médecin

Pr. Noureddine OULAOU  
**NEUROCHIRURGIEN**  
**Professeur Agrégé**  
**INP : 161187421**

Cachet du médecin :

Date de consultation : 16/03/22

Nom et prénom du malade : SLAOUI KITNATA

Age : 62

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie : Polyarthrose, Khnata

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Oujba

Le : 16/03/2022

Signature de l'adhérent(e) :



### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
16/03/22	C.		3000 D.H.	<i>DR. M. ADDINE OULALI CHIRURGIEN 16/03/2022</i>

### EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
<i>PHARMACIE LA CLINIQUE 32 BOULEVARD DE LA TÉL: 0533 70 47 30</i>	16/03/22	238,20-

### ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

### AUXILIAIRES MEDICAUX


Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A	M	P	C	

### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

#### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	COEFFICIENT DES TRAVAUX
				
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			MONTANTS DES SOINS
	H 25533412 00000000 35533411	D 00000000 00000000 35533411	G 21433552 00000000 11433553	DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION
	<b>(Création, remont, adjonction)</b> Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS


VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

# PROFESSEUR OULALI NOUREDDINE

Professeur à la Faculté de Médecine et de Pharmacie

Spécialiste en chirurgie Crânienne et Rachidienne

Spécialiste de la Douleur



البروفيسور العالمي نور الدين  
أستاذ بكلية الطب والصيدلة  
اختصاصي جراحة الدماغ والعمود الفقري  
اختصاصي في الألم



Le : 16/03/2022

J. SLawi Khnata.

1261,00 ① Esciplex 10 mg à Jidi Q.S 03ml


② Aulecetyl 40 mg à Jidi 03 ml

③ Iautof 10 mg 058 03 ~  
68,00

④ Syntox 25 mg à Jidi 1.0 - 1

⑤ Alroxia 70 mg à Jidi 20 ml

Votre prochain rendez-vous le :



1014638  
PHARMACIE LA GRANDE  
INFO : 062007111  
32, Bd. Masséna  
N° 50, BP 2007, 21030 Oujda  
Professeur OULALI  
NEUROCHIRURGIEN  
Professeur Agrégé  
N° P : 141147421



noureddine\_oulali@yahoo.fr



RDV : 07 67 16 68 28 - URG : 06 61 63 89 12

⑥ Birdalshay  
1/18 68%

⑥ Doltran 81

201-  
M, ① Sifel 80

⑧ Dux 25000 y

ex 15.

288,20-

**DIFAL®**  
Diclofénac de sodium

Formes	Composition	Présentation
DIFAL® 25 mg DIFAL® 50 mg Comprimés gastro-résistants	Diclofenac sodique 25 mg / 50 mg amidon de PVP30, a magnésium Excipient.	Boîte de 30
DIFAL® 25 mg / 100 mg Suppositoires	Diclofenac sodique 25 mg / 100 mg lactose suppl.	Boîte de 30 comprimés
DIFAL® 75 mg injectable Solution injectable IM 75 mg / 3 ml	glycose, alcool, eau et sucre	PPV : 44,20 DH 18000 190349 43x20x90 2 je 3 ml

## PROPRIETES :

**PROPRIÉTÉS :** Le diclofénac est un composé non stéroïdien possédant des propriétés anti-inflammatoires, antalgiques et antipyrrétiques, agissant par inhibition de la synthèse des prostaglandines.

#### **INDICATIONS:**

Elles procèdent de l'activité anti-inflammatoire du diclofénac, de l'importance des manifestations d'intolérance auxquelles le médicament donne lieu et de sa place dans l'éventail des produits anti-inflammatoires actuellement disponibles.

**Rhumatismes inflammatoires chez les enfants** : suppositoire à 25 mg (enfant > 16 kg, soit environ 4 ans), comprimé à 25 mg (enfant ≥ 6 ans) et comprimé à 50 mg (enfant à partir de 35 kg, soit environ 12 ans).

Pour les adultes et enfants à partir de 15 ans (comprimés à 25 mg et à 50 mg, suppositoire à 100 mg) :

- Traitement symptomatique au long cours des rhumatismes inflammatoires chroniques et de certaines arthroses douloureuses et invalidantes : notamment polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite ankylosante ou syndromes apparentés, tels que le syndrome de Fiessinger-Leroy-Reiter, et rhumatisme psoriasique.
- Traitement symptomatique de courte durée des poussées aiguës des rhumatismes

- Traitement des dysménorrhées essentielles, après bilan étiologique.
- Solution injectable à 75 mg/3 ml / traitement symptomatique de courte durée des rhumatismes inflammatoires en poussée, lombalgie aiguë, radiculalgie, crises de coliques néphrétiques.

#### **CONTRE-INDICATIONS :**

- DIFAL® (toutes formes) est contre-indiqué chez l'enfant de moins de 12 mois ;
  - Enfants de moins de 6 ans pour les formes : comprimé 25 mg, 50 mg, suppositoire 100 mg et injectable 75 mg ;
  - Enfant de moins de 16 kg : suppositoire à 25 mg, en raison du dosage inadapté ;
  - Enfant de moins de 35 kg : comprimé à 50 mg, en raison du dosage inadapté ;
  - Enfants de moins de 15 ans : suppositoire 100 mg et injectable 75 mg ;
  - Antécédents d'hémorragie ou de perforation digestive au cours d'un précédent traitement par AINS ;
  - Hypersensibilité au diclofénac ou à l'un des composants ;
  - Grossesse : dès le 5ème mois ;
  - Insuffisance hépatocellulaire sévère ;
  - Insuffisance rénale sévère ;
  - Insuffisance cardiaque sévère non contrôlée ;
  - Ulcère gastrique ou duodénal évolutif ;
  - Antécédent d'asthme ou d'urticaire suite à la prise d'acide acétylsalicylique ou d'autres médicaments anti-inflammatoires ;

# **SYNNAX®** 25mg, 50mg & 100 mg - Comprimé Boîtes de 30 et de 60 Lamotrigine

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## Quel est le sens de cette notice ?

1. Qu'est-ce que SYNNAX® Comprimé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SYNNAX® Comprimé ?
3. Comment prendre SYNNAX® Comprimé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver SYNNAX® Comprimé ?
6. Informations supplémentaires.

## 1. QU'EST-CE QUE SYNNAX® COMPRIMÉ ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique - code ATC : N03AX09

SYNNAX® appartient au groupe de médicaments appelés anti-épileptiques. Il est utilisé pour traiter 2 maladies : l'épilepsie et les troubles bipolaires.

SYNNAX® traite l'épilepsie en bloquant les signaux du cerveau qui déclenchent les crises d'épilepsie (convulsions).

• Chez les adultes et les enfants âgés de 13 ans et plus, SYNNAX® peut être utilisé seul ou avec d'autres médicaments, pour traiter l'épilepsie. SYNNAX® peut également être utilisé avec d'autres médicaments pour traiter les crises survenant dans une maladie appelée syndrome de Lennox-Gastaut.

• Chez les enfants âgés de 2 à 12 ans, SYNNAX® peut être utilisé avec d'autres médicaments, pour traiter ces maladies. Il peut être utilisé seul pour traiter un type d'épilepsie appelé crises d'absences typiques.

SYNNAX® traite également les troubles bipolaires.

Les personnes ayant des troubles bipolaires (parfois appelés maniaxo-dépression) ont des variations d'humeur extrêmes, avec des périodes maniaques (excitation ou euphorie) alternant avec des périodes de dépression (profonde tristesse ou désespoir). Chez les adultes âgés de 18 ans et plus, SYNNAX® peut être utilisé seul ou avec d'autres médicaments, pour prévenir les périodes de dépression qui surviennent dans les troubles bipolaires. On ne sait pas encore comment SYNNAX® agit dans le cerveau pour avoir cet effet.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE SYNNAX® COMPRIMÉ ?

### Ne prenez jamais SYNNAX® Comprimé :

- si vous êtes hypersensible (hypersensibilité) à la lamotrigine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- Si vous êtes concerné :

→ Parlez-en à votre médecin et ne prenez pas SYNNAX®.

### Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre SYNNAX® :

- si vous avez des problèmes de reins
- si vous avez déjà développé une éruption cutanée après avoir pris de la lamotrigine ou tout autre médicament pour les troubles bipolaires ou l'épilepsie
- si vous avez déjà développé une ménigrite après avoir pris de la lamotrigine

- La rispéridone, utilisée pour traiter des troubles psychiatriques
- La rifampicine, qui est un antibiotique
- des médicaments utilisés pour traiter l'infection par le Virus de l'Immuno-Humaine (VIH) (une association de lopinavir et de ritonavir ou d'azatizavir et de ritonavir)
- les contraceptifs hormonaux, comme la pilule (voir ci-dessous).

→ Prévenez votre médecin si vous prenez, commencez à prendre ou prenez l'un d'entre eux.

Les contraceptifs hormonaux (comme la pilule) peuvent perturber SYNNAX®.

Votre médecin peut vous recommander d'utiliser un type particulier de hormonal, ou une autre méthode de contraception, comme le préservatif, un IUD ou un stérilet. Si vous utilisez un contraceptif hormonal comme la pilule, voilà peut prélever des échantillons de votre sang pour contrôler le taux de SYNNAX®, prenez un contraceptif hormonal ou si vous envisagez de commencer à en prendre.

→ Parlez-en à votre médecin, qui discutera avec vous des méthodes de contraception pouvant vous convenir.

SYNNAX® peut également perturber le mode d'action des contraceptifs hormonaux, qu'il soit peu probable qu'il en diminue leur efficacité. Si vous utilisez un contraceptif hormonal et si vous remarquez tout changement dans votre cycle menstruel, comme un saignement ou de légères pertes vaginale sanglante entre les règles :

→ Parlez-en à votre médecin. Cela peut être le signe que SYNNAX® perturbe le mode d'action de votre contraceptif.

### SYNNAX® Comprimé avec des aliments et boissons

Sans objet.

### Grossesse et allaitement

→ Si vous êtes enceinte, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

• Vous ne devez pas arrêter le traitement sans en avoir parlé à votre médecin. Cela est particulièrement important si vous avez une épilepsie.

• La grossesse peut modifier l'efficacité de SYNNAX®, de sorte que vous pourrez avoir besoin d'effectuer des prises de sang et votre dose de SYNNAX® pourra être ajustée.

• Il existe un faible risque d'augmentation de malformations congénitales incluant des fentes labiales ou des fentes palatines, si SYNNAX® est pris au cours des 3 premiers mois de grossesse.

• Votre médecin peut vous conseiller de prendre un supplément en acide folique si vous envisagez une grossesse et pendant votre grossesse.

→ Si vous allaitez ou envisagez d'allaiter demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ce médicament. La substance active de SYNNAX® passe dans le lait maternel et peut affecter votre bébé. Votre médecin discutera des risques et des bénéfices de l'allaitement si vous êtes traitée par SYNNAX®. Si vous décidez d'allaiter, il examinera régulièrement votre bébé en cas de somnolence, d'éruption cutanée ou d'une prise de poids insuffisante. Informez votre médecin si vous observez un de ces symptômes chez votre bébé.

### Conduite de véhicules et utilisation de machines

SYNNAX® peut provoquer des sensations vertigineuses et une vision double.

→ Ne conduisez pas et n'utilisez pas de machines à moins que vous ne soyez certain de ne pas être affecté.

Si vous avez une épilepsie, parlez à votre médecin de la conduite et de l'utilisation de machines.

### SYNNAX® Comprimé contient du lactose

Si votre médecin vous a informé d'une intolérance à certains sucre, contactez-le avant de prendre ce médicament.

### SYNNAX® Comprimé contient du Sodium

Ce médicament contient moins de 1 mmol (23 mg) de sodium par comprimé, c'est à dire qu'il n'est essentiellement « sans sodium ».

COMMENT PRENDRE SYNNAX® COMPRIMÉ ?

LOT : PA10376  
PER : 03-2023  
PPV : 68,00DH

اتبع ارشادات الطبيب والصيدلي

### Effets indésirables fréquents

Ils affectent jusqu'à 1 personne sur 10 :

- agressivité ou irritabilité
- envie de dormir
- sensation de vertiges
- frisson ou tremblements
- difficultés à dormir (insomnie)
- sensation d'agitation
- diarrhée
- bouche sèche
- nausées ou vomissements
- sensation de fatigue
- douleur du dos ou des articulations ou ailleurs.

### Effets indésirables peu fréquents

Ils affectent jusqu'à 1 personne sur 100 :

- maladresses et manque de coordination (ataxie)
- vision double ou vision floue
- perte inhabituelle ou raréfaction des cheveux (alopecie).

### Effets indésirables rares

Ils affectent jusqu'à 1 personne sur 1 000 :

- une réaction cutanée mettant en jeu le pronostic vital (syndrome de Stevens-Johnson) (voir également les informations en début de rubrique 4)
- un ensemble de symptômes survenant en même temps incluant fièvre, nausées, vomissements, maux de tête, raidissement de la nuque et sensibilité extrême à la lumière. Cela peut être provoqué par une inflammation des membranes enveloppant le cerveau et la moelle épinière (méningitis). Ces symptômes disparaissent habituellement à l'arrêt du traitement dépendant s'ils continuent ou s'aggravent, contactez votre médecin
- mouvements rapides et incontrôlables des yeux (nystagmus)
- démagorée des yeux, accompagnée d'écoulement et de croutes sur les paupières (conjonctive).

### Effets indésirables très rares

Ils affectent jusqu'à 1 personne sur 10 000 :

- une réaction cutanée mettant en jeu le pronostic vital (nécrose épidermique toxique) (voir également les informations en début de rubrique 4)
- syndrome d'hypersensibilité médicamenteuse avec éosinophilie et symptômes systémiques (DRESS) (voir également les informations en début de rubrique 4)
- une température élevée (fièvre) (voir également les informations en début de rubrique 4)
- gonflement autour du visage (œdème) ou des ganglions gonflés au niveau du cou, de l'asselle ou de l'aine (œdème) (voir aussi les informations en début de rubrique 4)
- modifications de la fonction du foie, qui peuvent se voir dans les analyses de sang.

**ESCIPLIX** 10 mg et 20 mg,  
comprimé pelliculé sécable  
Escitalopram

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

**Dans cette notice :**

1. QU'EST-CE QUE ESCIPLIX, comprimé pelliculé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ESCIPLIX, comprimé pelliculé sécable?
3. COMMENT PRENDRE ESCIPLIX, comprimé pelliculé sécable?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS?
5. COMMENT CONSERVER ESCIPLIX, comprimé pelliculé sécable?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE ESCIPLIX, comprimé pelliculé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

ESCIPLIX contient la substance active escitalopram. L'escitalopram appartient à un groupe d'antidépresseurs appelés Inhibiteurs Sélectifs de la Recapture de la Sérotonine (ISRS). Ces médicaments agissent sur le système sérotoninergique dans le cerveau en augmentant le taux de sérotonine. Les dysfonctionnements du système sérotoninergique sont

généralement associés aux troubles compulsifs) chez les adultes de plus de 18 ans.

Environ deux semaines peuvent être nécessaires avant que vous ne commeniez à vous sentir mieux. Continuez à prendre ESCIPLIX même si vous tardez à ressentir une amélioration.

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

**2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ESCIPLIX, comprimé pelliculé sécable?**

**• Ne prenez jamais ESCIPLIX, comprimé pelliculé sécable dans les cas suivants :**

- si vous êtes allergique à l'escitalopram ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (listés dans la rubrique 6. « Informations supplémentaires »),
- si vous prenez d'autres médicaments appartenant à la famille des inhibiteurs de la MAO, dont la sélegiline (utilisée dans le traitement de la maladie de Parkinson), le moclobémide (utilisé dans le traitement de la dépression) et le linéozolide (un antibiotique),
- si vous êtes né avec ou si vous avez présenté un épisode de trouble du rythme cardiaque (observé à l'ECG, un examen réalisé pour évaluer comment votre cœur fonctionne),
- si vous prenez des traitements pour des troubles du rythme cardiaque qui pourraient affecter votre rythme cardiaque. (voir rubrique « Autres médicaments et ESCIPLIX »).

**• Avertissements et précautions**  
Adressez-vous à votre pharmacien avant de prendre ce m

LOT 212186  
EXP 09-2023  
PPV 126.00



- si vous présentez une insuffisance rénale (maladie du rein) ou hépatique (maladie du foie). Votre médecin peut-être adapter les doses de médicament,

- si vous êtes diabétique. Un traitement par ESCIPLIX peut déséquilibrer la glycémie. Une adaptation des d'insuline ou d'antidiabétique oral est nécessaire,

- si vous avez une quantité de glucose dans le sang diminuée,

- si vous avez tendance à saigner ou à avoir des bleus facilement,

- si vous recevez un traitement par électrochocs,

- si vous présentez une maladie d'ense, une

- si vous souffrez ou avez des problèmes cardiaques ou si vous avez récemment une crise cardiaque,

- si vous avez un rythme cardiaque au repos et/ou si vous savez que vous avez un risque de carence cardiaque, une diarrhée ou des nausées sévères et prolongées ou des traitements diurétiques,

- si vous ressentez un ralentissement rapide ou irrégulier, des maux de tête, des malaises et des vertiges lors du passage debout qui pourraient affecter le fonctionnement normal du cœur et du système cardiaque,

- si vous avez ou avez des problèmes aux yeux, comme des types de glaucome (augmentation de la pression à l'intérieur de l'œil),

- si vous présentez une sensibilité à certains sucrels, prévenez votre pharmacien avant de prendre ce médicament.



## مـصـحـة الـشـرـق

# CLINIQUE ACHARK

## **FACTURE**

Nº 002486

Oujda, le 16/03/22

Nom du patient : Slaoui - Khnata

*Arrêtée la présente Facture à la somme de*

deux centres H<sub>2</sub>

*Signature,*

**6, rue Saâd Zaghloul - OUJDA**  
**Tél. : 05 36 68 26 63 / 05 36 68 03 21 / 05 36 68 56 56 - Fax : 05 36 70 47 48**  
**TP 10704162 - IF 05300619 - CNSS 1722067 - ICE 001575971000064**