

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une lecture de la pharmacie doit être jointe.

## Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Education :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Prothétique :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire, en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

éclamation : contact@mupras.com

prise en charge : pec@mupras.com

adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



## Déclaration de Maladie

N° M21- 0056941

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

### Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 50082

Société :

112730

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

M'hamed FATHA

Date de naissance :

1944

Adresse :

HAY. EL. INADA RESIDENCE 1771  
ETAGE 3 APPT 8 AIM. CHAK COTE

Tél. : 0770981062

Total des frais engagés :

Dhs

### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation :

29/03/09

Nom et prénom du malade :

M'hamed FATHA

Age :

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

Diabète

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :



## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
29/03/2022			2500	

## EXECUTION DES ORDONNANCES

## **ANALYSES - RADIOGRAPHIES**

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

## AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ostéodensitométrie.

O.D.F  
PROTHESES DENTAIRES

## DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
D	
00000000	00000000
35533411	11433553

### **[Création, remont, adjonction]**

The diagram illustrates the 12th edition of the International System of Units (SI) base units and their definitions. It features a circular arrangement of 12 units, each with a symbol and a description. The units are: Length (m), Mass (kg), Time (s), Electric current (A), Temperature (K), Amount of substance (mol), Luminous intensity (cd), and the new units for Avogadro's number (NA), Planck's constant (h), and the speed of light (c). The diagram is centered around the concept of the kilogram (kg) as the base unit of mass.

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EX

Dr Bouchra ALAOUI EL HASSANI

Endocrinologue - Diabèteologues

## Nutritionniste

Nutrition in ISTE (Sanaa Mohamed ARRAB)

Docteur en Pharmacie

Image 1. Résidence Al Boustante.

ALMA 1, RESIDENCE AT BOOGSTAN  
ALMA 1, RESIDENCE AT BOOGSTAN

351N-21, CASABLANCA

دكتورة بشرى العلوى الحسنى

أخصائة في أمراض الغدد والسكري والتغذية

## Casablanca . le

2963102

Inara 1 - Résidence Al Boustane,

1990-1991 CASABLANCA

Table 25.22E3.73.82

Mme Mkhenti

 Amselfeld 9 mo Fehne

60, 40  
(x9)

2 - 1 -

205<sup>110</sup>  
(K3)

2

100

⑤ Cotaseq

—

MS. 160

1. 

6 118001 030132  
COTAREG 160/25 mg  
28 comprimés pelliculés  
PPV : 205.00 DH

Casablanca Ahl loghlem, Bd. Mohamed Zef  
Résidence Arrayane 2, Imm.2. 3<sup>ème</sup> Etage, N  
(en face de Maroc Telecom, Annasi)  
Fixe : 05 22 74 76 28 - 05 22 74 73 00  
GSM : 07 67 56 03 95

AMAREL 2MG  
CP B30  
P.P.V :600H40  
6 118000 060031

AMAREL 2MG  
CP B30  
P.P.V :600H40  
6 118000 060031

médicaments pour traiter la dépression (fluoxétine, Inhibiteurs de la MAO) ; médicaments diminuant les taux élevés de cholestérol (fibrates) ; médicaments diminuant la tension artérielle (inhibiteurs de l'enzyme de conversion) ;

médicaments pour traiter la goutte (Allopurinol, probénécide, sulfapyridine) ; médicaments anticancéreux (cyclophosphamide, ifosfamide, trofosfamide) ; médicaments utilisés pour la perte de poids (fenfluramine) ; médicament utilisé pour améliorer la circulation, en cas d'administration traveineuse de fortes doses (pentoxifylline) ;

médicaments pour traiter les allergies nasales telles que le rhume des foins (ritoqualine) ;

médicaments de type sympatholytiques pour traiter l'hypertension artérielle, l'insuffisance cardiaque, les troubles prostatiques.

Effet d'AMAREL, comprimé (diminution du taux de sucre dans le sang) peut être minué par les médicaments suivants. Ceci peut entraîner un risque d'hyperglycémie (augmentation du taux de sucre dans le sang) :

médicaments contenant des hormones sexuelles féminines (oestrogènes, progestatifs) ;

médicaments favorisant la production d'urine (diurétiques thiazidiques) ; médicaments utilisés pour stimuler la glande thyroïde (telle que la thyroxine) ;

médicaments pour traiter les allergies et l'inflammation (glucocorticoïdes) ; médicaments pour traiter les troubles psychiques sévères (chlorpromazine et ses dérivés de la phénothiazine) ;

médicaments utilisés pour augmenter le rythme cardiaque, pour le traitement de l'asthme, de la congestion nasale, de la toux, du rhume, médicaments utilisés pour la perte de poids, ou utilisés en urgence en cas de mise en jeu du pronostic vital (adrénaline et sympathomimétiques) ;

médicaments pour traiter les taux élevés de cholestérol (acide nicotinique) ; médicaments pour traiter la constipation lorsqu'ils sont utilisés au long cours (laxatifs) ;

médicaments pour traiter l'épilepsie (phénhytoïne) ;

médicaments pour traiter la nervosité et les troubles du sommeil (barbituriques) ; médicaments pour traiter une pression élevée dans l'œil (acétazolamide) ;

médicaments pour traiter l'hypertension artérielle ou la diminution du taux de sucre dans le sang (diazoxide) ;

médicaments pour traiter les infections, la tuberculose (rifampicine) ;

médicaments pour traiter les hypoglycémies sévères (glucagon).

Et diminution du taux de sucre dans le sang d'AMAREL, comprimé peut être minué ou augmenté par les médicaments suivants :

médicaments pour traiter les ulcères de l'estomac (appelés anti-H<sub>2</sub>) ;

médicaments pour traiter l'hypertension artérielle ou l'insuffisance cardiaque ou les bêta-bloquants, la clonidine, la guanéthidine, la réserpine. Une attention particulière est nécessaire lorsque vous prenez ces médicaments car ils peuvent aussi masquer les signes d'hyperglycémie.

AMAREL, comprimé peut augmenter ou diminuer les effets des médicaments suivants :

l'indanavir, l'arachide, l'aspirine et d'autres médicaments.

AMAREL, comprimé peut augmenter ou diminuer les effets des médicaments suivants :

l'indanavir, l'aspirine et d'autres médicaments.

**AMAREL 2MG**

**CP B30**

**P.P.V : 60DH40**



6 118000 060031

de type dérivés

le sang.

AMAREL

doit pas être utilisé pendant la grossesse, consultez votre médecin.

AMAREL peut passer dans le lait maternel. AMAREL doit pas être donné pendant l'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant d'utiliser ce médicament.

#### Conduite de véhicules et utilisation de machines

En cas d'hyperglycémie ou d'hyperglycémie, votre capacité à réagir peut être modifiée, en particulier si vous avez présenté des signes d'hyperglycémie. Dans ces situations, vous pouvez être un danger pour vous-mêmes et pour les personnes (par exemple en conduisant un véhicule ou en utilisant des machines). Demandez conseil à votre médecin pour la conduite de véhicules. Si vous présentez de fréquents épisodes d'hyperglycémie ou si vous n'avez pas de signes évocateurs d'hyperglycémie.

#### Informations importantes concernant certains composants d'AMAREL

AMAREL, comprimé contient du lactose. Si votre médecin vous présentez une intolérance à certains sucre, contactez-le avant d'utiliser ce médicament.

#### 3. COMMENT PRENDRE AMAREL, COMPRIME ?

Prenez toujours AMAREL, comprimé exactement selon la prescription de votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

#### Prise du médicament

• Prendre ce médicament par voie orale, juste avant ou pendant le repas principal de la journée (généralement le petit déjeuner). Si vous avez manqué le petit déjeuner, vous devez prendre le médicament au moment de votre prochain repas. Il est important de ne pas sauter de repas lorsque vous prenez ce médicament.

• Avaler les comprimés entiers avec au moins un demi-verre d'eau ou croquer les comprimés.

#### Posologie :

• La posologie d'AMAREL, comprimé dépend de vos besoins et de votre état de santé. Consultez votre médecin en fonction des résultats des analyses sanguines et urinaires.

Ne prenez pas plus de comprimés que ce que vous a prescrit votre médecin.

• La posologie usuelle initiale est de 1 comprimé d'AMAREL 1mg, 1 fois par jour.

• Si nécessaire, votre médecin peut augmenter la dose après une ou deux semaines de traitement.

• La dose maximale recommandée est de 6 mg d'AMAREL par jour.

• Un traitement associant glimépiride et metformine ou glimépiride et insuline peut être initié. Dans ce cas, les doses respectives de glimépiride, d'insuline dont vous avez besoin seront déterminées par votre médecin.

• En cas de modification de votre poids, de changement de rythme de vie ou de situation de stress, une modification des doses d'AMAREL peut s'avérer nécessaire. Par conséquent, informez en votre médecin.


• Si vous avez l'impression que l'effet de votre médicament est trop faible, ne modifiez pas vous-même la posologie de votre traitement. Consultez votre médecin.

#### Si vous avez pris plus d'AMAREL, comprimé que vous n'auriez dû

Si vous avez pris plus d'AMAREL que vous n'auriez dû, vous risquez d'avoir des signes d'hyperglycémie (Pour les signes de l'hyperglycémie, voir « Faites attention »).

Prenez immédiatement une quantité suffisante de sucre (par exemple, 6 à 8 morceaux de sucre, boissons sucrées, ou thé sucré) et informez au moins deux personnes de votre état. Consultez votre médecin.

Chez l'enfant, en cas d'ingestion accidentelle, un contrôle soigné du sucre ingéré devra être effectué afin d'éviter une hyperglycémie.



médicaments pour traiter la dépression (fluoxétine, Inhibiteurs de la MAO) ; médicaments diminuant les taux élevés de cholestérol (fibrates) ; médicaments diminuant la tension artérielle (inhibiteurs de l'enzyme de conversion) ; médicaments pour traiter la goutte (Allopurinol, probénécide, sulfapyridine) ; médicaments anticancéreux (cyclophosphamide, ifosfamide, trofosfamide) ; médicaments utilisés pour la perte de poids (fenfluramine) ; médicament utilisé pour améliorer la circulation, en cas d'administration traveineuse de fortes doses (pentoxifylline) ; médicaments pour traiter les allergies nasales telles que le rhume des foins (ritoqualine) ; médicaments de type sympatholytiques pour traiter l'hypertension artérielle, l'insuffisance cardiaque, les troubles prostatiques. Effet d'AMAREL, comprimé (diminution du taux de sucre dans le sang) peut être minué par les médicaments suivants. Ceci peut entraîner un risque hyperglycémie (augmentation du taux de sucre dans le sang) : médicaments contenant des hormones sexuelles féminines (oestrogènes, progestatifs) ; médicaments favorisant la production d'urine (diurétiques thiazidiques) ; médicaments utilisés pour stimuler la glande thyroïde (telle que la thyroxine) ; médicaments pour traiter les allergies et l'inflammation (glucocorticoïdes) ; médicaments pour traiter les troubles psychiques sévères (chlorpromazine et ses dérivés de la phénothiazine) ; médicaments utilisés pour augmenter le rythme cardiaque, pour le traitement de l'asthme, de la congestion nasale, de la toux, du rhume, médicaments utilisés pour la perte de poids, ou utilisés en urgence en cas de mise en jeu du pronostic vital (adrénaline et sympathomimétiques) ; médicaments pour traiter les taux élevés de cholestérol (acide nicotinique) ; médicaments pour traiter la constipation lorsqu'ils sont utilisés au long cours (laxatifs) ; médicaments pour traiter l'épilepsie (phénhytoïne) ; médicaments pour traiter la nervosité et les troubles du sommeil (barbituriques) ; médicaments pour traiter une pression élevée dans l'œil (acétazolamide) ; médicaments pour traiter l'hypertension artérielle ou la diminution du taux de sucre dans le sang (diazoxide) ; médicaments pour traiter les infections, la tuberculose (rifampicine) ; médicaments pour traiter les hypoglycémies sévères (glucagon). Et de diminution du taux de sucre dans le sang d'AMAREL, comprimé peut être minué ou augmenté par les médicaments suivants : médicaments pour traiter les ulcères de l'estomac (appelés anti-H<sub>2</sub>) ; médicaments pour traiter l'hypertension artérielle ou l'insuffisance cardiaque ou les bêta-bloquants, la clonidine, la guanéthidine, la réserpine. Une attention particulière est nécessaire lorsque vous prenez ces médicaments car ils peuvent aussi masquer les signes d'hypoglycémie. AMAREL, comprimé peut augmenter ou diminuer les effets des médicaments suivants : diurétiques, arachide, et d'autre part l'insuline. AMAREL, comprimé peut augmenter ou diminuer les effets des médicaments suivants : diurétiques, arachide, et d'autre part l'insuline.

AMAREL doit pas être utilisé pendant la grossesse, consultez votre médecin.

AMAREL peut passer dans le lait maternel. AMAREL doit pas être donné pendant l'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant d'utiliser ce médicament.

#### Conduite de véhicules et utilisation de machines

En cas d'hypoglycémie ou d'hyperglycémie, votre capacité à réagir peut être modifiée, en particulier si vous avez présenté des signes d'hypoglycémie. Dans ces situations, vous pouvez être un danger pour vous-mêmes et pour les personnes (par exemple en conduisant un véhicule ou en utilisant des machines). Demandez conseil à votre médecin pour la conduite de véhicules. Si vous présentez de fréquents épisodes d'hypoglycémie ou si vous n'avez pas de signes évocateurs d'hypoglycémie.

#### Informations importantes concernant certains composants d'AMAREL

AMAREL, comprimé contient du lactose. Si votre médecin vous présentez une intolérance à certains sucre, contactez-le avant d'utiliser ce médicament.

#### 3. COMMENT PRENDRE AMAREL, COMPRIME ?

Prenez toujours AMAREL, comprimé exactement selon la prescription de votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

#### Prise du médicament

- Prendre ce médicament par voie orale, juste avant ou pendant le repas principal de la journée (généralement le petit déjeuner). Si vous prenez le petit déjeuner, vous devez prendre le médicament au moment du petit déjeuner. Il est important de ne pas sauter de repas lorsque vous prenez ce médicament.
- Avaler les comprimés entiers avec au moins un demi-verre d'eau ou croquer les comprimés.

#### Posologie :

- La posologie d'AMAREL, comprimé dépend de vos besoins et de votre état de santé. Consultez votre médecin en fonction des résultats des analyses sanguines et urinaires.

Ne prenez pas plus de comprimés que ce que vous a prescrit votre médecin.

- La posologie usuelle initiale est de 1 comprimé d'AMAREL 1 mg, 1 fois par jour.

Si nécessaire, votre médecin peut augmenter la dose après une ou deux semaines de traitement.

- La dose maximale recommandée est de 6 mg d'AMAREL par jour.

Un traitement associant glimépiride et metformine ou glimépiride et d'insuline dont vous avez besoin seront déterminées par votre médecin.

En cas de modification de votre poids, de changement de rythme cardiaque ou de diminution du taux de sucre dans le sang d'AMAREL, comprimé peut s'avérer nécessaire. Par conséquent, informez en votre médecin.

Si vous avez l'impression que l'effet de votre médicament est trop faible, ne modifiez pas vous-même la posologie de votre traitement. Consultez votre médecin.

#### Si vous avez pris plus d'AMAREL, comprimé que vous n'auriez dû

Si vous avez pris plus d'AMAREL que vous n'auriez dû, vous risquez d'avoir des signes d'hypoglycémie (Pour les signes de l'hypoglycémie, voir « Faites attention à l'hypoglycémie »). Prenez immédiatement une quantité suffisante de sucre (par exemple, 3-4 morceaux de sucre, boissons sucrées, ou thé sucré) et informez au moins un adulte et votre médecin.

Chez l'enfant, en cas d'ingestion accidentelle, un contrôle soigné du sucre ingéré devra être effectué afin d'éviter une hyperglycémie.

AMAREL 2MG

CP B30

P.P.V : 60DH40




de type dérivés

le sang.

6 118000 060031

L01 :21E02  
PER.:07 2024



médicaments pour traiter la dépression (fluoxétine, Inhibiteurs de la MAO) ; médicaments diminuant les taux élevés de cholestérol (fibrates) ; médicaments diminuant la tension artérielle (inhibiteurs de l'enzyme de conversion) ; médicaments pour traiter la goutte (Allopurinol, probénécide, sulfapyridine) ; médicaments anticancéreux (cyclophosphamide, ifosfamide, trofosfamide) ; médicaments utilisés pour la perte de poids (fenfluramine) ; médicament utilisé pour améliorer la circulation, en cas d'administration traveineuse de fortes doses (pentoxifylline) ; médicaments pour traiter les allergies nasales telles que le rhume des foins (ritoqualine) ; médicaments de type sympatholytiques pour traiter l'hypertension artérielle, l'insuffisance cardiaque, les troubles prostatiques. Effet d'AMAREL, comprimé (diminution du taux de sucre dans le sang) peut être minué par les médicaments suivants. Ceci peut entraîner un risque hyperglycémie (augmentation du taux de sucre dans le sang) : médicaments contenant des hormones sexuelles féminines (oestrogènes, progestatifs) ; médicaments favorisant la production d'urine (diurétiques thiazidiques) ; médicaments utilisés pour stimuler la glande thyroïde (telle que la thyroxine) ; médicaments pour traiter les allergies et l'inflammation (glucocorticoïdes) ; médicaments pour traiter les troubles psychiques sévères (chlorpromazine et ses dérivés de la phénothiazine) ; médicaments utilisés pour augmenter le rythme cardiaque, pour le traitement de l'asthme, de la congestion nasale, de la toux, du rhume, médicaments utilisés pour la perte de poids, ou utilisés en urgence en cas de mise en jeu du pronostic vital (adrénaline et sympathomimétiques) ; médicaments pour traiter les taux élevés de cholestérol (acide nicotinique) ; médicaments pour traiter la constipation lorsqu'ils sont utilisés au long cours (laxatifs) ; médicaments pour traiter l'épilepsie (phénhytoïne) ; médicaments pour traiter la nervosité et les troubles du sommeil (barbituriques) ; médicaments pour traiter une pression élevée dans l'œil (acétazolamide) ; médicaments pour traiter l'hypertension artérielle ou la diminution du taux de sucre dans le sang (diazoxide) ; médicaments pour traiter les infections, la tuberculose (rifampicine) ; médicaments pour traiter les hypoglycémies sévères (glucagon). Et de diminution du taux de sucre dans le sang d'AMAREL, comprimé peut être minué ou augmenté par les médicaments suivants : médicaments pour traiter les ulcères de l'estomac (appelés anti-H<sub>2</sub>) ; médicaments pour traiter l'hypertension artérielle ou l'insuffisance cardiaque ou les bêta-bloquants, la clonidine, la guanéthidine, la réserpine. Une attention particulière est nécessaire lorsque vous prenez ces médicaments car ils peuvent aussi masquer les signes d'hypoglycémie. AMAREL, comprimé peut augmenter ou diminuer les effets des médicaments suivants : diurétiques, arachide, et d'autre part l'insuline. AMAREL, comprimé peut augmenter ou diminuer les effets des médicaments suivants : diurétiques, arachide, et d'autre part l'insuline.

AMAREL doit pas être utilisé pendant la grossesse, consultez votre médecin.

AMAREL peut passer dans le lait maternel. AMAREL doit pas être donné pendant l'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant d'utiliser ce médicament.

#### Conduite de véhicules et utilisation de machines

En cas d'hypoglycémie ou d'hyperglycémie, votre capacité à réagir peut être modifiée, en particulier si vous avez présenté des signes d'hypoglycémie. Dans ces situations, vous pouvez être un danger pour vous-mêmes et pour les personnes (par exemple en conduisant un véhicule ou en utilisant des machines). Demandez conseil à votre médecin pour la conduite de véhicules. Si vous présentez de fréquents épisodes d'hypoglycémie ou si vous n'avez pas de signes évocateurs d'hypoglycémie.

#### Informations importantes concernant certains composants d'AMAREL

AMAREL, comprimé contient du lactose. Si votre médecin vous présentez une intolérance à certains sucre, contactez-le avant d'utiliser ce médicament.

#### 3. COMMENT PRENDRE AMAREL, COMPRIME ?

Prenez toujours AMAREL, comprimé exactement selon la prescription de votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

#### Prise du médicament

- Prendre ce médicament par voie orale, juste avant ou pendant le repas principal de la journée (généralement le petit déjeuner). Si vous prenez ce médicament au petit déjeuner, vous devez prendre le médicament au moment du petit déjeuner, vous devez prendre le médicament au moment du petit déjeuner. Il est important de ne pas sauter de repas lorsque vous prenez ce médicament.
- Avaler les comprimés entiers avec au moins un demi-verre d'eau ou croquer les comprimés.

#### Posologie :

- La posologie d'AMAREL, comprimé dépend de vos besoins et de votre état de santé. Consultez votre médecin en fonction des résultats des analyses sanguines et urinaires.

Ne prenez pas plus de comprimés que ce que vous a prescrit votre médecin.

- La posologie usuelle initiale est de 1 comprimé d'AMAREL 1 mg, 1 fois par jour.
- Si nécessaire, votre médecin peut augmenter la dose après une ou deux semaines de traitement.
- La dose maximale recommandée est de 6 mg d'AMAREL par jour.
- Un traitement associant glimépiride et metformine ou glimépiride et d'insuline dont vous avez besoin seront déterminées par votre médecin.
- En cas de modification de votre poids, de changement de rythme cardiaque ou de diminution du taux de sucre dans le sang, une modification des doses d'AMAREL peut s'avérer nécessaire. Par conséquent, informez en votre médecin.
- Si vous avez l'impression que l'effet de votre médicament est trop faible, ne modifiez pas vous-même la posologie de votre traitement. Consultez votre médecin.

#### Si vous avez pris plus d'AMAREL, comprimé que vous n'auriez dû

Si vous avez pris plus d'AMAREL que vous n'auriez dû, vous risquez d'avoir des signes d'hypoglycémie (Pour les signes de l'hypoglycémie, voir « Faites attention à l'hypoglycémie »). Prenez immédiatement une quantité suffisante de sucre (par exemple, 3-4 morceaux de sucre, boissons sucrées, ou thé sucré) et informez au moins un adulte et votre médecin.

Chez l'enfant, en cas d'ingestion accidentelle, un contrôle soigné du sucre ingéré devra être effectué afin d'éviter une hyperglycémie.

AMAREL 2MG

CP B30

de type dérivés


P.P.V : 60DH40



s le sang.

6 118000 060031

L01 :21E02  
PER.:07 2024



médicaments pour traiter la dépression (fluoxétine, Inhibiteurs de la MAO) ; médicaments diminuant les taux élevés de cholestérol (fibrates) ; médicaments diminuant la tension artérielle (inhibiteurs de l'enzyme de conversion) ; médicaments pour traiter la goutte (Allopurinol, probénécide, sulfapyridine) ; médicaments anticancéreux (cyclophosphamide, ifosfamide, trofosfamide) ; médicaments utilisés pour la perte de poids (fenfluramine) ; médicament utilisé pour améliorer la circulation, en cas d'administration traveineuse de fortes doses (pentoxifylline) ; médicaments pour traiter les allergies nasales telles que le rhume des foins (ritoqualine) ; médicaments de type sympatholytiques pour traiter l'hypertension artérielle, l'insuffisance cardiaque, les troubles prostatiques. Effet d'AMAREL, comprimé (diminution du taux de sucre dans le sang) peut être minué par les médicaments suivants. Ceci peut entraîner un risque hyperglycémie (augmentation du taux de sucre dans le sang) : médicaments contenant des hormones sexuelles féminines (oestrogènes, progestatifs) ; médicaments favorisant la production d'urine (diurétiques thiazidiques) ; médicaments utilisés pour stimuler la glande thyroïde (telle que la thyroxine) ; médicaments pour traiter les allergies et l'inflammation (glucocorticoïdes) ; médicaments pour traiter les troubles psychiques sévères (chlorpromazine et ses dérivés de la phénothiazine) ; médicaments utilisés pour augmenter le rythme cardiaque, pour le traitement de l'asthme, de la congestion nasale, de la toux, du rhume, médicaments utilisés pour la perte de poids, ou utilisés en urgence en cas de mise en jeu du pronostic vital (adrénaline et sympathomimétiques) ; médicaments pour traiter les taux élevés de cholestérol (acide nicotinique) ; médicaments pour traiter la constipation lorsqu'ils sont utilisés au long cours (laxatifs) ; médicaments pour traiter l'épilepsie (phénhytoïne) ; médicaments pour traiter la nervosité et les troubles du sommeil (barbituriques) ; médicaments pour traiter une pression élevée dans l'œil (acétazolamide) ; médicaments pour traiter l'hypertension artérielle ou la diminution du taux de sucre dans le sang (diazoxide) ; médicaments pour traiter les infections, la tuberculose (rifampicine) ; médicaments pour traiter les hypoglycémies sévères (glucagon). Et de diminution du taux de sucre dans le sang d'AMAREL, comprimé peut être minué ou augmenté par les médicaments suivants : médicaments pour traiter les ulcères de l'estomac (appelés anti-H<sub>2</sub>) ; médicaments pour traiter l'hypertension artérielle ou l'insuffisance cardiaque ou les bêta-bloquants, la clonidine, la guanéthidine, la réserpine. Une attention particulière est nécessaire lorsque vous prenez ces médicaments car ils peuvent aussi masquer les signes d'hypoglycémie. AMAREL, comprimé peut augmenter ou diminuer les effets des médicaments suivants : diurétiques, arachide, et d'autre part l'insuline. AMAREL, comprimé peut augmenter ou diminuer les effets des médicaments suivants : diurétiques, arachide, et d'autre part l'insuline.

AMAREL doit pas être utilisé pendant la grossesse, consultez votre médecin.

AMAREL peut passer dans le lait maternel. AMAREL doit pas être donné pendant l'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant d'utiliser ce médicament.

#### Conduite de véhicules et utilisation de machines

En cas d'hypoglycémie ou d'hyperglycémie, votre capacité à réagir peut être modifiée, en particulier si vous avez présenté des signes d'hypoglycémie. Dans ces situations, vous pouvez être un danger pour vous-mêmes et pour les autres personnes (par exemple en conduisant un véhicule ou en utilisant des machines). Demandez conseil à votre médecin pour la conduite de véhicules. Si vous présentez de fréquents épisodes d'hypoglycémie ou si vous n'avez pas de signes évocateurs d'hypoglycémie.

#### Informations importantes concernant certains composants d'AMAREL

AMAREL, comprimé contient du lactose. Si votre médecin vous présentez une intolérance à certains sucre, contactez-le avant d'utiliser ce médicament.

#### 3. COMMENT PRENDRE AMAREL, COMPRIME ?

Prenez toujours AMAREL, comprimé exactement selon la prescription de votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

#### Prise du médicament

- Prendre ce médicament par voie orale, juste avant ou pendant le repas principal de la journée (généralement le petit déjeuner). Si vous prenez ce médicament au petit déjeuner, vous devez prendre le médicament au moment du petit déjeuner. Il est important de ne pas sauter de repas lorsque vous prenez ce médicament.
- Avaler les comprimés entiers avec au moins un demi-verre d'eau ou croquer les comprimés.

#### Posologie :

- La posologie d'AMAREL, comprimé dépend de vos besoins et de votre état de santé. Consultez votre médecin en fonction des résultats des analyses sanguines et urinaires.

Ne prenez pas plus de comprimés que ce que vous a prescrit votre médecin.

- La posologie usuelle initiale est de 1 comprimé d'AMAREL 1 mg, 1 fois par jour.

Si nécessaire, votre médecin peut augmenter la dose après une ou deux semaines de traitement.

- La dose maximale recommandée est de 6 mg d'AMAREL par jour.

Un traitement associant glimépiride et metformine ou glimépiride et insuline peut être initié. Dans ce cas, les doses respectives de glimépiride, d'insuline dont vous avez besoin seront déterminées par votre médecin.

En cas de modification de votre poids, de changement de rythme cardiaque ou de diminution du taux de sucre dans le sang, votre médecin peut s'avérer nécessaire. Par conséquent, informez en votre médecin.

Si vous avez l'impression que l'effet de votre médicament est trop faible, ne modifiez pas vous-même la posologie de votre traitement. Consultez votre médecin.

#### Si vous avez pris plus d'AMAREL, comprimé que vous n'auriez dû

Si vous avez pris plus d'AMAREL que vous n'auriez dû, vous risquez d'avoir des signes d'hypoglycémie (Pour les signes de l'hypoglycémie, voir « Faites attention à l'hypoglycémie »). Prenez immédiatement une quantité suffisante de sucre (par exemple, 100 g de sucre, boissons sucrées, ou thé sucré) et informez au moins deux personnes de votre état. Si vous n'avez pas de sucre, buvez du lait ou du jus de fruit.

Chez l'enfant, en cas d'ingestion accidentelle, un contrôle soigné de sucre ingéré devra être effectué afin d'éviter une hyperglycémie.

AMAREL 2MG

CP B30

P.P.V : 60DH40



de type dérivés

le sang.

6 118000 060031

L01 :21E02  
PER.:07 2024



médicaments pour traiter la dépression (fluoxétine, Inhibiteurs de la MAO) ; médicaments diminuant les taux élevés de cholestérol (fibrates) ; médicaments diminuant la tension artérielle (inhibiteurs de l'enzyme de conversion) ; médicaments pour traiter la goutte (Allopurinol, probénécide, sulfapyridine) ; médicaments anticancéreux (cyclophosphamide, ifosfamide, trofosfamide) ; médicaments utilisés pour la perte de poids (fenfluramine) ; médicament utilisé pour améliorer la circulation, en cas d'administration traveineuse de fortes doses (pentoxifylline) ; médicaments pour traiter les allergies nasales telles que le rhume des foins (ritoqualine) ; médicaments de type sympatholytiques pour traiter l'hypertension artérielle, l'insuffisance cardiaque, les troubles prostatiques. Effet d'AMAREL, comprimé (diminution du taux de sucre dans le sang) peut être minué par les médicaments suivants. Ceci peut entraîner un risque hyperglycémie (augmentation du taux de sucre dans le sang) : médicaments contenant des hormones sexuelles féminines (oestrogènes, progestatifs) ; médicaments favorisant la production d'urine (diurétiques thiazidiques) ; médicaments utilisés pour stimuler la glande thyroïde (telle que la thyroxine) ; médicaments pour traiter les allergies et l'inflammation (glucocorticoïdes) ; médicaments pour traiter les troubles psychiques sévères (chlorpromazine et ses dérivés de la phénothiazine) ; médicaments utilisés pour augmenter le rythme cardiaque, pour le traitement de l'asthme, de la congestion nasale, de la toux, du rhume, médicaments utilisés pour la perte de poids, ou utilisés en urgence en cas de mise en jeu du pronostic vital (adrénaline et sympathomimétiques) ; médicaments pour traiter les taux élevés de cholestérol (acide nicotinique) ; médicaments pour traiter la constipation lorsqu'ils sont utilisés au long cours (laxatifs) ; médicaments pour traiter l'épilepsie (phénhytoïne) ; médicaments pour traiter la nervosité et les troubles du sommeil (barbituriques) ; médicaments pour traiter une pression élevée dans l'œil (acétazolamide) ; médicaments pour traiter l'hypertension artérielle ou la diminution du taux de sucre dans le sang (diazoxide) ; médicaments pour traiter les infections, la tuberculose (rifampicine) ; médicaments pour traiter les hypoglycémies sévères (glucagon). Et de diminution du taux de sucre dans le sang d'AMAREL, comprimé peut être minué ou augmenté par les médicaments suivants : médicaments pour traiter les ulcères de l'estomac (appelés anti-H<sub>2</sub>) ; médicaments pour traiter l'hypertension artérielle ou l'insuffisance cardiaque ou les bêta-bloquants, la clonidine, la guanéthidine, la réserpine. Une attention particulière est nécessaire lorsque vous prenez ces médicaments car ils peuvent aussi masquer les signes d'hypoglycémie. AMAREL, comprimé peut augmenter ou diminuer les effets des médicaments suivants : diurétiques, arachide, et d'autre part l'insuline. AMAREL, comprimé peut augmenter ou diminuer les effets des médicaments suivants : diurétiques, arachide, et d'autre part l'insuline.

AMAREL doit pas être utilisé pendant la grossesse, consultez votre médecin.

AMAREL peut passer dans le lait maternel. AMAREL doit pas être donné pendant l'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant d'utiliser ce médicament.

#### Conduite de véhicules et utilisation de machines

En cas d'hypoglycémie ou d'hyperglycémie, votre capacité à réagir peut être modifiée, en particulier si vous avez présenté des signes d'hypoglycémie. Dans ces situations, vous pouvez être un danger pour vous-mêmes et pour les autres personnes (par exemple en conduisant un véhicule ou en utilisant des machines). Demandez conseil à votre médecin pour la conduite de véhicules. Si vous présentez de fréquents épisodes d'hypoglycémie ou si vous n'avez pas de signes évocateurs d'hypoglycémie.

#### Informations importantes concernant certains composants d'AMAREL

AMAREL, comprimé contient du lactose. Si votre médecin vous présentez une intolérance à certains sucre, contactez-le avant d'utiliser ce médicament.

#### 3. COMMENT PRENDRE AMAREL, COMPRIME ?

Prenez toujours AMAREL, comprimé exactement selon la prescription de votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

#### Prise du médicament

- Prendre ce médicament par voie orale, juste avant ou pendant le repas principal de la journée (généralement le petit déjeuner). Si vous prenez ce médicament au petit déjeuner, vous devez prendre le médicament au moment du petit déjeuner. Il est important de ne pas sauter de repas lorsque vous prenez ce médicament.
- Avaler les comprimés entiers avec au moins un demi-verre d'eau ou croquer les comprimés.

#### Posologie :

- La posologie d'AMAREL, comprimé dépend de vos besoins et de votre état de santé. Consultez votre médecin en fonction des résultats des analyses sanguines et urinaires.

Ne prenez pas plus de comprimés que ce que vous a prescrit votre médecin.

- La posologie usuelle initiale est de 1 comprimé d'AMAREL 1 mg, 1 fois par jour.

Si nécessaire, votre médecin peut augmenter la dose après une ou deux semaines de traitement.

- La dose maximale recommandée est de 6 mg d'AMAREL par jour.

Un traitement associant glimépiride et metformine ou glimépiride et insuline peut être initié. Dans ce cas, les doses respectives de glimépiride, d'insuline dont vous avez besoin seront déterminées par votre médecin.

En cas de modification de votre poids, de changement de rythme cardiaque ou de diminution du taux de sucre dans le sang, votre médecin peut s'avérer nécessaire. Par conséquent, informez en votre médecin.

Si vous avez l'impression que l'effet de votre médicament est trop faible, ne modifiez pas vous-même la posologie de votre traitement. Consultez votre médecin.

#### Si vous avez pris plus d'AMAREL, comprimé que vous n'auriez dû

Si vous avez pris plus d'AMAREL que vous n'auriez dû, vous risquez d'avoir des signes d'hypoglycémie (Pour les signes de l'hypoglycémie, voir « Faites attention à l'hypoglycémie »). Prenez immédiatement une quantité suffisante de sucre (par exemple, 100 g de sucre, boissons sucrées, ou thé sucré) et informez au moins deux personnes de votre état. Si vous n'avez pas de sucre, buvez du lait ou du jus de fruit.

Chez l'enfant, en cas d'ingestion accidentelle, un contrôle soigné de sucre ingéré devra être effectué afin d'éviter une hyperglycémie.

AMAREL 2MG

CP B30

P.P.V : 60DH40



de type dérivés

le sang.

6 118000 060031

L01 :21E02  
PER.:07 2024

médicaments pour traiter la dépression (fluoxétine, Inhibiteurs de la MAO) ; médicaments diminuant les taux élevés de cholestérol (fibrates) ; médicaments diminuant la tension artérielle (inhibiteurs de l'enzyme de l'conversion) ; médicaments pour traiter la goutte (Allopurinol, probénécide, sulfinpyrazone) ; médicaments anticancéreux (cyclophosphamide, ifosfamide, trofosfamide) ; médicaments utilisés pour la perte de poids (fenfluramine) ; médicament utilisé pour améliorer la circulation, en cas d'administration intraveineuse de fortes doses (pentoxifylline) ; médicaments pour traiter les allergies nasales telles que le rhume des foins (ritoquinaline) ; médicaments de type sympatholytiques pour traiter l'hypertension artérielle, l'insuffisance cardiaque, les troubles prostatiques. Effet d'AMAREL, comprimé (diminution du taux de sucre dans le sang) peut être minué par les médicaments suivants. Ceci peut entraîner un risque de hyperglycémie (augmentation du taux de sucre dans le sang) : médicaments contenant des hormones sexuelles féminines (oestrogènes, progestatifs) ; médicaments favorisant la production d'urine (diurétiques thiazidiques) ; médicaments utilisés pour stimuler la glande thyroïde (telle que la L-thyroxine) ; médicaments pour traiter les allergies et l'inflammation (glucocorticoïdes) ; médicaments pour traiter les troubles psychiques sévères (chlorpromazine et ses dérivés de la phénothiazine) ; médicaments utilisés pour augmenter le rythme cardiaque, pour le traitement de l'asthme, de la congestion nasale, de la toux, du rhume, médicaments utilisés pour la perte de poids, ou utilisés en urgence en cas de mise en jeu du pronostic vital (adrénaline et sympathomimétiques) ; médicaments pour traiter les taux élevés de cholestérol (acide nicotinique) ; médicaments pour traiter la constipation lorsqu'ils sont utilisés au long cours (laxatifs) ; médicaments pour traiter l'épilepsie (phénytoïne) ; médicaments pour traiter la nervosité et les troubles du sommeil (barbituriques) ; médicaments pour traiter une pression élevée dans l'œil (acétazolamide) ; médicaments pour traiter l'hypertension artérielle ou la diminution du taux de sucre dans le sang (diazoxide) ; médicaments pour traiter les infections, la tuberculose (rifampicine) ; médicaments pour traiter les hypoglycémies sévères (glucagon). Et de diminution du taux de sucre dans le sang d'AMAREL, comprimé peut être minué ou augmenté par les médicaments suivants : médicaments pour traiter les ulcères de l'estomac (appelés anti-H<sub>2</sub>) ; médicaments pour traiter l'hypertension artérielle ou l'insuffisance cardiaque, que les bêta-bloquants, la clonidine, la guanéthidine, la réserpine. Une attention particulière est nécessaire lorsque vous prenez ces médicaments car ils peuvent aussi masquer les signes d'hypoglycémie. AMAREL, comprimé peut augmenter ou diminuer les effets des médicaments

Le lait maternel est la meilleure source d'immunité.

pendant l'allaitement.  
à votre médecin ou à votre pharmacien av

#### Conduite de grues et utilisation de machines

En cas d'hypoglycémie ou d'hyperglycémie, votre capacité à vous égager peut être modifiée, en particulier si vous avez présenté des symptômes. Dans ces situations, vous pouvez être un danger pour vous-même et pour les personnes (par exemple en conduisant un véhicule ou en utilisant des machines). Demandez conseil à votre médecin pour la conduite de véhicules ou présentez de fréquents épisodes d'hypoglycémie ou si vous avez des signes évocateurs d'hypoglycémie.

#### Informations importantes concernant certains composants d'

MAREL, comprimé contient du lactose. Si votre médecin vous présentez une intolérance à certains sucres, contactez-le avant d'édicament.

## COMMENT PRENDRE AMAREL, COMPRIMÉ ?

renez toujours AMAREL, comprimé exactement selon la prescription de votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

## Prise du médicament

- Prendre ce médicament par voie orale, juste avant ou pendant le principal de la journée (généralement le petit déjeuner). Si vous avez faim au petit déjeuner, vous devez prendre le médicament au moment du petit déjeuner. Il est important de ne pas sauter de repas lorsque vous prenez ce médicament.

### **sologie:**

- La posologie d'AMAREL, comprimé dépend de vos besoins et est fixée par votre médecin en fonction des résultats des analyses sanguines effectuées.

Prenez pas plus de comprimés que ce qui vous convient.

- La posologie initiale est de 1 comprimé d'AMAREL 1 mg par jour. Si nécessaire, votre médecin peut augmenter la dose après un traitement. La dose maximale recommandée est de 6 mg d'AMAREL par jour. En traitement associant glimépiride et metformine ou glimépiride et étoïne, dans ce cas, les doses respectives de glimépiride, de sulfonylurea dont vous avez besoin seront déterminées par votre médecin. En cas de modification de votre poids, de changement de rythme ou en situation de stress, une modification des doses d'AMAREL peut s'avérer nécessaire. Par conséquent, informez en votre médecin si vous avez l'impression que l'effet de votre médicament est trop faible ou trop fort. Ne modifiez pas vous-même la posologie de votre traitement médicinal.

Vous avez pris plus d'AMAREL, comprimé pour maigrir, que ce que je vous ai prescrit.

avez pris plus d'AMAREL, comprime que vous n'auriez dû prendre. Si vous avez pris plus d'AMAREL que vous n'auriez dû, vous risquez une hypoglycémie (Pour les signes de l'hypoglycémie, voir "Faites attention". Prenez immédiatement une quantité suffisante de sucre (par exemple, fruits en sucre, beaux de sucre, boissons sucrées, ou thé sucré) et informez au moins un parent ou un adulte.

l'enfant, en cas d'ingestion accidentelle, un contrôle soigné

ANNABEL ANG

AMARIL  
CB-B20


BBM-600PH40

## *de type démodé*

### se le cano

6 118000 060031

LU 1.21 EU02  
PER.:07 2024



médicaments pour traiter la dépression (fluoxétine, Inhibiteurs de la MAO) ; médicaments diminuant les taux élevés de cholestérol (fibrates) ; médicaments diminuant la tension artérielle (inhibiteurs de l'enzyme de conversion) ; médicaments pour traiter la goutte (Allopurinol, probénécide, sulfapyridine) ; médicaments anticancéreux (cyclophosphamide, ifosfamide, trofosfamide) ; médicaments utilisés pour la perte de poids (fenfluramine) ; médicament utilisé pour améliorer la circulation, en cas d'administration traveineuse de fortes doses (pentoxifylline) ; médicaments pour traiter les allergies nasales telles que le rhume des foins (ritoqualine) ; médicaments de type sympatholytiques pour traiter l'hypertension artérielle, l'insuffisance cardiaque, les troubles prostatiques. Effet d'AMAREL, comprimé (diminution du taux de sucre dans le sang) peut être minué par les médicaments suivants. Ceci peut entraîner un risque hyperglycémie (augmentation du taux de sucre dans le sang) : médicaments contenant des hormones sexuelles féminines (oestrogènes, progestatifs) ; médicaments favorisant la production d'urine (diurétiques thiazidiques) ; médicaments utilisés pour stimuler la glande thyroïde (telle que la thyroxine) ; médicaments pour traiter les allergies et l'inflammation (glucocorticoïdes) ; médicaments pour traiter les troubles psychiques sévères (chlorpromazine et ses dérivés de la phénothiazine) ; médicaments utilisés pour augmenter le rythme cardiaque, pour le traitement de l'asthme, de la congestion nasale, de la toux, du rhume, médicaments utilisés pour la perte de poids, ou utilisés en urgence en cas de mise en jeu du pronostic vital (adrénaline et sympathomimétiques) ; médicaments pour traiter les taux élevés de cholestérol (acide nicotinique) ; médicaments pour traiter la constipation lorsqu'ils sont utilisés au long cours (laxatifs) ; médicaments pour traiter l'épilepsie (phénhytoïne) ; médicaments pour traiter la nervosité et les troubles du sommeil (barbituriques) ; médicaments pour traiter une pression élevée dans l'œil (acétazolamide) ; médicaments pour traiter l'hypertension artérielle ou la diminution du taux de sucre dans le sang (diazoxide) ; médicaments pour traiter les infections, la tuberculose (rifampicine) ; médicaments pour traiter les hypoglycémies sévères (glucagon). Et de diminution du taux de sucre dans le sang d'AMAREL, comprimé peut être minué ou augmenté par les médicaments suivants : médicaments pour traiter les ulcères de l'estomac (appelés anti-H<sub>2</sub>) ; médicaments pour traiter l'hypertension artérielle ou l'insuffisance cardiaque ou les bêta-bloquants, la clonidine, la guanéthidine, la réserpine. Une attention particulière est nécessaire lorsque vous prenez ces médicaments car ils peuvent aussi masquer les signes d'hypoglycémie. AMAREL, comprimé peut augmenter ou diminuer les effets des médicaments suivants : diurétiques, arachide, et d'autre part l'insuline. AMAREL, comprimé peut augmenter ou diminuer les effets des médicaments suivants : diurétiques, arachide, et d'autre part l'insuline.

AMAREL doit pas être utilisé pendant la grossesse, consultez votre médecin.

AMAREL peut passer dans le lait maternel. AMAREL doit pas être donné pendant l'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant d'utiliser ce médicament.

#### Conduite de véhicules et utilisation de machines

En cas d'hypoglycémie ou d'hyperglycémie, votre capacité à réagir peut être modifiée, en particulier si vous avez présenté des signes d'hypoglycémie. Dans ces situations, vous pouvez être un danger pour vous-mêmes et pour les personnes (par exemple en conduisant un véhicule ou en utilisant des machines). Demandez conseil à votre médecin pour la conduite de véhicules. Si vous présentez de fréquents épisodes d'hypoglycémie ou si vous n'avez pas de signes évocateurs d'hypoglycémie.

#### Informations importantes concernant certains composants d'AMAREL

AMAREL, comprimé contient du lactose. Si votre médecin vous présentez une intolérance à certains sucre, contactez-le avant d'utiliser ce médicament.

#### 3. COMMENT PRENDRE AMAREL, COMPRIME ?

Prenez toujours AMAREL, comprimé exactement selon la prescription de votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

#### Prise du médicament

- Prendre ce médicament par voie orale, juste avant ou pendant le repas principal de la journée (généralement le petit déjeuner). Si vous prenez ce médicament au petit déjeuner, vous devez prendre le médicament au moment du petit déjeuner, vous devez prendre le médicament au moment du petit déjeuner. Il est important de ne pas sauter de repas lorsque vous prenez ce médicament.
- Avaler les comprimés entiers avec au moins un demi-verre d'eau ou croquer les comprimés.

#### Posologie :

- La posologie d'AMAREL, comprimé dépend de vos besoins et de votre état de santé. Consultez votre médecin en fonction des résultats des analyses sanguines et urinaires.

Ne prenez pas plus de comprimés que ce que vous a prescrit votre médecin.

- La posologie usuelle initiale est de 1 comprimé d'AMAREL 1 mg, 1 fois par jour.
- Si nécessaire, votre médecin peut augmenter la dose après une ou deux semaines de traitement.
- La dose maximale recommandée est de 6 mg d'AMAREL par jour.
- Un traitement associant glimépiride et metformine ou glimépiride et d'insuline dont vous avez besoin seront déterminées par votre médecin.
- En cas de modification de votre poids, de changement de rythme cardiaque ou de diminution du taux de sucre dans le sang, une modification des doses d'AMAREL peut s'avérer nécessaire. Par conséquent, informez en votre médecin.
- Si vous avez l'impression que l'effet de votre médicament est trop faible, ne modifiez pas vous-même la posologie de votre traitement. Consultez votre médecin.

#### Si vous avez pris plus d'AMAREL, comprimé que vous n'auriez dû

Si vous avez pris plus d'AMAREL que vous n'auriez dû, vous risquez d'avoir des signes d'hypoglycémie (Pour les signes de l'hypoglycémie, voir « Faites attention à l'hypoglycémie »). Prenez immédiatement une quantité suffisante de sucre (par exemple, 3-4 morceaux de sucre, boissons sucrées, ou thé sucré) et informez au moins un adulte et votre médecin.

Chez l'enfant, en cas d'ingestion accidentelle, un contrôle soigné du sucre ingéré devra être effectué afin d'éviter une hyperglycémie.

AMAREL 2MG

CP B30

de type dérivés

P.P.V : 60DH40



s le sang.

6 118000 060031

L01 :21E02  
PER.:07 2024