

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR OBTENIR LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Informations générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

Une entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radiés peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Education :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

M22- N° 002821

couleur

Optique

Autres

Maladie

Dentaire

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : **3189**

Société :

167195

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

IDRISSI MBARK

Date de naissance :

Adresse :

Tél. :

Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : / /

Nom et prénom du malade : Age :

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie :

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Signature de l'adhérent(e) :

Le : / /

VOLET ADHÉRENT

Déclaration de maladie M22- N° 002821

Remplissez ce volet, découpez le et conservez le.
Il sera nécessaire de le présenter pour toute réclamation ultérieure.

Coupon à conserver par l'adhérent(e).

Matricule :

Nom de l'adhérent(e) :

Total des frais engagés :

Date de dépôt :



count'ee

FEUILLE DE SOIN N°

DATE DE DEPOT

1

A REMPLIR PAR L'ADHERENT

NOM & Prénom	IDRISSI MBARK	Téléphone 06.68.32.01.14	
Fonction retraité	Matricule 3189	Mail	

A REMPLIR PAR LE MEDECIN TRAITANT

NOM & Prénom : EDUARD 19 ans Age : 19 Date de la première visite : 1998-01-01

Nature de la maladie

HTA

S'agit-il d'un accident : Causes et circonstances

RELEVE DES FRAIS & HONORAIRES DU MEDECIN

Dates des actes	Nature des actes	Nombre de Coefficient	Montant détaillé des Honoraires
11.03.2022	INP	C	100/00

EXECUTION DES ORDONNANCES

: 04201 Pharmacie EL OUA Driss BENMHAMMED 06 23 87 86 98 231280006	Dates 19/03/2022	Montant de la facture 1036.94
--	---------------------	----------------------------------

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Dates	Désignation des Coefficients	Montant détaillé des Honoraires
-------	------------------------------	---------------------------------

AUXILIAIRES MEDICAUX

	Dates	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

SOINS ET PROTHÉSES DENTAIRES

Le praticien est prié de présenter la dent traitée, l'acte pratiqué et indiquer la nature des soins

Veuillez fournir une facture

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODP.

SOINS DENTAIRES		Dents Traitées	Nature des soins	Coefficient	Coefficient des travaux
					<input type="text"/>
					Montant des soins <input type="text"/>
					Début d'exécution <input type="text"/>
					Fin d'exécution <input type="text"/>
O.D.F. Prothèses dentaires		Détermination du coefficient masticatoire			
		H	25533412	21433552	<input type="text"/>
D		D	00000000	00000000	Montant des soins <input type="text"/>
			00000000	00000000	Date du devis <input type="text"/>
		B	35533411	11433553	Fin de l'exécution <input type="text"/>
(Création, Remont, adjonction) Fonctionnel, thérapeutique, nécessaire à la profession					

VOLET ADHERENT

NOM du Patient :

DECLARATION N°

1

MATRICULE N° Date de Dépôt Montant engagé Nbre de pièces Jointes

Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle

Durée de validité de cette feuille est de (3) trois mois

DR. ABDELAZIZ BENHMID

الدكتور عبد العزيز بنحميد

Médecine Générale

Échographie

DU De Diabétologie à L'université Paris 13

Ancien Médecin chef au ministère de la santé

Ancien Médecin du groupe OCP



الطب العام

الفحص بالصدى

أمراض السكري خريج جامعة باريس 13

طبيب رئيس سابق بوزارة الصحة

طبيب سابق بالجمعية الشريفة للفوسفاط

Sidi Ifni , Le :

10 MARS 2022

سيدي إفني ، في :

Mr, Mme, Melle : IDRISSI

Yahar

44,00 x 3 → 132,-

- Cardia 6,2 P

S.V.

57,70 x 4 140,-

→ 23,4,- Adductor 50

S.V.

97,60 x 3 → 292,- 148,-

- fan 8,7,- 10

S.V.

35,70 x 3 → 107,- 148,-

- Hand. eye 16,-

S.V.

822,-

- Augnt 15 x 3,-

9,-

22,20

- Col. Lp 78,-

Pharmacie EL OUAFI
Dr. Driss BENMHAMED
Tél : 05 23 87 66 96
N° CAIRE - Sidi Ifni
INP : C 2074161
ICE : 001231294000066

301,-

- Rlm ns Hnt 184,-

Dr. Abdelaziz BENHMID
Médicine Générale
en face du camping municipale
Amical AL FATH
Tél : 05 28 87 59 96

RDV Le :

1369-
1369-

ودادية الفتح أمام الحبّيم البلدي - سيدى إفني - الهاتف : 05.28.87.59.96

Amical AL FATH en face du camping municipale - Sidi Ifni - Tél : 05.28.87.59.96

Rhinathiol®

carbocisteïne

125 ml

PEA : 90
N°000302 : 101

RHINATHIOL 5% AD
SIROP FL 125 ML

P.P.V : 300H00



6 118000 061427



Indications : Ce médicament est indiqué chez l'adulte et l'adolescent de plus de 15 ans en cas d'affection respiratoire récente avec difficulté d'expectoration (difficulté à rejeter en crachant les sécrétions bronchiques).

Bien reboucher le flacon après usage.

TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

Lire attentivement la notice.

À conserver à une température inférieure à 25°C.

Titulaire d'AMM au Maroc : sanofi-aventis Maroc.
Route de Rabat R.P 1, Ain Sebaâ, Casablanca.
Lahcen BOUCHAOURI, Pharmacien Responsable.

Nom et adresse du fabricant : Maphar.
Km 10, Route côtière 111, Qi-Zenata, Ain Sebaâ, Casablanca.

codolimpagine®

PARACETAMOL ET CODEINE




16 COMPRIMES
STOMACHABLES

OCTU
b
82, Allée des Quinquas | Ain Séba - Casablanca
S. Bachoudi - Pharmacien Responsable

PPV: 22DH20

PER: 10/23

LOT: K2730



CARDIX® 6,25mg

Carvédilol




28 Comprimés

LOT : 181

PER : AUT 2024

PPV : 44 DH 00



PHARMACEUTICAL INSTITUTE

CARDIX® 6,25mg

Carvédilol




28 Comprimés

LOT : 181

PER : AUT 2024

PPV : 44 DH 00



PHARMACEUTICAL INSTITUTE

CARDIX® 6,25mg

Carvédilol




28 Comprimés

LOT : 181

PER : AUT 2024

PPV : 44 DH 00



PHARMACEUTICAL INSTITUTE

AUGMENTIN

AMOXICILLINE-ACIDE CLAVULANIQUE

125 mg

Sachets

..... sachet(s) fois par jour à prendre de préférence au début des repas, pendant jours.

Lire la notice attentivement avant emploi.

كيس بحرة في اليوم يتناول من الأفضل قبل الأكل، خلال ... يوم.

Uniquement sur ordonnance

RESPECTER LES DOSES PRESCRITES

PPU: 222,00 DH

LOT: 647025

PER: 11/22



Augmentin est une marque déposée
des sociétés du Groupe GlaxoSmithKline

رمان
رمان
رمان

سبه ماسباتين

RANSIMA® 20 mg
Boîte de 30
Comprimés pelliculés
Voie orale



30 قرصاً ملبيلاً
عن طريق الفم


20 مللي

LOT n° :

EXP :

PPV : 97 DH60

SUN
PHARMA



رمان
رمان
رمان

سبه ماسباتين

RANSIMA® 20 mg
Boîte de 30
Comprimés pelliculés
Voie orale




30 قرصاً ملبيلاً
عن طريق الفم

20 مللي

LOT n° :
EXP :
PPV : 97 DH60

SUN
PHARMA



رمان
رمان
رمان

سبه ماسباتين

RANSIMA® 20 mg
Boîte de 30
Comprimés pelliculés
Voie orale




30 قرصاً ملبيلاً
عن طريق الفم

20 مللي

LOT n° :
EXP :
PPV : 97 DH60

SUN
PHARMA




**Titulaire de
l'Autorisation
de mise sur le
marché au Maroc:
Laboratoires
Pfizer S.A. .
km 0.500 , Route de
Oualidia
BP 35, 24 000
El Jadida, Maroc**

Fabriqué par :
**PIRAMAL HEALTHCARE
UK LIMITED
WHALTON ROAD - MORPETH
NORTHUMBERLAND
NE61 3YA
ROYAUME UNI
ou
DELPHARM EVREUX
5 RUE DU GUESCLIN
27000 EVREUX
FRANCE**

ALDACTONE 50[®] mg

P.P.V: 57DH70



6 118001 170029


LOT : B26910
EXP : 12.2022

**Titulaire de
l'Autorisation
de mise sur le
marché au Maroc:
Laboratoires
Pfizer S.A. .
km 0.500 , Route de
Oualidia
BP 35, 24 000
El Jadida, Maroc**

Fabriqué par :
**PIRAMAL HEALTHCARE
UK LIMITED
WHALTON ROAD - MORPETH
NORTHUMBERLAND
NE61 3YA
ROYAUME UNI
ou
DELPHARM EVREUX
5 RUE DU GUESCLIN
27000 EVREUX
FRANCE**

ALDACTONE 50[®] mg

P.P.V: 57DH70



6 118001 170029


LOT : B26910
EXP : 12.2022

**Titulaire de
l'Autorisation
de mise sur le
marché au Maroc:
Laboratoires
Pfizer S.A. .
km 0.500 , Route de
Oualidia
BP 35, 24 000
El Jadida, Maroc**

Fabriqué par :
**PIRAMAL HEALTHCARE
UK LIMITED
WHALTON ROAD - MORPETH
NORTHUMBERLAND
NE61 3YA
ROYAUME UNI
ou
DELPHARM EVREUX
5 RUE DU GUESCLIN
27000 EVREUX
FRANCE**

ALDACTONE 50[®] mg

P.P.V: 57DH70



6 118001 170029


LOT : B26910
EXP : 12.2022

**Titulaire de
l'Autorisation
de mise sur le
marché au Maroc:
Laboratoires
Pfizer S.A. .
km 0.500 , Route de
Oualidia
BP 35, 24 000
El Jadida, Maroc**

Fabriqué par :
**PIRAMAL HEALTHCARE
UK LIMITED
WHALTON ROAD - MORPETH
NORTHUMBERLAND
NE61 3YA
ROYAUME UNI
ou
DELPHARM EVREUX
5 RUE DU GUESCLIN
27000 EVREUX
FRANCE**

ALDACTONE 50[®] mg

P.P.V: 57DH70



6 118001 170029

LOT : B26910
EXP : 12.2022

KARDEGIC® 160mg

Acétylsalicylate de DL-Lysine

poudre pour solution buvable en sachet-dose

SANOFI

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

• Gardez cette notice. Vous pourrez avoir besoin de la relire. • Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien. • Ce médicament vous a été prescrit personnellement, prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres. • Si vous présentez un accès aigu et/ou/épilepsie, parlez-en à votre médecin, ou votre pharmacien, qui ne serait pas mentionné dans ce

1. QU'EST-CE QUE KARDEGIC 160 mg

CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique :

ANTI-THROMBOTIQUE/INHIBITEUR DE

Le médicament contient de l'aspirine, appartenant à la famille des inhibiteurs

KARDEGIC 160 mg, poudre pour solution

sang et permet de fluidifier le sang.

Indications thérapeutiques :

KARDEGIC 160 mg, poudre pour solution buvable, d'accidents vasculaires cérébraux, ou cardiaques par

cerveau ou du cœur.

Votre médecin peut décider d'associer ce médicament

à d'autres médicaments pour résoudre à l'adulte. Vous ne devez pas prendre ce médicament sans

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE pour solution buvable en sachet?

Ne prenez jamais KARDEGIC 160 mg

• si vous êtes allergique à la substance

composants contenus dans KARDEGIC dans la rubrique 6.

• si vous êtes allergique (hypersensible

anti-inflammatoires non stéroïdiens -

• si vous êtes enceinte, à partir du début d'aménorrhée,

• si vous avez ou avez déjà eu de l'asth

par la piste d'aspirine ou d'un médicam

• si vous avez un antécédent d'un an

• si vous avez déjà eu une hémorragie, l'aspirine ou un autre médicament de la même famille (les anti-inflammatoires non stéroïdiens),

• si vous souffrez de saignements ou si votre médecin a indiqué chez vous des risques de saignements,

• si vous avez une maladie grave du foie, des reins ou du cœur,

• si vous êtes atteint d'une mastocytose (maladie des cellules impliquées dans les réactions allergiques) car il existe un risque de réactions allergiques sévères.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre KARDEGIC 160 mg, poudre pour solution buvable en sachet.

Avant de prendre ce médicament, prévenez votre médecin :

• si vous avez une maladie hérititaire des globules rouges, appellez déficit en G6PD, car des doses élevées d'aspirine peuvent alors provoquer une destruction des globules rouges,

• si vous avez déjà eu un ulcère de l'estomac ou duodénum ou une inflammation de l'estomac (gastrite),

• si vous avez déjà eu des saignements digestifs (vomissements de sang ou présence de sang dans les selles),

• si vous avez une maladie des reins ou du foie,

• si vous avez une hypertension artérielle (tension artérielle élevée),

• si vous avez des règles abondantes.

Des syndromes de Reye, pathologies très rares mais présentant un risque vital, ont été observés chez des enfants avec des signes d'infection virale (en particulier varicelle et épisodes d'allure grippale) et recevant de l'acide acétylsalicylique. KARDEGIC 160 mg, poudre pour solution buvable en sachet ne

doit pas être administré aux enfants et aux adolescents.

Pendant le traitement, des saignements ou des douleurs dans le ventre peuvent survenir. Le risque de survenue de ces effets augmente avec la dose, chez les personnes âgées, chez les personnes de faible poids corporel, chez les personnes ayant déjà souffert d'ulcère de l'estomac, et en cas d'association à certains médicaments (voir rubrique « Autres médicaments et KARDEGIC 160 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose »). Consultez immédiatement votre médecin en cas de survenue de tels effets.

Si une intervention chirurgicale est prévue :

L'aspirine augmente les risques de saignements même à de très faibles doses, et ce même lorsque la dernière prise de ce médicament date de plusieurs jours.

Prévenez votre médecin traitant, votre chirurgien, l'anesthésiste ou votre dentiste de la prise de ce médicament, dans le cas où une opération, même mineure, est envisagée.

Enfants et adolescents

Votre dentiste ou chirurgien peut vous donner des instructions supplémentaires.

ment, prévenez votre médecin à

l'adolescents.

sur solution buvable en sachet

Éléments en contenant. Vous ne devez

judre pour solution buvable en sachet

évidemment de la même famille des AINS

votre médecin ou à votre pharmacien.

, poudre pour solution buvable en

ainsi le risque d'effets indésirables,

notices des autres médicaments que vous

et contiennent pas d'aspirine et/ou

prendre KARDEGIC 160 mg, poudre pour

le sang) si vous avez un antécédent

gréel (médicaments utilisés pour fluidifier le

ourra vous prescrire conjointement de

robécido (médicaments utilisés pour

utilisé pour diminuer le nombre de

ent utilisé pour le traitement d'une maladie

magés et obstrués par des caillots sanguins),

ponitrine)

nt à base de :

gémaline (médicament utilisé pour traiter

la douleur et de

Durée du traitement

Votre médecin

Si vous avez pr

n'auriez dû (ou

Prévenez rapidement

Un surdosage peut

être : des boursouflures, vertiges, voire des

sures dans le sens de la

de la conscience

Si ces signes d'urgence

urgence dans le

Un ordre du p

et chronique avec l'age

être malré en cas de sur

Si vous oubliez de prend

Ne prenez pas de dose dou

Continuez votre traitement régulier

4. QUELS SONT LES EFFETS IN

Comme tous les médicam

survivants pas systématiqu

Les effets indésirables suivant

KARDEGIC® 160mg

Acétylsalicylate de DL-Lysine

poudre pour solution buvable en sachet-dose

SANOFI

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

• Gardez cette notice. Vous pourrez avoir besoin de la relire. • Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien. • Ce médicament vous a été prescrit personnellement, prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres. • Si vous présentez un accès aigu et/ou/épilepsie, parlez-en à votre médecin, ou votre pharmacien, qui ne serait pas mentionné dans ce

1. QU'EST-CE QUE KARDEGIC 160 mg

CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique :

ANTI-THROMBOTIQUE/INHIBITEUR DE

Le médicament contient de l'aspirine, appartenant à la famille des inhibiteurs

KARDEGIC 160 mg, poudre pour solution

sang et permet de fluidifier le sang.

Indications thérapeutiques :

KARDEGIC 160 mg, poudre pour solution buvable, d'accidents vasculaires cérébraux, ou cardiaques par

cerveau ou du cœur.

Votre médecin peut décider d'associer ce médicament

à d'autres médicaments pour résoudre à l'adulte. Vous ne devez

pas prendre pour solution buvable en sachet-dose.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE pour solution buvable en sachet ?

Ne prenez jamais KARDEGIC 160 mg

• si vous êtes allergique à la substance

composants contenus dans KARDEGIC dans la rubrique 6.

• si vous êtes allergique (hypersensible

anti-inflammatoires non stéroïdiens -

• si vous êtes enceinte, à partir du début

d'« aménorrhée ».

• si vous avez ou avez déjà eu de l'asth

par la prise d'aspirine ou d'un médicament

• si vous avez un antécédent d'un an

• si vous avez déjà eu une hémorragie

l'aspirine ou un autre médicament de la même famille (les anti-inflammatoires non stéroïdiens).

• si vous souffrez de saignements ou si votre médecin a indiqué chez vous des risques

saignements.

• si vous avez une maladie grave du foie, des reins ou du cœur.

• si vous êtes atteint d'une mastocytose (maladie des cellules impliquées dans les réactions

allergiques) car il existe un risque de réactions allergiques sévères.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre KARDEGIC 160 mg, poudre pour solution buvable en sachet.

Avant de prendre ce médicament, prévenez votre médecin :

• si vous avez une maladie hérititaire des globules rouges, appeler déficit en G6PD, car des doses élevées d'aspirine peuvent alors provoquer une destruction des globules rouges,

• si vous avez déjà eu un ulcère de l'estomac ou duodénum ou une inflammation de l'estomac (gastrite).

• si vous avez déjà eu des saignements digestifs (vomissements de sang ou présence de sang dans les selles).

• si vous avez une maladie des reins ou du foie,

• si vous avez une hypertension artérielle (tension artérielle élevée).

• si vous avez des règles abondantes.

Des syndromes de Reye, pathologies très rares mais présentant un risque vital, ont été observés chez

des enfants avec des signes d'infection virale (en particulier varicelle et épisodes d'allure grippale) et recevant de l'acide acétylsalicylique. KARDEGIC 160 mg, poudre pour solution buvable en sachet ne

doit pas être administré aux enfants et aux adolescents.

Pendant le traitement, des saignements ou des douleurs dans le ventre peuvent survenir. Le risque de survenue de ces effets augmente avec la dose, chez les personnes âgées, chez les personnes de faible poids corporel, chez les personnes ayant déjà souffert d'ulcère de l'estomac, et en cas d'association à certains médicaments (voir rubrique « Autres médicaments et KARDEGIC 160 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose »). Consultez immédiatement votre médecin en cas de survenue de tels effets.

Si une intervention chirurgicale est prévue :

L'aspirine augmente les risques de saignements même à de très faibles doses, et ce même lorsque la dernière prise de ce médicament date de plusieurs jours.

Prévenez votre médecin traitant, votre chirurgien, l'anesthésiste ou votre dentiste de la prise de ce médicament, dans le cas où une opération, même mineure, est envisagée.

Enfants et adolescents

Votre dentiste ou chirurgien peut vous donner des instructions supplémentaires.

ment, prévenez votre médecin à

l'adolescents.

sur solution buvable en sachet

Écarts en contiennent. Vous ne devez jadis pour solution buvable en sachet édication de la même famille (les AINS votre médecin ou à votre pharmacien, poudre pour solution buvable en ainsi le risque d'effets indésirables, notices des autres médicaments que vous e contiennent pas d'aspirine et/ou

prendre KARDEGIC 160 mg, poudre pour

le sang) si vous avez un antécédent

gréel (médicaments utilisés pour fluidifier le ourra vous prescrire conjointement de

robécido (médicaments utilisés pour

et utilisé pour diminuer le nombre de

ent utilisé pour le traitement d'une maladie magés et obstrués par des caillots sanguins), pomme)

nt à base de :

gémal (médicament utilisé pour traiter

• nombreux gastro-intestinaux, antacides et adoucissants (médicament utilisé pour traiter les douleurs digestives ou les ulcères digestifs),

• anticoagulant oral, thrombolytiques ou héparines (médicaments utilisés pour fluidifier le sang),

• anti-inflammatoires non stéroïdiens (médicament utilisé dans le traitement de la douleur et de la fièvre),

• ticagrelor (dans les indications validées),

• cobaméthilium,

• ibuprofène,

• un inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine (médicaments utilisés pour traiter la dépression ou les troubles anxieux),

• médicaments mises adrénergiques-sérotoninergiques.

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avec récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

KARDEGIC 160 mg, poudre pour solution buvable en sachet avec des aliments, boissons et de l'alcool

La consommation d'alcool doit être évitée pendant le traitement en raison d'un risque augmenté de lésions au niveau gastro-intestinal.

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous alliez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse,

demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre tout médicament.

GROSSEUR : Ce médicament contient de l'aspirine (acide acétylsalicylique). Ne prendre AUCUN

AUTRE médicament contenant de l'aspirine (y compris les médicaments sans ordonnance).

• jusqu'à 100 mg par jour : Pendant toute la grossesse, si nécessaire, votre médecin spécialiste

La
Voir
Respon
En cas d
Mode d'ac
Ce médic
Verser le co
dissoute ave
robécido (m
éfenseur pour
fréquence d
utilisation d
Durée du tra
Votre médec
Si vous avez p
n'auriez d'ou
Prévenez rapide
Un surdosage po
sont : des bousc
vertiges, voire des
sures dans le sa
de la conscience

Si ces signes
urgence dan
Un ordre du p
et chronique ave
l'apnée et
être mortel en cas de su
Si vous oubliez de pren
Ne prenez pas de dose doubl

Continuez votre traitement régulier.

5. QUELS SONT LES EFFETS IN

Comme tous les médicaments
sérieusement sans systématiqu

Les effets indésirables suivant