

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR TIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## ditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## iologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## que :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## ducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## taire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

## adie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

**MUPRAS** : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



## Déclaration de Maladie

N° M21- 066585

113201

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

### Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 3475

Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

Tél. :

Total des frais engagés : Dhs

### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Docteur Laïla IRAQI  
permatologue - Vénérologue  
N° 234, Bd. Lemara M'salah  
Hay El Béchir 50928 Casablanca

Date de consultation :

Nom et prénom du malade : CHAIBIA KHAADDIqui Age:

Lien de parenté :  Lui-même  Conjoint  Enfant

Nature de la maladie : Bulleuse, lichennelle avec Escarbe

En cas d'accident préciser les causés et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :



# RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
16.10.21 - 22.10.22				Laila IRAQI Dermatologue - Vénereologue 234 Bd. Témara M'salah Casablanca
21.10.21 - 22.10.22				Laila IRAQI Dermatologue - Vénereologue 234 Bd. Témara M'salah Casablanca

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
<i>Pharmacie AL KHEIR - Rue 1 N°6 Ain Chock Casablanca</i>	21/10/22	470.50 DH

## ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Cœfficients	Montant des Honoraires
<i>MY Abdellah Aïn Chock - DR. Hédi Ouali Alami</i>	17/10/22	356	670 DH

## AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

VOLET ADHERENT

# RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	COEFFICIENT DES TRAVAUX
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			COEFFICIENT DES TRAVAUX
	H	25533412	21433552	
D	00000000	00000000		
G	00000000	00000000		
B	35533411	11433553		
[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession				
				<img alt="Blank box for functional

# Docteur Laila IRAQI

Dermatologue - Vénérologue  
Spécialiste

Maladies de la peau, des Ongles et des Cheveux  
Maladies Sexuellement Transmissibles

Chirurgie de la peau

Cosmétologie - Allergologie

Epilation Laser

Ancienne Attachée du CHU Ibn Rochd  
de Casablanca

Casablanca, le

112.00

① ~~Docteur Laila IRAQI~~  
Dermatologue - Vénérologue  
234, Bd. Temara M'salah Aïn Chok  
Hay Mly Abdellah Ain Chok  
05 22 50 82 83 - Casablanca



# الدكتورة ليلى عراقى

الأمراض الجلدية - الأمراض التناسلية

اختصاصية

في أمراض الجلد الأضافر والشعر

الأمراض التناسلية جراحة الجلد

طب التجميل والحساسية

إزالة الشعر بالليزر

ملحقة سابقاً بالمركز الاستشفائي الجامعي

ابن رشد بالبيضاء

البيضاء، في

Pharmacie Aïn Chok  
Boulevard Temara M'salah Aïn Chok  
Casablanca

160



160

une infection en Intramusculaire pendant

15 jours

② ~~60.00~~ Ferflex Ampoule Buvable

une Ampoule à Boire Shah Jor

le matin

après repas

③ ~~75.00~~ Betadix 50 ml la Veille

une 420.50

Docteur Laila IRAQI  
Dermatologue - Vénérologue  
234, Bd. Temara M'salah Aïn Chok  
Hay Mly Abdellah Ain Chok  
05 22 50 82 83 - Casablanca

250

en Intramusculaire

05 22 50 82 83

شارع تمارة - رقم 234 - الطابق الأول - المصلى - حي مولاي عبد الله - عين الشق - الدار البيضاء

Boulevard Temara - N° 234 - 1<sup>er</sup> étage Hay Moulay M'salah Aïn Chok - Casablanca

# Zetalax DM®

## microlavement

### QUAND UTILISER

Zetalax DM® Microlavement agit mécaniquement au niveau du rectum et stimule le processus d'expulsion des matières fécales. L'action locale garantit la sécurité du produit, qui n'a pas d'interaction avec les processus physiologiques du tube digestif et n'a donc aucun effet collatéral sur le système.

Lot : 076  
À utiliser de préférence avant le : 11/2026  
PPC : 79,50 DH

### COMMENT FONCTIONNE

Zetalax DM® Microlavement agit mécaniquement au niveau du rectum et stimule le processus d'expulsion des matières fécales. L'action locale garantit la sécurité du produit, qui n'a pas d'interaction avec les processus physiologiques du tube digestif et n'a donc aucun effet collatéral sur le système.

Les ingrédients contenus dans le microlavement garantissent le ramollissement et la lubrification de la masse fécale, ce qui permet ensuite une expulsion rapide et aisée des matières fécales.

Zetalax DM® Microlavement ne contient pas de substances actives au niveau pharmacologique et son action est exclusivement mécanique. La présence d'extraits végétaux à action émolliente atténue l'effet irritant de la glycérine au niveau du rectum, ce qui rend son introduction plus aisée.

### CAS DANS LESQUELS IL NE FAUT PAS UTILISER LE PRODUIT :

Zetalax DM® Microlavement ne doit pas être utilisé en cas de douleur abdominale aiguë, nausée, vomissement, obstruction intestinale, saignement rectal d'origine inconnue, grave état de déshydratation, rectocolite hémorragique et inflammation hémorroïdale.

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité aux ingrédients contenus dans le produit.

### GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

Avant d'utiliser le produit, demander conseil au médecin ou au pharmacien.

### COMMENT UTILISER CE PRODUIT :

- Ouvrir l'emballage.
  - Enlever le bouchon du microlavement et lubrifier la canule avec une goutte du produit.
  - Introduire délicatement la canule dans le rectum, sans presser le tube.
  - Appuyer à fond sur le microlavement.
  - Extraire la canule sans relâcher la pression sur le tube, pour ne pas aspirer à nouveau le liquide.
- Il est conseillé d'appliquer un ou deux microlavements par jour.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 12 ans.  
Suivre attentivement le mode d'emploi.  
Conserver hors de portée des enfants.

### INGÉDIENTS :

Glycérol, amidon, camomille extrait fluide, mauve extrait fluide, eau.

### DATE D'ÉMISSION :

08/05/2011

Dispositif médical classe 1.

Autorisation ministère de la santé n° : 860/16116/2016/DMP/20/DM

### Fabricant

Zeta Farmaceutici S.p.A.  
Via Galvani, 10  
Sandrigo (VI)  
ITALY

### Importé au Maroc par :

Laboratoires IRCOS  
N°109 Q.I sidi ghanem  
40000 MARRAKECH

### Distribué au Maroc par :

MEDIPRO PHARMA  
Borj El yacout, Bd Rahal El Meskini.  
20120. Casablanca.

# Zetalax DM®

## microlavement

### QUAND UTILISER :

Zetalax DM® Microlavement agit mécaniquement au niveau du rectum et stimule le processus d'expulsion des matières fécales. L'action locale garantit la sécurité du produit, qui n'a pas d'interaction avec les processus physiologiques du tube digestif et n'a donc aucun effet collatéral sur le système.

Lot : 076  
À utiliser de préférence avant le : 11/2026  
PPC : 79,50 DH

### COMMENT FONCTIONNE :

Zetalax DM® Microlavement agit mécaniquement au niveau du rectum et stimule le processus d'expulsion des matières fécales. L'action locale garantit la sécurité du produit, qui n'a pas d'interaction avec les processus physiologiques du tube digestif et n'a donc aucun effet collatéral sur le système.

Les ingrédients contenus dans le microlavement garantissent le ramollissement et la lubrification de la masse fécale, ce qui permet ensuite une expulsion rapide et aisée des matières fécales.

Zetalax DM® Microlavement ne contient pas de substances actives au niveau pharmacologique et son action est exclusivement mécanique. La présence d'extraits végétaux à action émolliente atténue l'effet irritant de la glycérine au niveau du rectum, ce qui rend son introduction plus aisée.

### CAS DANS LESQUELS IL NE FAUT PAS UTILISER LE PRODUIT :

Zetalax DM® Microlavement ne doit pas être utilisé en cas de douleur abdominale aiguë, nausée, vomissement, obstruction intestinale, saignement rectal d'origine inconnue, grave état de déshydratation, rectocolite hémorragique et inflammation hémorroïdale.

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité aux ingrédients contenus dans le produit.

### GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

Avant d'utiliser le produit, demander conseil au médecin ou au pharmacien.

### COMMENT UTILISER CE PRODUIT :

- Ouvrir l'emballage.
  - Enlever le bouchon du microlavement et lubrifier la canule avec une goutte du produit.
  - Introduire délicatement la canule dans le rectum, sans presser le tube.
  - Appuyer à fond sur le microlavement.
  - Extraire la canule sans relâcher la pression sur le tube, pour ne pas aspirer à nouveau le liquide.
- Il est conseillé d'appliquer un ou deux microlavements par jour.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 12 ans.  
Suivre attentivement le mode d'emploi.  
Conserver hors de portée des enfants.

### INGÉDIENTS :

Glycérol, amidon, camomille extrait fluide, mauve extrait fluide, eau.

### DATE D'ÉMISSION :

08/05/2011

Dispositif médical classe 1.

Autorisation ministère de la santé n° : 860/16116/2016/DMP/20/DM

#### Fabricant

Zeta Farmaceutici S.p.A.  
Via Galvani, 10  
Sandriga (VI)  
ITALY

#### Importé au Maroc par :

Laboratoires IRCOS  
N°109 Q.I sidi ghanem  
40000 MARRAKECH

#### Distribué au Maroc par :

MEDIPRO PHARMA  
Borj El yacout, Bd Rahal El Meskini.  
20120. Casablanca.

# Zetalax DM®

## microlavement

### QUAND UTILISER :

Zetalax DM® Microlavement agit mécaniquement au niveau du rectum et stimule le processus d'expulsion des matières fécales. L'action locale garantit la sécurité du produit, qui n'a pas d'interaction avec les processus physiologiques du tube digestif et n'a donc aucun effet collatéral sur le système.

Lot : 076  
À utiliser de préférence avant le : 11/2026  
PPC : 79,50 DH

ication;  
e de vie,  
nédecin.

### MENT :

### COMMENT FONCTIONNE T-IL :

Zetalax DM® Microlavement agit mécaniquement au niveau du rectum et stimule le processus d'expulsion des matières fécales. L'action locale garantit la sécurité du produit, qui n'a pas d'interaction avec les processus physiologiques du tube digestif et n'a donc aucun effet collatéral sur le système.

Les ingrédients contenus dans le microlavement garantissent le ramollissement et la lubrification de la masse fécale, ce qui permet ensuite une expulsion rapide et aisée des matières fécales.

Zetalax DM® Microlavement ne contient pas de substances actives au niveau pharmacologique et son action est exclusivement mécanique. La présence d'extraits végétaux à action émolliente atténue l'effet irritant de la glycérine au niveau du rectum, ce qui rend son introduction plus aisée.

### CAS DANS LESQUELS IL NE FAUT PAS UTILISER LE PRODUIT :

Zetalax DM® Microlavement ne doit pas être utilisé en cas de douleur abdominale aiguë, nausée, vomissement, obstruction intestinale, saignement rectal d'origine inconnue, grave état de déshydratation, rectocolite hémorragique et inflammation hémorroïdale.

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité aux ingrédients contenus dans le produit.

### GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

Avant d'utiliser le produit, demander conseil au médecin ou au pharmacien.

### COMMENT UTILISER CE PRODUIT :

- Ouvrir l'emballage.
- Enlever le bouchon du microlavement et lubrifier la canule avec une goutte du produit.
- Introduire délicatement la canule dans le rectum, sans presser le tube.
- Appuyer à fond sur le microlavement.
- Extraire la canule sans relâcher la pression sur le tube, pour ne pas aspirer à nouveau le liquide.

Il est conseillé d'appliquer un ou deux microlavements par jour.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 12 ans.  
Suivre attentivement le mode d'emploi.  
Conserver hors de portée des enfants.

### INGÉDIENTS :

Glycérol, amidon, camomille extrait fluide, mauve extrait fluide, eau.

### DATE D'ÉMISSION :

08/05/2011

Dispositif médical classe 1.

Autorisation ministère de la santé n° : 860/16116/2016/DMP/20/DM

### Fabricant

Zeta Farmaceutici S.p.A.  
Via Galvani, 10  
Sandrigo (VI)  
ITALY

### Importé au Maroc par :

Laboratoires IRCOS  
N°109 Q.I sidi ghanem  
40000 MARRAKECH

### Distribué au Maroc par :

MEDIPRO PHARMA  
Borj El yacout, Bd Rahal El Meskini.  
20120. Casablanca.

# Gentamycine® Llorente

Gentamicine

## COMPOSITIONS

		Par ampoule de	
• Gentamicine (DCI) sulfate exprimé en base .....	2 ml 40 mg ou 80 mg	3 ml 120 mg	
			4 ml 160 mg

- Excipients q.s.

## FORMES ET PRESENTATIONS

### Soluté injectable :

- Ampoule de 2 ml (40 mg) : Boîte unitaire.
- Ampoule de 2 ml (80 mg) : Boîte unitaire et boîte de 6.
- Ampoule de 3 ml (120 mg) : Boîte unitaire et boîte de 6.
- Ampoule de 4 ml (160 mg) : Boîte unitaire et boîte de 6.

## CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

Antibiotique bactéricide de la famille des aminoglycosides.

## NOM ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT

Zone industrielle, Ouest Ain Harrouda, Route Régionale N° 322  
(ex R.S 111) Km 12.400 Ain Harrouda 28630 Mohammedia - Maroc

## INDICATIONS THERAPEUTIQUES

Les indications sont limitées aux infections à bacilles Gram négatif sensibles, notamment dans leurs localisations rénales et urologiques. La gentamicine, associée à un autre antibiotique, pourra être prescrite dans certaines infections à germes sensibles, en se basant sur les données bactériologiques. En particulier :

- infections rénales, urologiques et génitales ;
- infections cutanées et, en particulier, staphylococcies malignes de la face ;
- infections articulaires ;
- infections respiratoires ;
- septicémies et endocardites.

## CONTRE - INDICATIONS

### Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- Allergie aux antibiotiques de la famille des aminoglycosides,
- Myasthénie,
- Aminosides (administration simultanée).

### Pour la gentamycine 160 mg :

- Insuffisance rénale sévère ;
- Hypoacusie préexistante ;
- Malade pesant moins de 50 Kg.

## MISE EN GARDE

Ce produit contient des sulfites qui peuvent éventuellement entraîner ou aggraver des réactions de type anaphylactique.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

### Utiliser ce médicament avec précaution en cas de :

- Gentamycine devra être utilisée avec prudence chez les sujets porteurs d'une lésion vestibulaire ou cochléaire.
- La néphrotoxicité et l'ototoxicité de la gentamycine imposent les précautions suivantes :
  - chez le sujet insuffisant rénal, n'utiliser Gentamycine qu'en cas de stricte nécessité et adapter la posologie en fonction de la créatininémie. Une surveillance médicale portant sur les fonctions rénale et auditive est nécessaire. Les taux sériques de l'antibiotique seront contrôlés dans toute la mesure du possible, afin d'éviter de dépasser, de façon prolongée, le seuil toxique pour l'appareil cochléovestibulaire que l'on situe à 10-12 µg/ml. De même, des taux sériques résiduels supérieurs à 2 µg/ml sont à éviter ;
  - éviter d'associer la gentamycine aux diurétiques très actifs,
  - éviter les traitements itératifs et/ou prolongés, surtout chez les sujets âgés.
- En cas d'intervention chirurgicale, informer l'anesthésiste réanimateur de la prise de ce médicament.

### En cas de doute, ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

## INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

## GROSSESSE ET ALLAITEMENT

**Grossesse** : l'innocuité du produit au cours de la grossesse n'a pas été établie (toxicité potentielle pour l'appareil cochléovestibulaire du fœtus).

**Allaitement** : le passage dans le lait maternel est négligeable.

## POSOLOGIES

Les posologies seront adaptées à la严重度 de l'infection, à l'état et à l'âge du malade.



## NOTICE D'INFORMATION POUR LES UTILISATEURS

### FERPLEX 40 mg, Solution Orale

Fer protéinsuccinylate

Boîte de 10 flacons de 15 ml.

#### Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

#### Contenu de la notice :

- Qu'est-ce que FERPLEX 40 mg solution orale et dans quels cas est-il utilisé.
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre FERPLEX 40 mg solution orale.
- Comment prendre FERPLEX 40 mg solution orale.
- Quels sont les effets indésirables éventuels.
- Comment conserver FERPLEX 40 mg solution orale.
- Informations supplémentaires.

#### 1. QU'EST-CE QUE FERPLEX 40 MG SOLUTION ORALE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE :

Classe pharmacothérapeutique : Antianémique/fer.

FERPLEX 40 mg solution orale est un médicament qui apporte du fer aux globules rouges dans le sang, pour le traitement des carences de fer ainsi que le traitement de l'anémie (diminution du taux d'hémoglobine ainsi que du nombre et de la dimension des globules rouges), due à cette carence en fer.

#### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE FERPLEX 40 MG SOLUTION ORALE :

Ne prenez jamais FERPLEX 40 mg solution orale dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) au Fer protéinsuccinylate ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.
- Si vous êtes allergique aux protéines lactées.
- Si vous souffrez d'une maladie qui provoque une accumulation de fer dans l'organisme (Hemosidérose et Hémochromatose).
- Si vous souffrez d'une pancréatite (inflammation du pancréas) ou d'une cirrhose hépatique (maladie chronique du foie qui se caractérise par la formation de lésions de fibrose ou de « cicatrices » dans le tissu hépatique et qui altère sa structure et son fonctionnement normal) dues à une accumulation de fer.

Si vous souffrez d'une anémie sans carence en fer.

Faites attention avec FERPLEX 40 mg :

• En cas de carence en fer ou d'anémie, consultez votre médecin avant de prendre ce médicament.

#### Prise ou utilisation d'autres médicaments :

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien :

Antibiotiques de la classe des quinolones et des tétracyclines.

- Si vous prenez d'autres médicaments visant à traiter les problèmes osseux (ostéoporose), comme des biphosphonates. La pénicillamine utilisée pour l'arthrite (inflammation des articulations).

Alfa m

• artéri

Thyrox

• thyroï

Lévod

• de Par

Mycop

L'absorp

solution

accompa

necessair

celle des médicaments suivants :

Antiacides, habituellement utilisés chez les patients qui

- souffrent d'acidité gastrique.

Chloramphénicol (antibiotique).

• Cholestyramine, utilisé chez les patients ayant une

hypercholestérolémie.

Médicaments pour le traitement de l'ulcère gastrique ou le reflux

• gastro-oesophagique comme l'omeprazole, le lansoprazole et le pantoprazole.

Risque d'interférences avec les tests diagnostiques :

- Ce médicament peut interférer avec les analyses en laboratoire pour la recherche de sang occulte dans les selles.

#### Prise de FERPLEX 40 mg solution orale avec les aliments et boissons :

Certains aliments végétaux, le lait, le café et le thé diminuent l'absorption du fer. Il est donc nécessaire d'espacer d'au moins deux heures l'administration de FERPLEX 40 mg et la prise de ces aliments.

L'absorption des dérivés de fer peut être augmentée suite à l'ingestion de jus citrique (orange, citron, etc.) fraîchement pressé.

#### Grossesse et allaitement :

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

FERPLEX est indiqué pendant la grossesse et l'allaitement pour le traitement des carences en fer, il n'y a donc aucune précaution particulière à prendre.

#### Conduite de véhicules et utilisation de machines :

Aucun effet sur l'aptitude à la conduite et l'utilisation de machines n'a été observé.

#### Informations importantes concernant certains composants de FERPLEX 40 mg solution orale :

**FERPLEX® 40 mg**

Fer protéinsuccinylate

Boîte de 10 Falcons buvables

PPV 60,00 Dhs



6 118001 440016

## NOTICE D'INFORMATION POUR LES UTILISATEURS

### FERPLEX 40 mg, Solution Orale

Fer protéinsuccinylate

Boîte de 10 flacons de 15 ml.

#### Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

#### Contenu de la notice :

- Qu'est-ce que FERPLEX 40 mg solution orale et dans quels cas est-il utilisé.
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre FERPLEX 40 mg solution orale.
- Comment prendre FERPLEX 40 mg solution orale.
- Quels sont les effets indésirables éventuels.
- Comment conserver FERPLEX 40 mg solution orale.
- Informations supplémentaires.

#### 1. QU'EST-CE QUE FERPLEX 40 MG SOLUTION ORALE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE :

Classe pharmacothérapeutique : Antianémique/fer.

FERPLEX 40 mg solution orale est un médicament qui apporte du fer aux globules rouges dans le sang, pour le traitement des carences de fer ainsi que le traitement de l'anémie (diminution du taux d'hémoglobine ainsi que du nombre et de la dimension des globules rouges), due à cette carence en fer.

#### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE FERPLEX 40 MG SOLUTION ORALE :

Ne prenez jamais FERPLEX 40 mg solution orale dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) au Fer protéinsuccinylate ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.
- Si vous êtes allergique aux protéines lactées.
- Si vous souffrez d'une maladie qui provoque une accumulation de fer dans l'organisme (Hemosidérose et Hémochromatose).
- Si vous souffrez d'une pancréatite (inflammation du pancréas) ou d'une cirrhose hépatique (maladie chronique du foie qui se caractérise par la formation de lésions de fibrose ou de « cicatrices » dans le tissu hépatique et qui altère sa structure et son fonctionnement normal) dues à une accumulation de fer.

Si vous souffrez d'une anémie sans carence en fer.

Faites attention avec FERPLEX 40 mg :

• En cas de carence en fer ou d'anémie, consultez votre médecin avant de prendre ce médicament.

#### Prise ou utilisation d'autres médicaments :

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien :

Antibiotiques de la classe des quinolones et des tétracyclines.

- Si vous prenez d'autres médicaments visant à traiter les problèmes osseux (ostéoporose), comme des biphosphonates. La pénicillamine utilisée pour l'arthrite (inflammation des articulations).

Alfa m

• artéri

Thyrox

• thyroï

Lévod

• de Par

Mycop

L'absorp

solution

accompa

necessair

celle des médicaments suivants :

Antiacides, habituellement utilisés chez les patients qui

- souffrent d'acidité gastrique.

Chloramphénicol (antibiotique).

• Cholestyramine, utilisé chez les patients ayant une

hypercholestérolémie.

Médicaments pour le traitement de l'ulcère gastrique ou le reflux

- gastro-oesophagique comme l'omeprazole, le lansoprazole et le pantoprazole.

Risque d'interférences avec les tests diagnostiques :

- Ce médicament peut interférer avec les analyses en laboratoire pour la recherche de sang occulte dans les selles.

#### Prise de FERPLEX 40 mg solution orale avec les aliments et boissons :

Certains aliments végétaux, le lait, le café et le thé diminuent l'absorption du fer. Il est donc nécessaire d'espacer d'au moins deux heures l'administration de FERPLEX 40 mg et la prise de ces aliments.

L'absorption des dérivés de fer peut être augmentée suite à l'ingestion de jus citrique (orange, citron, etc.) fraîchement pressé.

#### Grossesse et allaitement :

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

FERPLEX est indiqué pendant la grossesse et l'allaitement pour le traitement des carences en fer, il n'y a donc aucune précaution particulière à prendre.

#### Conduite de véhicules et utilisation de machines :

Aucun effet sur l'aptitude à la conduite et l'utilisation de machines n'a été observé.

#### Informations importantes concernant certains composants de FERPLEX 40 mg solution orale :

**FERPLEX® 40 mg**

Fer protéinsuccinylate

Boîte de 10 Falcons buvables

PPV 60,00 Dhs



6 118001 440016

# Docteur Laila IRAQI

Dermatologue - Vénérologue

Spécialiste

Maladies de la peau, des Ongles et des Cheveux

Maladies Sexuellement Transmissibles

Chirurgie de la peau

Cosmétologie - Allergologie

Epilation Laser

Ancienne Attachée du CHU Ibn Rochd  
de Casablanca



Casablanca, le

Amour Laila IRAQI  
Dermatologue - Vénérologue  
234 Bd Temara M'salah  
Hay Mly Abdellah Aïn Chock  
Tel : 05 22 50 82 83 - Casablanca

# الدكتورة ليلى عراقى

الأمراض الجلدية - الأمراض التناسلية

اختصاصية

في أمراض الجلد الأنصاف والشعر

الأمراض التناسلية جراحة الجلد

طب التجميل والحساسية

إزالة الشعر بالليزر

ملحقة سابقاً بالمركز الاستشفائي الجامعي

ابن رشد بالبيضاء

البيضاء، في

Fix : 05 22 52 62 52 - 05 22 21 10 90  
My Abdellah Aïn Chock - ZK  
252, Bd El Moudawine, Hay

MEDECIN BILOGISTE  
DR. Hoda OUAL ALAMI

LABORATOIRE EL KHALIL

(1) ECB

ECB

(2) NFS

NFS

(3) CRP

CRP

glycémie aléan - Hb glyquée -

(4) ASAT

ASAT - ALAT

(5) Me

Me

meilleur

Docteur Laila IRAQI  
Dermatologue - Vénérologue  
234, Bd. Temara M'salah  
Hay Mly Abdellah Aïn Chock  
Tel : 05 22 50 82 83 - Casablanca

05 22 50 82 83

شارع تمارة - رقم 234 - الطابق الأول - المصلى - حي مولاي عبد الله - عين الشق - الدار البيضاء

Boulevard Temara - N° 234 - 1er étage Hay Moulay Abdellah M'salah Aïn Chok - Casablanca



INPE :



093061166

## FACTURE N° : 2202170050

Casablanca le 17-02-2022

Mme Chaibia KHADDIOUI

Demande N° 2202170050

Analyses :

### Récapitulatif des analyses

CN	Analyse	Val	Clefs
0111	Créatinine	B30	B
0118	Glycémie	B30	B
0119	Hémoglobine glycosylée	B100	B
0135	Urée	B30	B
0146	Transaminases O (TGO)	B50	B
0147	Transaminases P (TGP)	B50	B
0216	Numération formule	B80	B
0241	Cytologie, culture, identification	B90	B
0370	CRP	B100	B

Total des B : 560

Total des E : 0.00

TOTAL DOSSIER : **670.00DH**

Arrêtée la présente facture à la somme de : **six cent soixante-dix dirhams**

252, Bd. EL KHALIL , Hay My Abdellah, Ain Chok, Casablanca- Tél : 0522526252 / FAX:  
0522211090

E-Mail : [labo.elkhalil@gmail.com](mailto:labo.elkhalil@gmail.com) - Patente N : 34046060 - I.F.N : 15214903 - CNSS : 4204096

ICE : 001603906000091



# مختبر الخليل للتحاليل الطبية والبيولوجية

## LABORATOIRE EL KHALIL D'Analyses Médicales et Biologiques

Biochimie - Bactériologie - Hématologie - Immunologie - Hormonologie - Oncologie - Parasitologie - Mycologie - Virologie - Spermiose

Dr. Hoda OUALI ALAMI

Médecin Biologiste  
Diplômée de la Faculté de Médecine de Rabat

د. هدى الواي العلمي

Date du prélèvement : 17-02-2022

Code patient : 1903210050

Né(e) le : 01-01-1925 (97 ans)



Mme Chaibia KHADDIOUI

Dossier N° : 2202170050

Prescripteur : Dr LAILA IRAQI

## HEMATOLOGIE

### HEMOGRAMME (Automate : HORIBA Medical ABX PENTRA 80 XL)

(Les valeurs de référence sont en fonction de l'âge, du sexe, de l'état physiologique du patient, une éventuelle grossesse...)

25-12-2021

Hématies :	3,33 Millions/mm <sup>3</sup>	(3,85-5,20)	3,36
Hémoglobine :	10,2 g/dL	(11,8-15,8)	10,2
Hématocrite :	31,2 %	(35,0-45,5)	30,6
VGM :	94 fL	(80-101)	91
TCMH :	31 pg	(27-34)	30
CCMH :	32,7 g/dL	(28,0-36,0)	33,3
<b>Leucocytes :</b>	<b>7 680 /mm<sup>3</sup></b>	<b>(3 600-10 500)</b>	<b>6 780</b>
Polynucléaires Neutrophiles :	56 %		46
Soit:	4 301 /mm <sup>3</sup>	(2 000-7 500)	3 119
Lymphocytes :	31 %		43
Soit:	2 381 /mm <sup>3</sup>	(1 000-5 000)	2 915
Monocytes :	8 %		8
Soit:	614 /mm <sup>3</sup>	(<1 100)	542
Polynucléaires Eosinophiles :	4 %		3
Soit:	307 /mm <sup>3</sup>	(0-600)	203
Polynucléaires Basophiles :	1 %		0
Soit:	77 /mm <sup>3</sup>	(0-150)	0
<b>Plaquettes :</b>	<b>354 000 /mm<sup>3</sup></b>	<b>(150 000-450 000)</b>	<b>376 000</b>
VMP	7,7 µm <sup>3</sup>	(6,0-11,0)	7,8

Commentaire :

Anémie normochrome normocytaire.

LABORATOIRE EL KHALIL

Dr. Hoda OUALI ALAMI,  
MÉDECIN BIOLOGISTE

252, Bd El Khalil, Hay  
My Abdellah Ain Chock - HS  
Fix : 05 22 52 62 52 - 05 22 21 10 90

Prélèvement à domicile sur Rendez-vous

252, Boulevard El Khalil, Hay Moulay Abdellah, Ain Chock - Casablanca  
05 22 52 62 52 / Fax : 05 22 21 10 90 - E-mail-1 : labo.elkhalil@gmail.com / E-mail-2 : h.oualialami@gmail.com  
Tél : 05 22 52 62 52 - E : 15214903 - CNSS : 4204096 - R.C : 421712 - ICE : 001603906000091



# مختبر الخليل للتحاليل الطبية والبيولوجية

## LABORATOIRE EL KHALIL D'Analyses Médicales et Biologiques




Biochimie - Bactériologie - Hématologie - Immunologie - Hormonologie - Oncologie - Parasitologie - Mycologie - Virologie - Spermologie

Dr. Hoda OUALI ALAMI

Médecin Biologiste  
Diplômée de la Faculté de Médecine de Rabat

د. هدى الواي العلمي

Date du prélèvement : 17-02-2022 - 2202170050 - Mme Chaibia KHADDIOUI



## BIOCHIMIE SANGUINE

24-01-2022


### Protéine C-réactive (CRP)

(Immuno-turbidimétrie - AU480 BECKMAN)

17,7 mg/L

(<5,0)

28,8



### Urée

(Dosage enzymatique - AU 480 BECKMAN)

0,34 g/L

(0,10-0,50)

5,66 mmol/L

(1,67-8,33)

10-01-2022

### Créatinine

(Technique enzymatique -AU 480 BECKMAN )


8,0 mg/L

(3,0-11,0)

9,2

70,8 µmol/L

(26,6-97,4)



**LABORATOIRE EL KHALIL**  
Dr. Hoda OUALI ALAMI  
MEDECIN BIOLOGISTE  
252, Bd Elkhalil, Hay Moulay Abdellah, Ain Chock - HS  
My Abdellah Ain Chock - HS  
252, Boulevard El Khalil, Hay Moulay Abdellah, Ain Chock - Casablanca  
Tél : 05 22 52 62 52 / Fax : 05 22 21 10 90 - E-mail-1 : labo.elkhalil@gmail.com / E-mail-2 : h.oualialami@gmail.com  
Patente : 34046060 - I.F : 15214903 - CNSS : 4204096 - R.C : 421712 - ICE : 001603904000001

Prélèvement à domicile sur Rendez-vous : 252 62 52 - 05 22 21 10 90

Page 2 / 6

252, Boulevard El Khalil, Hay Moulay Abdellah, Ain Chock - Casablanca

Tél : 05 22 52 62 52 / Fax : 05 22 21 10 90 - E-mail-1 : labo.elkhalil@gmail.com / E-mail-2 : h.oualialami@gmail.com

Patente : 34046060 - I.F : 15214903 - CNSS : 4204096 - R.C : 421712 - ICE : 001603904000001

\* RAPPORT D'ANALYSE\*

LABORATOIRE KHALIL

2022/02/17 17:01

V01.2C

TOSOH

NO: 0024 TB 0003 - 04

ID: 0003 - 04 17150


CAL(N) = 1.1592X + 0.5891

TP 986

NOM	%	TEMPS	AIRE
GP	0.0	0.00	0.00
A1A	0.4	0.26	6.78
A1B	0.8	0.35	13.59
F	0.4	0.48	6.37
LA1C+	2.0	0.57	32.93
SA1C	5.1	0.71	64.47
AO	92.5	1.05	1532.69
		AIRE TOTALE	1656.82

HbA1c 5.1%

HbA1 6.3 % HbF 0.4 %  
0% 15%





# مختبر الخليل للتحاليل الطبية والبيولوجية

## LABORATOIRE EL KHALIL D'Analyses Médicales et Biologiques

Biochimie - Bactériologie - Hématologie - Immunologie - Hormonologie - Oncologie - Parasitologie - Mycologie - Virologie - Spermiologie

Dr. Hoda OUALI ALAMI

Médecin Biologiste  
Diplômée de la Faculté de Médecine de Rabat

د. هدى الواي العلمي

Date du prélèvement : 17-02-2022 - 2202170050 - Mme Chaibia KHADDIOUI

25-12-2021


### Glycémie à jeun

(Technique enzymatique- AU 480 BECKMAN)

0,87 g/L  
4,83 mmol/L

(0,70-1,10)  
(3,89-6,11)

0,90



25-12-2021

### Hémoglobine glyquée (HbA1c)

(Tosoh Biosciences GX - HPLC )

5,1 %

(4,0-6,0)

5,4

### Variant Hémoglobine


Absence de variant d'hémoglobine

#### Valeurs de référence :

Sujet normoglycémique : 4,00 à 6,00 % de l'hémoglobine totale.

Sujet diabétique équilibré : objectif ciblé autour de 6,50 %.

Diabète mal équilibré : taux supérieur à 8,50 %.



### Transaminases GPT (ALAT)

(Dosage enzymatique- AU 480 BECKMAN )

6 UI/L

(5-55)

### Transaminases GOT (ASAT)

(Dosage enzymatique – AU 480 BECKMAN)

13 UI/L

(5-40)

## BACTERIOLOGIE

### EXAMEN CYTOBACTERIOLOGIQUE DES URINES

(Cultures sur milieux : CLED et Milieu Chromogènes OXOID)

Recueil : Milieu du jet

Aspect : Trouble

**LABORATOIRE EL KHALIL**  
**Dr. Hoda OUALI ALAMI**  
**MEDECIN BIOLOGISTE**  
 252, Bd Elkhali, Hay  
 My Abdellah Ain Chock - HS  
 Fix : 05 22 52 62 52 - 05 22 21 10 90

Prélèvement à domicile sur Rendez-vous

252, Boulevard El Khalil, Hay Moulay Abdellah, Ain Chock - Casablanca  
 Tél : 05 22 52 62 52 / Fax : 05 22 21 10 90 - E-mail-1 : labo.elkhalil@gmail.com / E-mail-2 : h.oualialami@gmail.com

Patente : 34046060 - I.F : 15214903 - CNSS : 4204096 - R.C : 421712 - I.C.F : 001/0000/0000

Page 2 / 6



# مختبر الخليل للتحاليل الطبية والبيولوجية

## LABORATOIRE EL KHALIL D'Analyses Médicales et Biologiques

Biochimie - Bactériologie - Hématologie - Immunologie - Hormonologie - Oncologie - Parasitologie - Mycologie - Virologie - Spermiologie

Dr. Hoda OUALI ALAMI

Médecin Biologiste  
Diplômée de la Faculté de Médecine de Rabat

د. هدى الواي العلمي

Date du prélèvement : 17-02-2022 - 2202170050 - Mme Chaibia KHADDIOUI

### Recherche biochimique:

		26-01-2022
pH:	7,5	(6,0-7,5)
Sucre:	Négative	
Proteines:	Négative	
Sang:	<b>POSITIVE +</b>	
Acétone:	Négative	
Nitrites:	Négative	

### Examen cytologique

<b>Leucocytes :</b>	<b>624 / mm<sup>3</sup></b>	(0-20)	1 920
	<b>624 000 / ml</b>	(0-20 000)	
<b>Hématies :</b>	<b>100 / mm<sup>3</sup></b>	(0-10)	98
	<b>100 000 / ml</b>	(0-10 000)	
Cellules épithéliales :	Absence		
Cristaux:	Absence		
Coloration de Gram :	<b>Présence de nombreux bacilles à gram négatif</b>		

### Examen bactériologique

<b>Cultures :</b>	<b>CULTURE POSITIVE</b>
Numération 1 :	<b>10<sup>5</sup> UFC/ml</b>
<b>Germe 1 :</b>	<b>Klebsiella pneumoniae</b>
<b>Conclusion:</b>	<b>Leucocyturie positive, bactériurie positive : infection urinaire.</b>

### **ANTIBIOGRAMME**

#### ANTIBIOGRAMME

Les noms de spécialités sont à titre indicatif

<b>Nature de prélèvement</b>	Urides
<b>Germe isolé</b>	<b>Klebsiella pneumoniae</b>

#### **Pénicillines**

<b>Amoxicilline (AMX)</b> (AMOXIL®, CLAMOXIL®, AGRAM®, BACTOX®)	<b>RESISTANT</b>
<b>Ticarcilline (TIC)</b> (TICARPEN®)	<b>RESISTANT</b>
<b>Amoxicilline-Acide clavulanique (AMC)</b> (AUGMENTIN®, CLAVULIN®)	<b>RESISTANT</b>

**LABORATOIRE EL KHALIL**  
Dr. Hoda OUALI ALAMI  
MEDECIN BIOLOGISTE  
252, Bd El Khalil, Hay  
My Abdellah Ain Chock - HS  
Fix : 05 22 52 62 52 - 05 22 21 10 90

#### Prélèvement à domicile sur Rendez-vous

Page 4 / 6

252, Boulevard El Khalil, Hay Moulay Abdellah, Ain Chock - Casablanca

Tél : 05 22 52 62 52 / Fax : 05 22 21 10 90 - E-mail-1 : labo.elkhalil@gmail.com / E-mail-2 : h.oualialami@gmail.com

Portable : 34044040 - I.F. : 15214903 - CNSS : 4204096 - R.C : 421712 - ICE : 001603906000091



# مختبر الخليل للتحاليل الطبية والبيولوجية

## LABORATOIRE EL KHALIL D'Analyses Médicales et Biologiques

Biochimie - Bactériologie - Hématologie - Immunologie - Hormonologie - Oncologie - Parasitologie - Mycologie - Virologie - Spermiologie

Dr. Hoda OUALI ALAMI

Médecin Biologiste  
Diplômée de la Faculté de Médecine de Rabat

د. هدى الولي العلمي

Date du prélèvement : 17-02-2022 - 2202170050 - Mme Chaibia KHADDIOUI

### Céphalosporines (Voie parentérale)

<b>Céfalotine (KF)</b> (CEFALOTINE®, KEFLIN®)	<b>RESISTANT</b>
<b>Céfoxidine (FOX)</b> (MEFOXIN®)	<b>RESISTANT</b>
<b>Céfuroxime (CXM)</b> (ZINNAT® injectable et voie oral.)	<b>RESISTANT</b>
<b>Céfotaxime (CTX)</b> (CLAFORAN®)	<b>RESISTANT</b>
<b>Céftazidime (CRO)</b> (ROCEPHINE®)	<b>RESISTANT</b>
<b>Céftazidime (CAZ)</b> (FORTUM®)	<b>RESISTANT</b>

### Céphalosporines(Voie orale)

<b>Céfixime (CFM)</b> (OROKEN®)	<b>RESISTANT</b>
------------------------------------	------------------

### Carbapénèmes

<b>Imipénème (IPM)</b> (IMIPENEM CILASTATINE®)	<b>Sensible</b>
---	-----------------

### Aminosides

<b>Gentamicine (CN)</b> (GENTAMYCIN®, GENTALLINE®)	<b>Sensible</b>
<b>Amikacine (AK)</b> (AMIKACIN MYLAN®, AMIKLIN®)	<b>Sensible</b>

### Quinolones et Fluroquinolones

<b>Acide nalidixique (NA)</b> (NEGRAM®)	<b>Sensible</b>
<b>Norfloxacine (NOR)</b> (CHIBROXINE®, NOROXINE®)	<b>RESISTANT</b>
<b>Ofloxacine (OFL)</b> (OFLOCET®)	<b>RESISTANT</b>
<b>Ciprofloxacine (CIPRO)</b> (CIFLOX®, CIPRO®)	<b>RESISTANT</b>

LABORATOIRE EL KHALIL  
Dr. Hoda OUALI ALAMI  
MEDECIN BIOLOGISTE  
252, Bd El Khalil, Hay  
My Abdellah Ain Chock - Casablanca  
Fix : 05 22 52 62 52 - 05 22 21 10 90

Prélèvement à domicile sur Rendez-vous

Page 5 / 6

252, Boulevard El Khalil, Hay Moulay Abdellah, Ain Chock - Casablanca

Tél : 05 22 52 62 52 / Fax : 05 22 21 10 90 - E-mail-1 : labo.elkhalil@gmail.com / E-mail-2 : h.ouali.alami@gmail.com

Patente : 34046060 - I.F : 15214903 - CNSS : 4204096 - R.C : 421712 - I.C.F : 001/00001



# مختبر الخليل للتحاليل الطبية والبيولوجية

LABORATOIRE EL KHALIL D'Analyses Médicales et Biologiques

Biochimie - Bactériologie - Hématologie - Immunologie - Hormonologie - Oncologie - Parasitologie - Mycologie - Virologie - Spermiologie

Dr. Hoda OUALI ALAMI

Médecin Biologiste

Diplômée de la Faculté de Médecine de Rabat

د. هدى الواي العلمي

Date du prélèvement : 17-02-2022 - 2202170050 - Mme Chaibia KHADDIOUI

## Divers

<b>Triméthoprime/Sulfaméthoxazole</b> Sensible <b>(SXT)</b> (BACTRIM®, CO-TRIM®)
<b>Colistine (CT)</b> Sensible (COLIMYCINE®)
<b>Fosfomycine (FF)</b> Sensible (FOSFOCINE®, MONURIL® traitement monodose par V.O)
<b>Nitrofurantoïne (F)</b> Sensible (FURADANTINE®, FURAZIDE®)

Validé par : Dr Hoda OUALI ALAMI

LABORATOIRE EL KHALIL  
Dr. Hoda OUALI ALAMI  
MEDECIN BIOLOGISTE  
252, Bd El Khalil, Hay  
My Abdellah Ain Chock  
Fix : 05 22 52 62 52 - 05 22 21 10 90