

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Educations :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Prothésaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com
Prise en charge : pec@mupras.com
Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° M21- 0011496

☐ Maladie ☐ Dentaire ☒ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 081 Société : 113433
☒ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :
Nom & Prénom : EL HADDOU M
Date de naissance : 1935
Adresse : 27 Avenue N° 9 Tabriquet Salé
Tél. : 0666 6604 93 Total des frais engagés : 6010,20 DH Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr. TOUZANI Fatima ép. Kabbaj
Spécialiste des Maladies et Chirurgie des yeux
27 Rue Ibn Khaldoun - 2ème étage - Salé
Tél. Cas : 05 37 78 27 24
Sur Rendez-vous

Date de consultation : 19/04/2019
Nom et prénom du malade : EL HADDOU M Age : 84 ans
Lien de parenté : ☒ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant
Nature de la maladie : DHA + Maculose
En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Signature de l'adhérent(e) : Le : / /

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
19/04/22			300 MH	

Dr. TOUZANI Fatima ép. Kabbaj
Spécialiste des Maladies et Chirurgie des yeux
16, Rue Ton Khaldoun 2ème étage - Safé
Tél. Cab: 05 37 78 27 24
Sur Rendez-vous

Dr. TOUZANI Fatima ép. Kabbaj
Spécialiste des Maladies et Chirurgie des yeux
16, Rue Ton Khaldoun 2ème étage - Safé
Tél. Cab: 05 37 78 27 24
Sur Rendez-vous

RELEVÉ DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacie ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Pharmacie AL MOUAHAR Hay Al Mouahidine N° 9 Av. El Mehdi Ben Toumarel Safé - Tél: 037 86 09 68	19/04/22	756.60
	22/04/22	54.10

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
Dr. MELLA Zakaria Ophtalmologiste 998, AV. FAR, 1er Etage, Amal 5 Rabat Tél/Fax: 0537 29 29 38 IND: 101108157	19 AVR 2022	C U. A	400,00 DHS
	21/04/2022	OCT	1000 DH

AUXILIAIRES MEDICAUX




Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre	Montant détaillé des Honoraires
	26/04/22	AM PC IM IV	280,00
		INP:105002539	350,00

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient															
				CCEFFICIENT DES TRAVAUX														
				MONTANTS DES SOINS														
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU CCEFFICIENT MASTICATOIRE																	
	<table><tr><td colspan="2">H</td></tr><tr><td>25533412</td><td>21433552</td></tr><tr><td>00000000</td><td>00000000</td></tr><tr><td>D</td><td>G</td></tr><tr><td>00000000</td><td>00000000</td></tr><tr><td>35533411</td><td>11433553</td></tr><tr><td colspan="2">B</td></tr></table>			H		25533412	21433552	00000000	00000000	D	G	00000000	00000000	35533411	11433553	B		CCEFFICIENT DES TRAVAUX
	H																	
	25533412	21433552																
	00000000	00000000																
	D	G																
	00000000	00000000																
	35533411	11433553																
	B																	
	[Création, remont, adjonction]																	
	Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession																	

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXEC

Dr. MELLAL Zakaria

Ex. Professeur Agrégé à la Faculté
de Médecine de Rabat
Ophthalmologiste

Chirurgie de la Cataracte (Phaco)
Chirurgie du Glaucome
Chirurgie Orbito Palpébrale
Angio-Laser
INPE: 101108157



د. ملال زكرياء

أستاذ سابق بكلية الطب بالرباط
أخصائي في طب وجراحة العيون

جراحة المياه البيضاء
جراحة المياه الزرقاء
جراحة الجفون
تصوير أوعية الشبكية والليزر
INPE: 101108157

Rabat le: 21/04/2022

الرباط في:

Dr. MELLAL Zakaria

Ophthalmologiste
998, Av. FAR, 1ère Etage, Amal 5
CYM, Rabat-Tél/Fax: 0537 29 29 38
INPE- 101108157

Ahmed

accepte de

le CT papillaire

OD: $CD = 7/10$, $lim 1.62mm^2$ avec

NPCL normale avec aspect en brique bien
fréquent, angle de 45° normale

OS: $CD = 7/10$, $lim 1.36mm^2$, avec NPCL

normale avec aspect en brique bien fréquent
angle de 45° et 60° bien

perimétrie 10-11 en OD

Accompagné par

Dr. MELLAL Zakaria
Ophthalmologiste
998, Av. FAR, 1ère Etage, Amal 5
CYM, Rabat-Tél/Fax: 0537 29 29 38
INPE- 101108157

LOT T038511 1
EXP 07 2022
PPV 126. 10 DH

4- بيد واحدة، إمسك القارورة مقبولة، بوضع الأ
على منطقة الضغط.

5- باستخدام يدك الأخرى، يُرجى سحب جفكك الس

6- يُرجى إمالة الرأس إلى الخلف والنظر لأعلى.



7- ضع طرف القارورة بالقرب من الجفن السفلي. تجنب ملامسة
القارورة للعين.

8- اسحب ببطء قطرة واحدة داخل الجيب المكون بين العين و الجفن بالضغط على
القارورة ببطء.

9- أغلق العين لفترة من الوقت. لا يجب الغمز أو حك العينين.

10- مع الاستمرار في إغلاق العين، ضع إصبع السبابة على الزاوية الداخلية للعين، ثم اضغط
على الأنف لمدة دقيقتين تقريباً. فهذا سيساعد على منع نفاذ الدواء عبر القناة المسيلة للدموع إلى
الأنف أو الحلق، والتي قد يمتص الدواء في أجزاء أخرى من الجسم. ويرجى طلب مزيد
من التعليمات المحددة من الطبيب حول هذا الأسلوب في الاستعمال.

11- ضع الغطاء لفلق القارورة بإحكام ويرجى تجنب المبالغة في غلق الغطاء.

12- يجب غسل اليدين مرة أخرى بالماء والصابون لإزالة أي بقايا.

وينتظر لمدة 15 دقيقة على الأقل قبل وضع العدسات اللاصقة مرة أخرى
ويحذر لمس طرف القطرة للعين أو الجفن أو أي شيء آخر لتجنب تعرض قطرة العين للتلوث.

فقد تسبب قطرة العين الملونة إصابة عين المريض بالعدوى.

قد يشعر المريض بإحساس حارق طفيف في العين بعد استعمال قطرة العين.

إذا استمر هذا الحرقان، أو كان غير مريح بدرجة كبيرة، فيرجى الاتصال بالطبيب أو الصيدلاني.

مدة استعمال

تساعد قطرة كوزوبت في التحكم في الإصابة بالمياه الزرقاء، إلا أنها لا تشفيها. لذا، يجب استعمال
قطرة كوزوبت كل يوم. ويرجى الاستمرار في استعمال القطرة للمدة التي وصفها الطبيب.

إذا استعملت كوزوبت 20 ملغ/مل + 5 ملغ/مل، محلول قطرات للعين، أكثر مما يجب:

إذا ظن المريض أو أي شخص أنه ربما ابتلع محتوى قارورة كوزوبت، كلياً أو جزئياً، أو أفرط
في استعمال القطرة، فيرجى على الفور الاتصال بالطبيب، الصيدلاني أو مركز معلومات
السموم لطلب النصيحة، ويرجى إجراء ذلك حتى إذا لم تكن ثمة أي أعراض التوعد أو التسمم.

في حالة ابتلاع المريض من قطرة كوزوبت عن طريق الخطأ، أو في حالة تجاوزه القطرات،
قد يشعر بدوار أو دوخة، وقد يتعرض للإغماء، أو يعاني من بطن شديد في معدل نبضات القلب،
أو يعاني من صعوبة في التنفس أو التنفس بصغير.

إذا نسبت استعمال كوزوبت 20 ملغ/مل + 5 ملغ/مل، محلول قطرات للعين:

إذا حان وقت الجرعة التالية تقريباً، فيرجى تجاوز الجرعة التي نسيته، وأخذ الجرعة التالية
عند حلول وقتها. في غير ذلك، يمكن استعمال القطرة وقتما تذكرت، ثم العودة مجدداً إلى
استعمالها كما هو معاد.

كوزوبت 20 ملغ/مل + 5 ملغ/مل،
محلول قطرات للعين. 1 قارورة من فئة 5 ملل.
دورزولاميد / تيمولول

يرجى قراءة هذه النشرة بعناية قبل البدء في استعمال هذا الدواء.

- احفظ بهذه النشرة لأنك قد تحتاج إلى الإطلاع عليها لاحقاً.

- إذا كانت لديك أي استفسارات أخرى أو شك، يرجى مراجعة طبيبك أو الصيدلي.

- هذا الدواء موصوف لك شخصياً، لا يجوز لك أن تعطيه لغيرك لأنه قد يلحق بهم ضرراً حتى
ولو كانت أعراضهم مماثلة لأعراضك.

- يجب إخبار طبيبك أو الصيدلي إذا تطور أحد الأعراض الجانبية غير المرغوبة إلى درجة
خطيرة أو إذا لاحظت ظهور أعراض جانبية أخرى غير المذكورة في هذه النشرة.

في هذه النشرة:

1. ما هو كوزوبت 20 ملغ/مل + 5 ملغ/مل، محلول قطرات للعين وما هي دواعي استعماله؟

2. ما يجب أن تعرفه قبل البدء في تناول كوزوبت 20 ملغ/مل + 5 ملغ/مل، محلول قطرات
للعين؟

3. كيف تستعمل كوزوبت 20 ملغ/مل + 5 ملغ/مل، محلول قطرات للعين؟

4. ما هي الأعراض الجانبية المحتملة؟

5. كيف أحفظ كوزوبت 20 ملغ/مل + 5 ملغ/مل، محلول قطرات للعين؟

6. معلومات أخرى إضافية.

1. ما هو كوزوبت 20 ملغ/مل + 5 ملغ/مل، محلول قطرات للعين وما هي دواعي استعماله؟

تستخدم قطرة كوزوبت لتخفيف ارتفاع الضغط في العينين وعلاج المياه الزرقاء. المياه الزرقاء
حالة مرضية قد يرتفع فيها ضغط السائل في العينين. ومع ذلك، قد يكون لدى بعض المرضى
المصابين بالمياه الزرقاء ضغط طبيعي في العينين. بالإضافة إلى ذلك، قد لا يتعرض بعض
المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط العينين للإصابة بالمياه الزرقاء.

تحدث المياه الزرقاء عادة نتيجة تراكب السائل المتدفق عبر العين. ويحدث هذا التراكب بسبب
استنزاف السائل في العينين ببطء شديد أكثر من ضخه إليهما. ونظراً لاستمرار دخول السائل
الجديد إلى العينين، فضلاً عن السائل الموجود بهما بالفعل، يواصل الضغط ارتفاعه. وقد يسبب
هذا الارتفاع في الضغط تلفاً في الجزء الخلفي من العينين؛ مما يؤدي إلى فقدان تدريجي في
الرؤية. وقد يتطور تلف العينين ببطء شديد بحيث لا يعلم المريض ببقدانه التدريجي في الرؤية.

وحتى في بعض الأحيان يصاحب ضغط العينين الطبيعي تلف في الجزء الخلفي من العينين.
عادة لا توجد أعراض لمرض المياه الزرقاء. وتتميز الطريقة الوحيدة للتعرف على الإصابة
بالمياه الزرقاء في فحص ضغط العينين والعصب البصري ومجمل الإبصار على يد أحد

متخصصي طب العيون. وإذا لم تخضع المياه الزرقاء للعلاج، فقد تؤدي إلى مشكلات خطيرة
وقد لا تصاب بأعراض، إلا أن المياه الزرقاء قد تؤدي في النهاية إلى العمى الكلي. وفي حقيقة
الأمور، عدم معالجة المياه الزرقاء أحد أكثر الأسباب شيوعاً للإصابة بالعمى.

وبالرغم من أن قطرة كوزوبت تساعد على التحكم في الإصابة بالمياه الزرقاء، إلا أنها لا تشفيها.
تحتوي قطرة كوزوبت على مادتين فعالتين: هيدروكلوريد دورزولاميد وماليات تيمولول.

تخفف كلتا المادتين الفعالتين من الضغط داخل العين عن طريق تقليل إنتاج السائل، إلا أنها
ينجزان ذلك بطرق مختلفة.

ويتنمي هيدروكلوريد دورزولاميد إلى مجموعة من الأدوية تُعرف باسم مثبطات الانهيدراز
الكربونية. بينما يتنمي ماليات تيمولول إلى مجموعة من الأدوية تُعرف باسم مثبطات بيتا.

لا تسبب قطرة كوزوبت الاندما.

LOT T038511 1
EXP 07 2022
PPV 126. 10 DH

4- بيد واحدة، إمسك القارورة مقبولة، بوضع الأ
على منطقة الضغط.

5- باستخدام يدك الأخرى، يُرجى سحب جفكك الس

6- يُرجى إمالة الرأس إلى الخلف والنظر لأعلى.



7- ضع طرف القارورة بالقرب من الجفن السفلي. تجنب ملامسة
القارورة للعين.

8- اسحب ببطء قطرة واحدة داخل الجيب المكون بين العين و الجفن بالضغط على
القارورة ببطء.

9- أغلق العين لفترة من الوقت. لا يجب الغمز أو حك العينين.

10- مع الاستمرار في إغلاق العين، ضع إصبع السبابة على الزاوية الداخلية للعين، ثم اضغط
على الأنف لمدة دقيقتين تقريباً. فهذا سيساعد على منع نفاذ الدواء عبر القناة المسيلة للدموع إلى
الأنف أو الحلق، والتي قد يمتص الدواء في أجزاء أخرى من الجسم. ويرجى طلب مزيد
من التعليمات المحددة من الطبيب حول هذا الأسلوب في الاستعمال.

11- ضع الغطاء لفلق القارورة بإحكام ويرجى تجنب المبالغة في غلق الغطاء.

12- يجب غسل اليدين مرة أخرى بالماء والصابون لإزالة أي بقايا.

وينتظر لمدة 15 دقيقة على الأقل قبل وضع العدسات اللاصقة مرة أخرى
ويحذر لمس طرف القطرة للعين أو الجفن أو أي شيء آخر لتجنب تعرض قطرة العين للتلوث.

فقد تسبب قطرة العين الملونة إصابة عين المريض بالعدوى.

قد يشعر المريض بإحساس حارق طفيف في العين بعد استعمال قطرة العين.

فيما استمر هذا الحرقان، أو كان غير مريح بدرجة كبيرة، فيرجى الاتصال بالطبيب أو الصيدلاني.

مدة استعمال

تساعد قطرة كوزوبت في التحكم في الإصابة بالمياه الزرقاء، إلا أنها لا تشفيها. لذا يجب استعمال
قطرة كوزوبت كل يوم. ويرجى الاستمرار في استعمال القطرة للمدة التي وصفها الطبيب.

إذا استعملت كوزوبت 20 ملغ/مل + 5 ملغ/مل، محلول قطرات للعين، أكثر مما يجب:

إذا ظن المريض أو أي شخص أنه ربما ابتلع محتوى قارورة كوزوبت، كلياً أو جزئياً، أو أفرط
في استعمال القطرة، فيرجى على الفور الاتصال بالطبيب، الصيدلاني أو مركز معلومات
السموم لطلب النصيحة، ويرجى إجراء ذلك حتى إذا لم تكن ثمة أي أعراض التوَعك أو التسمم.

في حالة ابتلاع المريض من قطرة كوزوبت عن طريق الخطأ، أو في حالة تجاوزه القطرات،

قد يشعر بدوار أو دوخة، وقد يتعرض للإغماء، أو يعاني من بطن شديد في معدل نبضات القلب،

أو يعاني من صعوبة في التنفس أو التنفس بصغير.

إذا نسبت استعمال كوزوبت 20 ملغ/مل + 5 ملغ/مل، محلول قطرات للعين:

إذا حان وقت الجرعة التالية تقريباً، فيرجى تجاوز الجرعة التي نسيته، وأخذ الجرعة التالية

عند حلول وقتها. في غير ذلك، يمكن استعمال القطرة وقتما تذكرت، ثم العودة مجدداً إلى
استعمالها كما هو معاد.

كوزوبت 20 ملغ/مل + 5 ملغ/مل،
محلول قطرات للعين. 1 قارورة من فئة 5 ملل.
دورزولاميد / تيمولول

يرجى قراءة هذه النشرة بعناية قبل البدء في استعمال هذا الدواء.

- احفظ بهذه النشرة لأنك قد تحتاج إلى الإطلاع عليها لاحقاً.

- إذا كانت لديك أي استفسارات أخرى أو شك، يرجى مراجعة طبيبك أو الصيدلي.

- هذا الدواء موصوف لك شخصياً، لا يجوز لك أن تعطيه لغيرك لأنه قد يلحق بهم ضرراً حتى
ولو كانت أعراضهم مماثلة لأعراضك.

- يجب إخبار طبيبك أو الصيدلي إذا تطور أحد الأعراض الجانبية غير المرغوبة إلى درجة
خطيرة أو إذا لاحظت ظهور أعراض جانبية أخرى غير المذكورة في هذه النشرة.

في هذه النشرة:

1. ما هو كوزوبت 20 ملغ/مل + 5 ملغ/مل، محلول قطرات للعين وما هي دواعي استعماله؟

2. ما يجب أن تعرفه قبل البدء في تناول كوزوبت 20 ملغ/مل + 5 ملغ/مل، محلول قطرات
للعين؟

3. كيف تستعمل كوزوبت 20 ملغ/مل + 5 ملغ/مل، محلول قطرات للعين؟

4. ما هي الأعراض الجانبية المحتملة؟

5. كيف أحفظ كوزوبت 20 ملغ/مل + 5 ملغ/مل، محلول قطرات للعين؟

6. معلومات أخرى إضافية.

1. ما هو كوزوبت 20 ملغ/مل + 5 ملغ/مل، محلول قطرات للعين وما هي دواعي استعماله؟

تُستخدم قطرة كوزوبت لتخفيف ارتفاع الضغط في العينين وعلاج المياه الزرقاء. المياه الزرقاء

حالة مرضية قد يرتفع فيها ضغط السائل في العينين. ومع ذلك، قد يكون لدى بعض المرضى

المصابين بالمياه الزرقاء ضغط طبيعي في العينين. بالإضافة إلى ذلك، قد لا يتعرض بعض

المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط العينين للإصابة بالمياه الزرقاء.

تحدث المياه الزرقاء عادة نتيجة تراكب السائل المتدفق عبر العين. ويحدث هذا التراكب بسبب

استنزاف السائل في العينين ببطء شديد أكثر من ضخه إليهما. ونظراً لاستمرار دخول السائل

الجديد إلى العينين، فضلاً عن السائل الموجو بهما بالفعل، يواصل الضغط ارتفاعه. وقد يسبب

هذا الارتفاع في الضغط تلفاً في الجزء الخلفي من العين؛ مما يؤدي إلى فقدان تدريجي في

الرؤية. وقد يتطور تلف العينين ببطء شديد بحيث لا يعلم المريض ببقدانه التدريجي في الرؤية.

وحتى في بعض الأحيان يصاحب ضغط العينين الطبيعي تلف في الجزء الخلفي من العينين.

عادة لا توجد أعراض لمرض المياه الزرقاء. وتتميز الطريقة الوحيدة للتعرف على الإصابة

بالمياه الزرقاء في فحص ضغط العينين والعصب البصري ومجمل الإبصار على يد أحد

متخصصي طب العيون. وإذا لم تخضع المياه الزرقاء للعلاج، فقد تؤدي إلى مشكلات خطيرة

وقد لا تصاب بأعراض، إلا أن المياه الزرقاء قد تؤدي في النهاية إلى العمى الكلي. وفي حقيقة

الأمور، عدم معالجة المياه الزرقاء أحد أكثر الأسباب شيوعاً للإصابة بالعمى.

وبالرغم من أن قطرة كوزوبت تساعد على التحكم في الإصابة بالمياه الزرقاء، إلا أنها لا تشفيها.

تحتوي قطرة كوزوبت على مادتين فعالتين: هيدروكلوريد دورزولاميد وماليات تيمولول.

تخفف كلتا المادتين الفعالتين من الضغط داخل العين عن طريق تقليل إنتاج السائل، إلا أنهاما

ينجزان ذلك بطرق مختلفة.

ويتنمي هيدروكلوريد دورزولاميد إلى مجموعة من الأدوية تُعرف باسم مثبطات الانهيدراز

الكربونية. بينما يتنمي ماليات تيمولول إلى مجموعة من الأدوية تُعرف باسم مثبطات بيتا.

لا تسبب قطرة كوزوبت الاندما.

$\frac{1}{x^2} = x^{-2}$

④ 1.7 11 - 2 1.7 11

٤ - يذبح و أحرقه في النار

$\Delta = \frac{1}{2}(\sqrt{3}-1)$, $\delta = \frac{1}{2}(\sqrt{3}+1)$, $\epsilon = \frac{1}{2}(\sqrt{3}-1)$

محلول قطرات للعين 1. قارورة من قبة 5 مل.
5 مل / مل + 20 مل / مل
تورولو / تيمولو

Lot / Fab / EXP
حصة / صنع في / انتهاء الصلاحية

5048
12 2021
11 2023

Larmabak 0,9 POUR CENT, Collyre Chlorure de sodium

Consultez attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Que contient cette notice ?

1. QU'EST-CE QUE LARMABAK 0,9 POUR CENT, collyre ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER LARMABAK 0,9 POUR CENT, collyre ?
3. COMMENT UTILISER LARMABAK

Fréquence d'administration

Répartir les instillations au cours de la journée, en fonction des besoins.
En moyenne, 3 à 4 instillations par jour et jusqu'à 8, si nécessaire.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Dr. TOUZANI Fatima ép. Kabbaj
Spécialiste des Maladies et Chirurgie
des yeux

Diplômée de la Faculté de Médecine de Montpellier

Microchirurgie

Angio-Laser - Chirurgie réfractive

22, Rue Ibn Khaldoun - 2^{ème} étage - Salé

Tél.: Cab. 05 37 78 27 24

- Sur Rendez - vous -

الدكتورة التوزاني القبايج فتيحة
إختصاصية في أمراض وجراحة
العيون

خريجة كلية الطب بمونبلييه

عضو في الجمعية الفرنسية

لطب العيون

تصحيح البصر بأشعة الليزر

22, زنقة ابن خلدون الطابق الثاني - سلا

هاتف العيادة : 05 37 78 27 24

- بالموعد -

Salé le 29.4.99 سلا في

El Haddad Fed

Père OCT jophth
(H.T.O.)

Dr. TOUZANI Fatima ép. Kabbaj
Spécialiste des Maladies et Chirurgie des yeux
22, Rue Ibn Khaldoun - 2^{ème} étage - Salé
Tél.: Cab. 05 37 78 27 24
Sur Rendez-vous

Dr. MELLAL Zakaria
Ophtalmologiste
998, Av. FAR - 1^{ère} Etage - Anal 5
CVM, Rabat-Tél/Fax: 0537 29 29 38
INP- 101109-57

101.10
Sur Rendez-vous

Dr. MELLAL Zakaria

Ex. Professeur Agrégé à la Faculté
de Medecine de Rabat
Ophtalmologiste

Chirurgie de la Cataracte(Phaco)
Chirurgie du Glaucome
Chirurgie Orbito Palpebrale
Angio-Laser
INPE: 101108157



د. ملال زكرياء

أستاذ سابق بكلية الطب بالرباط
أخصائي في طب وجراحة العيون

جراحة المياه البيضاء
جراحة المياه الزرقاء
جراحة الجفون
تصوير أوعية الشبكية والليزر
INPE: 101108157

Rabat le:

21/04/2022

الرباط في:

Dr. MELLAL Zakaria
Ophtalmologiste
998, Av. FAR, 1ère Etage, Amal 5
CYM, Rabat-Tél/Fax: 0537 29 29 38
INPE: 101108157

FACTURE 144/2022

MR EL HADDAD MOHAMED

Je soussigne Dr MELLAL Zakaria avoir reçu la somme de Mille
Dirhams (1000.00 DH) frais d'OCT PAPILLAIRE+ PACHYMETRIE.

Dr. MELLAL Zakaria
Ophtalmologiste
998, Av. FAR, 1ère Etage, Amal 5
CYM, Rabat-Tél/Fax: 0537 29 29 38
INPE: 101108157

Dr. TOUZANI Fatima ép. Kabbaj
Spécialiste des Maladies et Chirurgie
des yeux

Diplômée de la Faculté de Médecine de Montpellier

Microchirurgie

Angio-Laser - Chirurgie réfractive

22, Rue Ibn Khaldoun - 2^{ème} étage - Salé

Tél.: Cab. 05 37 78 27 24

- Sur Rendez - vous -

الدكتورة التوزاني القباج فتيحة
إختصاصية في أمراض وجراحة
العيون

خريجة كلية الطب بمونبلييه

عضو في الجمعية الفرنسية

لطب العيون

تصحيح البصر بأشعة الليزر

22, زنقة ابن خلدون الطابق الثاني - سلا

هاتف العيادة : 05 37 78 27 24

- بالموعد -

Salé le 14.4.22 سلا في

El Hadad Ned

ods p - cu
de control (H.T.O.)

Dr. TOUZANI Fatima ép. Kabbaj
Spécialiste des Maladies et Chirurgie des yeux
22, Rue Ibn Khaldoun - 2^{ème} étage - Salé
Tél : Cab: 05 37 78 27 24
Sur Rendez-vous

BELMAIDOUB OUMAIMA
Orthoptiste
3 Avenue Mly email, apt 18
Hassan 2, Rabat
GSM: 0537222725 / 0731280213

BELMAJDOUB OUMAIMA

ORTHOPTISTE

EX ATTACHÉE À L'HÔPITAL DES SPÉCIALITÉS DE RABAT
EX PRATICIENNE DANS LES CENTRES D'ORTHOPTIE DE
NANTES ET ROUEN EN FRANCE
EX PRATICIENNE EN TÉLÉMEDECINE À ROUEN



CABINET
D'ORTHOPTIE

بلمجدوب أميمة

أخصائية في تعديل البصر و معالجة حول العينين

ملحقة سابقا بمستشفى الاختصاصات بالرياض
أخصائية سابقا بمرآة تعديل البصر بنونت و روون بفرنسا
أخصائية سابقا بالتطبيب عن بعد بروون

FACTURE

Cabinet d'Orthoptie

Belmajdoub Oumaima

3 Avenue Mly Ismail, N°18, 3^{ème} étage
Hassan Rabat
Téléphone : 05 37 26 27 25

FACTURE N°86/22

DATE : 19/04/2022

A l'attention de :

OBJET : 01 C.V.A

Mr EL HADDAD MOHAMMED

DÉSIGNATION	MONTANT TTC
01 Champ visuel	400
TOTAL TTC	400DHS

La présente facture est arrêtée à la somme de quatre cent dirhams.

N° ITP: 25102172 / N° ICE: 002211310000070 / N° IF: 97210079 / CNSS : 110172838

CABINET
D'ORTHOPTIE

3 شارع مولاي اسماعيل ، شقة 18 ، الطابق 3 ، حسان ، الرباط
3 Avenue Moulay Ismail, appt N° 18, 3^{ème} Etage
Hassan - Rabat
+212(5) 37 26 27 25 / +212(6) 71 16 98 83
cabinet.ob.orthoptie@gmail.com



optiqueessalam

Salé le 26/4/22

62, Av. Moulay Youssef - Salé
Tél.: 05 37 78 69 29
E-Mail : optiqueessalam@live.fr

FACTURE N° J03337

M. EL HADJAD Mohamed

NOMENCLATURE	LOIN	PRES	D.F.	PRO
	O.D. = O.G. =	O.D. = O.G. =	O.D. = O.G. =	O.D. = 435 O.G. = 428

Montures : Plastique

Verres (loin) : Progressif organique
Photogray Anti-Reflet

Verres (près) : u.v Blue

PD = (30 - 3,0) - 0,50
062 - 0,50 Add 3,50

700,00	700,00
1400,00	2800,00

TOTAL 3500,00
Dont TVA 583,33

Arrêtée la présente facture à la somme de : trois mille
cinq cents Dirhames (ESPECE)

Patente: 28 900869 - RC: 17644 IGR: 364 010 790 = 5. f
ICE: 000424136000051 INP: 105002539

Optique Essalam
Mahioudi Said
Opticien - Optométriste
62 Bis, Av. Moulay Youssef - Salé - Tél: 0537 78.69.29

Dr. TOUZANI Fatiha ép. Kabbaj
Spécialiste des Maladies et Chirurgie
des yeux

Diplômée de la Faculté de Médecine de Montpellier

Microchirurgie

Angio-Laser - Chirurgie réfractive

22, Rue Ibn Khaldoun - 2^{ème} étage - Salé

Tél.: Cab. 05 37 78 27 24

- Sur Rendez - vous -

الدكتورة التوزاني القباج فتيحة
إختصاصية في أمراض وجراحة
العيون

خريجة كلية الطب بمونبلييه

عضو في الجمعية الفرنسية

لطب العيون

تصحيح البصر بأشعة الليزر

22, زنقة ابن خلدون الطابق الثاني - سلا

هاتف العيادة : 05 37 78 27 24

- بالموعد -

Salé le 22 4 22 سلا في

El Haddad Ned

54.10

Larmasak

2 x 1

Pharmacie AL MOUHAJA
N°9
Hay Al Mouhandine
Av. El Mehdi Ben Toumaré
Salé - Tél. 037 86 08 65

Dr. TOUZANI Fatiha ép. Kabbaj
Spécialiste des Maladies et Chirurgie des yeux
22, Rue Ibn Khaldoun - 2^{ème} étage - Salé
Tél.: Cab: 05 37 78 27 24
Sur Rendez-vous

T=54.10

Dr. TOUZANI Fatima ép. Kabbaj
Spécialiste des Maladies et Chirurgie
des yeux

Diplômée de la Faculté de Médecine de Montpellier

Microchirurgie

Angio-Laser - Chirurgie réfractive

22, Rue Ibn Khaldoun - 2^{ème} étage - Salé

Tél.: Cab. 05 37 78 27 24

- Sur Rendez - vous -

الدكتورة التوزاني القباچ فتيحة
إختصاصية في أمراض وجراحة
العيون

خريجة كلية الطب بمونبلييه

عضو في الجمعية الفرنسية

لطب العيون

تصحيح البصر بأشعة الليزر

22, زنقة ابن خلدون الطابق الثاني - سلا

هاتف العيادة: 05 37 78 27 24

Salé le 19.4.92 سلا في

El Haddad Ned

Pharmacie AL MOUHAJER
N° 9
Av. El Mehdi Ben Toumarel
Salé - Tél.: 037 86 09 68

~~Handwritten signature and scribbles~~

VL
ON - 0,5 (-3 à 30°)
OG - 0,5 ph

VR
ODG: add + 3,5 ph

ODC: 6x26.10 -
Cosopt dly.
1/1th 2 x jour

U: 3m

Dr. TOUZANI Fatima ép. Kabbaj
Spécialiste des Maladies et Chirurgie des yeux
22, Rue Ibn Khaldoun - 2^{ème} étage - Salé
Tél.: Cab. 05 37 78 27 24
- Sur Rendez - vous -

ID : 01625

Ethnicity : Caucasian

Technician :

Name: MOHAMMED EL HADDAD

Gender : Male


Fixation : OD(R) Disc

DOB : 01/01/1935 Age : 87 Scan : 3D(6,0 x 6,0mm - 512 x 128)


OD(R)TopQ Image Quality : **40** mode : Fine(2.0.7)

Capture Date : 21/04/2022


Color photo



Thickness Map RNFL




SuperPixel-200



Red-free




RNFL Circular Tomogram / Thickness




Average thickness RNFL(μm)


Total Thickness	102
Superior	109
Inferior	122



Disc Topography




Horizontal Tomogram



Disc Area	(mm ²)	3,30
Cup Area	(mm ²)	1,68
Rim Area	(mm ²)	1,62
C/D Area Ratio		0,51
Linear CDR		0,71
Vertical CDR		0,68
Cup Volume	(mm ³)	0,24
Rim Volume	(mm ³)	0,14
Horizontal D.D	(mm)	1,88
Vertical D.D	(mm)	2,20

Disc margin ———
Cup margin ———

R/D Ratio



Disc parameters are determined at the reference plane height of 120 microns from the RPE plane in this version.

Comments :

Signature :



Date :

El Haddad Mohammed, 01/01/1935 (87Ans)

Œil droit (OD) / 19/04/2022 / 14:53:16.


Sept-en-un

Échelle de gris (CO)




BELMAJDOUB OUMAIMA
Ophtalmologiste
3 Avenue de la République, sppt 18
Batiment 25 / 06711 - 06711


Valeurs [dB]




Comparaison [dB]



Différences corrigées [dB]




Courbe de défauts




Déficits diffus [dB]: 0,6

Probabilités



Probabilités corrigées



[%]

- P > 5
- :: P < 5
- P < 2
- P < 1
- P < 0,5

Programmes: G Standard Blanc/blanc / Dynamique
Paramètres: 4 / 1000 asb III 100 ms
Essais pièges: 0/6 (0%) +, 0/7 (0%) -
Réfraction S/C/A: +3.00//
Pupille [mm]: 5.7
NV: T21 V2.1

Questions / Répétitions: 129 / 0
Durée: 04:20
RF: 0,0
VA:
PIO [mmHg]:

30°	
MS [dB]:	24,4
MD [< 2.0 dB]:	0,9
sLV [< 2.5 dB]:	2,7

Commentaires:

OCTOPUS®




EyeSuite™ Périmétrie statique, V3.3.1
OCTOPUS 101

HAAG-STREIT
DIAGNOSTICS


El Haddad Mohammed, 01/01/1935 (87Ans)

Oeil gauche (OS) / 19/04/2022 / 14:59:56


Sept-en-un




Comparaison [dB]




Différences corrigées [dB]





Courbe de défauts



Probabilités



Probabilités corrigées



Programmes: G Standard Blanc/blanc / Dynamique
Paramètres: 4 / 1000 asb III 100 ms
Essais pièges: 0/7 (0%) +, 0/8 (0%) -
Réfraction S/C/A: +3.00//
Pupille [mm]: 3.9
NV: T21 V2.1

Questions / Répétitions: 142 / 1
Durée: 05:17
RF: 0,0
VA:
PIO [mmHg]:

30°	
MS [dB]:	25,5
MD [< 2.0 dB]:	-0,1
sLV [< 2.5 dB]:	3,9

Commentaires:

OCTOPUS®

EyeSuite™ Périmétrie statique, V3.3.1
OCTOPUS 101

HAAG-STREIT
DIAGNOSTICS

Anterior Radial Report

3D OCT-1(Ver.8.39)

Print Date : 21/04/2022 **TOPCON**

ID : 01625

Ethnicity : Caucasian

Technician :

Name: MOHAMMED EL HADDAD


Gender : Male

Fixation : OD(R) External


DOB : 01/01/1935 Age : 87 Scan : Radial(6.0mm - 1024 x 12)

OD(R)


Signal strength : **49** mode : Fine(1.1.3)
Capture Date : 21/04/2022



Corneal Curvature Radius Map



Corneal Thickness Map





Center Curvature Radius (H) : 7.74mm

Center Curvature Radius (V) : 7.19mm

Center Corneal Thickness : 503µm

*Curvature radius and peripheral corneal thickness are for reference only.



Comments :

Signature :

Date :

Glaucoma Analysis - Macula

3D OCT-1(Ver.8.39)

Print Date : 21/04/2022 **TOPCON**

ID : 01625

Ethnicity : Caucasian

Technician :

Name : MOHAMMED EL HADDAD

Gender : Male

Fixation : OD(R) Macula

DOB : 01/01/1935 Age : 87



Scan : 3D(V)(NaN x NaNmm - 512 x 128)

OD(R)

TopQ Image Quality : **34**

mode : Fine(2.0,7)




Capture Date : 21/04/2022






RNFL
Thickness

GCL+

GCL++



SuperPixel-600






Average(6mm x 6mm)

Superior	33 μm
Inferior	50 μm
Total	41 μm

Superior	63 μm
Inferior	63 μm
Total	63 μm

Superior	96 μm
Inferior	112 μm
Total	104 μm

Asymmetry(Relative Thinning)



Comments :

Signature :

Date :