

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Education :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Nº M21- 064874

Optique 114764 Autres

Maladie Dentaire

Cadre réservé à l'adhérent [e]

Matricule : 00626

Société : R.A.M

Actif Pensionné(e)

Autre : RETRAITE

Nom & Prénom : TADILI sidi REDOUANE

Date de naissance : 07 08 1944

Adresse : 17, RUE AL BATIANI - ALAI - 10090 RABAT

E-mail : 2edousset.tadili@gmail.com

Tél. : 06 61 39 0226 Total des frais engagés : 209,20 Dhs

Autorisation CNDP N° : AA-215 / 2019

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 10/02/2022

Nom et prénom du malade :

Age : 76

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

lombosciatalgie


En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Signature de l'adhérent[e] :



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
10 2 MARS 2022	S5	S5	Gratuit	 <p>الدكتور سلاوي كبيبات أخصائي العظام والكلية Dr. Slaoui Kebibat - RAK Rhumatologue Allal Ben Abdellah - Rabat Tel.: 05 37 72 24 34</p>

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
<i>الطبخ</i> Pharmacie de Kebibat SEDRATI Med Pharmacie 1, rue Slaoui Kebibat - Rabat Tél.: 0537 69 05 01	02-03-22	209,20



102036316

RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

ACCESSOIRES MEDICAUX


Cachet et signature	Date des Soins	Nombre	Montant détaillé des Honoraires
<i>الطبخ</i> Pharmacie de Kebibat SEDRATI Med Pharmacie 1, rue Slaoui Kebibat - Rabat Tél.: 0537 69 05 01		AM PC IM IV	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	Coefficient des Travaux
				
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION

O.D.F PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE		Coefficient des Travaux
H	25533412 21433552 00000000 00000000	
D	00000000 00000000 35533411 11433553	
B		
G		
[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession		MONTANTS DES SOINS
		DATE DU DEVIS
		DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur N. LAZRAK

RHUMATOLOGUE

Spécialiste des maladies des os,
articulations, muscles, rachis

Diplômée en échographie

Ostéo-articulaire

Attachée hospitalier

CHU Ibn SINA

Hôpital EL AYACHI

Sur Rendez-vous

Tél.: 0527 69 05 07
 7, rue Slaoui Kébiba - Rabat
 SEDRATI Med Pharmaciens
 Pharmacie de Kébiba
 مكتب الأستاذ الدكتور نفيضة لازراك

RELAXOL 500MG/2ML
 CP B20
 P.P.V : 53DH10
 11800006008
 PER. 07/2024

الدكتورة نفيضة لازراك

اختصاصية في أمراض العظام والمفاصل
(الروماتيزم)

حاصلة على دبلوم في تشخيص

أمراض المفاصل بالصدى

ملحقة استشفائية بالمركز

الاستشفائي الجامعي ابن سينا

مستشفى العيashi

بالموعد

10.2 MARS. 2022

Tashrif

Sidi Redouane

60,10

- Gaprex 50 mg epycasol
 1cp 1j x 3 le soir

1cp 2 fois 1j x 10 j.

53,10

- Relexol 2mls

1cp 3 fois 1j au
 milieu de repas.

96,00

- Prazol 20mg

1cp 1j au petit déjeuner

الدكتورة نفيضة لازراك
 الاختصاصية في أمراض العظام والمفاصل
 Dr. N. LAZRAK
 0527 69 05 07
 7, rue Slaoui Kébiba - Rabat
 Av. Allal Ben Abdellah - Rabat - Tél. : 05 37 72 24 34

رقم 1، شارع علال بن عبد الله - الرباط 10 - الهاتف: 05 37 72 24 34

1, Av Allal Ben Abdellah - Rabat - Tél. : 05 37 72 24 34 / 06 67 79 08 07

E-mail: lazraknoufissa@yahoo.fr

Prazol® 20 mg

oméprazole

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été prescrit en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être prescrit.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous avez des réactions allergiques, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

PPV : 96DH00
PER : 03/24
LOT : K2832-1

à votre
même
mentionné

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Prazol® 20 mg :

Oméprazole (DCI)

Excipients qsp

20 mg
1 gélule

FORME PHARMACEUTIQUE

- Gélule contenant des microgranules gastrorésistants.
- Présentation : boîte de 7, 14 et 28 gélules.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

PRAZOL® 20 mg, gélule gastro-résistante contient la substance active oméprazole. Il appartient à la classe des médicaments appelée inhibiteurs de la pompe à protons. Il diminue la quantité d'acide produite par votre estomac.

DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MEDICAMENT

PRAZOL® 20 mg, gélule gastro-résistante est utilisé pour traiter les affections suivantes :

Chez les adultes :

- le reflux gastro-œsophagien (RGO).
- les ulcères de la partie haute de votre intestin (ulcère duodénal) ou de votre estomac (ulcère gastrique).
- les ulcères infectés par une bactérie appelée Helicobacter pylori. Dans ce cas, votre médecin peut également vous prescrire des antibiotiques qui permettent de traiter l'infection et de guérir l'ulcère.
- les ulcères de l'estomac associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). PRAZOL® 20 mg, gélule gastro-résistante peut aussi être utilisé pour la prévention de ceux-ci si vous prenez des AINS.
- Un excès d'acide dans l'estomac dû à une grossesse au niveau du pancréas (syndrome de Zollinger-Ellison)

Chez les enfants :

Enfants âgés de plus d'un an et avec un poids corporel $\geq 10 \text{ kg}$

- le reflux gastro-œsophagien (RGO).

Les symptômes chez l'enfant peuvent comprendre des remontées dans la bouche du contenu de l'estomac (régurgitation), des vomissements et une prise de poids limitée.

Enfants âgés de plus de 4 ans et adolescents

- les ulcères infectés par une bactérie appelée Helicobacter pylori. Dans ce cas, le médecin peut également prescrire à votre enfant des antibiotiques qui permettent de traiter l'infection et de guérir l'ulcère.

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT

- Maladie ulcéruseuse gastroduodénale :

Selon le cas :

- 1 gélule de Prazol® 20 mg matin et soir, associée à deux antibiotiques pendant 7 jours.

Cette trithérapie sera suivie par 1 gélule de Prazol® 20 mg par jour pendant 3 à 5 semaines supplémentaires.

- 1 gélule de Prazol® 20 mg par jour pendant 4 à 6 semaines.

- Oesophagite par reflux gastro-œsophagien :

1 gélule de Prazol® 20 mg par jour pendant 4 à 8 semaines.

- Traitement des lésions gastroduodénales induites par les anti-inflammatoires non stéroïdiens :

1 gélule de Prazol® 20 mg par jour pendant 4 à 8 semaines.

- Traitement préventif des lésions gastroduodénales induites par les anti-inflammatoires non stéroïdiens :



EPYCA® 50 mg, 75 mg et 150 mg

Pré gabapétine

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ceux s'appliquent aussi à tout effet indésirable mentionné dans cette notice.
- Ce médicament peut avoir un autre effet indésirables présent. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre sans que ce soit avec les mêmes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT

EPYCA 50 mg gélules, boîte de 14

EPYCA 75 mg gélules, boîte de 14

EPYCA 150 mg gélules, boîte de 14

COMPOSITION DU MÉDICAMENT

(DCP): Pré gabapétine 50 mg, 75 mg, 150 mg

Excipients :

Noyau :

lactose monohydraté, Amidon de maïs, Taic

Excipient à effet notable : Lactose monohydraté

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE OU LE TYPE D'ACTIVITÉ

Epyca contient la pré gabapétine. Cette substance appartient à une classe de médicaments utilisés pour traiter l'épilepsie, les douleurs neuropathiques et le Trouble Anxiolys Généralisé (TAG) chez l'adulte.

INDICATIONS THERAPEUTIQUE

Douleurs neuropathiques périphériques et centrales : Epyca est utilisé pour traiter les douleurs persistantes causées par des lésions des nerfs. Différentes pathologies comme le diabète ou le zona peuvent induire des douleurs neuropathiques périphériques.

Les manifestations dououreuses peuvent être décrites comme étant des sensations de chaleur, de brûlure, de douleur lancinante, d'éblouissement, de coup de poignard, de douleur fulgurante, de crampes, d'endorcéose, de picotements, d'engourdissement, de picotements et de coup d'aiguille. Les douleurs neuropathiques périphériques et centrales peuvent aussi être associées à des changements de l'humeur, des troubles du sommeil, de la fatigue, et peuvent avoir un impact sur le fonctionnement physique et social, et sur la qualité de vie en général.

Epilepsie : Epyca est utilisé pour traiter un type particulier d'épilepsie (crises épileptiques partielles avec ou sans généralisation secondaire) chez l'adulte. Votre médecin vous prescrira Epyca pour aider à traiter votre épilepsie lorsque votre traitement actuel ne permet pas de contrôler complètement vos crises. Vous devez prendre Epyca en association à votre traitement actuel. Epyca ne doit pas être utilisé seul, mais doit toujours être utilisé en association à un autre traitement antiépileptique.

Trouble Anxiolys Généralisé : Epyca est utilisé pour traiter le Trouble Anxiolys Généralisé (TAG) continu. Le TAG peut également induire une agitation ou une sensation d'excitation ou d'inquiétude, une sensation d'être facilement fatigué, des difficultés à se concentrer ou des trous de mémoire, une irritable, une tension musculaire ou des troubles du sommeil. Ceci est différent du stress et des tensions de la vie quotidienne.

POSOLOGIE

Mode et voie d'administration :

Veiller à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Votre médecin déterminera la posologie qui convient dans votre cas.

Epyca est destiné à la voie orale uniquement.

Douleurs neuropathiques périphériques et centrales, épilepsie ou Trouble Anxiolys

Généralités :

- Prenez le nombre de gélules prescrit par votre médecin.
- La dose habituelle, qui a été adaptée à vous et à votre état, est comprise entre 150 mg et 600 mg par jour.

Votre médecin vous dira si vous devez prendre Epyca deux fois ou trois fois par jour. En cas de deux prises par jour, prenez Epyca une fois le matin et une fois le soir, environ aux mêmes heures chaque jour. En cas de trois prises par jour, prenez Epyca une fois le matin, une fois le midi et une fois le soir, environ aux mêmes heures chaque jour.

Si vous avez l'impression que l'effet d'Epyca est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien. Si vous êtes un patient âgé (de plus de 65 ans), vous devez prendre Epyca normalement sauf en cas de maladie des reins.

Votre médecin peut vous prescrire un horaire de prise et/ou une dose différents en cas de maladie des reins.

Avant de prendre la gélule entière avec de l'eau. Continuez à prendre Epyca jusqu'à ce que votre médecin vous dise d'arrêter.

CONTRE-INDICATIONS

Ne prenez jamais Epyca :

- si vous êtes allergique (hypersensible) à la Prégabalin ou à l'un des autres composants contenus dans EPYCA.

indésirables, mais le
sont courantes sur 10 000

Lot N°: 3484

EXP.: 04/23

P.V.: 60DH10

tdo, irritable
toire, tremblements,
charge, insomnie,
tdo, tics, tics, tics,

• sensation d'irritation, troubles de la marche

• prise de poids

• crampes musculaires, douleurs articulaires, douleurs dorsales, douleurs dans les membres

• mal de gorge

Peu fréquentes : susceptibles d'effacter jusqu'à 1 personne sur 100

• perte d'appétit, perte de poids, taux élevé de sucre dans le sang, taux de sucre élevé dans le sang

• modification de la personnalité, nervosité, dépression, agitation, humeur changeante, difficulté à trouver les mots, hallucinations, rires anormaux, crises de panique, apathie, agression, exaltation, altération de la fonction mentale, difficulté à se concentrer, augmentation de la libido, problèmes de fonctionnement sexuel incluant l'incapacité de parvenir à un orgasme, ejaculatio retardata

• trouble de la vue, mouvements oculaires anormaux, troubles de la vision y compris rétrécissement du champ visuel, accès de larmes, mouvements des paupières, diminution des réflexes, hyperactivité, vertiges en position debout, peau sensible, perte du goût, sensation de brûlure, tremblements lors des mouvements, diminution de la vigilance, perte de connaissance, syncope, sensibilité au bruit augmentée, sensation de malaise

• yeux secs, yeux gonflés, douleurs oculaires, faiblesse oculaire, yeux larmoyants, irritation des yeux

• troubles du rythme du cœur, accélération du rythme cardiaque, diminution de la pression sanguine, augmentation de la pression sanguine, modifications des batttemens du cœur, insuffisance cardiaque

• rougeur de la face, bouffée de chaleur

• difficulté à respirer, sécheresse de la nez, congestion nasale

• augmentation de la salive, troubles d'estomac, engourdissement autour de la bouche

• transpiration, rash cutané, hirsutisme, fièvre

• contractions musculaires, gonflements articulaires, rigidité musculaire, douleurs y compris douleurs musculaires, douleurs de la nuque

• douleur dans les seins

• émission difficile ou dououreuse, incontinence

• sensation de faiblesse, sensation de soif, oppression dans la poitrine

• modifications des résultats des tests sanguins et du foie (augmentation de la créatinine phosphokinase dans le sang, augmentation de l'alanine aminotransférase, augmentation de l'aspartate aminotransférase, diminution du nombre des plaquettes, neutropénie, augmentation de la créatinine dans le sang, diminution du potassium dans le sang)

• hypersensibilité, gonflement du visage, démagénaisons, urticaire, écoulement nasal, saignement nasal, toux, congolements

• douleurs ménétrines

• froideur des mains et des pieds

Rares : susceptibles d'effacter jusqu'à 1 personne sur 1 000

• troubles de l'odorat, vision oscillante, altération de la perception de la profondeur, état visuel, perte de la vue

• dilatation des pupilles, strabisme

• sueurs froides, contraction de la gorge, gonflement de la langue

• inflammation du pancréas

• difficultés à avaler

• mouvement lent ou réduit du corps

• difficultés à uriner correctement

• accumulation de liquide dans l'abdomen

• liquide dans les poumons

• convulsions

• modifications de l'enregistrement des paramètres électriques (ECG) du cœur correspondant à des troubles du rythme du cœur

• lésion musculaire

• écoulement mammaire, croissance anormale des seins, augmentation de la taille des seins chez l'homme

• interruption des règles