

RECOMMANDATIONS A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

ditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

macie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

iologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

que :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

ducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

taire :

Er cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

adie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

RAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 [LG] - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

Nº M21- 062864

ANNU03

Optique

Autres

Maladie

Dentaire

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 10.006 Société : R.A.M

Actif Pensionné(e) Autre :

Nom & Prénom : DR CHAMOUNE HASSAN

Date de naissance : 05/07/1961

Adresse : LOT NESTONNA Rue 24 N° 43 HAY HASSANI ?

CASABLANCA

Tél. : 06.60.98.12.18 Total des frais engagés : Dhs

Autorisation CNDP N° : AA-215 / 2019

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr. KHALID OUABI
CHIRURGIEN UROLOGUE
48, Bd. Idriss Lahzizi
Tél: 05.22.27.22.41 / 05.22.27.19.30

Date de consultation : / /

Nom et prénom du malade : Mme ALLIMOUNI ANINA Age : 53 ANS

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : Cysto-uréte


En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASA Le : 28/04/2022

Signature de l'adhérent(e) :



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
8.04.22	S		G	Dr. KHALID TOUABI CHIRURGIEN UROLOGUE 46, Bd. Idriss Lahrizi Tél : 05.22.27.22.41 / 05.22.27.19.30
10.01.22	VJ		TOUABI CHIRURGIEN UROLOGUE 46, Bd. Idriss Lahrizi Tél : 05.22.27.22.41 / 05.22.27.19.30	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Bachet du Pharmacien et du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
LAHLOU NABIL LOUBNA PHARMACIE GRANADA Lot. N° 39 29- Casablanca Tél.: 05 23 81 22 22	10/05/2022	303,60

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

AUXiliaires MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DE CONNAISSANCES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan des

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
D	—
00000000	00000000
35533411	11433553

[Création, remont, adjonction]

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXÉCUTION



Clinique Al Massira

ج. توان

مصحة المسيرة

CLINIQUE AL MASSIRA

28/04/2022


Medigum Amin

Floximat CP



90,10

1425



16,67

Betafin

~~دمنهور~~ gynécologique



14117

(870) 763 0001)

106,7-

PHARMACIE GRANADA
LAHLOU NABIL Loubna
Lotissement Moutouna Lot. N° 39
Rue 25 N° 27 - 29 - Casablanca
Tél.: 05 22 89 48 44

Dr. KHALIL OUABI
CHIRURGIEN UROLOGUE
48, Bd. Idess Lahrizi
Tél.: 05 22 27 22 41 / 05 22 27 19 37

5, Rue Ahmed MOKRI (Hauteur 158 Bd. d'Anfa) - Casablanca
Tél. : 05 22 39 40 41 (6 L.G) - Fax : 05 22 39 14 15

Dr. Khalid TOUABI

CHIRURGIEN UROLOGUE

Maladie du Rein et de l'Appareil Urinaire

Maladie Sexuellement Transmissibles


Stérilité Masculine - Impuissance Sexuelle

Lithotriptie extra-corporelle

Membre de l'Association Française d'Urologie

Diplômé de l'université de Nice

Sophia-Antipolis (France)



الدكتور خالد توابي

اختصاصي في أمراض الكلية
والمالك البولية - العقم الجنسي

الأمراض التناسلية - تفتيت الحصى

عضو الجمعية الفرنسية

لأمراض الكلية و المالك البولية

خريج كلية الطب بنيس (فرنسا)

Casablanca, Le:

10/10/2022

ALLIUM

TOUABI DR. KHALID

Dr. Khalid Touabi
11 Rue Prince My Abdellah Casablanca
Tél.: 05 22.27.22.41 / 05 22.27.19.30

S.V.

Signature

34.00

OXYDOPINE

303.60

1 x 2

510 S.V.

PHARMACIE GRANADA
LAHOU NABIL Loubna
Lot. N° 39
Rue 25 Novembre
Moulay Abdellah Casablanca
Tél.: 05 22.27.22.41 / 05 22.27.19.30

TOUABI DR. KHALID
11 Rue Prince My Abdellah Casablanca
Tél.: 05 22.27.22.41 / 05 22.27.19.30

زنقة الأمير مولاي عبد الله (فوق ياق روشي) - الدار البيضاء

11, Rue Prince My Abdelleah (au dessus de Yves Rocher) - Casablanca

البريد الإلكتروني : البريد الإلكتروني : Email : urotk@yahoo.fr

Fax : 05 22.27.59.43



OSMOSINE®

Hydroxyde de magnésium

Composition :

Composition pour 5 ml :

Hydroxyde de magnésium 1 g

Excipients : sorbitol, arôme orange, parahydroxybenzoate de méthyle sodé, parahydroxybenzoate de propyle sodé, eau purifiée et autres excipients qsp

Titulaire et fabricant :

Laboratoires SPIMACO MAROC km 4 ancienne route de l'aviation Tanger.

Qu'est ce qu'OSMOSINE, et dans quels cas est-il utilisé.

OSMOSINE, est présenté sous forme d'une suspension orale en flacon de 260 ml. La boîte contient une cuillère qui peut mesurer des doses de 2,5 et 5 ml.

OSMOSINE, est un médicament qui possède une activité laxative et anti-acide (neutralise l'excès d'acide dans l'estomac).

OSMOSINE, est indiqué dans le traitement symptomatique de la constipation.

Avant de prendre OSMOSINE :

Ne prenez pas ce médicament :

- Si vous êtes allergique à n'importe quel composant de la suspension.

- Si vous avez une maladie de l'estomac grave.

LEVAMOX®

(Amoxicilline + acide clavulanique)

PPV 134DH80
LOT 000351
EXP 11/2022

DENOMINATION DU MEDICAMENT

- LEVAMOX® 1 g/125 mg Comprimé effervescent adulte, boîte de 12, 16 et 24.
 - LEVAMOX® 500 mg/62,5 mg Comprimé effervescent enfant, boîte de 12 et 24.
 - LEVAMOX® 1 g/125 mg Poudre pour suspension buvable adulte en sachet-dose, boîte de 12 et 16.
 - LEVAMOX® 500 mg/62,5 mg Poudre pour suspension buvable enfant en sachet-dose, boîte de 12.
 - LEVAMOX® 100 mg/12,5 mg par ml Poudre pour suspension buvable nourrisson en flacon de 30 ml
 - LEVAMOX® 100 mg/12,5 mg par ml Poudre pour suspension buvable enfant en flacon de 60 ml
- (Rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1)

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice

1. Qu'est-ce que LEVAMOX® et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LEVAMOX® ?
3. Comment prendre LEVAMOX® ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver LEVAMOX® ?
6. Informations supplémentaires

1- QU'EST-CE QUE LEVAMOX® ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

- Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité

LEVAMOX® est un antibiotique qui tue les bactéries responsables des infections. Il contient deux molécules différentes, appelées amoxicilline et acide clavulanique. L'amoxicilline appartient à un groupe de médicaments appelés « pénicillines », qui peuvent parfois arrêter d'être efficaces (être inactives). L'autre constituant actif (l'acide clavulanique) empêche cette inactivation.

- Indications thérapeutiques

LEVAMOX® est utilisé chez l'adulte, chez l'enfant et chez le nourrisson pour traiter les infections suivantes :

- infections de l'oreille moyenne et des sinus,
- infections des voies respiratoires,
- infections des voies urinaires,
- infections de la peau et des tissus mous, incluant les infections dentaires,
- infections des os et des articulations.

2- QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE LEVAMOX® ?

- Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

LEVAMOX® contient de l'aspartam, si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucre, contactez-le avant de prendre ce médicament.

- Ne prenez jamais LEVAMOX® (Contre-indications)

• Si vous êtes allergique (hypersensible) à l'amoxicilline, à l'acide clavulanique, à la pénicilline ou à l'un des autres composants contenus dans LEVAMOX®.

• Si vous avez déjà présenté une réaction allergique grave (d'hypersensibilité) à un autre antibiotique. Ceci peut inclure une éruption cutanée ou un gonflement du visage ou du cou.

• Si vous avez déjà eu des problèmes au foie ou développé un ictere (jaunissement de la peau) lors de la prise d'un antibiotique.

Ne prenez pas LEVAMOX® si vous êtes dans l'une des situations mentionnées ci-dessus.

En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre LEVAMOX®.

- Faites attention avec LEVAMOX® (Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi)

Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ce médicament si vous :

- souffrez de mononucléose infectieuse,
- êtes traité(e) pour des problèmes du foie ou aux reins,
- n'urinez pas régulièrement.

En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ou avant d'administrer LEVAMOX® à votre enfant.

Dans certains cas, votre médecin pourra rechercher le type de bactérie responsable

a, il pourra vous ou à votre enfant prescrire un dosage différent d'un autre médicament.

- Faites attention particulière

agraver certaines maladies ou engendrer des effets secondaires de réaction imprévue, des convulsions et une inflammation que vous prenez ou à votre enfant prend LEVAMOX®, vous devez surveiller vos symptômes afin de réduire les risques.

Tests sanguins et urinaires

Si vous effectuez ou votre enfant effectue des analyses de sang (nombre de globules rouges ou explorations fonctionnelles hépatiques) ou des analyses d'urine (dosage de glucose), vous devez informer le médecin ou l'infirmière (ier) que vous prenez ou à votre enfant prend LEVAMOX®. En effet, LEVAMOX® peut influer sur les résultats de ces types de tests.

Tenir compte, au besoin, des teneurs en potassium et sodium.

- Enfants et adolescents

Demandez conseil au médecin de votre enfant ou au pharmacien avant d'administrer ce médicament à votre enfant s'il :

- souffre de mononucléose infectieuse,

- est traité(e) pour des problèmes du foie ou aux reins,

- n'urine pas régulièrement.

En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant d'administrer LEVAMOX® à votre enfant.

- Prises d'autres médicaments (interactions avec d'autres médicaments)

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous ou votre enfant prenez ou avez pris récemment un autre médicament, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Cela inclut les médicaments vendus sans ordonnance, et aussi les produits à base de plantes.

Si vous prenez ou votre enfant prend de l'allopurinol (en traitement de la goutte) avec LEVAMOX®, le risque de réaction cutanée allergique est plus élevé.

Si vous prenez ou votre enfant prend du probénécide (en traitement de la goutte), votre médecin peut décider d'ajuster votre dose de LEVAMOX®.

Si des médicaments destinés à empêcher la coagulation du sang (tels que la warfarine) sont pris avec LEVAMOX®, des analyses sanguines supplémentaires peuvent être requises.

LEVAMOX® peut influer sur l'action du méthotrexate (un médicament utilisé pour traiter le cancer ou les maladies rhumatismales).

LEVAMOX® peut influer sur l'action du mycophénolate moftéfil (traitement pour prévenir le rejet de greffe d'organes).

- Aliments et boissons (interactions avec les aliments et les boissons)

Sans objet

- Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet

- Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Si vous êtes enceinte ou s'il est possible que vous le soyez, ou si vous allaitez, vous devez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre quelconque médicament.

- Sportifs

Sans objet

- Effets sur l'aptitude à conduire un véhicule ou à utiliser des machines

Poudre pour suspension buvable en sachet-dose et comprimés effervescents à 1 g/125 mg

Conduite de véhicules et utilisation de machines :

LEVAMOX® peut provoquer des effets indésirables susceptibles de réduire la capacité à conduire

- Excipients à effet notable

- Aspartam : - 30 mg/1 comprimé effervescent à 1 g/125 mg
- 15 mg/1 sachet à 1 g/125 mg.
- 15 mg/1 comprimé effervescent à 500 mg/62,5 mg
- 7,5 mg/1 sachet à 500 mg/62,5 mg.
- 1,5 mg/ml poudre pour suspension buvable 100 mg/12,5 mg par ml

LEVAMOX® contient de l'Aspartam (E951), qui est une source de phénylalanine. Celui-ci peut être nocive chez les enfants nés avec une maladie appelée « phénylktonurie ».

- Potassium : - 27,91 mg/1 comprimé effervescent ou sachet à 1 g/125 mg.
- 11,95 mg/1 comprimé effervescent ou sachet à 500 mg/62,5 mg.
- 2,8 mg/ml poudre pour suspension buvable 100 mg/12,5 mg par ml

Les comprimés effervescents, les sachets et la poudre pour suspension buvable contiennent du potassium, en tenir compte chez les personnes suivant un régime pauvre en potassium.

- Sodium : - 296 mg/1 comprimé effervescent à 1 g/125 mg.
- 147 mg/1 comprimé effervescent à 500 mg/62,5 mg.
- 0,32 mg/ml poudre pour suspension buvable 100 mg/12,5 mg par ml

Les comprimés effervescents et la poudre pour suspension buvable contiennent du sodium, en tenir compte chez les personnes suivant un régime pauvre en sel strict.

3- COMMENT PRENDRE LEVAMOX® ?

- Instruction pour un bon usage

Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas de doute,

LEVAMOX®

(Amoxicilline + acide clavulanique)

PPV 134DH80
LOT 000351
EXP 11/2022

DENOMINATION DU MEDICAMENT

- LEVAMOX® 1 g/125 mg Comprimé effervescent adulte, boîte de 12, 16 et 24.
 - LEVAMOX® 500 mg/62,5 mg Comprimé effervescent enfant, boîte de 12 et 24.
 - LEVAMOX® 1 g/125 mg Poudre pour suspension buvable adulte en sachet-dose, boîte de 12 et 16.
 - LEVAMOX® 500 mg/62,5 mg Poudre pour suspension buvable enfant en sachet-dose, boîte de 12.
 - LEVAMOX® 100 mg/12,5 mg par ml Poudre pour suspension buvable nourrisson en flacon de 30 ml
 - LEVAMOX® 100 mg/12,5 mg par ml Poudre pour suspension buvable enfant en flacon de 60 ml
- (Rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1)

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice

1. Qu'est-ce que LEVAMOX® et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LEVAMOX® ?
3. Comment prendre LEVAMOX® ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver LEVAMOX® ?
6. Informations supplémentaires

1- QU'EST-CE QUE LEVAMOX® ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

- Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité

LEVAMOX® est un antibiotique qui tue les bactéries responsables des infections. Il contient deux molécules différentes, appelées amoxicilline et acide clavulanique. L'amoxicilline appartient à un groupe de médicaments appelés « pénicillines », qui peuvent parfois arrêter d'être efficaces (être inactives). L'autre constituant actif (l'acide clavulanique) empêche cette inactivation.

- Indications thérapeutiques

LEVAMOX® est utilisé chez l'adulte, chez l'enfant et chez le nourrisson pour traiter les infections suivantes :

- infections de l'oreille moyenne et des sinus,
- infections des voies respiratoires,
- infections des voies urinaires,
- infections de la peau et des tissus mous, incluant les infections dentaires,
- infections des os et des articulations.

2- QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE LEVAMOX® ?

- Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

LEVAMOX® contient de l'aspartam, si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucre, contactez-le avant de prendre ce médicament.

- Ne prenez jamais LEVAMOX® (Contre-indications)

• Si vous êtes allergique (hypersensible) à l'amoxicilline, à l'acide clavulanique, à la pénicilline ou à l'un des autres composants contenus dans LEVAMOX®.

• Si vous avez déjà présenté une réaction allergique grave (d'hypersensibilité) à un autre antibiotique. Ceci peut inclure une éruption cutanée ou un gonflement du visage ou du cou.

• Si vous avez déjà eu des problèmes au foie ou développé un ictere (jaunissement de la peau) lors de la prise d'un antibiotique.

Ne prenez pas LEVAMOX® si vous êtes dans l'une des situations mentionnées ci-dessus.

En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre LEVAMOX®.

- Faites attention avec LEVAMOX® (Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi)

Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ce médicament si vous :

- souffrez de mononucléose infectieuse,
- êtes traité(e) pour des problèmes du foie ou aux reins,
- n'urinez pas régulièrement.

En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ou avant d'administrer LEVAMOX® à votre enfant.

Dans certains cas, votre médecin pourra rechercher le type de bactérie responsable

a, il pourra vous ou à votre enfant prescrire un dosage différent d'un autre médicament.

- Faites attention particulière

agraver certaines maladies ou engendrer des effets secondaires de réaction imprévue, des convulsions et une inflammation que vous prenez ou à votre enfant prend LEVAMOX®, vous devez surveiller vos symptômes afin de réduire les risques.

Tests sanguins et urinaires

Si vous effectuez ou votre enfant effectue des analyses de sang (nombre de globules rouges ou explorations fonctionnelles hépatiques) ou des analyses d'urine (dosage de glucose), vous devez informer le médecin ou l'infirmière (ier) que vous prenez ou à votre enfant prend LEVAMOX®. En effet, LEVAMOX® peut influer sur les résultats de ces types de tests.

Tenir compte, au besoin, des teneurs en potassium et sodium.

- Enfants et adolescents

Demandez conseil au médecin de votre enfant ou au pharmacien avant d'administrer ce médicament à votre enfant s'il :

- souffre de mononucléose infectieuse,

- est traité(e) pour des problèmes du foie ou aux reins,

- n'urine pas régulièrement.

En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant d'administrer LEVAMOX® à votre enfant.

- Prises d'autres médicaments (interactions avec d'autres médicaments)

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous ou votre enfant prenez ou avez pris récemment un autre médicament, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Cela inclut les médicaments vendus sans ordonnance, et aussi les produits à base de plantes.

Si vous prenez ou votre enfant prend de l'allopurinol (en traitement de la goutte) avec LEVAMOX®, le risque de réaction cutanée allergique est plus élevé.

Si vous prenez ou votre enfant prend du probénécide (en traitement de la goutte), votre médecin peut décider d'ajuster votre dose de LEVAMOX®.

Si des médicaments destinés à empêcher la coagulation du sang (tels que la warfarine) sont pris avec LEVAMOX®, des analyses sanguines supplémentaires peuvent être requises.

LEVAMOX® peut influer sur l'action du méthotrexate (un médicament utilisé pour traiter le cancer ou les maladies rhumatismales).

LEVAMOX® peut influer sur l'action du mycophénolate moftéfil (traitement pour prévenir le rejet de greffe d'organes).

- Aliments et boissons (interactions avec les aliments et les boissons)

Sans objet

- Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet

- Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Si vous êtes enceinte ou s'il est possible que vous le soyez, ou si vous allaitez, vous devez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre quelconque médicament.

- Sportifs

Sans objet

- Effets sur l'aptitude à conduire un véhicule ou à utiliser des machines

Poudre pour suspension buvable en sachet-dose et comprimés effervescents à 1 g/125 mg

Conduite de véhicules et utilisation de machines :

LEVAMOX® peut provoquer des effets indésirables susceptibles de réduire la capacité à conduire

- Excipients à effet notable

- Aspartam : - 30 mg/1 comprimé effervescent à 1 g/125 mg
- 15 mg/1 sachet à 1 g/125 mg.
- 15 mg/1 comprimé effervescent à 500 mg/62,5 mg
- 7,5 mg/1 sachet à 500 mg/62,5 mg.
- 1,5 mg/ml poudre pour suspension buvable 100 mg/12,5 mg par ml

LEVAMOX® contient de l'Aspartam (E951), qui est une source de phénylalanine. Celui-ci peut être nocive chez les enfants nés avec une maladie appelée « phénylktonurie ».

- Potassium : - 27,91 mg/1 comprimé effervescent ou sachet à 1 g/125 mg.
- 11,95 mg/1 comprimé effervescent ou sachet à 500 mg/62,5 mg.
- 2,8 mg/ml poudre pour suspension buvable 100 mg/12,5 mg par ml

Les comprimés effervescents, les sachets et la poudre pour suspension buvable contiennent du potassium, en tenir compte chez les personnes suivant un régime pauvre en potassium.

- Sodium : - 296 mg/1 comprimé effervescent à 1 g/125 mg.
- 147 mg/1 comprimé effervescent à 500 mg/62,5 mg.
- 0,32 mg/ml poudre pour suspension buvable 100 mg/12,5 mg par ml

Les comprimés effervescents et la poudre pour suspension buvable contiennent du sodium, en tenir compte chez les personnes suivant un régime pauvre en sel strict.

3- COMMENT PRENDRE LEVAMOX® ?

- Instruction pour un bon usage

Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas de doute,