

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR VER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## soins généraux :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie. La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

**Maladie**

**Dentaire**

**Optique**

**Autres**

### Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : **2800** Société : **116016**

**Actif**

**Pensionné(e)**

**Autre :**

Nom & Prénom : **ARACHANE SAADIA**

Date de naissance :

Adresse :

Tél : ..... Total des frais engagés : ..... Dhs

### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : ..... / ..... / .....

Nom et prénom du malade : ..... Age : .....

Lien de parenté :  **Lui-même**

**Conjoint**

**Enfant**

Nature de la maladie : **Cardiopathie**

Affection longue durée ou chronique :  **ALD**  **ALC**

**Pathologie**

En cas d'accident préciser les causes et circonstances : .....

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : .....

Le : ..... / ..... / .....

Signature de l'adhérent(e) :

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
17/05/22	CS		0	Signature de Mohamed S. S. Keita - Cardiologue Interventionnel - 0650 00 16 22 - Fax 05 22 82 16 22

## EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
<b>PHARMACIE LUMIERES</b> <b>LA FRICHI SARL AU</b> 550, Bd. Al Qods, Imara, Ain Ch. Casablanca - INFE : 09204042 Tél.: 05 22 32 40 29	<u>18</u> <u>05</u> <u>2022</u>	<u>128</u> <u>1205</u> <u>1498,30</u>

## ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

## AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### Important

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				Coefficient des travaux
				Montants des soins
				Début d'exécution
				Fin d'exécution

O.D.F  
PROTHESES DENTAIRES

## DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000

(Création, remont, adjonction)

The diagram shows a dental arch with numbered teeth (1 through 8) and arrows indicating movement directions. A vertical arrow labeled 'H' points upwards, and a horizontal arrow labeled 'D' points to the left.

COEFFICIENT  
DES TRAVAUX

MONTANTS  
DES SOINS

DATE DU  
DEVIS





## NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

# CoPlavix® 75 mg/100 mg

comprimés pelliculés

clopidogrel/acide acétylsalicylique

SANOFI

### Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice (voir rubrique 4).

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que CoPlavix et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CoPlavix
3. Comment prendre CoPlavix
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver CoPlavix
6. Contenu de l'emballage et autres informations

### 1. QU'EST-CE QUE COPLAVIX ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ

CoPlavix contient du clopidogrel et de l'acide acétylsalicylique (AAS) et appartient à une classe de médicaments appelés antiagrégants plaquettaires. Les plaquettes sont de très petits éléments circulant dans le sang et qui s'agrègent lors de la coagulation du sang. En empêchant cette agrégation dans certains vaisseaux sanguins (appelés artères), les antiagrégants plaquettaires réduisent le risque de formation de caillots sanguins (phénomène appelé athérothrombose).

CoPlavix est utilisé chez l'adulte pour éviter la formation de caillots sanguins dans les artères devenues rigides pouvant conduire à la survenue d'événements athérothrombotiques (tels que l'accident vasculaire cérébral, la crise cardiaque, ou le décès).

On vous a prescrit CoPlavix à la place de deux médicaments, le clopidogrel et l'acide acétylsalicylique pour empêcher la formation de caillots sanguins parce que vous avez eu une douleur thoracique grave connue sous le nom "d'angor instable" ou de crise cardiaque (infarctus du myocarde). Pour cela, vous avez pu bénéficier d'une pose de stent dans l'artère bouchée ou rétrécie afin de rétablir une circulation sanguine efficace.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE COPLAVIX

#### Contre-indications :

##### Ne prenez jamais CoPlavix

- si vous êtes allergique au clopidogrel, à l'acide acétylsalicylique (AAS) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- si vous êtes allergique à d'autres médicaments appelés anti-inflammatoires non stéroïdiens généralement utilisés pour traiter la douleur et/ou les maladies inflammatoires des muscles ou des articulations.

6 118001 082018

- si vous souffrez d'une maladie
- si vous souffrez d'une maladie
- si vous êtes dans le 3ème trimé

#### Précautions d'emploi : mises en

#### Avertissements et précaution

- Si l'une des situations mentionnées vous devez en avertir votre médecin
- si vous avez un risque hémorragique :
    - une maladie qui peut provoquer un ulcère de l'estomac.
    - des troubles de la coagulation interne (saignement au sein d'une articulation).
    - une blessure grave récente.
    - une intervention chirurgicale.
    - une intervention chirurgicale les 7 jours à venir.
  - si vous avez eu un caillot dans un vaisseau cérébral (ischémique) :
    - si vous présentez une maladie de la moelle épinière
    - si vous avez des antécédents d'allergie, compris les allergies à tout médicament.
    - si vous avez de la goutte.
    - si vous buvez de l'alcool, en raison de lésions gastro-intestinales.
    - si vous avez une maladie appelée déshydrogénase (ou déficit en cytochrome P450 2C19) qui peut développer une forme particulière de la maladie.
  - si vous avez aussi avertir votre médecin si vous présentez une maladie de l'artère carotidaine (ou PTT) incluant fièvre, apparition de petites têtes non de fatigue extrême inexplicable, ou des yeux (jaunisse) (voir rubrique 4).
  - Si vous vous coupez ou si vous vous blessez, vous pouvez demander plus de temps que l'action de votre médicament qui empêche la formation de caillots sanguins. Dans le cas de coupure (par exemple au cours du rasage), vous devez constater d'anormal. Cependant, si vous avez en avertir immédiatement votre médecin.
  - Votre médecin pourra vous demander de faire des examens sanguins.

Pendant la prise de CoPlavix :

- Vous devez avertir votre médecin si vous présentez une maladie de l'artère carotidaine (ou PTT) incluant fièvre, apparition de petites têtes non de fatigue extrême inexplicable, ou des yeux (jaunisse) (voir rubrique 4).
- Si vous vous coupez ou si vous vous blessez, vous pouvez demander plus de temps que l'action de votre médicament qui empêche la formation de caillots sanguins. Dans le cas de coupure (par exemple au cours du rasage), vous devez constater d'anormal. Cependant, si vous avez en avertir immédiatement votre médecin.
- Votre médecin pourra vous demander de faire des examens sanguins.



## NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

# CoPlavix® 75 mg/100 mg

comprimés pelliculés

clopidogrel/acide acétylsalicylique

SANOFI

### Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice (voir rubrique 4).

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que CoPlavix et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CoPlavix
3. Comment prendre CoPlavix
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver CoPlavix
6. Contenu de l'emballage et autres informations

### 1. QU'EST-CE QUE COPLAVIX ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ

CoPlavix contient du clopidogrel et de l'acide acétylsalicylique (AAS) et appartient à une classe de médicaments appelés antiagrégants plaquettaires. Les plaquettes sont de très petits éléments circulant dans le sang et qui s'agrègent lors de la coagulation du sang. En empêchant cette agrégation dans certains vaisseaux sanguins (appelés artères), les antiagrégants plaquettaires réduisent le risque de formation de caillots sanguins (phénomène appelé athérothrombose).

CoPlavix est utilisé chez l'adulte pour éviter la formation de caillots sanguins dans les artères devenues rigides pouvant conduire à la survenue d'événements athérothrombotiques (tels que l'accident vasculaire cérébral, la crise cardiaque, ou le décès).

On vous a prescrit CoPlavix à la place de deux médicaments, le clopidogrel et l'acide acétylsalicylique pour empêcher la formation de caillots sanguins parce que vous avez eu une douleur thoracique grave connue sous le nom "d'angor instable" ou de crise cardiaque (infarctus du myocarde). Pour cela, vous avez pu bénéficier d'une pose de stent dans l'artère bouchée ou rétrécie afin de rétablir une circulation sanguine efficace.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE COPLAVIX

#### Contre-indications :

##### Ne prenez jamais CoPlavix

- si vous êtes allergique au clopidogrel, à l'acide acétylsalicylique (AAS) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- si vous êtes allergique à d'autres médicaments appelés anti-inflammatoires non stéroïdiens généralement utilisés pour traiter la douleur et/ou les maladies inflammatoires des muscles ou des articulations.

6 118001 082018

- si vous souffrez d'une maladie
- si vous souffrez d'une maladie
- si vous êtes dans le 3ème trimé

#### Précautions d'emploi : mises en

#### Avertissements et précaution

- Si l'une des situations mentionnées vous devez en avertir votre médecin
- si vous avez un risque hémorragique
    - une maladie qui peut provoquer un ulcère de l'estomac.
    - des troubles de la coagulation interne (saignement au sein d'une articulation).
    - une blessure grave récente.
    - une intervention chirurgicale.
    - une intervention chirurgicale les 7 jours à venir.
  - si vous avez eu un caillot dans un vaisseau cérébral (ischémique)
  - si vous présentez une maladie de l'œil
  - si vous avez des antécédents d'allergie, compris les allergies à tout médicament
  - si vous avez de la goutte.
  - si vous buvez de l'alcool, en raison de lésions gastro-intestinales
  - si vous avez une maladie appelée déshydrogénase (ou déficit en déhydrogénase) qui peut entraîner le sang en faible quantité.

#### Pendant la prise de CoPlavix :

- Vous devez avertir votre médecin
  - si une intervention chirurgicale
  - si vous souffrez de douleurs abdominales, ou si vous avez des douleurs dans l'intestin (selles rouges)
- Vous devez aussi avertir votre médecin si vous présentez une maladie de l'œil (athérothrombotique ou PTT) incluant les symptômes de apparition comme des petites têtes non de fatigue extrême inexplicable, ou des yeux (jaunisse) (voir rubrique 4).
- Si vous vous coupez ou si vous vous blessez, vous pouvez demander plus de temps que l'action de votre médicament qui empêche la formation de caillots sanguins. Dans le cas de coupure (par exemple au cours du rasage), vous devez constater d'anormal. Cependant, si vous avez une blessure dans l'intestin (selles rouges), vous devez en avertir immédiatement ("Effets indésirables éventuels").
- Votre médecin pourra vous demander de faire des examens sanguins.



## NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

# CoPlavix® 75 mg/100 mg

comprimés pelliculés

clopidogrel/acide acétylsalicylique

SANOFI

### Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice (voir rubrique 4).

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que CoPlavix et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CoPlavix
3. Comment prendre CoPlavix
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver CoPlavix
6. Contenu de l'emballage et autres informations

### 1. QU'EST-CE QUE COPLAVIX ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ

CoPlavix contient du clopidogrel et de l'acide acétylsalicylique (AAS) et appartient à une classe de médicaments appelés antiagrégants plaquettaires. Les plaquettes sont de très petits éléments circulant dans le sang et qui s'agrègent lors de la coagulation du sang. En empêchant cette agrégation dans certains vaisseaux sanguins (appelés artères), les antiagrégants plaquettaires réduisent le risque de formation de caillots sanguins (phénomène appelé athérothrombose).

CoPlavix est utilisé chez l'adulte pour éviter la formation de caillots sanguins dans les artères devenues rigides pouvant conduire à la survenue d'événements athérothrombotiques (tels que l'accident vasculaire cérébral, la crise cardiaque, ou le décès).

On vous a prescrit CoPlavix à la place de deux médicaments, le clopidogrel et l'acide acétylsalicylique pour empêcher la formation de caillots sanguins parce que vous avez eu une douleur thoracique grave connue sous le nom "d'angor instable" ou de crise cardiaque (infarctus du myocarde). Pour cela, vous avez pu bénéficier d'une pose de stent dans l'artère bouchée ou rétrécie afin de rétablir une circulation sanguine efficace.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE COPLAVIX

#### Contre-indications :

##### Ne prenez jamais CoPlavix

- si vous êtes allergique au clopidogrel, à l'acide acétylsalicylique (AAS) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- si vous êtes allergique à d'autres médicaments appelés anti-inflammatoires non stéroïdiens généralement utilisés pour traiter la douleur et/ou les maladies inflammatoires des muscles ou des articulations.

6 118001 082018

- si vous souffrez d'une maladie
- si vous souffrez d'une maladie
- si vous êtes dans le 3ème trimé

#### Précautions d'emploi : mises en

#### Avertissements et précaution

- Si l'une des situations mentionnées vous devez en avertir votre médecin
- si vous avez un risque hémorragique :
    - une maladie qui peut provoquer un ulcère de l'estomac.
    - des troubles de la coagulation interne (saignement au sein d'une articulation).
    - une blessure grave récente.
    - une intervention chirurgicale.
    - une intervention chirurgicale les 7 jours à venir.
  - si vous avez eu un caillot dans un vaisseau cérébral (ischémique) :
    - si vous présentez une maladie de la moelle épinière
    - si vous avez des antécédents d'allergie, compris les allergies à tout médicament.
    - si vous avez de la goutte.
    - si vous buvez de l'alcool, en raison de lésions gastro-intestinales.
    - si vous avez une maladie appelée déshydrogénase (ou déficit en cytochrome P450 2C19) qui peut développer une forme particulière de la maladie.
  - si vous avez aussi avertir votre médecin si vous présentez une maladie de l'artère carotidaine (ou PTT) incluant les symptômes d'apparition comme des petites têtes, non de fatigue extrême inexpliquée, ou des yeux (jaunisse) (voir rubrique 4).
  - Si vous vous coupez ou si vous vous blessez, vous pouvez demander plus de temps que l'action de votre médicament qui empêche la formation de caillots sanguins. Dans le cas de coupure (par exemple au cours du rasage), vous devez constater d'anormal. Cependant, si vous avez en avertir immédiatement votre médecin.
  - Votre médecin pourra vous demander de faire des examens sanguins.

Pendant la prise de CoPlavix :

- Vous devez avertir votre médecin si vous présentez une maladie de la moelle épinière.
- si vous avez des antécédents d'allergie, compris les allergies à tout médicament.
- si vous avez de la goutte.
- si vous buvez de l'alcool, en raison de lésions gastro-intestinales.
- si vous avez une maladie appelée déshydrogénase (ou déficit en cytochrome P450 2C19) qui peut développer une forme particulière de la maladie.
- si vous avez aussi avertir votre médecin si vous présentez une maladie de l'artère carotidaine (ou PTT) incluant les symptômes d'apparition comme des petites têtes, non de fatigue extrême inexpliquée, ou des yeux (jaunisse) (voir rubrique 4).
- Si vous vous coupez ou si vous vous blessez, vous pouvez demander plus de temps que l'action de votre médicament qui empêche la formation de caillots sanguins. Dans le cas de coupure (par exemple au cours du rasage), vous devez constater d'anormal. Cependant, si vous avez en avertir immédiatement votre médecin.
- Votre médecin pourra vous demander de faire des examens sanguins.



## NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

# CoPlavix® 75 mg/100 mg

comprimés pelliculés

clopidogrel/acide acétylsalicylique

SANOFI

### Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice (voir rubrique 4).

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que CoPlavix et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CoPlavix
3. Comment prendre CoPlavix
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver CoPlavix
6. Contenu de l'emballage et autres informations

### 1. QU'EST-CE QUE COPLAVIX ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ

CoPlavix contient du clopidogrel et de l'acide acétylsalicylique (AAS) et appartient à une classe de médicaments appelés antiagrégants plaquettaires. Les plaquettes sont de très petits éléments circulant dans le sang et qui s'agrègent lors de la coagulation du sang. En empêchant cette agrégation dans certains vaisseaux sanguins (appelés artères), les antiagrégants plaquettaires réduisent le risque de formation de caillots sanguins (phénomène appelé athérothrombose).

CoPlavix est utilisé chez l'adulte pour éviter la formation de caillots sanguins dans les artères devenues rigides pouvant conduire à la survenue d'événements athérothrombotiques (tels que l'accident vasculaire cérébral, la crise cardiaque, ou le décès).

On vous a prescrit CoPlavix à la place de deux médicaments, le clopidogrel et l'acide acétylsalicylique pour empêcher la formation de caillots sanguins parce que vous avez eu une douleur thoracique grave connue sous le nom "d'angor instable" ou de crise cardiaque (infarctus du myocarde). Pour cela, vous avez pu bénéficier d'une pose de stent dans l'artère bouchée ou rétrécie afin de rétablir une circulation sanguine efficace.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE COPLAVIX

#### Contre-indications :

##### Ne prenez jamais CoPlavix

- si vous êtes allergique au clopidogrel, à l'acide acétylsalicylique (AAS) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- si vous êtes allergique à d'autres médicaments appelés anti-inflammatoires non stéroïdiens généralement utilisés pour traiter la douleur et/ou les maladies inflammatoires des muscles ou des articulations.

6 118001 082018

- si vous souffrez d'une maladie
- si vous souffrez d'une maladie
- si vous êtes dans le 3ème trimé

#### Précautions d'emploi : mises en

#### Avertissements et précaution

- Si l'une des situations mentionnées vous devez en avertir votre médecin
- si vous avez un risque hémorragique
    - une maladie qui peut provoquer un ulcère de l'estomac.
    - des troubles de la coagulation interne (saignement au sein d'une articulation).
    - une blessure grave récente.
    - une intervention chirurgicale.
    - une intervention chirurgicale les 7 jours à venir.
  - si vous avez eu un caillot dans un vaisseau cérébral (ischémique)
  - si vous présentez une maladie de l'œil
  - si vous avez des antécédents d'allergie, compris les allergies à tout médicament
  - si vous avez de la goutte.
  - si vous buvez de l'alcool, en raison de lésions gastro-intestinales
  - si vous avez une maladie appelée déshydrogénase (ou déficit en déhydrogénase) qui peut entraîner le sang en faible quantité.

#### Pendant la prise de CoPlavix :

- Vous devez avertir votre médecin
  - si une intervention chirurgicale
  - si vous souffrez de douleurs abdominales, ou si vous avez des douleurs dans l'intestin (selles rouges)
- Vous devez aussi avertir votre médecin si vous présentez une maladie de l'œil (athérothrombotique ou PTT) incluant les symptômes de apparition comme des petites têtes non de fatigue extrême inexplicable, ou des yeux (jaunisse) (voir rubrique 4).
- Si vous vous coupez ou si vous vous blessez, vous pouvez demander plus de temps que l'action de votre médicament qui empêche la formation de caillots sanguins. Dans le cas de coupure (par exemple au cours du rasage), vous devez constater d'anormal. Cependant, si vous avez une coupure, vous devez en avertir immédiatement ("Effets indésirables éventuels").
- Votre médecin pourra vous demander de faire des examens sanguins.



## NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

# CoPlavix® 75 mg/100 mg

comprimés pelliculés

clopidogrel/acide acétylsalicylique

SANOFI

### Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice (voir rubrique 4).

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que CoPlavix et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CoPlavix
3. Comment prendre CoPlavix
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver CoPlavix
6. Contenu de l'emballage et autres informations

### 1. QU'EST-CE QUE COPLAVIX ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ

CoPlavix contient du clopidogrel et de l'acide acétylsalicylique (AAS) et appartient à une classe de médicaments appelés antiagrégants plaquettaires. Les plaquettes sont de très petits éléments circulant dans le sang et qui s'agrègent lors de la coagulation du sang. En empêchant cette agrégation dans certains vaisseaux sanguins (appelés artères), les antiagrégants plaquettaires réduisent le risque de formation de caillots sanguins (phénomène appelé athérothrombose).

CoPlavix est utilisé chez l'adulte pour éviter la formation de caillots sanguins dans les artères devenues rigides pouvant conduire à la survenue d'événements athérothrombotiques (tels que l'accident vasculaire cérébral, la crise cardiaque, ou le décès).

On vous a prescrit CoPlavix à la place de deux médicaments, le clopidogrel et l'acide acétylsalicylique pour empêcher la formation de caillots sanguins parce que vous avez eu une douleur thoracique grave connue sous le nom "d'angor instable" ou de crise cardiaque (infarctus du myocarde). Pour cela, vous avez pu bénéficier d'une pose de stent dans l'artère bouchée ou rétrécie afin de rétablir une circulation sanguine efficace.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE COPLAVIX

#### Contre-indications :

##### Ne prenez jamais CoPlavix

- si vous êtes allergique au clopidogrel, à l'acide acétylsalicylique (AAS) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- si vous êtes allergique à d'autres médicaments appelés anti-inflammatoires non stéroïdiens généralement utilisés pour traiter la douleur et/ou les maladies inflammatoires des muscles ou des articulations.

6 118001 082018

- si vous souffrez d'une maladie
- si vous souffrez d'une maladie
- si vous êtes dans le 3ème trimé

#### Précautions d'emploi : mises en

#### Avertissements et précaution

- Si l'une des situations mentionnées vous devez en avertir votre médecin
- si vous avez un risque hémorragique :
    - une maladie qui peut provoquer un ulcère de l'estomac.
    - des troubles de la coagulation interne (saignement au sein d'une articulation).
    - une blessure grave récente.
    - une intervention chirurgicale.
    - une intervention chirurgicale les 7 jours à venir.
  - si vous avez eu un caillot dans un vaisseau cérébral (ischémique) :
    - si vous présentez une maladie de la moelle épinière
    - si vous avez des antécédents d'allergie, compris les allergies à tout médicament.
    - si vous avez de la goutte.
    - si vous buvez de l'alcool, en raison de lésions gastro-intestinales.
    - si vous avez une maladie appelée déshydrogénase (ou déficit en déhydrogénase) qui peut entraîner le sang en faible quantité.
  - Vous devez aussi avertir votre médecin si vous présentez une maladie d'athérothrombose ou PTT incluant les symptômes qui peuvent apparaître comme des petites têtes non de fatigue extrême inexpliquée, ou des yeux (jaunisse) (voir rubrique 4).
  - Si vous vous coupez ou si vous vous blessez, vous pouvez demander plus de temps que l'action de votre médicament qui empêche la formation de caillots sanguins. Dans le cas de coupure (par exemple au cours du rasage), vous devez constater d'anormal. Cependant, si vous avez en avertir immédiatement "Effets indésirables éventuels".
  - Votre médecin pourra vous demander de faire des examens sanguins.

Pendant la prise de CoPlavix :

- Vous devez avertir votre médecin si vous présentez une maladie d'athérothrombose ou PTT incluant les symptômes qui peuvent apparaître comme des petites têtes non de fatigue extrême inexpliquée, ou des yeux (jaunisse) (voir rubrique 4).
- Vous devez aussi avertir votre médecin si vous présentez une maladie d'athérothrombose ou PTT incluant les symptômes qui peuvent apparaître comme des petites têtes non de fatigue extrême inexpliquée, ou des yeux (jaunisse) (voir rubrique 4).
- Si vous vous coupez ou si vous vous blessez, vous pouvez demander plus de temps que l'action de votre médicament qui empêche la formation de caillots sanguins. Dans le cas de coupure (par exemple au cours du rasage), vous devez constater d'anormal. Cependant, si vous avez en avertir immédiatement "Effets indésirables éventuels".
- Votre médecin pourra vous demander de faire des examens sanguins.

# NOTICE : INFORMATIO

6 118001 100859

Cardensiel® 2,5 mg

Comprimés pelliculés sécables B/30

PPV: 50,70 DHS

7862160246

# CARDENSIEL®, comprimé p

## Bisoprolol Fumarate

### Voie orale

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable qui persiste, contactez votre pharmacien.

### Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que CARDENSIEL et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CARDENSIEL ?
3. Comment prendre CARDENSIEL ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CARDENSIEL ?
6. Informations supplémentaires.

### **1. QU'EST-CE QUE CARDENSIEL ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?**

#### Classe pharmacothérapeutique

La substance active de CARDENSIEL est le bisoprolol. Le bisoprolol appartient à la classe des bêtabloquants.

#### Indications thérapeutiques

Les bêtabloquants agissent en modifiant la réponse de l'organisme à certaines informations. Ils réduisent le rythme cardiaque et permettent au cœur de pomper plus efficacement le sang dans le corps. L'insuffisance cardiaque se produit lorsque le muscle cardiaque est faible et incapable de pomper suffisamment de sang. CARDENSIEL est utilisé pour traiter les patients présentant une insuffisance cardiaque. Il peut également être utilisé avec d'autres médicaments adaptés à cette affection (tels que les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine).

### **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CARDENSIEL ?**

Ne prenez pas CARDENSIEL si vous avez des antécédents de :

# REDLIP 20 et 40 mg, comprimé pelliculé en boîte de 30.

## Simvastatine

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire. Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez à votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous ne vous sentez pas bien, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

97,60

### 1. Composition du médicament :

#### Composition qualitative et quantitative en substance active :

La substance active est :

**REDLIP 20 mg :**

Simvastatine : 20 mg pour un comprimé pelliculé.

**REDLIP 40 mg :**

Simvastatine : 40 mg pour un comprimé pelliculé.

#### Composition qualitative en excipients :

Lactose monohydraté, amidon prégélatinisé, cellulose microcristalline, butylhydroxyanisole, acide ascorbique, acide citrique monohydraté, stéarate de magnésium, Opadray-OY- 22920 jaune, Opadray Y-1-7000 blanc (REDLIP 20 mg) et Opadray Y-34997 rose (REDLIP 40 mg).

Excipient à effets notoires : Lactose.

### 2. Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :

Ce médicament est un hypolipémiant.

### 3. Indications thérapeutiques :

REDLIP est un médicament utilisé pour faire baisser les taux du cholestérol total, du mauvais cholestérol (cholestérol LDL), et des substances grasses appelées triglycérides dans le sang. De plus, REDLIP augmente les niveaux du bon cholestérol (cholestérol HDL). REDLIP fait partie de la classe de médicaments appelés statines.

Le cholestérol est une des nombreuses substances grasses trouvées dans le système sanguin. Votre cholestérol total est composé principalement de cholestérol LDL et de cholestérol HDL.

Le LDL cholestérol est souvent appelé le « mauvais » cholestérol parce qu'il peut s'agglomérer sur les parois de vos artères en formant une plaque. Finalement, la création de cette plaque peut mener à un rétrécissement des artères. Ce rétrécissement peut ralentir ou bloquer le flux sanguin vers les organes vitaux comme le cœur et le cerveau. Ce blocage du flux sanguin peut entraîner une crise cardiaque ou une attaque cérébrale.

Le HDL cholestérol est souvent appelé le « bon » cholestérol parce qu'il aide à empêcher le mauvais cholestérol de s'agglomérer dans les artères et protège contre les maladies cardiaques.

Les triglycérides sont une autre forme de graisse dans votre sang qui peuvent augmenter votre risque de maladie cardiaque.

Vous devez poursuivre un régime hypocholestérolémiant pendant la prise de ce médicament.

REDLIP est utilisé en complément d'un régime hypocholestérolémiant, si vous avez :

- un taux élevé de cholestérol dans votre sang (hypercholestérolémie primaire) ou des niveaux élevés de graisse dans votre sang (dyslipidémie mixte),

- une maladie héréditaire (hypercholestérolémie familiale homozygote) qui augmente le taux de cholestérol dans le sang.

Vous pouvez également recevoir d'autres traitements.

- une insuffisance coronarienne ou un risque élevé d'insuffisance coronarienne (parce que vous avez un diabète, avez un antécédent d'accident vasculaire cérébral ou une maladie vasculaire d'origine athéroscléreuse). REDLIP peut prolonger votre vie en réduisant le risque de problèmes cardiaques, indépendamment de la quantité de votre cholestérol sanguin.

Chez la plupart des gens, il n'y a pas de symptôme immédiat dû à un taux élevé de cholestérol. Votre médecin peut mesurer votre cholestérol à l'aide d'un simple test sanguin. Consultez votre médecin régulièrement, vérifiez votre cholestérol, et discutez avec votre médecin des résultats à atteindre.

### 4. Posologie :

Votre médecin déterminera la posologie en fonction de votre état de santé, de votre traitement en cours tout en tenant compte de vos facteurs de risque.

Toujours prendre ce médicament comme votre médecin vous l'a indiqué. Vérifiez avec votre médecin ou votre pharmacien si vous n'êtes pas sûr.

Vous devez suivre un régime faisant baisser le cholestérol pendant le traitement par REDLIP.

### Dosage :