

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 5852 Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : HIMMI Noufissa

Date de naissance :

Adresse :

Tél. : Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr BOUTAXEB Taoufik
CARDIOLOGUE
Résidence Raouidi, 1er Etage,
Bouskoura Centre
Tel: 06 62 80 63 51

Date de consultation : 9/3/2022

Nom et prénom du malade : Mme HIMMI NOFISSA Age:

Lui-même

Conjoint

Enfant

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie : HTA

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca

Le : 9/3/2022

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

| Dates des Actes | Natures des Actes | Nombre et Coefficient | Montant détaillé des Honoraires | Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes |
|-----------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|--|
| 9/3/2022 | CS | | 250 DHS | <p>Dr BOUTAYEB Taoufik CARDIOLOGUE Résidence Rachid, 1er Etage, Bouskoura Centre Tél: 06 62 80 63 51 INIC 091017 194</p> |

EXECUTION DES ORDONNANCES

| Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur | Date | Montant de la Facture |
|---|----------|-----------------------|
| PHARMACIE RACHID YOUNES N°6 LOT D'ALIA CITE FOUKKA CASA TEL: 05 22 32 06 11 | 9/3/2022 | 735,10 |

ANALYSES - RADIographies

| Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue | Date | Désignation des Coefficients | Montant des Honoraires |
|---|------|------------------------------|------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

AUXILIAIRES MEDICAUX

| Cachet et signature du Praticien | Date des Soins | Nombre | | | | Montant détaillé des Honoraires |
|----------------------------------|----------------|--------|----|----|----|---------------------------------|
| | | AM | PC | IM | IV | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

| SOINS DENTAIRES | Dents Traitées | Nature des Soins | Coefficient | Coefficient DES TRAVAUX |
|-----------------|----------------|------------------|-------------|-------------------------|
| | | | | <input type="text"/> |
| </td | | | | |

Docteur BOUTAYEB Taoufik

Spécialiste des maladies du cœur et des vaisseaux

ECG - Echocardiographie
Holter ECG - Holter Tensionnel - Epreuve d'effort



- Lauréat du CHU Ibn Rochd de Casablanca
- Ancien chef de service de cardiologie à l'hôpital régional Moulay Youssef - Casab Anfa
- Ancien Médecin Conseil à la Mutuelle C.N.O.P.S
- Diplôme d'Expertise Médicale de la Faculté de Médecine de Rennes, France

الدكتور بوطيب توفيق
اختصاصي في أمراض القلب و الشريانين

تخطيط القلب - تصوير القلب بالصدى
هولتر 24 ساعة لضربات القلب - ضغط الدم - اختبار جهد القلب

- خريج المستشفى الجامعي ابن رشد - الدار البيضاء
- رئيس سابق قسم أمراض القلب والشريانين بالمستشفى الجهوي مولاي يوسف الدار البيضاء آنفا
- مستشار سابق بالتعاقدية : ص.و.م.ح.ج
- يمتلك الخبرة الطبية من كلية الطب في رن ، فرنسا

Mme HIMMI NOFISSA

Le : 9/3/2022

22.10

1) Bi PRO ~~150 mg~~ 1/2 gr 1.

65,70 x 2



PHARMACIE RACHIDI "A"
DR. RACHIDI
LOT. RACHIDI
CASA, TEL. 05 22 32 00 58

14H

1/2 gr 1.

65,00 x 3

2) MED 2 ~~50 mg~~ 1 gr 1.



1 gr 1.

math

27,70

3) Cardo aspirin ~~100 mg~~ 1 gr 1.

1 gr 1.

14H

739,10

4) Curcu flex force ~~1 gelée x 2~~

1 gelée x 2

68,60

5) HEPANA ~~1,88 x 2~~

57,89 x 3

6) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

7) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

8) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

9) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

10) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

11) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

12) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

13) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

14) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

15) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

16) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

17) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

18) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

19) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

20) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

21) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

22) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

23) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

24) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

25) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

26) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

27) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

28) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

29) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

30) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

31) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

32) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

33) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

34) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

35) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

36) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

37) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

38) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

39) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

40) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

41) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

42) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

43) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

44) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

45) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

46) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

47) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

48) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

49) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

50) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

51) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

52) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

53) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

54) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

55) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

56) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

57) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

58) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

59) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

60) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

61) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

62) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

63) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

64) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

65) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

66) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

67) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

68) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

69) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

70) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

71) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

72) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

73) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

74) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

75) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

76) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

77) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

78) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

79) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

80) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

81) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

82) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

83) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

84) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

85) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

86) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

87) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

88) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

89) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

90) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

91) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

92) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

93) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

94) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

95) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

96) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

97) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

98) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

99) BOUTAYEB TAOUFIK ~~100 mg~~

100 mg

100 mg</p



LOT : 211107
EXP : 06/2024
P.P.V : 57,80D

LOT N° :



if
ore nerveux

LOT : 210422
DLUO : 10/2024
139,00DH

65,70

65,00

65,00

65,70

LD-NOR®

10 mg, 20 mg & 40 mg, Comprimé pelliculé (DCI: Atorvastatine)

- Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.

- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que LD-NOR, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LD-NOR, comprimé pelliculé?
3. Comment prendre LD-NOR, comprimé pelliculé?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
5. Comment conserver LD-NOR, comprimé pelliculé?
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE LD-NOR, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ?

LD-NOR appartient à un groupe de médicaments appelés statines, qui interviennent dans la régulation des lipides (gras).

LD-NOR est utilisé pour diminuer le taux sanguin des lipides appelés cholestérol et triglycérides lorsqu'un régime pauvre en graisses associé à des modifications du mode de vie ne sont pas suffisants. Si vous présentez des facteurs de risque de survenue de maladie du cœur, LD-NOR peut également être utilisé pour réduire ce risque même si votre taux de cholestérol est normal. Vous deviez continuer à poursuivre un régime alimentaire standard pauvre en cholestérol pendant toute la durée du traitement.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE LD-NOR, comprimé pelliculé?

Ne prenez jamais LD-NOR, comprimé pelliculé :

- si vous êtes allergique à l'atorvastatine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique Informations supplémentaires,
- si vous avez ou avez eu une maladie du foie,
- si vous avez eu des résultats d'analyse des tests de votre fonction hépatique anormaux et inexpliqués,
- si vous êtes une femme en âge d'avoir des enfants et que vous n'utilisez pas une méthode de contraception fiable,
- si vous êtes enceinte ou essayez de l'être,
- si vous allaitez,
- si vous utilisez l'association glécaprévir/pibrentasvir dans le traitement de l'hépatite C.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère avant de prendre LD-NOR, comprimé pelliculé.

- si vous avez une insuffisance respiratoire sévère,
- si vous prenez ou avez pris au cours des 7 derniers jours un médicament appelé acide fusidique (médicament utilisé pour traiter les infections bactériennes) par voie orale ou injectable. L'association l'acide fusidique et de LD-NOR peut provoquer des problèmes musculaires graves (rhabdomyolyse),
- si vous avez précédemment eu un accident vasculaire cérébral avec saignement dans le cerveau, ou vous avez de petites poches de liquide dans le cerveau suite à un accident vasculaire cérébral,
- si vous avez des problèmes aux reins,
- si l'activité de votre glande thyroïde est insuffisante (hypothyroïdie),
- si vous avez présenté dans le passé des courbatures ou des douleurs musculaires répétées inexpliquées, ou si vous avez des antécédents personnels ou familiaux de problèmes musculaires,
- si vous avez eu des problèmes musculaires pendant un traitement avec d'autres médicaments diminuant les lipides du sang (par exemple une autre statine ou un fibrate),
- si vous buvez régulièrement d'importantes quantités d'alcool,
- si vous avez des antécédents de maladie du foie,
- si vous êtes âgée(e) de plus de 70 ans.

Si vous présentez l'une des situations ci-dessus, votre médecin vous prescrira une analyse de sang avant, et peut-être pendant, votre traitement par LD-NOR afin d'évaluer votre risque de survenue d'effets indésirables musculaires. En effet, le risque d'effets indésirables musculaires, notamment de la rhabdomyolyse, peut être majoré en cas de crise simultanée de certains médicaments.

3. COMMENT PRENDRE LD-NOR, comprimé pelliculé?

Avant que vous ne commencez le traitement, votre médecin vous prescrira un régime pauvre en cholestérol, que vous devrez poursuivre pendant toute la durée de votre traitement par LD-NOR. La posologie initiale habituelle de LD-NOR est de 10 mg en une prise par jour chez les adultes et enfants âgés de 10 ans ou plus. La posologie peut être augmentée si nécessaire par votre médecin jusqu'à la posologie dont vous avez besoin. La posologie sera adaptée par votre médecin à intervalles d'au moins 4 semaines. La dose maximale de LD-NOR est de 80 mg une fois par jour.

Les comprimés de LD-NOR doivent être avalés entiers avec un verre d'eau et peuvent être pris à tout moment de la journée, avec ou sans aliments. Essayez cependant de prendre votre comprimé tous les jours à la même heure.

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

La durée du traitement par LD-NOR, comprimé pelliculé est déterminée par votre médecin.

Si vous pensez que l'effet de LD-NOR est trop fort ou trop faible, parlez-en à votre médecin.

Si vous avez pris plus de LD-NOR, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû

Si vous avez pris accidentellement plus de comprimés de LD-NOR que vous n'auriez dû (plus que votre dose quotidienne habituelle), consultez immédiatement votre médecin, votre pharmacien ou l'hôpital le plus proche pour avis.

Si vous oubliez de prendre LD-NOR, comprimé pelliculé

Si vous avez oublié de prendre une dose, prenez simplement la prochaine dose prévue à l'heure normale. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez de prendre LD-NOR, comprimé pelliculé

Sans objet.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament ou souhaitez arrêter de prendre votre traitement, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Si vous ressentez l'un des effets indésirables ou symptômes graves suivants, arrêtez de prendre vos comprimés et contactez immédiatement votre médecin ou allez au service des urgences de l'hôpital le plus proche.

Rare : peut affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000

- Réaction allergique sévère entraînant un gonflement du visage, de la langue et de la gorge pouvant provoquer d'importantes difficultés à respirer.

- Pathologie sévère avec pelade et gonflement graves de la peau, cloques sur la peau, dans la bouche, sur la zone génitale et autour des yeux et une fièvre. Eruption cutanée de taches roses-rouges, particulièrement sur la paume des mains ou la plante des pieds, qui peuvent former des cloques.

- Faiblesse musculaire, sensation douloureuse, douleur ou rupture musculaires ou coloration rouge-brun de l'urine associées à une sensation de malaise ou de fièvre, pouvant être causées par une atteinte musculaire anormale (rhabdomyolyse). La dégradation anormale des muscles ne disparaît pas toujours, même après larrêt de l'atorvastatine, et peut engager le pronostic vital et entraîner des problèmes aux reins.

Très rare : peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10 000

- La présence inattendue ou inhabituelle de saignements ou de fonctionnement de votre foie. Dans ce cas, consultez votre médecin.

- Syndrome lipoïde (incluant éruption cutanée, troubles a

utiles)



LOT : 220042

EXP : 03/2025

PPV : 57,80 DH

LD-NOR®

10 mg, 20 mg & 40 mg, Comprimé pelliculé (DCI: Atorvastatine)

- Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.

- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que LD-NOR, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LD-NOR, comprimé pelliculé?
3. Comment prendre LD-NOR, comprimé pelliculé?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
5. Comment conserver LD-NOR, comprimé pelliculé?
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE LD-NOR, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ?

LD-NOR appartient à un groupe de médicaments appelés statines, qui interviennent dans la régulation des lipides (graisses).

LD-NOR est utilisé pour diminuer le taux sanguin des lipides appelés cholestérol et triglycérides lorsqu'un régime pauvre en graisses associé à des modifications du mode de vie ne sont pas suffisants. Si vous présentez des facteurs de risque de survenue de maladie du cœur, LD-NOR peut également être utilisé pour réduire ce risque même si votre taux de cholestérol est normal. Vous deviez continuer à poursuivre un régime alimentaire standard pauvre en cholestérol pendant toute la durée du traitement.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE LD-NOR, comprimé pelliculé?

Ne prenez jamais LD-NOR, comprimé pelliculé :

- si vous êtes allergique à l'atorvastatine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique Informations supplémentaires,
- si vous avez ou avez eu une maladie du foie,
- si vous avez eu des résultats d'analyse des tests de votre fonction hépatique anormaux et inexpliqués,
- si vous êtes une femme en âge d'avoir des enfants et que vous n'utilisez pas une méthode de contraception fiable,
- si vous êtes enceinte ou essayez de l'être,
- si vous allaitez,
- si vous utilisez l'association glécaprévir/pibrentasvir dans le traitement de l'hépatite C.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère avant de prendre LD-NOR, comprimé pelliculé.

- si vous avez une insuffisance respiratoire sévère,
- si vous prenez ou avez pris au cours des 7 derniers jours un médicament appelé acide fusidique (médicament utilisé pour traiter les infections bactériennes) par voie orale ou injectable. L'association l'acide fusidique et de LD-NOR peut provoquer des problèmes musculaires graves (rhabdomyolyse),
- si vous avez précédemment eu un accident vasculaire cérébral avec saignement dans le cerveau, ou vous avez de petites poches de liquide dans le cerveau suite à un accident vasculaire cérébral,
- si vous avez des problèmes aux reins,
- si l'activité de votre glande thyroïde est insuffisante (hypothyroïdie),
- si vous avez présenté dans le passé des courbatures ou des douleurs musculaires répétées inexpliquées, ou si vous avez des antécédents personnels ou familiaux de problèmes musculaires,
- si vous avez eu des problèmes musculaires pendant un traitement avec d'autres médicaments diminuant les lipides du sang (par exemple une autre statine ou un fibrate),
- si vous buvez régulièrement d'importantes quantités d'alcool,
- si vous avez des antécédents de maladie du foie,
- si vous êtes âgée(e) de plus de 70 ans.

Si vous présentez l'une des situations ci-dessus, votre médecin vous prescrira une analyse de sang avant, et peut-être pendant, votre traitement par LD-NOR afin d'évaluer votre risque de survenue d'effets indésirables musculaires. En effet, le risque d'effets indésirables musculaires, notamment de la rhabdomyolyse, peut être majoré en cas de crise simultanée de certains médicaments.

3. COMMENT PRENDRE LD-NOR, comprimé pelliculé?

Avant que vous ne commencez le traitement, votre médecin vous prescrira un régime pauvre en cholestérol, que vous devrez poursuivre pendant toute la durée de votre traitement par LD-NOR. La posologie initiale habituelle de LD-NOR est de 10 mg en une prise par jour chez les adultes et enfants âgés de 10 ans ou plus. La posologie peut être augmentée si nécessaire par votre médecin jusqu'à la posologie dont vous avez besoin. La posologie sera adaptée par votre médecin à intervalles d'au moins 4 semaines. La dose maximale de LD-NOR est de 80 mg une fois par jour.

Les comprimés de LD-NOR doivent être avalés entiers avec un verre d'eau et peuvent être pris à tout moment de la journée, avec ou sans aliments. Essayez cependant de prendre votre comprimé tous les jours à la même heure.

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

La durée du traitement par LD-NOR, comprimé pelliculé est déterminée par votre médecin.

Si vous pensez que l'effet de LD-NOR est trop fort ou trop faible, parlez-en à votre médecin.

Si vous avez pris plus de LD-NOR, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû

Si vous avez pris accidentellement plus de comprimés de LD-NOR que vous n'auriez dû (plus que votre dose quotidienne habituelle), consultez immédiatement votre médecin, votre pharmacien ou l'hôpital le plus proche pour avis.

Si vous oubliez de prendre LD-NOR, comprimé pelliculé

Si vous avez oublié de prendre une dose, prenez simplement la prochaine dose prévue à l'heure normale. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez de prendre LD-NOR, comprimé pelliculé

Sans objet.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament ou souhaitez arrêter de prendre votre traitement, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Si vous ressentez l'un des effets indésirables ou symptômes graves suivants, arrêtez de prendre vos comprimés et contactez immédiatement votre médecin ou allez au service des urgences de l'hôpital le plus proche.

Rare : peut affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000

- Réaction allergique sévère entraînant un gonflement du visage, de la langue et de la gorge pouvant provoquer d'importantes difficultés à respirer.

- Pathologie sévère avec pelade et gonflement graves de la peau, cloques sur la peau, dans la bouche, sur la zone génitale et autour des yeux et une fièvre. Eruption cutanée de taches roses-rouges, particulièrement sur la paume des mains ou la plante des pieds, qui peuvent former des cloques.

- Faiblesse musculaire, sensation douloureuse, douleur ou rupture musculaires ou coloration rouge-brun de l'urine associées à une sensation de malaise ou de fièvre, pouvant être causées par une atteinte musculaire anormale (rhabdomyolyse). La dégradation anormale des muscles ne disparaît pas toujours, même après larrêt de l'atorvastatine, et peut engager le pronostic vital et entraîner des problèmes aux reins.

Très rare : peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10 000

- La présence inattendue ou inhabituelle de saignements ou de fonctionnement de votre foie. Dans ce cas, consultez votre médecin.

- Syndrome lipoïde (incluant éruption cutanée, troubles a

utiles)



LOT : 220042

EXP : 03/2025

PPV : 57,80 DH