

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

Reclamation

la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données



**MUPRAS**  
Mutuelle de Prévoyance  
& d'Actions Sociales  
de Royal Air Maroc

## Déclaration de Maladie

N° W21-713172

156283

Maladie  Dentaire  Optique  A

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 13181 Société : RAM

Actif  Pensionné(e)  Autre

Nom & Prénom : Soukaina EZZENFARI

Date de naissance :

Adresse :

Tél. : 06 6612 8750 Total des frais engagés :

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation :

Nom et prénom du malade : EZZENFARI SOUKAINA Age :

Lien de parenté :  Lui-même  Conjoint  Enfant

Nature de la maladie : J's fuit

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'att. médecin conseil de la Mutuelle

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je  
avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca Le : 20/05/2022

Signature de l'adhérent(e) : AZ

Autorisation CNDP N° : A-A-215/2019

MUPRAS  
24 MAI 2022  
ACCUEIL



**Docteur MARIANA ȘIMION**

GYNECOLOGIE MEDICALE

SUIVI DE GROSSESSE

MALADIES DES ENFANTS

ECHOGRAPHIE GÉNÉRALE ET OBSTETRICALE

STÉRILITÉ DE COUPLE

Diplômée de la faculté de médecine

«IASI» Roumanie

**الدكتور سيميون ماريانا**

طب النساء

تتبع الحمل

أمراض الأطفال

الكشف العام بالصدى و التوليد

عقم الزوجين

خريجة كلية الطب

«IASI» برومانيا

Mohammedia , le :

20/05/2022

BEZON FARI SOUKAÏNA

49.80

34,40

AS

1) FLAGYL 500

AS

2) Bedelix 57.70

AS

3) Clotruin 34.40  
15 x 3  
1/2 kg  
T: 144,90

PHARMACIE EL MESSID  
BEN YAKHLEF Mohammedia  
CHOSNE Bouchara - Tél: 023 33 51 52

Lotissement Smikref N°20, Ben Yakhlef en face de Centre de Santé Louizia

إقامة سميكريف الرقم 20 بني يخلف (اللوزية) أمام المستوصف الصحي اللوزية

الهاتف / الفاكس : 0523335152

ت. وثيرة وأوقات استعمال الدواء :

1 إلى 3 مرات في اليوم، حسب الاستعمالات.

ث مدة العلاج :

لكي يثبت هذا المضاد الحيوي فعاليته، يجب استعماله بانتظام بالجرعات الموصوفة، وطالما ينصح به الطبيب.

لا يعني اختفاء الحمى أو أحد الأعراض أنك شفيت تماما. فالشعور المحتمل بالتعب غير ناجم عن العلاج بالمضاد الحيوي لكن عن التعفن بذاته. ولن يكون لخفض العلاج أو توقيفه أي تأثير على هذا الشعور وسيؤخر شفائك.

حالات خاصة :  
• تدوم مدة علاج داء الجيارديات (تعفن ناتج عن طفيلي) 5 أيام؛  
• تدوم مدة علاج داء الأميبية (تعفن ناتج عن طفيلي) وبعض الالتهابات المهبلية (تعفن في المهبل) 7 أيام؛  
• وبالنسبة للشعرة (تعفن ناتج عن طفيلي) فالعلاج يتم في جرعة وحيدة.

ج ما العمل في حالة جرعة مفروطة  
في حالة القيء، صعوبة في تنسيق الحركات، الارتباك، استشر الطبيب. قد يتعين عليه وصف علاج.

5. التأثيرات غير المرغوب فيها والمزعجة  
كبثل كافة الأدوية، قد يؤدي هذا الدواء لدى بعض الأشخاص إلى تأثيرات مزعجة شيئا ما.

• أعراض هضمية :

- غثيان، قيء، تشنجات في المعدة، إسهال؛

- التهاب اللسان مع شعور بجفاف الفم، التهاب الفم، مذاق معدني في الفم، فقدان الشهية؛

- استثنائيا، حالة التهاب البنكرياس الذي يزول بعد إيقاف العلاج.

• أعراض جلدية ومخاطية :

- هبات حرارية مع احمرار الوجه، حكة، طفح على الجلد مصحوب

أحيانا بالحمى؛

- شرى (طفح جلدي يشبه لدغة نبتة القراص)، انتفاخ مفاجئ في الوجه والعنق ذات أصل تحسسي (وذمة كوينك)، استثنائيا صدمة ذات أصل تحسسي.

• أعراض عصبية :

- آلام الرأس؛

- إصابات أعضاء الأطراف؛

- اختلاجات، دوار، سوء تنسيق الحركات الإرادية.

• أعراض نفسية :

- ارتباك، هلوسة.

• اضطرابات دموية :

- حالات جد نادرة لثمن:

• أو الصفير

• أعراض

- حالات

والتهاب

• أعراض

- تلون

اخبر الطبيب أو الصيدلي عن أي تأثير غير مرغوب فيه ومرجع لم يذك في هذه النشرة.

6. الحفظ

لا تتجاوز تاريخ انتهاء الصلاحية المدون على العلبة الخارجية.

7. تاريخ مراجعة النشرة

أبريل 2009.

8. نصائح/ تربية صحية

"ما ينبغي معرفته حول المضادات الحيوية؟"

تتميز المضادات الحيوية بفعاليتها لمكافحة التعففات الناجمة عن البكتيريا. لكنها غير فعالة ضد التعففات الناتجة عن الفيروسات.

لذلك قرر طبيبك أن يصف لكم هذا المضاد الحيوي لأنه يناسب تماما حالتكم ومرضكم الحالي.

تتمكن البكتيريا من البقاء أو التكاثر رغم فعل هذا المضاد الحيوي وتسمى هذه الظاهرة بالمقاومة، التي تبطل مفعول بعض المضادات الحيوية.

تزداد المقاومة بفعل الاستعمال المفرط أو غير الملائم للمضادات الحيوية.

قد تشجعون ظهور البكتيريا المقاومة وبالتالي تأخير شفائكم أو حتى إبطال مفعول هذا الدواء في حالة عدم احترام :

• الجرعة الواجب تناولها،

• أوقات الجرعة،

• مدة العلاج.

وكنيجة لذلك، من أجل الحفاظ على فعالية هذا الدواء :

1. لا تستعملوا مضادا حيويا إلا إذا وصفه لكم الطبيب،

2. احترموا وصفة الطبيب احتراما تاما،

3. لا تستعملوا المضاد الحيوي مجددا دون وصفة طبية، حتى لا اعتقدتم مكافحة مرض مماثل في الأعراض.

4. لا تعطوا هذا المضاد الحيوي إلى أي شخص آخر، قد لا يكون مناسباً لمرضه.

5. عند الانتهاء من علاجكم، ارجعوا للصيدلي كافة العبث المفتوح من أجل التخلص منها على الوجه الصحيح والملائم.

بيات البيضاء

بيان الكبدى

LOT : 21E008  
PER : 03 2026

FLAGYL 500 mg  
CP PEL B20

P.P.V. 490H80



6

# bedelix® 3g

Montmorillonite beidellitique  
poudre pour suspension buvable en sachet

**Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

## Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que BEDELIX, poudre pour suspension buvable en sachet et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre BEDELIX, poudre pour suspension buvable en sachet ?
3. Comment prendre BEDELIX, poudre pour suspension buvable en sachet ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver BEDELIX, poudre pour suspension buvable en sachet ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

## 1. QU'EST-CE QUE BEDELIX, poudre pour suspension buvable en sachet ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : AUTRES

ADSORBANTS - ATC : A07BC05

Ce médicament

(muqueux)

Ce médicament

symptomatique

intestinale

à une

le bon fonctionnement de l'intestin.

LOT : 22E003  
PER : 12 2026

BEDELIX 3G  
SACHETS B30

P. P. V. : 57DH70



stintement  
illes  
ômes liés  
qui affecte

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE BEDELIX, poudre pour suspension buvable en sachet ?

### **Ne prenez jamais BEDELIX, poudre pour suspension buvable en sachet :**

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active (la montmorillonite beidellitique) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- Si vous souffrez d'une maladie provoquant un rétrécissement de votre tube digestif.

### **Avertissements et précautions**

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre BEDELIX, poudre pour suspension buvable en sachet.

Si votre médecin vous a informé d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

### **Faites attention avec BEDELIX :**

Si vous êtes sous dialyse, cela signifie que vos reins fonctionnent mal et ceux-ci auront des difficultés à éliminer l'hydroxyde d'aluminium contenu dans ce médicament. Dans ce cas, vous ne devez pas prendre ce médicament pendant une période prolongée sans en parler à votre médecin.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose.

### **Autres médicaments et BEDELIX, poudre pour suspension buvable en sachet**

Vous devez espacer la prise de BEDELIX et d'un autre médicament pour éviter de diminuer l'efficacité de l'autre traitement.

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

### **BEDELIX, poudre pour suspension buvable en sachet avec des aliments et boissons**

Vous devez prendre BEDELIX entre les repas ou un peu avant.

### **Grossesse et allaitement**

BEDELIX n'est pas recommandé pendant la grossesse et l'allaitement.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant