

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
 Prise en charge : pec@mupras.com
 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 2335 Société : R. A. M.

Actif Pensionné(e) Autre : 116429

Nom & Prénom : KAISSE Mohamed


Date de naissance : 1er 07. 1951

Adresse : Habituelle

Tél. : 06.41.93.98.77 Total des frais engagés : 612,70 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 05 / 05 / 2022

Nom et prénom du malade : KAISSE AOUAD Age : 71 ans

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : Allergie à l'ail et abonnement

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Dar Ouled Zidouh Le : 05 / 05 / 2022

Signature de l'adhérent(e) :

BELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
05/05/2023	1	-	150,-	Dr Faissal ZANNA Médecin Générale Dax Ouled Zidouh 06.23.39.04.91

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
 Pharmacie Populaire Dr. MOURI Lakbir 122080880  Daroud Zidoun Tel: 05 23 46 54 79	2022.05.12.22	462170 DH

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	H D B G	25533412 21433552 00000000 00000000 D —————— G 00000000 00000000 35533411 11433553 B		COEFFICIENT DES TRAVAUX
	H D B G	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession		MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION



Dar ouled Zidouh le 05 - 05 - 2022

M^e MOHAMED KAISSÉ

37.7°

1) D-poméadol 10g



duj en 19

45.00

2) No-Spa 50ml



$$58.80 \times 6 = 316.80 \text{ d} - 1 - 1$$

3) Auler 20g

farmacie populaire
Dar Ouled Zidouh
05 23 46 54 79

(03 متس)



4) Zyrtex 10g

(025)



$$= 462.70$$

14015

Dr Faissal ZANNA
Médecine Générale
Dar Ouled Zidouh
06.23.39.04.91

تجزئة الفلاح (قرب صيدلية الفلاح) دار أولاد زيدوح - إقليم الفقيه بن صالح

الهاتف: 06.23.39.04.91

Patente N°: 41176236 - INPE: 161187471

NOTICE : INFORMATION POUR L'UTILISATEUR

1. DENOMINATION :

AULCER 20 mg, gélules gastro-résistantes

Boîte de 14 et 28 gélules gastro-résistantes

DCI : oméprazole

Veuillez lire attentivement ce qui suit :

- Gardez cette notice, vous pourrez en avoir besoin.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin.
- Ce médicament vous a été prescrit pour une maladie. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Voir la rubrique 4.

AMM N° : 569/17 DMP/21

LOT : 22025

PER : 11/2024

PPU : 52,80 DH

medicament.

emandez plus

de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Voir la rubrique 4.

2. COMPOSITION D'AULCER 20 mg gélules gastro-résistantes :

• Composition en substance active :

AULCER 20 mg : chaque gélule contient 20 mg d'oméprazole.

Composition en excipient :

Les excipients sont : saccharose/ amidon de maïs, laurylsulfate de sodium, phosphate disodique, mannitol, hydroxypropyl méthylcellulose (hypromellose), polyéthylèneglycol 6000 (Macrogol), talc, polysorbate 80, dioxyde de titane (CI=77891, E-171), eudragitL30D55 (copolymères) Acrilil.

Liste des excipients à effet notoire :

Saccharose, polyéthylèneglycol (Macrogol) et mannitol.

3. CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE OU TYPE D'ACTIVITÉ

Oméprazole appartient à la classe des médicaments appelée « inhibiteurs de la pompe à protons ». Il diminue la quantité d'acide produite par votre estomac.

4. INDICATIONS THERAPEUTIQUES

AULCER® 20 mg, gélule gastro-résistante est utilisé pour traiter les affections suivantes :

Votre médecin vous dira combien de temps vous devez le prendre et de votre âge.

La dose habituelle est indiquée en ci-dessous.

Adultes :

Traitement des symptômes du reflux gastro-œsophagien (régurgitation acide) :

• Si votre médecin constate que votre état n'améliore pas avec la dose recommandée, il peut augmenter la dose à 40 mg (2 gélules de 20 mg) une fois par jour. Votre médecin peut vous demander de prendre ce médicament pendant plusieurs semaines supplémentaires si votre état n'améliore pas.

• La dose usuelle une fois que votre état s'améliore est de 20 mg une fois par jour.

• Si votre œsophage n'a pas été endommagé, il peut être nécessaire de prendre ce médicament une fois par jour.

Traitement des ulcères dans la partie haute de l'estomac (œsophagien et duodénal) :

• La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour. Votre médecin peut vous demander de prendre ce médicament pendant plusieurs semaines supplémentaires si votre ulcère n'a pas complètement disparu.

• Si l'ulcère n'a pas été complètement guéri, il peut être nécessaire de prendre ce médicament une fois par jour.

• La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour. Votre médecin peut vous demander de prendre ce médicament pendant plusieurs semaines supplémentaires si votre ulcère n'a pas complètement disparu.

• Si l'ulcère n'est pas complètement guéri, il peut être nécessaire de prendre ce médicament une fois par jour.

• La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour. Votre médecin peut augmenter la dose à 40 mg (2 gélules de 20 mg) une fois par jour.

• La dose recommandée est de 10 mg une fois par jour. Votre médecin peut augmenter la dose à 20 mg (2 gélules de 10 mg) une fois par jour.

• La dose recommandée est de 10 mg une fois par jour. Votre médecin peut augmenter la dose à 20 mg (2 gélules de 10 mg) une fois par jour.

NOTICE : INFORMATION POUR L'UTILISATEUR

1. DENOMINATION :

AULCER 20 mg, gélules gastro-résistantes

Boîte de 14 et 28 gélules gastro-résistantes

DCI : oméprazole

Veuillez lire attentivement ce

- Gardez cette notice, vous pourrez en avoir besoin.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin.
- Ce médicament vous a été prescrit par un professionnel de la santé. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Voir la rubrique 4.

AMM N° : 569/17 DMP/21

LOT : 22025

PER : 11/2024

PPU : 52,80 DH

médicament.

emandez plus

de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

ne jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

2. COMPOSITION D'AULCER 20 mg gélules gastro-résistantes :

*** Composition en substance active :**

AULCER 20 mg : chaque gélule contient 20 mg d'oméprazole.

Composition en excipient :

Les excipients sont : saccharose/ amidon de maïs, laurylsulfate de sodium, phosphate disodique, mannitol, hydroxypropyl méthylcellulose (hypromellose), polyéthylèneglycol 6000 (Macrogol), talc, polysorbate 80, dioxyde de titane (CI=77891, E-171), eudragitL30D55 (copolymères) Acril.

Liste des excipients à effet notoire :

Saccharose, polyéthylèneglycol (Macrogol) et mannitol.

3. CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE OU TYPE D'ACTIVITÉ

Oméprazole appartient à la classe des médicaments appelée « inhibiteurs de la pompe à protons ». Il diminue la quantité d'acide produite par votre estomac.

4. INDICATIONS THERAPEUTIQUES

AULCER® 20 mg, gélule gastro-résistante est utilisé pour traiter les affections suivantes :

Votre médecin vous dira combien de temps vous devez le prendre et de votre âge.

La dose habituelle est indiquée en ci-dessous.

Adultes :

Traitement des symptômes du reflux gastro-œsophagien (régurgitation acide) :

Si votre médecin constate que votre état n'améliore pas avec la dose recommandée, il peut augmenter la dose à 40 mg (2 gélules de 20 mg) une fois par jour. Votre médecin peut vous demander de prendre ce médicament pendant plusieurs semaines supplémentaires si votre état n'améliore pas.

La dose usuelle une fois que votre état s'améliore est de 20 mg une fois par jour. Si votre œsophage n'a pas été endommagé, il peut être nécessaire de prendre ce médicament une fois par jour.

Traitement des ulcères dans la paroi œsophagienne (œsophagite) :

La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour. Votre médecin peut vous demander de prendre ce médicament pendant plusieurs semaines supplémentaires si votre ulcère n'est pas complètement guéri.

Si l'ulcère n'a pas été complètement guéri, il peut être nécessaire de prendre ce médicament une fois par jour.

Traitement des ulcères de l'estomac (estomac) :

La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour. Votre médecin peut vous demander de prendre ce médicament pendant plusieurs semaines supplémentaires si votre ulcère n'est pas complètement guéri.

Si l'ulcère n'est pas complètement guéri, il peut être nécessaire de prendre ce médicament une fois par jour.

Prévention de la récidive de l'ulcère gastrique :

La dose recommandée est de 10 mg une fois par jour. Votre médecin peut augmenter la dose à 40 mg (2 gélules de 20 mg) une fois par jour.

Traitement de l'ulcère gastrique et des maladies inflammatoires non stéroïdiennes (MINS) :

NOTICE : INFORMATION POUR L'UTILISATEUR

1. DENOMINATION :

AULCER 20 mg, gélules gastro-résistantes

Boîte de 14 et 28 gélules gastro-résistantes

DCI : oméprazole

Veuillez lire attentivement ce qui suit :

- Gardez cette notice, vous pourrez en avoir besoin.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin.
- Ce médicament vous a été prescrit pour une maladie. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Voir la rubrique 4.

AMM N° : 569/17 DMP/21

LOT : 22025

PER : 11/2024

PPU : 52,80 DH

medicament.

emandez plus

de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Voir la rubrique 4.

2. COMPOSITION D'AULCER 20 mg gélules gastro-résistantes :

• Composition en substance active :

AULCER 20 mg : chaque gélule contient 20 mg d'oméprazole.

Composition en excipient :

Les excipients sont : saccharose/ amidon de maïs, laurylsulfate de sodium, phosphate disodique, mannitol, hydroxypropyl méthylcellulose (hypromellose), polyéthylèneglycol 6000 (Macrogol), talc, polysorbate 80, dioxyde de titane (CI=77891, E-171), eudragitL30D55 (copolymères) Acrilil.

Liste des excipients à effet notoire :

Saccharose, polyéthylèneglycol (Macrogol) et mannitol.

3. CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE OU TYPE D'ACTIVITÉ

Oméprazole appartient à la classe des médicaments appelée « inhibiteurs de la pompe à protons ». Il diminue la quantité d'acide produite par votre estomac.

4. INDICATIONS THERAPEUTIQUES

AULCER® 20 mg, gélule gastro-résistante est utilisé pour traiter les affections suivantes :

Votre médecin vous dira combien de temps vous devez le prendre et de votre âge.

La dose habituelle est indiquée en ci-dessous.

Adultes :

Traitement des symptômes du reflux gastro-œsophagien (régurgitation acide) :

• Si votre médecin constate que votre état n'améliore pas avec la dose recommandée, il peut augmenter la dose à 40 mg (2 gélules de 20 mg) une fois par jour. Votre médecin peut vous demander de prendre ce médicament pendant plusieurs semaines supplémentaires si votre état n'améliore pas.

• La dose usuelle une fois que votre état s'améliore est de 20 mg une fois par jour.

• Si votre œsophage n'a pas été endommagé, il peut être nécessaire de prendre ce médicament une fois par jour.

Traitement des ulcères dans la partie haute de l'estomac (œsophagien et duodénal) :

• La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour. Votre médecin peut vous demander de prendre ce médicament pendant plusieurs semaines supplémentaires si votre ulcère n'a pas complètement disparu.

• Si l'ulcère n'a pas été complètement guéri, il peut être nécessaire de prendre ce médicament une fois par jour.

• La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour. Votre médecin peut vous demander de prendre ce médicament pendant plusieurs semaines supplémentaires si votre ulcère n'a pas complètement disparu.

• Si l'ulcère n'est pas complètement guéri, il peut être nécessaire de prendre ce médicament une fois par jour.

Prévention de la récidive de l'ulcère gastrique :

• La dose recommandée est de 10 mg une fois par jour. Il peut augmenter la dose à 40 mg (2 gélules de 20 mg) une fois par jour.

Traitement de l'ulcère gastrique et des affections inflammatoires non stéroïdiennes :

NOTICE : INFORMATION POUR L'UTILISATEUR

1. DENOMINATION :

AULCER 20 mg, gélules gastro-résistantes

Boîte de 14 et 28 gélules gastro-résistantes

DCI : oméprazole

Veuillez lire attentivement ce

- Gardez cette notice, vous pourrez en avoir besoin.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin.
- Ce médicament vous a été prescrit par un professionnel de la santé. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Voir la rubrique 4.

AMM N° : 569/17 DMP/21

LOT : 22025

PER : 11/2024

PPU : 52,80 DH

medicament.

emandez plus

quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Voir la rubrique 4.

2. COMPOSITION D'AULCER 20 mg gélules gastro-résistantes :

*** Composition en substance active :**

AULCER 20 mg : chaque gélule contient 20 mg d'oméprazole.

Composition en excipient :

Les excipients sont : saccharose/ amidon de maïs, laurylsulfate de sodium, phosphate disodique, mannitol, hydroxypropyl méthylcellulose (hypromellose), polyéthylèneglycol 6000 (Macrogol), talc, polysorbate 80, dioxyde de titane (CI=77891, E-171), eudragitL30D55 (copolymères) Acrilil.

Liste des excipients à effet notoire :

Saccharose, polyéthylèneglycol (Macrogol) et mannitol.

3. CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE OU TYPE D'ACTIVITÉ

Oméprazole appartient à la classe des médicaments appelée « inhibiteurs de la pompe à protons ». Il diminue la quantité d'acide produite par votre estomac.

4. INDICATIONS THERAPEUTIQUES

AULCER® 20 mg, gélule gastro-résistante est utilisé pour traiter les affections suivantes :

Votre médecin vous dira combien de temps vous devez le prendre et de votre âge.

La dose habituelle est indiquée en ci-dessous.

Adultes :

Traitement des symptômes du reflux gastro-œsophagien (régurgitation acide) :

- Si votre médecin constate que votre état n'améliore pas avec la dose recommandée, il peut augmenter la dose à 40 mg (2 gélules de 20 mg) une fois par jour.
- Si votre œsophage n'a pas été endommagé par le reflux, la dose recommandée est de 20 mg une fois par jour.

Traitement des ulcères dans la paroi œsophagienne (œsophagite) :

- La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour. Votre médecin peut vous demander de prendre jusqu'à 40 mg (2 gélules de 20 mg) une fois par jour.

Traitement des ulcères de l'estomac (ulcère gastrique) :

- La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour. Votre médecin peut vous demander de prendre jusqu'à 40 mg (2 gélules de 20 mg) une fois par jour.
- Si l'ulcère n'est pas complètement cicatrisé, la dose peut être augmentée à 40 mg (2 gélules de 20 mg) une fois par jour.

Prévention de la récidive de l'ulcère gastrique :

- La dose recommandée est de 10 mg une fois par jour. Votre médecin peut augmenter la dose à 40 mg (2 gélules de 20 mg) une fois par jour.

Traitement de l'ulcère gastrique et des maladies inflammatoires non stéroïdiennes (MINS) :

NOTICE : INFORMATION POUR L'UTILISATEUR

1. DENOMINATION :

AULCER 20 mg, gélules gastro-résistantes

Boîte de 14 et 28 gélules gastro-résistantes

DCI : oméprazole

Veuillez lire attentivement ce

- Gardez cette notice, vous pourrez en avoir besoin.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin.
- Ce médicament vous a été prescrit par un professionnel de la santé. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Voir la rubrique 4.

AMM N° : 569/17 DMP/21

LOT : 22025

PER : 11/2024

PPU : 52,80 DH

medicament.

emandez plus

quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Voir la rubrique 4.

2. COMPOSITION D'AULCER 20 mg gélules gastro-résistantes :

*** Composition en substance active :**

AULCER 20 mg : chaque gélule contient 20 mg d'oméprazole.

Composition en excipient :

Les excipients sont : saccharose/ amidon de maïs, laurylsulfate de sodium, phosphate disodique, mannitol, hydroxypropyl méthylcellulose (hypromellose), polyéthylèneglycol 6000 (Macrogol), talc, polysorbate 80, dioxyde de titane (CI=77891, E-171), eudragitL30D55 (copolymères) Acrilil.

Liste des excipients à effet notoire :

Saccharose, polyéthylèneglycol (Macrogol) et mannitol.

3. CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE OU TYPE D'ACTIVITÉ

Oméprazole appartient à la classe des médicaments appelée « inhibiteurs de la pompe à protons ». Il diminue la quantité d'acide produite par votre estomac.

4. INDICATIONS THERAPEUTIQUES

AULCER® 20 mg, gélule gastro-résistante est utilisé pour traiter les affections suivantes :

Votre médecin vous dira combien de temps vous devez le prendre et de votre âge.

La dose habituelle est indiquée en ci-dessous.

Adultes :

Traitement des symptômes du reflux gastro-œsophagien (régurgitation acide) :

- Si votre médecin constate que votre état n'améliore pas avec la dose recommandée, il peut augmenter la dose à 40 mg (2 gélules de 20 mg) une fois par jour.
- Si votre œsophage n'a pas été endommagé par le reflux, la dose recommandée est de 20 mg une fois par jour.

Traitement des ulcères dans la paroi œsophagienne (œsophagite) :

- La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour. Votre médecin peut vous demander de prendre jusqu'à 40 mg (2 gélules de 20 mg) une fois par jour.

Traitement des ulcères de l'estomac (ulcère gastrique) :

- La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour. Votre médecin peut vous demander de prendre jusqu'à 40 mg (2 gélules de 20 mg) une fois par jour.
- Si l'ulcère n'est pas complètement cicatrisé, la dose peut être augmentée à 40 mg (2 gélules de 20 mg) une fois par jour.

Prévention de la récidive de l'ulcère gastrique :

- La dose recommandée est de 10 mg une fois par jour. Votre médecin peut augmenter la dose à 40 mg (2 gélules de 20 mg) une fois par jour.

Traitement de l'ulcère gastrique et du syndrome inflammatoire non stéroïdiens :

NOTICE : INFORMATION POUR L'UTILISATEUR

1. DENOMINATION :

AULCER 20 mg, gélules gastro-résistantes

Boîte de 14 et 28 gélules gastro-résistantes

DCI : oméprazole

Veuillez lire attentivement ce

- Gardez cette notice, vous pourrez en avoir besoin.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin.
- Ce médicament vous a été prescrit par un professionnel de la santé. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Voir la rubrique 4.

AMM N° : 569/17 DMP/21

LOT : 22025

PER : 11/2024

PPU : 52,80 DH

médicament.

emandez plus

de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Voir la rubrique 4.

2. COMPOSITION D'AULCER 20 mg gélules gastro-résistantes :

• Composition en substance active :

AULCER 20 mg : chaque gélule contient 20 mg d'oméprazole.

Composition en excipient :

Les excipients sont : saccharose/ amidon de maïs, laurylsulfate de sodium, phosphate disodique, mannitol, hydroxypropyl méthylcellulose (hypromellose), polyéthylèneglycol 6000 (Macrogol), talc, polysorbate 80, dioxyde de titane (CI=77891, E-171), eudragitL30D55 (copolymères) Acrilil.

Liste des excipients à effet notoire :

Saccharose, polyéthylèneglycol (Macrogol) et mannitol.

3. CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE OU TYPE D'ACTIVITÉ

Oméprazole appartient à la classe des médicaments appelée « inhibiteurs de la pompe à protons ». Il diminue la quantité d'acide produite par votre estomac.

4. INDICATIONS THERAPEUTIQUES

AULCER® 20 mg, gélule gastro-résistante est utilisé pour traiter les affections suivantes :

Votre médecin vous dira combien de temps vous devez le prendre et de votre âge.

La dose habituelle est indiquée en ci-dessous.

Adultes :

Traitement des symptômes du reflux gastro-œsophagien (régurgitation acide) :

• Si votre médecin constate que votre état n'améliore pas avec la dose recommandée, il peut augmenter la dose à 20 mg par jour. Votre médecin peut vous demander de prendre ce médicament pendant plusieurs semaines supplémentaires si votre état n'améliore pas.

• La dose usuelle une fois que votre état s'améliore est de 20 mg par jour.

• Si votre œsophage n'a pas été endommagé, il peut être nécessaire de prendre ce médicament une fois par jour.

Traitement des ulcères dans la paroi œsophagienne (œsophagite) :

• La dose recommandée est de 20 mg par jour. Votre médecin peut vous demander de prendre ce médicament pendant plusieurs semaines supplémentaires si votre ulcère n'est pas complètement guéri.

• Si l'ulcère n'a pas été complètement guéri, il peut être nécessaire de prendre ce médicament une fois par jour.

Traitement des ulcères de l'estomac (œsophagite) :

• La dose recommandée est de 20 mg par jour. Votre médecin peut vous demander de prendre ce médicament pendant plusieurs semaines supplémentaires si votre ulcère n'est pas complètement guéri.

• Si l'ulcère n'est pas complètement guéri, il peut être nécessaire de prendre ce médicament une fois par jour.

Prévention de la récidive de l'ulcère gastrique :

• La dose recommandée est de 10 mg par jour. Votre médecin peut augmenter la dose à 20 mg (2 gélules) si nécessaire.

Traitement de l'ulcère gastrique et des maladies inflammatoires non stéroïdiennes (MINS) :



NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Depo-Medrol®

80 mg/2 ml*

Suspension Injectables

acétate de méthylprednisolone



FW4134
08/2026
P.P.V:37DH70

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que Depo-Medrol et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Depo-Medrol ?

Allaitement

L'utilisation de ce médicament n'a pas été étudiée dans l'accord avec votre médecin.

Fertilité

Les études menées chez

Conduite de véhicules

Des sensations vertigineuses indésirables possibles après un effet indésirable rare. Si vous en ressentez, ne conduisez pas de véhicule.

3. Comment utiliser

ZYRTEC® 10 mg, comprimé pelliculé sécable
ZYRTEC® 10 mg/ml, solution buvable en gouttes
ZYRTEC® 1 mg/ml, solution buvable en flacon

Dichlorhydrate de cétirizine

763,20

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la re
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un dout
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. N
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarqu

nédecin ou à votre pharmacien.

même en cas de symptômes identiques, cela pourra inné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE ZYRTEC ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ZYRTEC ?
3. COMMENT PRENDRE ZYRTEC ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER ZYRTEC ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE ZYRTEC ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Le dichlorhydrate de cétirizine est la substance active de ZYRTEC.

ZYRTEC est un médicament antihistaminique utilisé dans le traitement de l'allergie.

ZYRTEC solution buvable en gouttes et Zyrtec solution buvable en flacon sont indiqués chez l'adulte et l'enfant à partir de 2 ans :
ZYRTEC comprimé est indiqué chez l'adulte et l'enfant à partir de 6 ans :

- Pour le traitement des symptômes nasaux et oculaires de la rhinite allergique saisonnière ou perannuelle.
- Pour le traitement des symptômes de l'urticaire.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ZYRTEC ?

Ne prenez jamais ZYRTEC

- Si vous avez une maladie grave des reins (insuffisance rénale sévère avec une clairance de la créatinine inférieure à 10 ml/min).
- Si vous êtes allergique au dichlorhydrate de cétirizine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (voir rubrique 6 INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES), à l'hydroxyzine ou aux dérivés de la pipérazine (substances actives apparentées contenues dans d'autres médicaments).

No-Spa® Forte 80mg

Chlorhydrate de drotavérine

Comprimé

Veuillez lire attentivement cette notice
prendre ce médicament car elle contient
des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament scrupuleusement les informations fournies par votre médecin ou votre pharmacien. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après quelques jours.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que No-Spa forte comprimé et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre No-Spa forte comprimé ?
3. Comment prendre No-Spa forte comprimé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver No-Spa forte comprimé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE NO-SPA FORTE COMPRIME ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE ?

No-Spa forte comprimé est un antispasmodique. Il peut être utilisé dans les situations suivantes :

- Spasmes des muscles lisses associés à des troubles d'origine biliaire : calcul biliaire, inflammation de la vésicule biliaire ou des voies biliaires.
- Spasmes des muscles lisses associés à des troubles d'origine urinaire : calcul urinaire (dans les reins ou les uretères), pyérite (inflammation du bassinet), cystite (inflammation de la vessie), ténèse vésical (tension douloureuse de la vessie avec sensation de brûlure et envie continue d'uriner).
- Traitement d'appoint des troubles suivants :
 - spasmes des muscles lisses associés à des troubles d'origine digestive : ulcère gastrique (de l'estomac) ou ulcère

LOT : 21E020
PER : 09

NO - SPA FORTE 80MG

CP 820

P.P.V : 45DH00



5 118000 061816

duodénal (du duodénum), inflammation de la muqueuse gastrique, spasmes du sphincter (anneau musculaire) cardia ou du pylore (orifice supérieur ou inférieur de l'estomac), inflammation de l'intestin grêle ou du grêle

x de tête appelés des « céphalées de tension » écologiques : règles douloureuses ou crampes

T LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE NO-SPA FORTE COMPRIME ?

is No-Spa forte comprimé :

- si vous êtes allergique à la drotavérine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique informations supplémentaires).
- si vous avez une maladie grave du foie, des reins ou du cœur.

Faites attention avec No-Spa forte comprimé :

Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre No-Spa forte comprimé.

Ce médicament doit être utilisé avec prudence chez les patients présentant une tension artérielle basse (hypotension).

Utilisation d'autres médicaments

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament. L'utilisation simultanée de la drotavérine et de la lévodopa entraîne une diminution de l'effet de la lévodopa, à savoir l'atténuation des symptômes de la maladie de Parkinson, ainsi qu'une accentuation de la rigidité des muscles squelettiques des tremblements.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Grossesse :

Les études effectuées chez l'animal gravide et celles réalisées chez la femme enceinte n'ont pas mis en évidence d'effet délétère pour le foetus ou pour la mère. Si vous êtes enceinte, votre médecin déterminera si l'utilisation de ce médicament est pertinente pour vous.

Allaitement :

En l'absence de données cliniques suffisantes, l'utilisation de ce médicament n'est pas recommandée durant l'allaitement.

Fertilité :

Aucune donnée n'est disponible concernant un éventuel effet sur la fertilité chez l'homme.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

L'administration de No-Spa forte comprimé aux posologies habituelles n'a pas d'effet sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines. Cependant, en cas