

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Reclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

N° W21-659166

116502

<input checked="" type="checkbox"/> Maladie	<input type="checkbox"/> Dentaire	<input type="checkbox"/> Optique	<input type="checkbox"/> Autres
Cadre réservé à l'adhérent(e)			
Matricule :	0836	Société :	
<input type="checkbox"/> Actif	<input checked="" type="checkbox"/> Pensionné(e)	<input type="checkbox"/> Autre :	
Nom & Prénom : JAMAL FASINE DOURA ZED			
Date de naissance : 01/01/1943			
Adresse : 49 RUE MY IDRISSE EL AZHAR - BERRECHIDA			
Tél. : 06.41.44.46.65	Total des frais engagés : 252,20 Dhs		

Cadre réservé au Médecin			
Cachet du médecin :			
A.L.D.			
Date de consultation :			
Nom et prénom du malade :			
Lien de parenté : <input checked="" type="checkbox"/> Lui-même <input type="checkbox"/> Conjoint <input type="checkbox"/> Enfant			
Nature de la maladie :			
En cas d'accident préciser les causes et circonstances :			
Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.			

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : BERRECHIDA

Le : 11/04/2022

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
.....	INP : <input type="checkbox"/>
.....	
.....	
.....	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	11.04.2022	120,10
	06.05.2022	126,13

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important:

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP : <input type="text"/>																
				COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>																
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>																
				DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/>																
				FIN D'EXECUTION <input type="text"/>																
O.D.F PROTHESES DENTAIRES		DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE																		
		<table border="1"> <tr><td colspan="2">H</td></tr> <tr><td>25533412</td><td>21433552</td></tr> <tr><td>00000000</td><td>00000000</td></tr> <tr><td colspan="2">G</td></tr> <tr><td colspan="2">00000000</td></tr> <tr><td colspan="2">35533411</td></tr> <tr><td colspan="2">11433553</td></tr> <tr><td colspan="2">B</td></tr> </table>		H		25533412	21433552	00000000	00000000	G		00000000		35533411		11433553		B		COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>
H																				
25533412	21433552																			
00000000	00000000																			
G																				
00000000																				
35533411																				
11433553																				
B																				
		<p>[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Therapeutique, nécessaire à la profession</p>		MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>																
				DATE DU DEVIS <input type="text"/>																
				DATE DE L'EXECUTION <input type="text"/>																

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

HARMACIE 2000

LALLA ZINEB KADIRI

05 22 53 36 05

22 boulevard mohammed 5 , berrechid

**JAMALEDDINE MOHAMED**

Maroc

Facture N° 20220509-443

Date de vente : 11/04/2022

Médecin traitant :

Produit	Qté.	P.U	TVA	Total
COSOPT CL 20MG/5MG 5ML COLLYRE	1	126,10	TVA (7.00%)	126,10

Total HT	117,85 DHS
TVA	8,25 DHS
Total	126,10 DHS

Arrêté la présente facture à la somme de : cent vingt-six DHS et dix centimes

PHARMACIE 2000
DT. KADIRI LALLA ZINEB
22, Bd. Mohamed V (Pré de la mosquée CHOUR
Berrechid
Tél : 05 22 53 36 05 / 06 01 65 62 50
Instagram : Pharmacie_2000

IF : 70742700 RC : 12920 ICE : 000510808000032
Tel : 05 22 53 36 05 RIB : ATTIJARI WAFA BANK 007780000364200000011923
Adresse : 22 boulevard mohammed 5 , berrechid

**COSOPT® 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre et
Boîte de 1 flacon de 5 ml**
Dorzolamide/Timolol

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser le produit.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui faire mal.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez quelque chose de suspect, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution ?

3. COMMENT UTILISER COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution ?

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

5. COMMENT CONSERVER COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution ?

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

COSOPT est utilisé pour diminuer une pression oculaire accrue et soigner le glaucome. Le glaucome est une maladie qui entraîne une pression potentiellement élevée du liquide présent dans l'œil. Toutefois, certaines personnes atteintes peuvent présenter une pression oculaire normale. D'autre part, une pression accrue dans l'œil n'induit pas nécessairement un glaucome.

Le glaucome est généralement causé par une accumulation du liquide qui circule dans l'œil. Cette accumulation est due à une élimination trop lente du liquide oculaire par rapport à sa sécrétion : du liquide continue à rejoindre le liquide déjà présent dans l'œil et la pression ne cesse d'augmenter. Cette hausse de pression peut endommager la partie arrière de l'œil et réduire ainsi progressivement la vue. Cette baisse progressive de la vue peut se faire si lentement que la personne ne s'en rend pas compte. Il arrive même parfois qu'une pression oculaire normale soit liée à des dommages dans la partie arrière de l'œil.

Généralement, le glaucome n'occasionne aucun symptôme. Le seul moyen de détecter un glaucome est de procéder à un examen de la pression oculaire, du nerf optique et du champ visuel auprès d'un ophtalmologue. Un glaucome non soigné peut entraîner des problèmes graves. Vous pouvez ne présenter aucun symptôme, mais le glaucome peut finir par provoquer la cécité. En réalité, c'est l'une des causes les plus fréquentes de la cécité.

Bien que COSOPT aide à lutter contre le glaucome, il ne s'agit pas d'un traitement curatif. COSOPT contient deux substances actives : le chlorhydrate de dorzolamide et le maléate de timolol. Ces deux substances actives réduisent la pression intraoculaire en diminuant la production de liquide, chacune de manière différente.

Le chlorhydrate de dorzolamide appartient à un groupe de médicaments appelé inhibiteurs de l'anhydrase carbonique. Le maléate de timolol appartient à un groupe de médicaments appelé bêta-bloquants.

COSOPT ne crée pas de dépendance.

LOT U031803 2

EXP 07 2023

PPV 126.10 DH

main, tenez le flacon à l'envers, en plaçant votre pouce sur le poussoir.

main, tirez doucement la paupière inférieure pour former une cuvette.



2. Placez l'embout du flacon près de la paupière inférieure. Évitez tout contact avec la tête en arrière et regardez vers le haut.

3. Placez l'embout du flacon près de la paupière inférieure. Évitez tout contact avec la tête en arrière et regardez vers le haut. Laissez une goutte tomber dans la cuvette formée entre l'œil et la paupière inférieure. Évitez tout contact avec la tête en arrière et regardez vers le haut.

4. Fermez l'œil pendant quelques instants. Ne clignez pas des yeux, ne vous égouttez pas. 10. En gardant l'œil fermé, placez l'index dans le coin interne de l'œil et appuyez dessus pendant deux minutes environ. Cela empêche le médicament de couler vers le nez et la gorge, où il pourrait être absorbé par d'autres parties du corps. Veuillez demander à votre pharmacien pour obtenir plus d'informations sur cette méthode.

11. Replacez le bouchon pour fermer le flacon hermétiquement. Ne serrez pas trop fort. 12. Lavez-vous à nouveau les mains à l'eau et au savon pour éliminer les résidus de collyre. Attendez au moins 15 minutes avant de remettre vos lentilles de contact. Veuillez à éviter tout contact de l'embout compte-gouttes avec l'œil, la paupière inférieure ou toute autre partie pour ne pas contaminer le collyre.

La contamination du collyre peut donner lieu à une infection oculaire. Après l'instillation du collyre, il est possible de ressentir une sensation de brûlure ou de picotement. Consultez votre pharmacien ou votre pharmacien si cette sensation est réellement gênante.

Durée d'utilisation

COSOPT aide à contrôler la maladie, mais ne la guérit pas. COSOPT doit être utilisé tous les jours. Continuez d'utiliser COSOPT tant que votre pharmacien vous le prescrira.

Si vous avez utilisé plus de COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution

Si vous pensez que vous, ou une autre personne, avez avalé le contenu du flacon entièrement ou partiellement, ou avez utilisé plus de gouttes qu'il ne faut, contactez immédiatement votre pharmacien ou le Centre Anti-poison, ou une autre personne qui peut vous aider.

En cas d'ingestion accidentelle de COSOPT ou de surdosage, il se peut que vous ressentiez des étourdissements ou des vertiges, une perte de connaissance, un pouls très lent ou des difficultés à respirer.

HARMACIE 2000

LALLA ZINEB KADIRI

05 22 53 36 05

22 boulevard mohammed 5 , berrechid



Facture N° 20220509-824

JAMALEDINE MOHAMED

Maroc

Date de vente : 06/05/2022
Médecin traitant :

Produit	Qté.	P.U	TVA	Total
COSOPT CL 20MG/5MG 5ML COLLYRE	1	126,10	TVA (7.00%)	126,10

Total HT	117,85 DHS
TVA	8,25 DHS
Total	126,10 DHS

Arrêté la présente facture à la somme de : cent vingt-six DHS et dix centimes


PHARMACIE 2000
Dr. KADIRI LALLA ZINEB
22. Bd. Mohamed V (Près de la Mosquée OHDAD)
Berrechid
Tél : 05 22 53 36 05 / 05 22 01 65 62 50
Instagram: Pharmacie_2000

IF : 70742700 RC 12920 ICE : 000510808000032
Tel : 05 22 53 36 05 RIB : ATTIJARI WAFA BANK 0077800036420000011923
Adresse : 22 boulevard mohammed 5 , berrechid

**COSOPT® 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre et
Boîte de 1 flacon de 5 ml**
Dorzolamide/Timolol

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser le produit.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui faire mal.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez quelque chose de suspect, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution ?

3. COMMENT UTILISER COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution ?

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

5. COMMENT CONSERVER COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution ?

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

COSOPT est utilisé pour diminuer une pression oculaire accrue et soigner le glaucome. Le glaucome est une maladie qui entraîne une pression potentiellement élevée du liquide présent dans l'œil. Toutefois, certaines personnes atteintes peuvent présenter une pression oculaire normale. D'autre part, une pression accrue dans l'œil n'induit pas nécessairement un glaucome.

Le glaucome est généralement causé par une accumulation du liquide qui circule dans l'œil. Cette accumulation est due à une élimination trop lente du liquide oculaire par rapport à sa sécrétion : du liquide continue à rejoindre le liquide déjà présent dans l'œil et la pression ne cesse d'augmenter. Cette hausse de pression peut endommager la partie arrière de l'œil et réduire ainsi progressivement la vue. Cette baisse progressive de la vue peut se faire si lentement que la personne ne s'en rend pas compte. Il arrive même parfois qu'une pression oculaire normale soit liée à des dommages dans la partie arrière de l'œil.

Généralement, le glaucome n'occasionne aucun symptôme. Le seul moyen de détecter un glaucome est de procéder à un examen de la pression oculaire, du nerf optique et du champ visuel auprès d'un ophtalmologue. Un glaucome non soigné peut entraîner des problèmes graves. Vous pouvez ne présenter aucun symptôme, mais le glaucome peut finir par provoquer la cécité. En réalité, c'est l'une des causes les plus fréquentes de la cécité.

Bien que COSOPT aide à lutter contre le glaucome, il ne s'agit pas d'un traitement curatif. COSOPT contient deux substances actives : le chlorhydrate de dorzolamide et le maléate de timolol. Ces deux substances actives réduisent la pression intraoculaire en diminuant la production de liquide, chacune de manière différente.

Le chlorhydrate de dorzolamide appartient à un groupe de médicaments appelé inhibiteurs de l'anhydrase carbonique. Le maléate de timolol appartient à un groupe de médicaments appelé bêta-bloquants.

COSOPT ne crée pas de dépendance.

LOT U031803 2

EXP 07 2023

PPV 126.10 DH

main, tenez le flacon à l'envers, en plaçant votre pouce sur le poussoir.

main, tirez doucement la paupière inférieure pour former une cuvette.



2. Placez l'embout du flacon près de la paupière inférieure. Évitez tout contact avec la tête en arrière et regardez vers le haut.

3. Placez l'embout du flacon près de la paupière inférieure. Évitez tout contact avec la tête en arrière et regardez vers le haut. Laissez une goutte tomber dans la cuvette formée entre l'œil et la paupière inférieure. Évitez tout contact avec la tête en arrière et regardez vers le haut.

4. Fermez l'œil pendant quelques instants. Ne clignez pas des yeux, ne vous égouttez pas. 10. En gardant l'œil fermé, placez l'index dans le coin interne de l'œil et appuyez dessus pendant deux minutes environ. Cela empêche le médicament de couler vers le nez et la gorge, où il pourrait être absorbé par d'autres parties du corps. Veuillez demander à votre pharmacien pour obtenir plus d'informations sur cette méthode.

11. Replacez le bouchon pour fermer le flacon hermétiquement. Ne serrez pas trop fort. 12. Lavez-vous à nouveau les mains à l'eau et au savon pour éliminer les résidus de collyre. Attendez au moins 15 minutes avant de remettre vos lentilles de contact. Veuillez à éviter tout contact de l'embout compte-gouttes avec l'œil, la paupière inférieure ou toute autre partie pour ne pas contaminer le collyre.

La contamination du collyre peut donner lieu à une infection oculaire. Après l'instillation du collyre, il est possible de ressentir une sensation de brûlure ou de picotement. Consultez votre pharmacien ou votre pharmacien si cette sensation est réellement gênante.

Durée d'utilisation

COSOPT aide à contrôler la maladie, mais ne la guérit pas. COSOPT doit être utilisé tous les jours. Continuez d'utiliser COSOPT tant que votre pharmacien vous le prescrira.

Si vous avez utilisé plus de COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution

Si vous pensez que vous, ou une autre personne, avez avalé le contenu du flacon entièrement ou partiellement, ou avez utilisé plus de gouttes qu'il ne faut, contactez immédiatement votre pharmacien ou le Centre Anti-poison, ou une autre personne qui peut vous aider.

En cas d'ingestion accidentelle de COSOPT ou de surdosage, il se peut que vous ressentiez des étourdissements ou des vertiges, une perte de connaissance, un pouls très lent ou des difficultés à respirer.